



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

B

3 9015 00222 826 3

University of Michigan - BUHR



4th
R.

610.5
a 67
w 8



Lindig Photo

ARCHIV

FÜR

WISSENSCHAFTLICHE UND PRAKTISCHE

THIERHEILKUNDE.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. C. F. MÜLLER UND PROF. DR. J. W. SCHÜTZ,
LEHRER DER KÖNIGL. THIERARZNEISCHULE ZU BERLIN.

Zwölfter Band.

Mit einem Portrait, 6 lithographirten Tafeln und 1 Holzschnitt.

BERLIN, 1886.

Verlag von August Hirschwald.

NW. Unter den Linden 63.



Inhalt des zwölften Bandes.

	Seite
Friedrich Heinrich Roloff †. Nekrolog. Mit Portrait	I—XXIV
Erstes Heft.	
I. Eichbaum , Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Clitoris der weiblichen Hausthiere. (Hierzu Taf. I u. II.)	1
II. Schüts , Ueber den Rothlauf der Schweine und die Impfung desselben (Fortsetzung)	30
III. Frick , Ueber Antipyrin	52
Esser u. Schüts , Mittheilungen aus den amtlichen Veterinär-Sanitätsberichten Berichtsjahr 1883/84	65
Referate und Kritiken.	
Seuchenhaftes Auftreten von Ergotismus. First annual report of the bureau of animal industry for the year 1884. (Lüpke)	79
Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in den Niederlanden während des Jahres 1884. (Niederl. Veter.-Ber. 1884) (Müller)	81
Hermann Eulenberg, Ueber die im Jahre 1884 in Preussen auf Trichinen und Finnen untersuchten Schweine. (Preusse)	87
L. Pasteur, Méthode pour prévenir la rage après morsure. (Lüpke)	89
Friedrich Eichbaum, Grundriss der Geschichte der Thierheilkunde. (Eggeling)	91
Personal-Notizen	93
Zweites Heft.	
IV. Müller , Eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Oxyhäoglobins im Blute der Haussäugethiere	97
V. Ellenberger und Hofmeister , Die Magenverdauung der Schweine	126
VI. Ellenberger , Beitrag zu der Lehre von den Kernkörperchen	147
Kleinere Mittheilungen	150
Blausäurevergiftung bei Schafen. Von Kr.-Th. Renner in Cresfeld	150
Personal-Notizen	154
Drittes und viertes Heft.	
VII. Schmalts , Die Purkinje'schen Fäden im Herzen der Haussäugethiere. (Hierzu Taf. III u. IV.)	161
VIII. Schüts , Ueber die Schweineseuche. (Hierzu Taf. V.)	210
IX. Ellenberger u. Hofmeister , Ueber die Aufenthaltszeiten der aufgenommenen Nahrung im Darmcanal der Schweine und die Reactionsverhältnisse des Darminhalts dieser Thiere	271
X. Nasse , Die Wirkung der Galle auf rohes und gekochtes Stärkemehl	277
Esser u. Schüts , Mittheil. aus den amtl. Vet.-Sanitätsber. 1883/84. (Fortsetzung)	279
Referate und Kritiken:	
Vulpian, Recherches experimentales sur l'excitabilité électrique du cerveau proprement dit. — Sur les différences qui paraissent présenter les diverses régions de l'écorce grise cérébrale, dites centres psycho-moteurs sous le rapport de leur excitabilité. — Recherches relatives à la durée de l'excitabilité des régions excito-motrices du cerveau proprement dit après la mort. (Frick)	297
Vulpian, Recherches experimentales concernant: I Les attaques épileptiformes provoquées par l'électrisation des régions excito-motrices du cerveau proprement dit. — Expériences relatives aux phénomènes qui se produisent dans le domaine de la vie organique pendant les attaques d'épilepsie. (Lüpke)	299
Vanlair, Nouvelles recherches sur la régénération des nerfs périphériques. (Frick)	300
Boucheron, De l'acide urique dans la salive et dans le mucus nasal, pharyngeal, bronchique, utéro-vaginal. (Frick)	301

	Seite
Villiers, Sur les urines pathologiques. (Lüpke)	302
Billet, Sur les Bacterium ureae. (Lüpke)	302
Daresté, Sur le rôle physiologique du retournement des oeufs	
Dammann, Die Gesundheitspflege der landwirthschaftlichen Haus-	
säugethiere. (Schmaltz)	303
Leisering und Hartmann, Der Fuss des Pferdes in Rücksicht	
auf Bau, Verrichtungen und Hufbeschlag. (Peters)	305
Schaefer, Der Pferdefreund. Monatsblätter für Pferdezüchter und	
Pferdeliebhaber. (Eggeling)	306
Personal-Notizen	307
Fünftes und sechstes Heft.	
XI. Müller, Bericht über die Königl. Thierarzneischule zu Berlin 1885/86.	313
XII. Ellenberger u. Hofmeister, Ueber die Verdauungssäfte und die Verdauung	
des Pferdes	332
XIII. Hertwig, Ueber den Actinomyces musculorum der Schweine (Mit 1 Tafel.)	365
XIV. Sücker, Mittheilungen aus dem pathologischen Institut der Kgl. Thier-	
arzneischule zu Berlin	373
XV. Fröhner, Ueber perniciöse Anämie beim Pferde	383
XVI. Frick, Anwendung der Magenpumpe beim Hunde und einige Schlund-	
operationen bei demselben	394
Esser u. Schütz, Mittheilungen aus den amtlichen Veterinär-Sanitätsberichten.	
1883/84. (Schluss)	398
Referate und Kritiken.	
Die 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte	413
Annual Report of the Agricultural Department of the Privy Council	
Office for the year 1885. (Lüpke)	417
Die Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in den Nieder-	
landen während des Jahres 1885. (Müller)	422
Salmon, Dr., Ueber die Hog cholera. (Lüpke)	425
Amtlicher Bericht über die Viehzucht in der Australischen Kolonie.	
New South Wales für das Jahr 1885. (Müller)	427
Ellenberger, Prof. Dr. W., Lehrbuch der allgemeinen Therapie	
der Haussäugethiere. (Fröhner)	428
Arnold, Dr. C., Pharmakognosie, pharmaceutisch chemische Prä-	
parate und Receptirkunde. (Fröhner)	433
Schlamp, K. W., Das Dispensirrecht der Thierärzte, nebst den	
für Thierärzte wissenswerthen Abschnitten der Apotheker-Ge-	
setzgebung (Fröhner)	433
Anleitung zur Kenntniss u. Gesundheitspflege des Pferdes. Von	
E. Zschocke, Professor an der Thierarzneischule in Zürich.	
(Frick)	434
Der Hufschmid. Zeitschrift für das gesammte Hufbeschlagwesen.	
Redigirt v. A. Lungwitz, Vorstand der Beschlagschmiede in	
Dresden. (Möller)	434
Veterinär Receptir- und Dispensirkunde. Von G. A. Müller-	
Flöha. (Frick)	435
Die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Tri-	
chinen und Finnen. Rathgeber für Fleischbeschauer in popu-	
lärer Darstellung. Von Dr. C. Rollier, Kgl. Kreiswundarzt in	
Trier. (Lüpke)	435
Kleinere Mittheilungen.	
Leukämie bei einer Kuh. Von Kreisthierarzt Preusse in Obornik	436
Heilung einer durchschnittenen Achillessehne. Von Kreisthierarzt	
Mertens in Sangerhausen	439
Personal-Notizen	441
Literatur	446
Erklärung	449

Friedrich Heinrich Roloff †.

Der Herausgeber dieses Archivs, Geheime Medicinalrath, Professor Dr. Friedrich Heinrich Roloff, Director der Berliner Thierarzneischule, ist am 22. December 1885 nach längerer Krankheit gestorben. In ihm verliert die thierärztliche Wissenschaft einen ihrer hervorragendsten Vertreter, die Thierarzneischule den Director, welcher fast volle acht Jahre hindurch so erfolgreich für deren weitere Vervollkommnung thätig gewesen ist, und eine ausgezeichnete Lehrkraft, Alle, welche ihm näher standen, einen treuen Freund. An seinem Sarge trauern die Wittve und drei noch unmündige Kinder.

Dieser Zeitschrift, deren vierten bis elften Jahrgang der Verewigte herausgegeben hat, fällt zunächst die ehrenvolle Pflicht zu, ihren Lesern ein Bild von der vielseitigen Thätigkeit des Hingeschiedenen und eine Darstellung des an Arbeit, aber auch an Erfolgen und Ehren reichen Lebens zu geben, welches nunmehr sein irdisches Ziel erreicht hat.

Friedrich Heinrich Roloff wurde am 19. Mai 1830 als ältester Sohn des Mühlenbesitzers und Landwirthes Heinrich Roloff in Badersleben, Kreis Oschersleben, geboren. Er besuchte bis zu seinem elften Lebensjahre die Dorfschule seines Heimathsortes, wurde jedoch durch Privatunterricht von Seiten des Ortspfarrers soweit ausgebildet, dass er October 1841 in die vierte Klasse der damaligen Martini-Schule (höheren Bürgerschule) zu Halberstadt aufgenommen werden konnte. Er bestand, nachdem er zwei Jahre die Prima derselben Schule besucht hatte, am 22. Mai 1846 mit Auszeichnung die Abiturientenprüfung. Seiner Absicht, sich sofort dem Studium der Thierheilkunde zu widmen, stand die Bestimmung entgegen, nach welcher die Eleven der Thierarzneischule in Berlin erst im Alter von 18 Jahren aufgenommen werden konnten. Die an diesem Alter noch fehlende

Zeit füllte Roloff dadurch aus, dass er ein Jahr lang im Bureau des Landrathsamtes in Dardesheim arbeitete und sechs Monate lang bei einem Schmied in Schlanstedt den Hufbeschlag erlernte. Als ein Zeichen des Fleisses und des Eifers, welchen er das ganze Leben hindurch bekundete, mag an dieser Stelle angeführt werden, dass er den eine Stunde weiten Weg von Badersleben nach Dardesheim täglich hin und zurück zu Fuss gemacht hat.

Von October 1847 bis Ostern 1851 besuchte Roloff als Civileleve die Thierarzneischule in Berlin, hörte auch während seines Studiums bereits einige Vorlesungen an der Universität. Er bestand Ostern 1851 die Fachprüfung mit der Censur „sehr gut“ und liess sich zunächst bis zum Herbst 1851 als Thierarzt in seinem Heimathsorte nieder. Aus Rücksicht auf einen älteren, seit längerer Zeit in der Nähe von Badersleben ansässigen Thierarzt verlegte er seinen Wohnort sodann nach dem Städtchen Calbe a. Milde in der Altmark. Nach einem Jahre verliess er den zuletzt genannten Ort wieder, um sich in Gröningen bei Halberstadt niederzulassen, woselbst er bis zum November 1859, sieben Jahre lang, eine sehr umfangreiche Praxis betrieb und unter anderen auch zuerst seine reichen Erfahrungen über die Lungenseuche gesammelt hat.

Gegen Ende des Jahres 1855 hatte Roloff die kreisthierärztliche Prüfung mit der Censur „sehr gut“ bestanden; jedoch erst fast drei Jahre später, im November 1858, wurde ihm durch Ernennung zum Kreisthierarzt der Kreise Steinfurt und Tecklenburg, Reg.-Bez. Münster, die erste amtliche Stellung übertragen. Die gänzlich ungewohnten wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse dieses westfälischen Bezirkes und der Wunsch nach Begründung eines dauernden Wohnsitzes in der heimathlichen Provinz Sachsen veranlassten Roloff bereits nach Ablauf eines Jahres, seine Versetzung nach dem Kreise Liebenwerda, Reg.-Bez. Merseburg, zu beantragen. Als Kreisthierarzt des letzteren mit dem Wohnsitz in Mühlberg a. E. ist er vom November 1859 bis zum April 1862 angestellt gewesen.

Nach elfjähriger Thätigkeit als praktischer Thierarzt und dreieinhalb Jahre nach seiner Anstellung als Kreisthierarzt wurde Roloff am 1. April 1862 als Repetitor und Assistent des klinischen Lehrers an die Berliner Thierarzneischule berufen, in welcher Stellung er bis zum Sommer 1865 verblieb. Er benutzte diese Zeit nicht nur zu eingehenden anatomischen, histologischen und pathologisch-anatomischen Studien, zu denen ihm die Anstalt Gelegenheit bot, sondern auch,

um zahlreiche Vorlesungen an der Universität zu hören. Mit besonderem Eifer besuchte er die Vorträge und Demonstrationen der Professoren Virchow und Frerichs; fast ohne Unterbrechung hat er die ganzen drei Jahre von 1862 bis 1865 in dem von Virchow geleiteten pathologisch-anatomischen Institut gearbeitet. Die zuletzt genannten Studien haben jedenfalls am meisten bestimmend auf die spätere Lehr- und Forschungsthätigkeit des Verewigten eingewirkt und die Grundlage für seine späteren Leistungen abgegeben. Schon in der Stellung als Repetitor gelang es Roloff, die Früchte seines Studiums zum Besten der Thierarzneischule zu verwerthen und einen, weitere Fortschritte anbahnenden Einfluss auf den klinischen Unterricht an derselben zu gewinnen.

Im April 1863 erwarb Roloff nach Ablegung der damals für diesen Zweck vorgeschriebenen Prüfungen das Fähigkeitszeugniss zur Anstellung als Departementsthierarzt.

Im Sommer 1865 folgte Roloff einem Rufe als Docent an dem von Jahr zu Jahr unter Kühn's Leitung immer mehr aufblühenden landwirthschaftlichen Institut der Universität zu Halle. Er wurde zunächst zum Lector an derselben ernannt. In derselben Zeit war ihm auf Grund einer Dissertation „Ueber den Instinct der Thiere“ von der Universität in Göttingen das Diplom als Doctor der Philosophie ertheilt worden. Schon im nächsten Jahre — am 20. December 1866 — erfolgte seine Ernennung zum ausserordentlichen Professor. Neben seinem Lehramte bekleidete er von 1865 an die Stelle eines Kreisthierarztes für den Stadtkreis Halle und für den Saalkreis, bis ihm 1873 ausserdem noch die Stelle als Departementsthierarzt des Reg.-Bez. Merseburg übertragen wurde. In den genannten Stellungen ist er bis zum Herbst 1876 verblieben.

In den elf Jahren seines Wirkens in Halle entfaltete Roloff die vielseitigste Thätigkeit. Seine Stellung als alleiniger thierärztlicher Docent an dem frequentirtesten landwirthschaftlichen Institut des Staates legte ihm die Verpflichtung auf, sich mit sämmtlichen Fächern der Veterinärmedizin, mithin auch mit solchen zu beschäftigen, welche, wie z. B. die normale Anatomie, seinen Neigungen weniger entsprachen. Er hatte zahlreiche Vorlesungen und Demonstrationen zu halten, welche zu den besuchtesten des Instituts gehörten und eine besonders sorgfältige Vorbereitung erforderten, weil die Lehrgegenstände den Bedürfnissen der landwirthschaftlichen Zuhörer angepasst werden mussten. Mit welchem Erfolge er diesen Anforderungen

seiner Lehrthätigkeit genügte, dafür liefern die Hochachtung und die allgemeine Anerkennung seiner Verdienste von Seiten sämmtlicher Universitätsprofessoren in Halle, die von ihm abgelehnten Berufungen an die Thierarzneischulen in Giessen, Zürich, Bern, bezw. an die landwirthschaftlichen Institute in Leipzig und Jena, und die treue Anhänglichkeit seiner Zuhörer den besten Beweis. Die Landwirthe, welche Roloff's Vorlesungen in Halle besucht hatten, sahen in ihm fort und fort auch noch lange Zeit, nachdem sie in das praktische Leben getreten waren, den besten Berather in den verschiedenartigsten, die Veterinärmedizin und Thierzucht betreffenden Fragen. Die umfangreiche, durch die Bitten um Belehrung von Seiten ehemaliger Zuhörer in Halle veranlasste Correspondenz nahm einen nicht unbeträchtlichen Theil von der Zeit des Verewigten auch noch in den letzten Jahren seines Lebens in Anspruch.

Die Stellung in Halle brachte es mit sich, dass Roloff in bedeutendem Umfange an den Verhandlungen der landwirthschaftlichen Vereine in der Provinz Sachsen theilnehmen musste. Von dieser Thätigkeit geben die zahlreichen belehrenden Artikel, die Gutachten und Berichte Kunde, welche Roloff 1865—1876 in landwirthschaftlichen Journalen veröffentlicht hat. Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass von seinen Vorträgen und von seiner Betheiligung an den Debatten landwirthschaftlicher Vereine Vieles nicht gedruckt worden ist.

Die amtlichen Geschäfte als Kreis- und später auch als Departementsthierarzt erreichten zeitweise einen erheblichen Umfang und gaben vielfach Anlass zu zeitraubenden Reisen, namentlich während der Jahre, in welchen der Verewigte auch die kreisthierärztlichen Geschäfte des Kreises Merseburg und der beiden Mansfelder Kreise zu verwalten hatte, und zur Zeit, als 1870 und 1871 die Rinderpest in Deutschland eine bedeutende Verbreitung erlangte. Auch die Herzoglich Anhaltische Regierung hat Roloff die technische Leitung der Massregeln zur Unterdrückung der Rinderpest, welche in einigen Orten bei Dessau ausgebrochen war, übertragen und ihm als Zeichen der Anerkennung für seine erfolgreiche Thätigkeit das Ritterkreuz 1. Cl. des Ordens Albrechts des Bären verliehen.

Ausser der Lehrthätigkeit und den amtlichen Geschäften hatte Roloff häufig weite Reisen zu machen, um den Anforderungen einer umfangreichen consultativen Praxis nachzukommen. Er konnte und wollte dieselbe nicht zurückweisen, weil sie eng mit seiner Stellung an einem landwirthschaftlichen Institut zusammenhing, und weil sie

ihm vielfach Material zu weiteren Forschungen und Versuchen über ansteckende bezw. Herdekrankheiten der Hausthiere lieferte. Seine Bemühungen, die Behandlung kranker Thiere in Halle und Umgegend von der Hand zu weisen, waren häufig ohne Erfolg; das allgemeine Vertrauen zwang ihn nicht selten, auch diesen Geschäften einen Theil seiner Zeit zu opfern.

Trotz dieser rastlosen und vielseitigen Thätigkeit hat Roloff sich während seiner Stellung in Halle ununterbrochen mit wissenschaftlichen Forschungen und Versuchen beschäftigt. Ein namhafter Theil seiner umfangreichen Veröffentlichungen, unter diesen seine bahnbrechende und vielfach citirte Studie, „Die Lungenseuche-Impfung“, ist während der Halleschen Zeit erschienen. Ebenso geben die Artikel in Virchow's Archiv und in thierärztlichen Zeitschriften ein beredtes Zeugniß von seiner unermüdeten wissenschaftlichen Thätigkeit in den Jahren 1865—1876.

Am 25. October 1876 wurde Roloff zum Regierungsrath und ordentlichen Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes ernannt. Wie schwer ihm die Trennung von seinem Berufe in Halle fiel, beweist die Thatsache, dass er die ihm angebotene ehrenvolle Stelle zuerst ablehnte; seine Zuhörer in Halle gaben der Freude, den hochgeschätzten Docenten zu behalten, durch Ueberreichung einer reich ausgestatteten Adresse Ausdruck. Erst bei dem wiederholten Anbieten von Seiten der Reichsbehörde entschloss sich Roloff zur Annahme der Stellung im Gesundheitsamt, hauptsächlich um seine Arbeitskraft in Zukunft bestimmten Fächern widmen zu können und nicht — wie in Halle — genöthigt zu sein, sich mit allen thierärztlichen Disciplinen eingehend beschäftigen zu müssen. Die Uebersiedelung nach Berlin wurde ihm wesentlich dadurch erleichtert, dass das Königliche Ministerium für Landwirthschaft ihn gleichzeitig zum ordentlichen Mitglied der technischen Deputation für das Veterinärwesen und zum Departementsthierarzt für den Reg.-Bez. Potsdam ernannte und ihm auch die Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie an der Thierarzneischule übertrug. Auf diese Weise wurde Roloff in den Stand gesetzt, dauernd Fühlung mit der praktischen Thierheilkunde zu behalten, worauf er grosses Gewicht legte, und seine Lehrthätigkeit im Interesse des thierärztlichen Standes fortzusetzen.

Er hat als Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes an den vorbereitenden Berathungen des Nahrungsmittelgesetzes und des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr und Tilgung von Viehseuchen, einen

hervorragenden Antheil genommen und ist der einzige Thierarzt, welcher bisher als Commissarius der Reichsbehörde in den Verhandlungen des Reichstages das Wort ergriffen hat. Die Denkschriften über die Wirksamkeit der Instruction zum Rinderpestgesetz und über die Ausbrüche der Rinderpest in Deutschland während der Jahre 1870—1878 sind von Roloff verfasst. Gleich im ersten Jahre seiner Stellung im Gesundheitsamt konnte er seine Erfahrungen über die Rinderpest bei Bereisung der zahlreichen Ortschaften verwerthen, in denen diese Seuche während des Winters 1876/77 ausgebrochen war. Seine Anordnungen, in erster Linie seine Berichte über die Gefährlichkeit der Schlachtviehmärkte in den grossen Städten für die Verbreitung der Rinderpest, haben wesentlich beigetragen, den oben erwähnten umfangreichen Seuchenausbruch zu unterdrücken und die Wiederkehr ähnlicher Ausbrüche zu verhüten.

Nachdem der Director der Berliner Thierarzneischule, Geheimer Medicinalrath Professor Gerlach, am 29. August 1877 gestorben war, wurde Roloff nach längeren Verhandlungen, welche die Belassung seiner Stellung im Gesundheitsamt als Nebenamt erforderlich machte, am 6. April 1878 zuerst commissarisch und sodann am 22. Juli 1878 unter Beilegung des Charakters als Geheimer Medicinalrath definitiv zum Director der Berliner Thierarzneischule ernannt.

In den siebeneinhalb Jahren seines Directorats hat Roloff unausgesetzt für das Wohl und das Gedeihen der von ihm geleiteten Anstalt gesorgt und sich bemüht, die Einrichtungen derselben zu vervollkommen. Er ist stets den Wünschen des Lehrkörpers bezüglich der Bedürfnisse des Unterrichts mit der grössten Bereitwilligkeit entgegengekommen und hat in keinem Falle versucht, seine Autorität gegenüber abweichenden Anschauungen der Mitglieder des Lehrercollegiums, mit denen er ununterbrochen in guten collegialischen Verhältnissen blieb, geltend zu machen.

In den Verhandlungen der thierärztlichen Vereine, des Veterinärathes und in der thierärztlichen Presse ist während des Roloff'schen Directorats vielfach über die Vorzüge einer Rectoratsverfassung für die Thierarzneischulen vor dem in Preussen bestehenden Directorialsystem debattirt worden, niemals jedoch mit Gründen, welche aus der Amtsführung des Verewigten hergenommen waren. Mag man über die Vorzüge und Uebelstände des Directorialsystems noch so verschieden denken, so wird man doch nicht bestreiten können, dass dieselben unter allen Umständen auf das Genaueste mit der Persöu-

lichkeit des Directors zusammenhängen und in erster Linie von der Art abhängen müssen, in welcher der Director von der ihm verliehenen Autorität Gebrauch macht. Dass dem Director Roloff während seines Lebens auch von den enthusiastischen Verfechtern der Rectoratsverfassung niemals weder direct noch indirect ein Missbrauch seiner Amtsgewalt zur Erhöhung seines eigenen Ansehens und zum Nachtheil des Lehrkörpers der Thierarzneischule vorgeworfen worden ist, beweist wohl am sichersten, dass er sein Amt stets nur mit Rücksicht auf das Beste der Anstalt und des Lehrkörpers derselben geführt und in keinem Falle versucht hat, seine Persönlichkeit als die allein massgebende hinzustellen.

Dagegen sind nach Roloff's Tode in verschiedenen thierärztlichen Zeitschriften Stimmen laut geworden, welche dem Verewigten vorwerfen, dass von ihm keine nennenswerthen Leistungen zur Förderung der Lehranstalt, welche seiner Leitung anvertraut war, und des thierärztlichen Standes hervorzuheben seien, und dass er durch Beibehaltung seiner Stelle am Gesundheitsamt gewusst habe, die Berufung eines selbstständigen Nachfolgers zu verhindern. Ein Artikel ging selbst soweit, den Verstorbenen als den Vertreter des autokratischen Directorialsystems hinzustellen, dessen Egoismus jede freiere wissenschaftliche Entwicklung der Berliner Thierarzneischule gehindert hat. Wie viel diese Veröffentlichungen dem thierärztlichen Stande in der öffentlichen Meinung geschadet haben, davon giebt die Rede Zeugnis, welche der Abgeordnete Dr. Virchow bei Befürwortung der Rectoratsverfassung für die Thierarzneischule am 1. Februar 1886 im Preussischen Abgeordnetenhause gehalten hat. Der Abgeordnete, welcher seit Decennien das wärmste Interesse für die Thierheilkunde und deren Lehrinstitute gezeigt hat, sagte nach dem stenographischen Bericht:

„Ich habe Gelegenheit gehabt, den verstorbenen Director Roloff lange Jahre hindurch in nächster Nähe zu beobachten und darf mir wohl ein Urtheil über ihn erlauben. Und da muss ich sagen, ich kenne wenig Männer, die mit solcher Hingebung an die Wissenschaft und zugleich an ihre amtliche Stellung bis zu ihrem Tode gewirkt haben. Ich hatte in der That geglaubt, es würde das Andenken an diesen Mann bei seinen Collegen, den Thierärzten Deutschlands, speciell den Vertretern der veterinären Presse, in höchsten Ehren bleiben. Aber mit einem immer neuen Gefühl der

Entrüstung sehe ich, wie, als er kaum die Augen geschlossen hatte, sich ein Strom von Wuth über sein Gedächtniss ergossen hat, und in Ausdrücken, welche wir sonst gar nicht gewohnt sind, in wissenschaftlichen Organen über die Parteilichkeit, Einseitigkeit und Gewaltthätigkeit dieses Mannes geklagt wird.“

Alle Thierärzte, welche die Empfindung der Dankbarkeit für Roloff's Thätigkeit und die Gerechtigkeitsliebe noch nicht vollständig verloren haben, werden die Gefühle theilen, denen der verehrte Abgeordnete Ausdruck gegeben hat, und die äusserste Beschämung nicht unterdrücken können, dass so pietätlose und ungerechtfertigte Anklagen gegen einen verdienten Mann erhoben wurden, über welchen sich eben erst das Grab geschlossen hat.

Der Lehrkörper der Thierarzneischule ist doch jedenfalls in erster Linie berufen, ein Urtheil über die Führung des Directorats von Seiten des Verewigten abzugeben, und alle Mitglieder des Collegiums werden bereitwillig anerkennen, dass Roloff von allen Directoren der Berliner Thierarzneischule derjenige gewesen ist, unter dessen Leitung die Uebelstände, mit denen das Directorialsystem verbunden sein muss, am wenigsten fühlbar geworden sind.

Das Directorat und die Lehrthätigkeit Roloff's haben stets die gesteigerte wissenschaftliche und praktische Ausbildung der Thierärzte im Auge gehabt, und das ist jedenfalls die beste Hebung des thierärztlichen Standes, welche es überhaupt geben kann.

Der Vorwurf endlich, dass der Verstorbene aus selbstsüchtigen Gründen die Stellung am Gesundheitsamt beibehalten und dadurch die Ernennung eines Nachfolgers verhindert hat, kann nur von solchen Personen gemacht werden, welchen die Verhältnisse gänzlich unbekannt sind. Man muss vielmehr anerkennen, dass Roloff durch sein Verbleiben in der genannten Stellung die letztere dem thierärztlichen Stande erhalten und sofort seine Entbindung von diesem Nebenamt beantragt hat, als eine Aenderung der bis dahin bestehenden Verhältnisse es gestattete, ohne den Fortbestand der thierärztlichen Stelle zu gefährden. Dass das Gesundheitsamt seit dem Februar 1885 keine passende Persönlichkeit für die letztere gefunden hat, ist gewiss nicht Roloff's Schuld.

Wir versuchen nunmehr, kurz die wesentlichsten Einrichtungen zusammenzufassen, welche Zeugnis von der directorialen Thätigkeit des Verewigten geben. Roloff hat zunächst die Lehrmittel der

Anstalt entsprechend den Anforderungen erweitert, welche die Prüfungsordnung vom 27. März 1878 an den Unterricht stellte. Hierher gehört zunächst die vollständig neue Einrichtung des Laboratoriums für die chemischen Uebungen, welche bis dahin nicht Gegenstand des Lehrplans gewesen waren, sowie die Erweiterung der Räumlichkeiten und die Beschaffung der Anzahl von Instrumenten, welche bei der sehr erheblich gesteigerten Frequenz der Anstalt erst die Theilnahme an den histologischen und pathologisch-histologischen Uebungen ermöglichte. Den klinischen Lehrern wurden besondere Zimmer in den Kliniken und ein allen Anforderungen entsprechendes chemisches bezw. bacteriologisches Laboratorium zur Verfügung gestellt. Die unzureichenden Räumlichkeiten des Spitals für kleine Hausthiere wurden durch einen Anbau vergrößert. Die Viehwirtschaft der Anstalt erhielt durch Ankauf von Kühen verschiedener Racen einen sehr viel höheren Werth für den Unterricht in der Racenkenntniss. In den Jahren 1882 und 1883 ist das neue pathologische Institut, jedenfalls das schönste und am besten eingerichtete der Anstalt, gebaut worden, und in demselben wurde später ein bacteriologisches Laboratorium eingerichtet, welches die eingehendsten Forschungen auf diesem Gebiet ermöglichte. Der Neubau gestattete, die bisher von dem pathologischen Institut benutzten Räumlichkeiten für die Präparirübungen des anatomischen Unterrichts umzubauen, welche nunmehr in hellen, vorzüglich ventilirten Sälen an Stelle der bis dahin für diesen Zweck bestimmten kellerartigen, schlecht beleuchteten Räume stattfinden konnten. Den Bemühungen des Verewigten ist es zu danken, dass der Unterricht in der Botanik einem besonderen Hülflehrer übertragen, dass zur Unterstützung des Professors der Anatomie ein ständiger Prosector angestellt wurde, und dass fast alle Professoren Assistenten aus der Zahl der Thierärzte erhielten, denen der Herr Minister Stipendien zur Fortsetzung ihrer Studien bewilligt hatte. Der Herr Minister hat auf Antrag des Verewigten die Anstellung einer neuen Lehrkraft genehmigt und diese Stelle auf den Etat des Jahres 1886 gebracht, welcher vom Abgeordnetenhause bereits bewilligt worden ist. Das letzte Werk der directorialen Thätigkeit Roloff's war die von verschiedenen Seiten und seit langer Zeit gewünschte Theilung der Klinik für grosse Hausthiere in je eine Abtheilung für innere und für äussere Krankheiten.

Während der ganzen Zeit seines Directorats hatte Roloff noch eine umfangreiche Lehrthätigkeit zu erfüllen und in jedem Winter-

semester gerichtliche Thierheilkunde, Geschichte, auch Methodologie und Encyclopädie der Thierheilkunde, in jedem Sommersemester Seuchenlehre und Veterinärpolizei, sowie Diätetik vorzutragen. Seine Vorlesungen zeichneten sich durch Klarheit und Sachlichkeit, namentlich aber auch dadurch aus, dass dieselben nicht nur das Interesse der Zuhörer dauernd zu fesseln verstanden, sondern auch stets die Verwerthung des Lehrgegenstandes für das praktische Leben im Auge behielten. Als ein Beispiel, dass Roloff keine Mühe scheute, wenn es auf die praktische Ausbildung der Studirenden ankam, sei an dieser Stelle erwähnt, dass er in den Vorträgen über gerichtliche Thierheilkunde und über Veterinärpolizei fast in jeder Woche den Studirenden die Aufgabe stellte, thierärztliche Gutachten, Protocolle und Berichte über bestimmte Themata zu verfassen und ihm sodann vorzulegen. Wenn man die während seines Directorats fast von Jahr zu Jahr wachsende Zahl der Studirenden in Erwägung zieht, wird es ohne weitere Worte verständlich sein, welchen erheblichen Theil seiner so überaus in Anspruch genommenen Zeit der Verewigte opfern musste, um diese Schriftstücke seiner Zuhörer in der eingehendsten Weise zu kritisiren und die vorgekommenen technischen und formellen Verstöße zu besprechen. Die gerichtliche Thierheilkunde und die Veterinärpolizei können als die Fächer bezeichnet werden, für welche Roloff eine besondere Vorliebe hatte; es ist sehr zu bedauern, dass die von ihm in Verbindung mit Professor Dr. Schütz unternommene und schon weit vorgeschrittene Bearbeitung eines Handbuches der gerichtlichen Thierheilkunde nicht vollendet worden ist.

Die Thätigkeit des Verewigten wurde ferner noch sehr erheblich durch die zahlreichen Examina, bei denen er theils selbst betheilig war oder den Vorsitz zu führen hatte, und durch die Arbeiten in Anspruch genommen, welche ihm als Mitglied der technischen Deputation für das Veterinärwesen, namentlich aber in der zuletzt genannten Eigenschaft durch die Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten für das kreisthierärztliche Examen zufielen. Als Examiner hat er stets bei den Candidaten den Eindruck der Gerechtigkeit und der Billigkeit hinterlassen. Für seine Anforderungen in den naturwissenschaftlichen, Fach- und kreisthierärztlichen Prüfungen war immer in erster Linie der Nachweis massgebend, dass der Candidat den Prüfungsgegenstand gut verstanden und richtig aufgefasst hatte. Dieser Gesichtspunkt trat besonders in dem klinischen Theil der Fachprüfung hervor; er verlangte, dass sich der Candidat streng an den objectiven Befund

hielt, welchen das kranke Thier bot. Zeigte der Examinand, dass er das letztere eingehend und praktisch zu untersuchen verstand und ein zutreffendes Urtheil über die gemachten Wahrnehmungen abgeben konnte, so war der Examinator immer zufriedengestellt; dagegen versäumte er anderseitig nicht, den Candidaten zurecht zu weisen, wenn derselbe ohne eingehende Untersuchung des kranken Thieres sofort mit einem fertigen Urtheil hervortrat und dieses mit weitschweifigen allgemeinen Ausführungen, welche sich nicht genau an den Thatbestand hielten, zu begründen suchte.

Trotz der geschilderten vielseitigen Thätigkeit fand Roloff noch Zeit, sich mit mühevollen wissenschaftlichen Arbeiten und Versuchen zu beschäftigen, von denen wir namentlich die über den Milzbrand der Hausthiere, die Impfung der Lungenseuche und die Lupinose der Schafe erwähnen.

Allen, welche dem Verewigten näher gestanden haben, ist ein treuer Freund durch den Tod entrissen worden; die Welt hat einen Menschen von hervorragender geistiger Bedeutung verloren, dessen Charakter ohne Makel war, und dessen Umgangsformen bei Jedermann den angenehmsten Eindruck hinterliessen. Auch für die Wünsche und Bitten von ihm durchaus fremden Personen hatte Roloff ein stets offenes Ohr, und geradezu rührend ist der Eifer, mit welchem er Nothleidenden zu helfen suchte. Seine Herzengüte ist nicht selten gemissbraucht worden, mit einem gewissen trockenen Humor wusste er sich jedoch über solche Enttäuschungen hinweg zu helfen. Niemals haben die letzteren ihm Veranlassung gegeben, seine Hülfe im nächsten vorkommenden Falle zu versagen. In den Conferenzen des Lehrercollegiums, in den Sitzungen von Vereinen und im gesellschaftlichen Verkehr ging er gern auf Debatten über Fragen ein, in denen er sich ein Urtheil zutraute. Er vertheidigte zwar hartnäckig seine Anschauungen, war jedoch sachgemässen Argumenten durchaus nicht unzugänglich und scheute sich auch nicht vor dem Eingeständniss eines Irrthums. Seine Freunde werden sich erinnern, wie objectiv er bei solchen Debatten war und blieb. Selbst im erregtesten Widerstreit der Meinungen war es ihm immer nur um die Sache zu thun, kamen niemals persönliche Motive zur Geltung oder gab die Verschiedenheit der Auffassung Anlass zu persönlichen Missheiligkeiten.

Fast ohne persönliche Bedürfnisse und nur seiner Arbeit und seiner Familie lebend, wusste Roloff in seinem Hause eine schöne Geselligkeit zu unterhalten, bei der er den liebenswürdigsten Wirth

zu machen verstand. Väterlich hat er für das Wohl der Studirenden der Thierarzneischule gesorgt, unausgesetzt war sein Sinnen und Trachten darauf gerichtet, die Beneficien zu vermehren, welche er bedürftigen und fleissigen Schülern zuwenden konnte. Dagegen verlangte er von den Studirenden, dass sie mit Fleiss und Eifer von den Lehrmitteln der Anstalt Gebrauch und der letzteren nach allen Richtungen und auch ausserhalb der Anstalt Ehre machten. Von dieser Sorge giebt das von ihm entworfene und noch jetzt geltende Reglement für die Studirenden überzeugenden Ausdruck. Auch auf das Vereinsleben der Studirenden wirkte er stets anregend ein; er hat den Ausschuss der Studirenden begründet und dessen Geschäftsführung durchweg in freundlicher Weise beeinflusst, und ist wiederholt bestrebt gewesen, einen wissenschaftlichen Verein der Studirenden in das Leben zu rufen, an dessen Verhandlungen er sich persönlich gern betheiligte.

An Anerkennungen seiner Verdienste hat es dem Verewigten nicht gefehlt. Die Belgische Akademie der Medicin hatte ihn zum correspondirenden Mitglied gewählt, er war Ehrenmitglied des Veterinärinstituts zu Dorpat, des Royal College of Veterinary Surgeons in London, der thierärztlichen Vereine für die Provinz Brandenburg und für Elsass-Lothringen, des Vereins der praktischen Aerzte in Halle und der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, ausserdem Inhaber des Rothen Adlerordens. Der ihm kurz vor seinem Tode verliehene Dannebrogorden ist nicht mehr in seine Hände gelangt.

Roloff erfreute sich keiner eisernen Constitution, sondern litt schon in jüngeren Jahren an wenn auch nur selten vorkommendem Heisshunger-, mitunter an Ohnmachtsanfällen. Er erschien nach Farbe und Ausdruck des Gesichts älter, als er in der That war. Diese Leiden thaten jedoch seiner körperlichen Rüstigkeit keinen Abbruch, sie beschränkten weder seine geistige Arbeitskraft, noch setzten sie ihn ausser Stand, körperliche Strapazen zu ertragen. Er konnte namentlich weite Fusstouren ohne übermässige Ermüdung machen und rühmte sich gern seiner Leistungen als Tourist und im Bergsteigen.

Dagegen stellten sich im Jahre 1874 die Erscheinungen eines hartnäckigen und bedenklichen chronischen Lungenkatarrhs ein, welche Roloff veranlassten, eminente ärztliche Specialisten zu consultiren. Dieselben riethen ihm, der grösseren Vorsicht wegen seine Vorlesungen für das Sommersemester auszusetzen und in Davos Heilung zu suchen. Er kehrte von dort im Herbst 1874 anscheinend vollkommen genesen

zurück und hat bis zu seinem Lebensende stets mit Befriedigung über die Davoser Kur gesprochen, von welcher er eine grosse Vorliebe für kalte Douchen und Abreibungen behielt.

Ebenso ging eine heftige Erkrankung an Rheumatismus, von welcher Roloff 1876 auf einer Ferienreise in Pontresina befallen wurde, ohne nachhaltige Störung der Gesundheit vorüber, und er fühlte sich bis zum Frühjahr 1882 wohler als je zuvor. Im März 1882 erkrankte er an einer schweren Pneumonie, zu welcher sich vorübergehend starke rheumatische Anfälle und später eine hartnäckige, ausgebreitete Pleuritis gesellten. Fast drei Monate lang blieb er an das Bett gefesselt, und erst im Herbst 1882 erholte er sich in Friedrichsroda, in welchem Orte er gern seine Ferien zubrachte, soweit, dass er im folgenden Winter vollständig genesen zu sein schien und bis Ende des Sommers 1883 seinen vielfachen Arbeiten wie in den Tagen der besten Gesundheit nachzukommen im Stande war.

Gegen Ende des Winters 1883/84 stellten sich vorübergehende Krankheitserscheinungen ein, von denen sich Roloff jedoch bald erholte.

Im Winter 1884/85 machten sich jedoch in auffälliger Weise die Erscheinungen eines allgemeinen Siechthums und eines Verfalls der Kräfte bemerklich, und der folgende Sommer brachte nur geringe und vorübergehende Besserung. Der Aufenthalt in Friedrichsroda, Norderney und Soden während der Monate August und September schien dem Kranken einige Erleichterung gewährt zu haben; der Kräfteverfall, die Erscheinungen des Lungenleidens und das fortschreitende allgemeine Siechthum nahmen jedoch bald nach der Rückkehr von Soden immer auffälliger zu. Vom Herbst 1884 an wies Roloff die eindringlichsten Bitten seiner Freunde, sich den augenscheinlich verderblichen Einflüssen des nordischen Winters durch den Aufenthalt in einem südlichen Klima zu entziehen, zurück. Hartnäckig erklärte er, bis zu seinem letzten Athemzuge auf seinem Posten bleiben zu wollen und diesem gegenüber das Nachsuchen eines längerenurlaubes nicht verantworten zu können. Mit Aufbietung der letzten Kräfte bemühte er sich, seinen vielfachen Amtsgeschäften nachzukommen, und versuchte als ein Märtyrer der Pflichttreue, noch Mitte October den Vorsitz bei den naturwissenschaftlichen Prüfungen zu führen, bis ihn die fortschreitende Krankheit als todtkranken Mann am 22. October 1885 auf das letzte Schmerzenslager warf, von welchem er sich nicht wieder erheben sollte.

Zu den krankhaften Veränderungen, welche von der im Jahre 1882 überstandenen Lungen-Brustfellentzündung zurückgeblieben waren, gesellten sich bald Erscheinungen, welche auf Amyloiddegenerationen der Nieren und des Darmes hinwiesen, und an der zuletzt genannten Krankheit ist er am 22. December 1885 Abends 9 Uhr verschieden. Bis zum letzten Augenblick behielt er seine volle Besinnung; ruhig sah er, ohne sich über die Bedenklichkeit seines Zustandes den geringsten Illusionen hinzugeben, dem Tode entgegen; mit der grössten Sorgfalt hat er seine irdischen Angelegenheiten bis in die kleinsten Details geordnet.

Roloff hatte schon in den letzten Jahren seines Lebens und ebenso während seiner letzten Krankheit den Wunsch ausgesprochen, nach seinem Tode in Gotha durch Feuer bestattet zu werden. Seine Wittve hat diesen Wunsch des Verewigten getreulich erfüllt, so schwer es ihr auch gewesen sein mag, auf die Trauer an dem Grabe des geliebten Mannes in heimathlicher Erde verzichten zu müssen. Die Leichenfeier Roloff's fand in Gegenwart des Herrn Ministers für Landwirthschaft und einer zahlreichen glänzenden Trauerversammlung am 27. December 1885 in der Wohnung des Verewigten statt. Die Thierarzneischulen in Dresden und München hatten die Directoren Leisering und Hahn nach Berlin entsendet, um ihre Kränze und Palmenzweige den zahlreichen Blumenspenden hinzuzufügen, welche den reich geschmückten Sarg vollständig verdeckten. An demselben sprachen im Namen der Berliner Thierarzneischule und als langjährigster Freund Professor Müller und als Vertreter der Wissenschaft Professor Dr. Virchow. Letzterem schuldet der thierärztliche Stand tiefgefühlten Dank für die beredten Worte der Anerkennung und des Abschiedes am Sarge des Verblichenen.

Wir lassen an dieser Stelle die von den beiden Genannten gehaltenen Reden folgen.

Bede des Professor Müller.

Eine verhängnissvolle Krankheit hat langsam, jedoch stetig fortschreitend die ursprünglich kräftige Natur des in diesem Sarge Ruhenden überwunden und die Hoffnungen auf Genesung getäuscht, welche wir Alle fast bis zum letzten Augenblick nicht aufgegeben

hatten. Als Aeltester im Lehrercollegium der Königlichen Thierarzneischule und als sein langjährigster Freund habe ich dem Verewigten die letzten Abschiedsworte der Anstalt zuzurufen, welche er fast volle acht Jahre mit so glänzendem Erfolge geleitet hat. Ein beredterer Mund als der meinige hat es übernommen, die wissenschaftlichen Verdienste des Geschiedenen zu feiern; unsere spätere Aufgabe wird es sein, in der Literatur seiner Bedeutung für die Veterinärmedizin durch einen ausführlichen Nekrolog gerecht zu werden; ich kann an dieser Stelle nur mit schlichten Worten erwähnen, was er der Anstalt als Director und Lehrer, was er uns als College und was er mir als Freund gewesen ist.

Als Director hat der Hingeschiedene unausgesetzt und nach allen Richtungen hin das Wohl und das Gedeihen der von ihm geleiteten Anstalt im Auge gehabt und die Lehrmittel der letzteren den Anforderungen der Neuzeit entsprechend erweitert. Seinen Bemühungen ist es zu verdanken, dass die zu diesen Zwecken erforderlichen Mittel so bereitwillig und in so ausgedehntem Masse gewährt wurden. Unter den Werken, welche von seiner Thätigkeit Zeugnis geben, nenne ich die Einrichtung des chemischen und des bacteriologischen Laboratoriums, den Umbau der Anatomie, die Erweiterung der Thierspitäler, namentlich aber den Neubau des pathologischen Instituts. Letzteres ist als ein Monument zu bezeichnen, welches späteren Geschlechtern noch ehrende Kunde von der Verwaltungsthätigkeit des Verewigten geben wird.

Seine Pflichttreue und sein Eifer sind bis zur letzten schweren Erkrankung nicht einen Augenblick und selbst dann nicht unterbrochen worden, als die schwankende Gesundheit ihn immer gebieterischer und dringender ermahnte, an sein eigenes Wohl zu denken. Mit Aufbietung aller, ich möchte sagen, mit Aufbietung auch der letzten Kräfte hat der Geist den Körper beherrscht und in demselben Sinne fortgewirkt, wie in den Tagen der vollen Gesundheit. Seine Pflicht ging ihm über Alles; den wiederholten Bitten, sich zu schonen und sich dadurch seiner Familie, seinen Freunden und der Anstalt zu erhalten, hat er nie nachgegeben. Selbst auf dem letzten schweren Krankenlager blieb das Gedeihen der Anstalt sein steter Gedanke, welchem er durch häufige Erkundigungen selbst nach den kleinsten Einzelheiten Ausdruck lieh.

Ich darf schliesslich wohl noch darauf hinweisen, dass der Verstorbene in vollendetstem Masse die für die Leitung einer Anstalt,

wie die unserige, so höchst werthvolle Eigenschaft der Objectivität besass; er hatte stets nur allein die Sache im Auge, persönliche Verhältnisse und Rücksichten haben niemals einen Einfluss auf seine Handlungen ausgeübt.

Die umfangreiche Lehrthätigkeit des Verewigten an der Anstalt erstreckte sich während der ganzen Zeit seines Directorats auf die Vorträge über gerichtliche Thierheilkunde, über Veterinärpolizei, über Diätetik und über Geschichte und Encyclopädie der Thierheilkunde. Sie zeichnete sich nicht nur durch Klarheit und leichte Verständlichkeit des Vortrages, sondern auch dadurch aus, dass sie die Studirenden stets darauf hinwies, in welcher Weise der Lernstoff im praktischen Leben anzuwenden sei. Unser theurer Hingeschiedene verwerthete in seinen Vorträgen stets den reichen Schatz von Erfahrungen, welchen er während seiner elfjährigen Thätigkeit als praktischer bezw. beamteter Thierarzt und später durch seine ausgedehnte consultative Praxis in Halle von 1865 bis 1876 gesammelt hatte. Den Schülern dieser Anstalt wird der Eindruck seines Lehrtalents ebenso in dankbarem Gedächtniss bleiben, wie die väterliche Fürsorge, welche er unausgesetzt dem Wohlergehen der Studirenden widmete.

Der Thätigkeit als Examinator bezw. als Vorsitzender von Prüfungscommissionen, welche einen grossen Theil seiner Zeit in Anspruch nahm, werden alle Candidaten, welche sich den von ihm vorgenommenen oder geleiteten Prüfungen unterzogen haben, wegen der Milde und Gerechtigkeit des Urtheils eine unvergessene Erinnerung bewahren.

Wir beklagen aber nicht nur den Verlust eines verehrten Directors und ausgezeichneten Lehrers, sondern wir stehen trauernd auch an dem Sarge eines liebenswürdigen Collegen, eines guten und treuen Freundes und eines durch und durch braven Menschen.

Jeder von uns, welcher mit dem Verewigten zusammen an dieser Anstalt gewirkt hat, wird sich das ganze Leben hindurch an das schöne collegialische Verhältniss erinnern, in welchem der Hingeschiedene zu den Mitgliedern des Lehrkörpers stand. Unvergessen wird sein, mit welcher Bereitwilligkeit er allen Wünschen der Lehrer bezüglich der Bedürfnisse des Unterrichts entgegenkam, unvergessen aber auch, mit welcher Liebenswürdigkeit er in den Conferenzen widerstreitende Meinungen und Anschauungen zu versöhnen und eine Einigung herbeizuführen verstand.

Es ist mir endlich ein Herzensbedürfniss, zu erwähnen, dass die näheren freundschaftlichen Beziehungen, in denen ich fast volle fünf-

undzwanzig Jahre lang zu dem Entschlafenen und zu seiner Familie stand, keinen Augenblick getrübt worden sind, sondern ununterbrochen in guten und in bösen Tagen fortgedauert haben, und dass ich seinen Verlust wie den eines nahen Verwandten beweine.

Unserem theueren Entschlafenen ist es nicht vergönnt gewesen, seine vielseitige Thätigkeit bis in ein vorgerücktes Lebensalter fortzusetzen; er wurde nach längerem Leiden in einer Lebenszeit abberufen, welche nach dem gewöhnlichen Verlauf noch eine reiche und segensvolle Wirksamkeit in Aussicht stellen sollte. Uns den Fügungen eines höheren Willens beugend, werden wir dem verehrten Director, dem theuren Collegen und guten Freunde eine treue und anhängliche Erinnerung bewahren. Wir rufen ihm unser letztes schmerz erfülltes Lebewohl zu.

Frieden sei seiner Asche!

Rede des Geheimen Medicinalrath Professor Dr. Virchow.

Wenn ich in diesem schmerzlichen Augenblick, wo die Familie, die Freunde, die ganze Schule, welche ihr geliebtes Haupt verloren hat, zum letzten Male an dem Sarge des Verstorbenen sich vereinigt haben, um in gemeinsamer Trauer ihr Leid zu mildern, das Wort ergreife, um in kurzen Zügen die Grösse unseres Verlustes zu zeichnen und in unserer Erinnerung das Bild des Verblichenen zu festigen, so geschieht es zunächst auf den Wunsch der Angehörigen und der nächsten Collegen, sodann im Namen der technischen Deputation für das Veterinärwesen und endlich in dem Gefühl langjähriger persönlicher Freundschaft und herzlichster Achtung.

Ich weiss, dass ich in diesem Gefühl mit allen denen zusammen treffe, welche dem Verstorbenen jemals näher getreten sind. Wer hat es nicht erfahren, wie milde er gegen Andere und wie hart er gegen sich selbst war! Stets bereit zu helfen und Menschen menschlich zu beurtheilen, stellte er an sich selbst die höchsten Anforderungen. Ihm war kein Opfer zu schwer, wenn die Pflicht es forderte, und was für ihn Pflicht bedeutete, das hat er am schönsten auf seinem langen Schmerzenslager gezeigt. Er ist auf dem Platze gestorben, wohin ihn das Vertrauen seiner Vorgesetzten gestellt hat, bis zum letzten Augenblick ein treuer ergebener Beamter.

Roloff's Leben fiel in eine Zeit der grössten Bewegung auf dem Gebiete, dem er sich zugewendet hatte. Als er im Jahre 1847 seine Studien an dieser Schule begann, war die Thierarzneikunde in eine Art von Ruhezustand versunken. Nach schönen Anfängen war eine bedrückende Erschlaffung eingetreten. Die Medicin überhaupt hatte erst seit kurzer Zeit begriffen, dass es sich darum handle, inmitten der in stürmischem Fortschritt begriffenen Naturwissenschaften wieder ihren Platz zu suchen. Neue Methoden der Beobachtung waren in Angriff genommen, aber der erste Angriff hatte mehr Verwirrung und Dunkel, als Ordnung und Aufklärung gebracht. Jahre mühseliger Arbeit vergingen, ehe das weite Feld sich lichtete. Ein gütiges Geschick führte Roloff alsdann an die Schule zurück. Im Jahre 1862 wurde er als Repetitor in den Lehrkörper berufen und nun trat er selbst als Mitarbeiter für den Neuaufbau der Thierarzneikunde oder vielmehr für die Umgestaltung der Thierarzneikunde in eine Thierarzneiwissenschaft ein. Das war die Zeit, wo ich selbst ihn kennen lernte und wo es mir gestattet war, sowohl auf ihn, als auf seinen gleichfalls so früh dahingeshiedenen ausgezeichneten Vorgänger Einfluss zu üben und jene fruchtbare Durchdringung der Medicin und des Veterinärwesens anbahnen zu helfen, welche durch ihre Thätigkeit so mächtig gefördert ist. Für die Berliner Thierarzneischule wird es ein unvergesslicher Ruhmes-titel sein, dass sie in dieser denkwürdigen Zeit hintereinander zwei Directoren gehabt hat, welche im vollen Bewusstsein der zu erstrebenden Ziele alle Anstrengung darauf gerichtet haben, durch eigenes Vorbild die Nacheiferung der jungen Generation wach zu erhalten.

Roloff hatte das besondere Glück, dass ihm, nachdem er sich in den neuen Methoden und Lehren fest gemacht hatte, alsbald eine Stellung zu Theil wurde, wo ihm Gelegenheit und Musse zu eigener Forschung nicht fehlte. 1865 wurde er als Docent an das neue landwirthschaftliche Institut der Universität Halle berufen und bald darauf zum ausserordentlichen Professor ernannt. Zwölf Jahre hat er diese Stelle eingenommen, Jahre schwerer Arbeit. Er zeigte nun, wie man mit den strengen Methoden der neuen Zeit, sei es auf dem Wege der Beobachtung, sei es auf dem des Versuchs, die Natur zwingen kann, Antwort zu ertheilen auf verständig gestellte Fragen. Nicht ohne ein Gefühl der Genugthuung habe ich die Reihe trefflicher Abhandlungen gemustert, die er in den Jahren 1866—1869 in meinem Archiv veröffentlicht hat. Die Lehre von der Osteomalacie und

Rachitis, von der fettigen Degeneration der Muskeln bei jungen Hausthieren, von den käsigen Processen im Darm der Schweine wurde von ihm in durchaus selbstständiger und zum Theil in entscheidender Weise behandelt. Ja, er war schon damals nahe daran, den Strahlpilz im Schweinefleisch zu entdecken.

Aber die Aufgaben, welche ihm gestellt waren, beschränkten sich nicht auf Forschung und Unterricht. Er sollte und wollte auch praktischer Thierarzt sein. Schon vor seiner Anstellung als Repetitor war er Kreisthierarzt in Burgsteinfurt und in Liebenwerda gewesen; in Halle war ihm neben der Professur auch die Kreisthierarztstelle des Saalkreises übertragen. Hier, inmitten einer Provinz, deren hochentwickelte Industrie vielfach auf die Benutzung von Hausthieren angewiesen ist, traten die grossen Fragen der Thierhygiene ihm nahe. Zahlreiche Fälle, namentlich von Lungenseuche, wurden seiner Beurtheilung unterstellt, gerade in der Zeit, wo die Schutzimpfung von Freund und Feind auf das Heftigste erörtert wurde. Aus dem Jahre 1868 datirt sein viel consultirtes Buch über die Impfung der Lungenseuche. Dann folgten 1871 die Rinderpest, 1875 die Schwindsucht der Schweine und später 1883 der Milzbrand.

Ich übergehe andere Schriften, so wichtig sie auch sind, da sie nicht so unmittelbar in die Gestaltung der öffentlichen Dinge eingriffen. Denn inzwischen hatten sich auf dem Gebiete des Veterinärwesens grosse Umgestaltungen vollzogen, welche auch äusserlich der Entwicklung und Thätigkeit des Thierarztes ganz neue Bahnen eröffnen sollten. Durch die weise Initiative des vorgesetzten Ministeriums war die technische Deputation für das Veterinärwesen ins Leben gerufen; neue Lehrpläne waren für die vollkommener ausgestatteten Thierarzneyschulen vorgeschrieben; endlich begann mit dem Jahre 1875 die tief einschneidende Gesetzgebung über die Viehseuchen, welche die Stellung der Thierärzte kräftigte und hob. Roloff hatte eine Zeit lang den bestimmenden Kreisen fern gestanden. Aber schon 1876 wurde er zum ordentlichen Mitglied des Reichsgesundheitsamtes, 1877 zum Departementsthierarzt für den Regierungsbezirk Potsdam, zum Lehrer an der hiesigen Thierarzneyschule und zum ordentlichen Mitglied der technischen Deputation für das Veterinärwesen ernannt. Und schon im nächsten Jahre, nach dem Tode von Gerlach, wurde ihm auch die Direction der Thierarzneyschule übertragen, die er sieben Jahre hindurch mit Aufbietung aller Kräfte geleitet hat.

Viele Ehren sind ihm zu Theil geworden. Aber fast jede neue Ehre brachte auch neue Arbeit. Galt es doch, das gesammte Veterinärwesen aus seiner früheren gedrückten und verkümmerten Stellung in die neue Bahn voller Anerkennung, aber auch voller Anforderungen an die Hingebung, die Pflichttreue und die wissenschaftliche Weiterbildung der Einzelnen hinüber zu leiten. Wer war dazu mehr berufen, als der Director der Thierarzneischule, der vom Tage des Eintritts an den jugendlichen Eifer wachrufen, später mit Strenge die wissenschaftliche und praktische Entwicklung leiten, endlich die Leistungen der beamteten Thierärzte beobachten sollte! Und mit welchem Geschick, mit welcher Ausdauer und Umsicht hat er sich allen diesen schwierigen Aufgaben unterzogen! Wie viel Arbeit hat diese Verwaltungsthätigkeit gekostet! Wir, die wir in den Sitzungen der technischen Deputation die Klarheit seiner Darlegungen, das Gewinnende seiner Motive, die Sicherheit seiner Erfahrungen so oft zu bewundern Gelegenheit hatten, wir fragen uns bekümmert, wer Ersatz bieten soll für so schweren Verlust?

Und selbst wenn uns Ersatz zu Theil würde, unser Schmerz wird darum nicht geringer sein, dass ein solcher Mann so früh aus dieser Welt scheiden musste. Kaum fünfundfünfzig Jahre alt, hätte er nach menschlicher Berechnung noch manches Jahr erleben können, um die Früchte seiner Thätigkeit reifen zu sehen. Er verlässt diese Schule, ja seine Wissenschaft, nachdem sie Veränderungen durchgemacht und Verbesserungen erreicht hat, wie er selbst sie vor noch nicht zu langer Zeit wohl kaum erwartet hat. Er war jetzt an eine Stelle gestellt, wo er gewissermassen die Seele des weiteren Fortschrittes sein konnte. Da musste er scheiden! Seine Kräfte waren erschöpft.

Aber sein Geist wird in den Institutionen bleiben, welche mitzuschaffen er berufen war. Er wird, dess sind wir gewiss, in dieser Schule lebendig, in dem Gedächtniss der Studirenden als eine treibende und erhebende Kraft wirksam bleiben! Ein Geist voll Unabhängigkeit und Bescheidenheit, voll von idealem Streben in der Wissenschaft und von sittlicher Strenge im Leben!

Ja, er war ein ganzer Mann, aus einem Gusse, bei dem Ueberzeugung und That aus gleicher Quelle harmonisch flossen.

So erscheint er auch noch in seiner letzten Anordnung. Abweichend von dem Herkommen unserer Zeit, hat er gewollt, dass sein Körper den Flammen übergeben werde. Die Familie, die trauernde Wittwe, sie fügen sich dem Gebot des Geliebten. Sie wissen es wohl, dass der religiöse Glaube bei jeder Form der Bestattung des sterb-

lichen Körpers bestehen kann. Die Anschauungen der Menschen wechseln. Kaum tausend Jahre sind es her, dass auf deutschem Boden die Gestorbenen in die Erde gesenkt werden. Sicherlich mehr als tausend Jahre hindurch sind vorher die Leichen verbrannt worden, und doch hofften unsere Vorfahren auf Walhalla.

Unser Freund hat seine Ueberzeugung von der besten Art der Bestattung gehabt, und er hat noch nach seinem Tode Zeugniß dafür ablegen wollen. Treu gegen sich, wie er im Leben treu war gegen Andere! Möge er so in unser Aller Gedächtniß fortleben! Möge sein Vorbild uns und vor Allem die Seinigen stärken, wenn sie sich schwach fühlen! Möge der Gedanke sie erheben, dass hinter diesem Manne kein feindliches Gefühl zurückbleibt, dass Alle ihn ehren werden als einen Helden der Arbeit, als einen Märtyrer der Pflichttreue!

Friede sei mit ihm!

Am 28. December 1885 wurden die sterblichen Ueberreste Roloff's in Gotha den Flammen übergeben. Zu dieser Bestattung und der derselben vorhergehenden kirchlichen Feier waren der Sohn, Bruder und Schwager des Verewigten mit Regierungsrath Wolffhügel vom Kaiserlichen Gesundheitsamt und mit Professor Müller der Leiche nach Gotha gefolgt. Zu der Bestattung hatten sich die Thierärzte aus Gotha, Erfurt und Mühlhausen eingefunden.

In der offenen Halle des schönen Friedhofes in Gotha steht die Urne, welche die Asche des Heimgegangenen enthält. Die Erinnerung an ihn wird in den Herzen seiner Freunde, Collegen und Schüler lebendig bleiben. Möge die allgemeine dankbare Anerkennung seiner Verdienste beitragen, die tiefe Betrübniß der hinterbliebenen Familie zu mildern. Möge der ganze thierärztliche Stand in Erinnerung behalten, was er in Roloff verloren hat, und ihm das Gedächtniß bewahren, welches er so reichlich verdient hat.

Müller. Schütz.

Verzeichniss der literarischen Arbeiten Roloff's.¹⁾

Ueber den Instinct der Thiere und dessen Bedeutung für die Diätetik. Halle 1865.

Impfung der Lungenseuche. Berlin 1868.

Beurtheilungslehre des Pferdes und des Zugochsen. Mit 114 Abbildungen. Halle 1870.

Die Rinderpest. Halle 1871, 1. Aufl.; 1877, 2. Aufl.

Die Schwindsucht der Schweine. Berlin 1875.

Der Milzbrand, seine Entstehung und Bekämpfung. Berlin 1883.

Thierärztliche Gutachten, Berichte und Protocolle. Berlin 1885.

Veterinär-Kalender, herausgegeben in Verbindung mit Prof. Müller, 1.—13. Jahrg. Berlin 1866—1878.

Mittheilungen aus der thierärztlichen Praxis im Preussischen Staate, aus den Veterinär-Sanitätsberichten der Königl. Regierungen zusammengestellt. Herausgegeben in Verbindung mit Prof. Müller 13.—22. Jahrg. und neue Folge 1.—3. Jahrg; in Verbindung mit Prof. Dr. Schütz 4.—8. Jahrg. Berlin 1866—1883.

Gurlt und Hertwig, Magazin für die gesammte Thierheilkunde:

Einige Beiträge zur Lungenseuche-Impfung. Bd. XXI, 1855.

Ueber thyphoide Diathese bei Pferden. Bd. XXIII, 1857.

Historische Untersuchungen über das Alter der Castrationsmethoden von Erco-
lani. Bd. XXV, 1859.

Ueber die rinderpestähnlichen Erkrankungen der Schafe in Chlumez, Sedlec und
Wysoka. Bd. XXX, 1864.

Ueber Rotzkrankheit. Bd. XXX, 1864.

Die Rotzknoten in der Lunge. Bd. XXX, 1864.

Zur Entwicklungsgeschichte der beim Rinde über dem Kehlkopf vorkommenden
Hohlgeschwülste. Bd. XXXI, 1865.

Beiträge zur pathologischen Anatomie der Rinderpest. Bd. XXXI, 1865.

Pathologisch-anatomische Mittheilungen. Die sog. Schweinsberger Krankheit bei
Pferden; Verkalkung der Herzvorkammer bei einem Pferde; Hyperplasie und
Abscessbildung in der Milz mit Perforation des Magens bei einem Pferde; Fibro-
matöse Schlauchgeschwulst beim Pferde; Melanocarcinom im Schlauch vom
Pferde; Multiple Lymphosarcome beim Huhn; Krebs in der Pleura beim Hunde;
Ein Knieschwamm von einer Kuh. Bd. XXXIV, 1868.

Pathologisch-anatomische Mittheilungen. Kiefergeschwulst bei Ziegen; Epulis sar-
comatosa beim Rinde; Epulis sarcomatosa beim Pferde; Gelenkmaus im Sprung-
gelenk beim Pferde; Verstauchung des Fesselgelenkes; Necrose in der Lunge
bei Lungenseuche. Bd. XXXIV, 1868.

Zur Theorie der Rinderpest. Bd. XXXIV, 1868.

¹⁾ Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Verzeichniss nicht als ganz voll-
ständig bezeichnet werden wird, weil einzelne, namentlich in landwirthschaftlichen
Zeitschriften erschienene Veröffentlichungen übersehen worden sind.

Gerlach, später Roloff. Archiv für wissenschaftliche und praktische Thierheilkunde:

- Ueber Osteomalacie und Rachitis. Bd. I, 1875.
 Kehlkopfgeschwulst bei einer perlsüchtigen Kuh. Bd. II, 1876.
 Lungenentzündung bei Schaflämmern. Bd. II, 1876.
 Missgeburten. Bd. II, 1876.
 Ueber die Räude der Ziege. Bd. III, 1877.
 Zusammengesetzte Cyste auf dem Zungenrunde bei einem Pferde. Bd. III, 1877.
 Auszug aus den deutschen Justizgesetzen. Bd. VI, 1880.
 Nekrolog des Med.-R. Dr. Hertwig. Bd. VII, 1881.
 Die Zwangsimpfung bei der Unterdrückung der Lungenseuche. Bd. VII, 1881.
 Ueber die Lupinose. Bd. IX, 1883.
 Ueber die Lungenseucheimpfung. Bd. IX, 1883.
 Bericht über die Königl. Thierarzneischule zu Berlin 1882/83, 1883/84, 1884/85.
 Bd. IX, X, XI, 1883, 1884, 1885.
 Ueber die Milzbrandimpfung. Bd. IX, 1883.
 Ueber die Milzbrandimpfung und die Entwicklung der Milzbrandbakterien. Bd. IX, 1883.
 Ueber Lungenseuche. Bd. X, 1884.
 Ueber die Milzbrandimpfung in Packisch. Bd. X, 1884.

Pütz, Zeitschrift für praktische Veterinär-Wissenschaften:

- Ueber Gesetze und Verordnungen zur Unterdrückung der Lungenseuche. I. Jahrg. 1873.
 Zur Aetiologie der Lähme bei den jungen Thieren. I. Jahrg., 1873.
 Zur Aetiologie der Tuberculose. II. Jahrg., 1874.
 Ueber den Einfluss des Kalkgehalts der Nahrung auf die Entwicklung der Knochen. II. Jahrg., 1874.
 Pathologisch-anatomische Mittheilungen. Eitrige Entzündung des Ellenbogengelenkes; Erweichung der Kopfknochen; Psorospermienschläuche; Geschwülste in der Haut eines Schafes; Hermaphroditus transversus femininus. II. Jahrg., 1874.

Bollinger-Franck, Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin und vergleichende Pathologie:

- Männliche Geschlechtstheile beim Sunda-Rind und Rennthier. Bd. II, 1876.

Virchow, Archiv für pathologische Anatomie:

- Cancroid im Schläfenbein bei einem Ochsen. Bd. 32, 1865.
 Käsiges Darmentzündung bei Schweinen. Bd. 36, 1866.
 Ueber Osteomalacie und Rachitis. Bd. 37, 1866.
 Ueber die Ursachen der fettigen Degeneration und der Rachitis bei Füllen. Bd. 43, 1868.
 Ueber die sog. Psorospermiennoten in der Leber bei Kaninchen. Bd. 43, 1868.
 Ueber Osteomalacie. Bd. 46, 1869.
 Die Miescher'schen Schläuche oder Rainey'schen Körper. Bd. 46, 1869.
 Ueber die Anhäufung von Zellen und Kernen in den Muskeln des Frosches. Bd. 47, 1869.

Zeitschrift des landwirthschaftlichen Central-Vereins für die Provinz Sachsen:

- Gutachten des landwirthschaftlichen Central-Vereins für die Provinz Sachsen, betreffend die Anwendung der bestehenden veterinär-polizeilichen Vorschriften über den Milzbrand auf die Blutseuche der Schafe. Bd. 23, 1866.

- Kritische Beleuchtung der Viehhandelsgesetze. Bd. 23, 1866.
 Ueber die Knochenbrüchigkeit. Bd. 23, 1866.
 Die Behandlung der Schafräude. Bd. 24, 1867.
 Ueber die Pockenkrankheit der Schafe. Bd. 24, 1867.
 Hat sich das Petroleum gegen die Schafräude bewährt? Bd. 24, 1867.
 Ueber Steinbildung in den Harnorganen der Wiederkäuer. Bd. 24, 1867.
 Zur Frage der Entstehung und Vorbeugung des Milzbrandes. Bd. 25, 1868.
 Die Rinderpest in Holland. Bd. 25, 1868.
 Zur Entstehung der Traberkrankheit. Bd. 25, 1868.
 Ueber die Ursachen des Milzbrandes. Bd. 26, 1869.
 Ueber die Form des Brustkastens bei Schafen. Bd. 27, 1870.
 Der Brand bei Schafen. Bd. 28, 1871.
 Maul- und Klauenseuche bei Lämmern. Bd. 29, 1872.
 Ueber Gesetze und Verordnungen zur Unterdrückung der Lungenseuche. Bd. 30, 1873.
 Ueber die Ursachen des Milzbrandes. Bd. 32, 1875.

Fühling's Landwirthschaftliche Zeitung:

- Brandige Lungenentzündung bei Schafen. Neue Folge, 3. Jahrg., 1866.
 Zur Veterinärpolizei-Gesetzgebung. Neue Folge, 4. Jahrg., 1867.
 Ueber die Ursachen des Milzbrandes. Neue Folge, 6. Jahrg., 1869.
 Die Scrophulosis der Schweine. Neue Folge, 12. Jahrg., 1874.

Annalen der Landwirthschaft:

- Die Fettdegeneration bei jungen Schweinen. 1871.

Veterinär-Kalender:

- Ueber die Ursachen der Traberkrankheit. 1873.

Eulenberg, Handbuch des öffentlichen Gesundheitswesens:

- Die Artikel: Maul- und Klauenseuche; Milzbrand (Anthrax); Räude; Rotz; Thierseuchen und Wuth (Tollwuth). 1881/82.

Meyer's Conversations-Lexikon:

- Die Artikel, welche sich auf Thierheilkunde beziehen. III. Aufl., 1876/78.

I.

Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung der Clitoris der weiblichen Hausthiere.

Von

Prof. Dr. **Eichbaum** in Giessen.

(Hierzu Taf. I.)

Die Angaben, die wir über den feineren Bau der Clitoris in den Handbüchern der Veterinäranatomie vorfinden, sind nur dürftig und gehen im Allgemeinen dahin, dass die Clitoris, ein dem Penis des männlichen Thieres analoges Organ, in ihren Corpora cavernosa einen dem letzteren gleichen (Fürstenberg¹⁾, Franck²⁾, Leisering³⁾, Ellenberger⁴⁾, Chauveau-Arloing⁵⁾) oder wenigstens ähnlichen (Gurlt⁶⁾, Leyh⁷⁾, Weiss⁸⁾) Bau besitzt. Von einer sehr festen, fibrösen Haut sollen kleine Fortsätze nach innen abgehen, welche zahlreiche Blutgefässe und das erectile Gewebe enthalten. Einige der angeführten Autoren (Franck, Leisering) heben diese Structur nur für das Pferd hervor, andere auch für das Rind (Fürstenberg) oder für sämtliche Hausthiere (Gurlt, Leyh, Weiss). Fr. Müller fand ferner einen Knorpel in der Clitoris der Katze, in einem Falle auch bei der Hündin. Franck fügt endlich in Bezug auf die Function

¹⁾ Die Rindviehzucht von Fürstenberg-Rohde, I. Th., 1873, S. 803.

²⁾ Anatomie der Hausthiere, 1883.

³⁾ Gurlt's Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haussäugethiere, 1885, S. 375.

⁴⁾ Ibid.

⁵⁾ *Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques*, 1879.

⁶⁾ Handbuch der vergl. Anatomie der Haussäugethiere, 1860, S. 426.

⁷⁾ Handbuch der Anatomie der Hausthiere, 1850, S. 308.

⁸⁾ *Specielle Physiologie der Haussäugethiere*, 1869, S. 475.

dieses Organs hinzu, dass es sehr fraglich sei, ob der Kitzler ein Wollustorgan darstellt, was ihm von den meisten Anatomen und Physiologen unterstellt wird, da er ja bei der Begattung vieler Thiere garnicht berührt würde; er glaubt vielmehr, dass er als eines jener verkümmerten Gebilde anzusehen ist, die ursprünglich bei beiden Geschlechtern gleichmässig angelegt, bei der späteren Entwicklung derselben jedoch zurückbleiben.

Bei den Untersuchungen, die ich behufs Bearbeitung des Capitels „Weibliche Genitalien“ für die vergleichende Histologie von W. Ellenberger vornahm, entdeckte ich zu meiner Ueberraschung, dass diese Angaben nur für die Corpora cavernosa der Clitoris der Stute zutreffen, während bei allen übrigen Hausthieren das Balkengewebe und damit auch der ganze Schwellkörper durch mehr oder weniger massenhafte Einlagerungen von Fettzellen eine ganz andere Beschaffenheit erhalten haben, eine Beschaffenheit, die gleichzeitig einen Schluss auf die Function der in Rede stehenden Theile zulässt.

Obwohl die Resultate dieser Untersuchungen in Kürze bereits in dem erwähnten Lehrbuche niedergelegt sind, so habe ich es doch für angezeigt gehalten, die letzteren noch in einer besonderen Arbeit zu veröffentlichen, einmal, weil das Erscheinen der zweiten Hälfte der Ellenberger'schen Histologie sich bis jetzt leider immer noch verzögert hat, und andererseits, weil ich nachträglich noch eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen habe, die sich besonders auf die Entwicklung der Clitoris bezogen und zu recht interessanten und für die Entwicklungsgeschichte der Corpora cavernosa wichtigen Ergebnissen geführt haben.

Ich lasse in Nachstehendem zunächst die Darstellung des Befundes, wie er sich bei erwachsenen Individuen der einzelnen untersuchten Thierspecies ergeben hat, folgen. Das makroskopische Verhalten der einzelnen Theile der Clitoris, so namentlich der Corpora cavernosa, der Glans, des Präputium, der Gefässvertheilung u. s. w. soll hierbei nur insoweit in Betracht gezogen werden, als dasselbe von Wichtigkeit für die Schilderung der mikroskopischen Structur ist. Dasselbe ist auch in den gebräuchlichen anatomischen Lehrbüchern so eingehend und zutreffend beschrieben, dass ich nur eine Wiederholung bekannter Thatsachen bringen würde.

Pferd (Fig. 1).

Die Corpora cavernosa clitoridis werden bei der Stute von einer mehrere Millimeter starken Albuginea umgeben. Dieselbe besteht aus

einem derben, fibrösen Gewebe, welches zu starken, longitudinal verlaufenden Bündeln angeordnet ist, die ihrerseits wieder von schwächeren, transversal und radiär verlaufenden Bindegewebszügen umfasst werden. In der Nähe des cavernösen Gewebes wird das Gewebe der Albuginea zarter und kernreicher und seine Fasern lassen eine bestimmte Richtung nicht mehr erkennen. In dieser Form geht dasselbe in das Gewebe der Balken des Schwellgewebes über. Diese letzteren begrenzen die zur Aufnahme des Blutes bestimmten Maschenräume oder Cavernen, sind 0,20—1,0 Mm. stark und bestehen vorzugsweise aus einem kernreichen, zarten Bindegewebe, in welchem neben vereinzelten feinen elastischen Fasern Bündel glatter Muskelfasern von verschiedener Stärke (0,10—0,40 Mm.) eingelagert sind. Der Verlauf der letzteren ist meist longitudinal, und in solchen Fällen pflegen die Bündel in der Regel in der Nähe der Arterien oder mehr an der Oberfläche der Trabekel zu liegen. Daneben giebt es dann auch schief oder transversal verlaufende Muskelbündel, die indess von geringerer Mächtigkeit sind. Ausser diesen Muskelbündeln führen die Balken endlich die 0,24—0,40 Mm. starken Arterien. Dieselben zeichnen sich durch eine verhältnissmässig starke Muscularis aus. Ihr Verlauf ist ebenfalls meist ein longitudinaler. Die Oberfläche der Balken ist mit einem Endothel ausgekleidet, dessen runde Kerne sich von den spindelförmigen Kernen des darunter gelegenen Bindegewebes deutlich abheben.

Die von den Balken begrenzten und mit einander communicirenden Räume besitzen eine mannigfache Gestalt. Im Allgemeinen erscheinen sie auf dem Querschnitt rundlich oder sternförmig mit convex in das Lumen vorspringenden Contouren, auf dem Längsschnitt als Längsspalten.

In der Nähe der Spitze der Corp. cavern. clitoridis, in jenem Theil, welchen man mit der ihn überziehenden Schleimhaut auch als die Glans clitoridis bezeichnet, ändert sich das beschriebene Verhalten in der Weise, dass die Maschenräume kleiner und die Balken schwächer werden. Auch das Verhältniss der die letzteren constituirenden Bestandtheile wird ein anderes. Glatte Muskelfasern resp. Bündel derselben werden vollständig vermisst. Dafür treten elastische Fasern in grösserer Menge auf. Es liegt hier somit ein ähnliches Verhalten vor, wie in der Glans penis, nur dass hier die Corp. cavern. clitoridis, welche bekanntlich ein Analogon der Corp. cavern. penis darstellen, ohne Unterbrechung in das Schwellgewebe der Glans übergehen und

eine Trennung zwischen beiden Theilen durch eine Albuginea nicht existirt.

Eine gesonderte Albuginea fehlt der soeben erwähnten Abtheilung der Corp. cavern. der Clitoris. Es verschmilzt hier vielmehr, ähnlich wie bei der Glans penis, Schleimhaut und Albuginea vollkommen mit einander, so dass die Trabekel ihren Ursprung scheinbar aus den tiefsten Abtheilungen der Schleimhaut nehmen. An der Grenze zwischen den letzteren und dem eigentlichen Schwellgewebe, zum Theil auch in den peripherischen Balken desselben, verlaufen zahlreiche Gefässe und Nerven. Letztere, stark gewunden, erreichen eine Stärke bis zu 0,15 Mm. Sie sowohl wie die Gefässe geben zahlreiche Seitenzweige ab, welche senkrecht zur Oberfläche der Schleimhaut in die Höhe steigen.

Die Schleimhaut der Glans clitoridis zeigt einen cutanen Charakter. Jene Abtheilungen derselben, welche die vordere und die Seitenflächen der stumpf kegelförmigen Hervorragung, sowie das sogen. Praeputium clitoridis bilden, zeichnen sich durch den Besitz eines gut entwickelten Papillarkörpers aus, der von einem starken, geschichteten, stellenweise in seinen unteren Schichten pigmentirten, in seinen oberen Schichten vorhornten Plattenepithel bedeckt ist. Die Form der dicht neben einander stehenden Papillen ist eine kegel- oder fingerförmige. Dieselben sind in der zwischen Präputium und Clitoris gelegenen Grube verhältnissmässig niedrig, nehmen jedoch im weiteren Verlauf an der vorderen Fläche des Kitzlers an Umfang zu, um ihre grösste Höhe an der Spitze der Clitoris zu erreichen, wo sie, häufig stark verbreitert, die weiter unten zu beschreibenden Nervenendgebilde beherbergen. An der Stelle, wo die Schleimhaut von der Spitze der Clitoris in die hinter derselben gelegene Schmiergrube — Analogon der schifförmigen Grube des männlichen Thieres — übergeht, hört der Papillarkörper fast plötzlich auf; die Oberfläche des Stratum mucosum der erwähnten Grube erscheint vollkommen glatt, sein epithelialer Ueberzug ist beträchtlich schwächer und ebenso fehlt demselben der auffallende Gefäss- und Nervenreichthum, der die vorhin erwähnten Schleimhautabtheilungen der Clitoris auszeichnet.

Das Stratum mucosum der Clitorisschleimhaut besteht aus einem kernarmen, fibrillären Bindegewebe, welches zu Bündeln angeordnet sich in mannigfacher Weise durchflechtet und in den tieferen Schichten, in der Nähe des Schwellkörpers beträchtlich dichter erscheint, als in den mehr oberflächlichen. Es wird von ungemein zahlreichen

Gefäßen und Nerven durchzogen. Letztere nehmen ihren Ursprung in den tieferen Schichten des Stratum mucosum und verlaufen von hier aus, gewöhnlich parallel neben einander liegend, nach der Oberfläche der Schleimhaut, wo sie in die Papillen eintreten und dort endigen. Sie liegen so dicht neben einander, dass meist nur ein Zwischenraum von 0,03 Mm. zwischen ihnen vorhanden ist und sie dem Stratum mucosum ein radiär gestreiftes Aussehen verleihen. In zahlreichen Papillen der Schleimhaut der oberen Abtheilung der vorderen Kitzlereichelfläche befinden sich eigenthümliche Gebilde von rundlicher oder ovaler Form, die eine Länge bis zu 0,12 Mm., eine Breite von 0,06 Mm. besitzen und mit feinen Nervenfäden im Zusammenhange stehen. Sie werden nach aussen von einer zarten Hülle umgeben, in welcher spindelförmige Kerne vorzugsweise in der Längsrichtung des Organs eingelagert sind. Der Inhalt der letzteren besteht aus einer feinkörnigen Masse und zahlreichen, darin suspendirten, stäbchen- oder spindelförmigen transversal gelegenen Kernen. Es sind dies zweifellos dieselben oder ähnliche Nervenendkörperchen, welche Krause beim Menschen und anderen Thieren beobachtet und mit dem Namen der „Genitalnervenkörperchen“ bezeichnet hat.

Rind (Fig. 2).

Bezüglich des grob anatomischen Baues ist hier zunächst hervorzuheben, dass zu beiden Seiten der in der unteren Schamcommissur gelegenen, zugespitzten Kitzlereichel zwei Schleimhautfalten entspringen, welche divergirend nach hinten verlaufen und eine mediane grubige Vertiefung von ovaler Form begrenzen. Diese Grube, die in ähnlicher Gestalt auch bei anderen Thierspecies vorkommt und hier der Kürze wegen Kitzlergrube genannt sein mag, setzt sich nach vorn zu in Form eines Spaltes auf eine Strecke von 5 Mm. unter die Glans clitoridis fort und trennt so die untere Fläche der letzteren von dem Boden der Kitzlergrube. Es wäre hiernach, wenn wir die erwähnten Schleimhautfalten als Präputialfalten auffassen, die obere Fläche der Clitoriseichel, wie die meisten Veterinäranatomen sich ausdrücken, mit dem Präputium verwachsen. Es geschieht dies jedoch nicht nur „in manchen Fällen“, wie Franck angiebt; ich habe vielmehr dieses Verhalten constant, sowohl bei ganz jungen wie bei erwachsenen Thieren gefunden. Auch Fürstenberg (l. c.) giebt eine hiermit übereinstimmende Beschreibung.

Das geschlängelt verlaufende Corpus cavernosum clitoridis zeigt

auf dem Querschnitt eine ovale Gestalt, welche auf der oberen Fläche eine schwache Aushöhlung zur Aufnahme grösserer Gefässe und Nerven besitzt. Die mikroskopische Untersuchung desselben ergibt ein vom Pferde wesentlich verschiedenes Verhalten. Es wird zunächst, wie dort, der Schwellkörper von einer rein bindegewebigen, 0,4 Mm. breiten Albuginea umgeben. Ein Balkenwerk, wie wir es bei der Stute kennen gelernt haben, existirt dagegen nur in den centralen Abtheilungen des Schwellkörpers. Die Trabekel sind hier schwächer, sie besitzen gewöhnlich nur eine Stärke von 0,16—0,20 Mm. und liegen dicht neben einander, so dass die zwischen ihnen befindlichen cavernösen Räume auf schmale Spalten reducirt sind. Die Balken bestehen aus einem fibrillären Gewebe mit zahlreichen spindel- und stäbchenförmigen Kernen. Glatte Musculatur, in Form von Längsbündeln angeordnet, findet sich in den Balken nicht vor. Nach der Albuginea hin lösen sich diese Balken in breitere und schmalere, sich immer wieder von Neuem theilende Züge auf, welche aus denselben Elementen bestehen. Sie führen häufig kleine Arterien oder Capillaren, werden schliesslich bis zu einer Stärke von 0,02 Mm. und noch weniger reducirt und begrenzen in dieser Stärke zahlreiche vereinzelte oder zu Gruppen vereinigte Fettzellen. Letztere sind meist rundlich, häufig auch polygonal gestaltet, besitzen einen Durchmesser von durchschnittlich 0,10 Mm. und zeigen alle für Fett charakteristischen Reactionen; sie werden namentlich durch Ueberosmiumsäure schwarz gefärbt. Sie kommen um so reichlicher vor, je mehr man sich der Albuginea nähert, so dass die Peripherie des Corpus cavernosum fast ausschliesslich von Fettzellen gebildet ist, die dann stellenweise spaltartige Cavernen umgeben. In unmittelbarer Nähe der Albuginea, an welcher sich die zu schmalen Bindegewebszügen aufgelösten Balken mit verbreiteter Basis anlegen, werden die Fettzellen sparsamer, die Balken stärker. Das Gewebe der letzteren erscheint hier sowohl, wie in den centralen Theilen des Schwellkörpers in der Umgebung der Fettzellen lockerer und kernreicher.

Gegen die Spitze des Corpus cavernosum ändert sich dieses Verhalten in der Weise, dass die Fettzellen allmählich seltener zur Beobachtung kommen und schliesslich vollständig verschwinden, so dass hier die Balken nur noch aus einem kernreichen Bindegewebe bestehen, welches von zahlreichen Capillargefässen durchzogen wird. Die Albuginea ist beträchtlich schwächer, die Cavernen stellen, wie in den

übrigen Abtheilungen des Corpus cavernosum, äusserst schmale, längliche oder sternförmige Spalten dar.

Die die Spitze des Corpus cavernosum umgebende Glans besteht aus einem zarten, kernreichen, bindegewebigen Stratum, in welchem zu beiden Seiten des ersterwähnten Gebildes zahlreiche, verhältnissmässig starke Nerven geschlängelt verlaufen. Zahlreiche venöse Gefässe sind ferner in den tieferen Schichten der Schleimhaut eingelagert und verleihen dem ganzen Gewebe ein cavernöses Aussehen. In der Nähe der Oberfläche erscheint das Gewebe dichter und wird von Capillargefässen und vereinzelt dünnen Nervenzweigen durchzogen. Die untere Fläche der Glans ist uneben und lässt einen schwach entwickelten Papillarkörper erkennen, in welchem nervöse Endorgane jedoch, insbesondere Endkolben, wie sie Bense¹⁾ beobachtet hat, in keinem Falle nachgewiesen werden konnten. Ihre obere Fläche zeigt die Einrichtung der Schleimhaut des Vestibulum und besitzt stellenweise Lymphfollikel. Beide Flächen tragen ein geschichtetes Plattenepithel.

Schaf.

Das Schaf besitzt in der unteren Commissur der Vulva einen 3—4 Mm. langen, sich nach hinten zuspitzenden Fortsatz, dessen untere Fläche mit Wollhaaren besetzt ist, während die obere das Aussehen der Vorhofsschleimhaut besitzt. Auf diesem Fortsatz befindet sich die flache, 3 Mm. lange und 2,5 Mm. breite Kitzlergrube, welche sich nach vorn zuspitzt. Die übrigen Verhältnisse wie bei dem Rinde.

Das ebenfalls stark geschlängelte Corpus cavernosum zeigt auf dem Transversalschnitt die Form eines Querovals, dessen grösster Durchmesser 3,20 Mm. und dessen Höhe 1 Mm. beträgt. Die Albuginea stellt eine dichte, kernreiche, bindegewebige Schicht von 0,20 Mm. Stärke dar. Die davon entspringenden 0,030—0,060 Mm. starken Trabekel bestehen aus einem feingestreiften Gewebe mit spindel- und stäbchenförmigen Kernen. Die Cavernen stellen sternförmige, rundliche oder ovale Räume von geringen Dimensionen dar. An der Stelle, wo das Corpus cavernosum in die Clitoriseichel übertritt, finden sich auch Fettzellen in den Balken eingelagert vor. Unter allmählicher Abnahme seiner Höhen- und Breitendurchmesser, sowie der

¹⁾ Zeitschr. f. ration. Med., Bd. 23.

Zahl und Grösse seiner Maschenräume endet das Corpus cavernosum in der Nähe der Spitze der Glans clitoridis.

Die Form und das Gewebe der letzteren wie bei dem Rinde. Besondere Nervenendgebilde fehlen auch hier. Dagegen sind an vielen Stellen an der Basis der papillenartigen Vorsprünge longitudinal verlaufende Nervenzweige zu beobachten. In den peripherischen Abtheilungen der Glans verlaufen dicht neben einander liegend zahlreiche ziemlich starke Venen in longitudinaler Richtung.

Die Kitzlergrube zeigt in der Mitte eine longitudinale Erhöhung, die nach beiden Seiten von flachen Furchen begrenzt wird. Ein Papillarkörper ist auf ersterer nur angedeutet. Die Propria mucosae besteht aus einem dichten, elastische Fasern führenden, bindegewebigen Stratum, welches ungemein zahlreiche, starke, meist gewunden verlaufende Gefässe enthält. Ebenso finden sich an mehreren Stellen ziemlich starke, in der Längsrichtung der Grube verlaufende Nerven. Das Epithel ist ein starkes geschichtetes Plattenepithel, welches sich in der Gegend, wo die Glans den Boden der Grube berührt, in Form von breiten Zapfen in die Tiefe hineinstülpt, welche sich mehrfach theilen, so dass zwischen Epithelstreifen mehr oder weniger breite Partien des bindegewebigen Stratum eingeschlossen erscheinen.

Bei der Ziege liegen die makro- und mikroskopischen Verhältnisse ähnlich wie bei dem Schafe. Das Corpus cavernosum ist hier etwas stärker als bei letzterem und ebenso auch das System der cavernösen Räume besser entwickelt. Im ganzen Verlauf des Corpus cavernosum lassen sich Fettzellen in den Balken entweder einzeln oder in Gruppen eingelagert constatiren.

Schwein (Fig. 3).

Aus dem unteren Schamwinkel ragt ein kegelförmiger Fortsatz von 5 Mm. Länge hervor. Von der oberen Fläche desselben entspringen dicht neben einander zwei Falten, welche divergirend nach vorn verlaufen, wobei sie allmählich niedriger werden und eine ovale Grube begrenzen, welche nach vorn zu von einer transversalen Schleimhautfalte überbrückt wird. Diese letztere besitzt einen nach hinten gerichteten, freien Rand und in der Medianlinie einen zugespitzten Fortsatz von kegelförmiger Gestalt und 3—4 Mm. Länge, die Spitze der Glans clitoridis. An ihrer unteren Fläche weist sie eine longitudinale, wulstartige Verdickung auf, welche mit der Falte durch einen spaltartigen Raum von dem Boden der anfangs erwähnten Grube

getrennt wird. Letztere ist in niedrige, unregelmässig angeordnete Falten gelegt, zwischen welchen flache, rundliche, grubige Vertiefungen zu bemerken sind.

Das Corpus cavernosum des Kitzlers verläuft stark geschlängelt und besitzt auf dem Querschnitt die Form eines Querovals, dessen Breite 7 Mm. und dessen Höhe 4 Mm. beträgt. Das mikroskopische Bild desselben besitzt eine grosse Aehnlichkeit mit dem bei dem Rinde beschriebenen, nur dass hier das Balkengewebe noch mehr durch die eingelagerten Fettzellen verdrängt ist. Es findet sich zunächst, dass dasselbe von einer 0,30 Mm. starken Albuginea umgeben wird. Dieselbe besteht aus einem dichten, bindegewebigen Stratum, welches in seinen tieferen, dem Schwellgewebe zugewandten Schichten breite Züge stäbchenförmiger Kerne aufweist. Der Schwellkörper macht bei oberflächlicher Betrachtung vollständig den Eindruck eines quer durchschnittenen Fettstranges, dessen zu Gruppen vereinigte Zellen durch bindegewebige Züge von einander getrennt werden. Diese letzteren sind in den centralen Abtheilungen des Corpus cavernosum immer stärker als in der Peripherie. Bei genauerer Untersuchung finden sich vereinzelt Cavernen in Form von sternförmigen oder länglichen Spalten vor. Dieselben erreichen unter Umständen eine Länge von 0,40 Mm. und eine Breite von 0,16 Mm. Die unmittelbare Umgebung derselben wird von einem feingestreiften, mit spindelförmigen Kernen ausgestatteten Balkengewebe gebildet. Von hier strahlen mehr oder weniger breite Züge nach allen Richtungen aus, welche sich bald in feinere und feinste, aus einigen Fibrillen bestehende Bälkchen zerlegen und in dieser Form Fettzellen einschliessen, welche meist in Gruppen von rundlicher oder polygonaler Form zu 5—10 zusammengelagert sind. Die stärkeren Balken führen ziemlich starke Gefässe, die in verschiedener Richtung getroffen erscheinen, in der Regel aber so, dass die stärkeren Gefässe transversal durchschnitten sind, also einen longitudinalen Verlauf haben, während die kleineren Arterien auch häufig der Länge nach getroffen werden. Das Gewebe der Balken besteht aus einem kernreichen fibrillären Bindegewebe.

In der Nähe der Spitze des Corpus cavernosum verschwinden die Fettzellen aus den Trabekeln. Die Cavernen werden zahlreicher, die Form derselben meist rund oder oval. Die Balken bestehen aus einem feinstreifigen Gewebe mit rundlichen oder ovalen, seltener spindelförmigen Kernen. Als solider, fibröser, anfangs 0,80 Mm. starker, im weiteren Verlauf sich verschmälernder Faden setzt sich

das Corpus cavernosum in den oben beschriebenen, die Spitze der Clitoriseichel bildenden Fortsatz fort, um in demselben zu enden.

Die Glans clitoridis besteht aus einem dichten Geflecht von fibrillären Bindegewebsbündeln, welches von zahlreichen Gefässen und Nerven durchzogen wird. Die grösseren Zweige der letzteren verlaufen stets in longitudinaler Richtung in der Nähe der Albuginea corp. cavernosi; von hier aus treten dann die Seitenzweige ab, um nach der Oberfläche zu verlaufen, wobei die Nerven mit eigenthümlichen, sogleich zu beschreibenden Nervenendorganen in Verbindung treten. Die obere Fläche der Clitoriseichel bildet, soweit letztere mit der anfangs erwähnten transversalen Schleimhautfalte verbunden ist, einen Theil der Schleimhaut des Vestibulum und besitzt hier zahlreiche, dicht neben einander stehende, finger- oder keulenförmige Papillen, die von einer starken Lage eines geschichteten Plattenepithels bedeckt sind. An der Basis einzelner Papillen, die in solchen Fällen stark verbreitert sind, finden sich Lymphfollikel vor.

Die papilläre Einrichtung ist auch noch auf der oberen Fläche der Spitze der Clitoriseichel zu beobachten. Die untere Fläche derselben zeigt jedoch ein hiervon ganz abweichendes Verhalten. Verhältnissmässig glatt, weist dieselbe kolbige Epitheleinstülpungen in das darunter liegende bindegewebige Stratum auf, die an der Spitze der Glans kurz und vereinzelt vorkommen, im weiteren Verlauf nach vorn immer tiefer sich hineinsenken und ihre stärkste Entwicklung an jener Stelle erfahren, wo die untere Fläche der Glans clitoridis den Boden der Kitzlergrube berührt (vergl. Fig. 3). Hier erreichen diese Epithelzapfen, welche sich auch häufig verästeln, eine Länge von 0,60 Mm. und liegen so dicht neben einander, dass die Zwischenräume zwischen denselben in der Regel nur 0,20—0,30 Mm. betragen. Auch die Schleimhaut der Kitzlergrube zeigt an der angeführten Stelle eine ähnliche Einrichtung.

Die von den erwähnten Epitheleinstülpungen begrenzten Abtheilungen des Stratum mucosum zeigen auf dem Querschnitt meist eine kolbenförmige Gestalt, dadurch hervorgerufen, dass die Epithelzapfen an ihrem Ende stark verdickt sind, und der Abstand zwischen je zwei Epithelfortsätzen hierdurch geringer wird, als in der Nähe der Oberfläche der Schleimhaut. In diesen von Epithelmassen umgebenen Räumen liegen in der Regel einzeln, seltener zu zweien, eigenthümliche Gebilde, die wegen ihres Zusammenhanges mit den Nerven der Clitoris als Nervenendorgane aufgefasst werden müssen. Dieselben besitzen meist eine rundliche

Gestalt und einen Durchmesser von 0,21—0,24 Mm. Sie bestehen aus einer äusseren, 0,024 Mm. starken, fein gestreiften Hülle, welche zahlreiche spindelförmige Kerne aufweist und einen feinkörnigen Inhalt einschliesst. Die zahlreichen, theils rundlichen, theils oblongen Kerne, welche in diesem Inhalt vorhanden sind, lassen eine bestimmte Anordnung nicht erkennen, sondern liegen zum Theil in der Quer-, zum Theil in der Längsrichtung des Organs, theilweise auch in schiefer Richtung zu demselben. Die eintretenden Nerven, deren Zahl in der Regel zwei, selten mehr ist, legen sich gewöhnlich an die Seitenfläche der Körperchen an und verschmelzen hier mit ihrem Neurilemm mit der streifigen Hülle der Terminalkörperchen. Nylander, Kölliker und W. Krause wollen auch Vater'sche Körperchen in der Glans clitoridis des Schweins gesehen haben. Letzterer erwähnt auch eine Uebergangsform von Endkolben zu Vater'schen Körperchen. Nach seiner Beschreibung liegen dieselben ziemlich oberflächlich, haben eine Länge von 0,17—0,22 Mm. und „eine dicke, mehrfach geschichtete Bindegewebshülle, doch keine eigentlichen Kapseln, und der Centralstrang ist nicht schmal, wie beim Vater'schen Körperchen, sondern macht der Masse nach den grössten Theil des ganzen Gebildes aus. Häufig treten mehrere Nervenfasern, zuweilen auch an der seitlichen Begrenzung, in dasselbe ein und vertheilen sich, vielfach gewunden, theils noch doppelt contourirt, theils fein und blass geworden in dem ganzen Innern.“ Es sind dies offenbar die vorher beschriebenen Körperchen. Bense¹⁾ beschreibt dieselben in ähnlicher Weise und bezeichnet sie nach dem Vorgange von Finger als Wollustkörperchen.

Hund (Fig. 4).

Der Kitzler der Hündin entspringt mit zwei Wurzeln, die auf dem Querschnitt eine ovale Form besitzen und sich nach einem Verlauf von 1 Cm. zu dem Corpus cavernosum vereinigen. Der Schwellkörper, welcher schon bei makroskopischer Untersuchung das Aussehen eines festen, derben Fettstranges macht, wird durch ein medianes Septum, welches sich bis auf eine Entfernung von 1 Cm. bis zur Spitze verfolgen lässt, in zwei symmetrische Hälften getheilt. Seine Breite beträgt nach der Vereinigung der beiden Wurzeln 1,6 Cm., seine Höhe 10 Mm.; im weiteren Verlauf nach hinten nimmt der

¹⁾ Zeitschr. f. ration. Med.. Bd. 23.

Breitendurchmesser ab, so dass in der Nähe der Clitorisspitze der Höhendurchmesser prävalirt, der seine früheren Dimensionen beibehalten hat, während der Querdurchmesser auf 8 Mm. reducirt ist. An der Stelle, wo das Corpus cavernosum in die die Kitzlergrube überbrückende Schleimhautfalte hineintritt, spitzt sich dasselbe ziemlich plötzlich zu und endet daselbst, nachdem es im Ganzen eine Länge von 4 Cm. erreicht hat.

Die Einrichtung der Kitzlereichel und der Kitzlergrube verhält sich ähnlich wie bei dem Schwein. Von den Seitenrändern der kurzen Eichelspitze treten zwei Falten ab, welche divergirend zunächst nach aussen, dann unter fast rechtem Winkel abgebogen nach hinten verlaufen, um in der Nähe der unteren Commissur in die Ränder der Labien überzugehen. Die erwähnten Falten begrenzen eine flache, ovale Grube, die eine Länge von 3 Cm., eine Breite von 1,5 Cm. besitzt, und nach vorn zum Theil von einer transversalen Schleimhautfalte bezw. der an der unteren Fläche derselben als Längswulst hervortretenden Clitoriseichel bedeckt wird. Zwischen der letzt-erwähnten Fläche und der Bodenfläche der Kitzlergrube befindet sich ein blindsackförmiger Raum, welcher eine Ausdehnung von etwa 1 Cm. besitzt und die Glans clitoridis von der Kitzlergrube trennt. Die Schleimhaut der letzteren besitzt unterhalb der Clitoris eine mediane, wulstartige Erhöhung und ist in mehrere niedrige, longitudinale Falten gelegt, zwischen welchen sich rundliche, flache, grubige Vertiefungen vorfinden.

Eine eigenthümliche Structur weisen auch hier die den Corpora cavernosa entsprechenden Gebilde auf. Dieselben werden nach aussen von einer fibrösen Albuginea begrenzt, welche in der Mitte der oberen Fläche am stärksten (1,80 Mm.) ist, nach beiden Seiten zu sich beträchtlich verschmälert (0,40 Mm.) und in dieser Stärke auch an der unteren und den Seitenflächen des auf dem Querschnitt eine annähernd dreieckige Gestalt besitzenden Corpus cavernosum vorhanden ist. An den letzterwähnten Flächen erscheint sie jedoch weniger derb und zeigt häufig kleinere und grössere, mit Fettzellen erfüllte Spalten. Die Albuginea besteht fast ausschliesslich aus Bindegewebe. Von der Mitte der oberen Fläche geht ein Septum in das Innere des Körpers ab, welches jedoch nur in der Nähe der Vereinigungsstelle der beiden Wurzeln die Albuginea der unteren Fläche des Schwellkörpers erreicht, in den übrigen Abtheilungen des letzteren an seinem Ursprung eine Stärke von 0,40 Mm. besitzt, die im weiteren Verlauf in Folge der

Abgabe zahlreicher seitlicher Bündel immer geringer wird, so dass das Septum schliesslich zugespitzt endet, ohne die untere Wand zu erreichen. Ausser diesem Septum treten von zahlreichen Stellen der Albuginea balkenartige Fortsätze, jedoch meist schwächer, in das Innere hinein, welche sich im Uebrigen so verhalten, wie das Septum und die von ihm ausstrahlenden Bindegewebszüge. Dieselben begrenzen häufig spaltförmig comprimirt Cavernen und führen Arterien, die in verschiedenen Richtungen getroffen erscheinen. Von ihnen gehen unter rechtem oder spitzem Winkel Seitenzweige ab, die sich durch fortgesetzte Theilung bis auf 0,003—0,006 Mm. starke Züge verschmälern und in dieser Stärke mit anderen Bälkchen in Verbindung treten. Sie umschliessen so rundliche oder polygonale Räume, von denen jeder mit einer Fettzelle ausgefüllt ist. In den Knotenpunkten findet sich in der Regel ein ovaler Kern vor, während die stärkeren Bälkchen spindel- oder stäbchenförmige Kerne aufweisen. An der Aussenfläche der Seitenwand des Corpus cavernosum finden sich in einem lockeren, Fettzellen enthaltenden Gewebe grössere Arterien, Venen und Nerven eingebettet; die obere Fläche desselben stösst an ein ziemlich stark entwickeltes Schwellgewebe, die mediane Abtheilung der Corpora cavernosa vestibuli.

Die beschriebene Structur zeigt das Corpus cavernosum clitoridis bis zu jener Stelle, wo das letztere in die oben erwähnte, die Kitzlergrube überbrückende Schleimhautfalte hineintritt. Hier nehmen die Dimensionen des Schwellkörpers in beträchtlichem Masse ab und letzterer geht in eine Spitze über, in welcher die Balken dichter liegen, die eingelagerten Fettzellen seltener werden und zuletzt vollständig verschwinden, so dass auch hier die Spitze des Corpus cavernosum aus einem soliden fibrösen Faden besteht, welcher sich, von zahlreichen Nerven begleitet, bis zu dem Rande der angeführten Schleimhautfalte hinzieht.

Die Eichel des Kitzlers besteht aus einem dichten bindegewebigen Stratum, welches von ungemein zahlreichen, stark gewundenen Arterien, Venen und Nerven durchzogen wird. Die Blutgefässe sind besonders stark an der Spitze der Clitoriseichel entwickelt und in dem Gewebe der letzteren so gelagert, dass die Venen mehr in den tieferen Abtheilungen, die Arterien mehr in der Peripherie desselben gelegen sind. Ausserdem kommen hier zahlreiche Cavernen von unregelmässig sternförmiger Gestalt von 0,015—0,060 Mm. Durchmesser vor. Die Oberfläche der Glans zeigt einen schwach entwickelten

Papillarkörper und wird von einem geschichteten Plattenepithel bedeckt. Nervenendorgane sind in oder in der Nähe der Papillen nicht wahrzunehmen. Auch Bense (l. c.) hat sich vergebens bemüht, Nervenendkörperchen in der Clitoris des Hundes nachzuweisen. Von dem Gewebe der darüber liegenden und mit der Kitzlereichel verwachsenen Schleimhautfalte ist das Gewebe der Eichel durch eine 0,40 Mm. breite Bindegewebsschicht getrennt, welche der grösseren Gefässe fast vollständig entbehrt. Die Grundlage der erwähnten Falte wird von einem etwa 1 Mm. starken cavernösen Gewebe gebildet, welches sich bis zum hinteren Rande derselben hinzieht und nach beiden Seiten zu in die Corpora cavernosa vestibuli übergeht; es steht mit den Venennetzen der Kitzlereichel durch Verbindungsäste, welche die vorhin angeführte Bindegewebsschicht durchbohren, in Communication.

Die Schleimhaut der Kitzlergrube ist vollkommen drüsenlos und besteht ebenfalls aus einem derben, von elastischen Fasern durchzogenen Bindegewebsgeflecht, welches in seinen tieferen Schichten ausser zahlreichen Gefässen noch longitudinal und transversal verlaufende Züge glatter Muskelfasern enthält, welche besonders reichlich in der medianen Partie der Grube zur Beobachtung kommen. An der Stelle, wo sich die Clitoriseichel bis zur Verschmelzung der Bodenfläche der in Rede stehenden Grube genähert, findet sich in der Schleimhaut, etwa 2—3 Mm. unter der Oberfläche gelegen, ein cavernöses Gewebe vor, in dessen Balken Züge glatter Muskelfasern in den verschiedensten Richtungen verlaufen. Dasselbe erstreckt sich mehrere Millimeter weit, unter den Corp. cavern. clitoridis gelegen, nach vorn und bildet eine Art Knollen, welchen Kobelt¹⁾ als Eichelknollen bezeichnet und als ein dem Penisknollen des männlichen Hundes analoges Organ anspricht. Er steht nach beiden Seiten mit der Pars intermedia der Corp. cavern. vestibuli in Communication: aus seiner vorderen Abtheilung nehmen die beiden Äste der Vena dorsalis ihren Ursprung. Die Oberfläche der Schleimhaut der Kitzlergrube besitzt ein geschichtetes Plattenepithel, welches einen Papillarkörper bedeckt, der besonders in den hinteren Abtheilungen der Grube gut entwickelt ist und aus ziemlich hohen kegelförmigen Papillen besteht, während er in jenen Partien, welche von der transversalen Schleimhautfalte überbrückt sind, meist

¹⁾ Kobelt, Die männlichen und weiblichen Wollustorgane des Menschen und einiger Säugethiere. 1844.

nur angedeutet ist. Auch die Stärke des epithelialen Belages hat hier in bemerkbarem Grade abgenommen.

Katze (Fig. 5).

Das Corpus cavernosum des Kitzlers besitzt auf dem Querschnitt eine dreieckige Gestalt, deren Basis nach dem Scheidenvorhof und deren Spitze nach abwärts gerichtet ist. In der Nähe seines Ursprunges besitzt dasselbe eine Breite von 2 Mm. und eine ebensolche Höhe. Gebildet wird das Corpus cavernosum von einer 0,20 Mm. starken bindegewebigen Albuginea, von welcher zahlreiche feine Trabekel ausstrahlen, die zwischen sich Fettzellen enthalten und sich in der Mitte zu einem 0,50 Mm. starken bindegewebigen und sich durch die ganze Länge des Corpus cavernosum hinziehenden Strang vereinigen, welcher die Gefässe und vereinzelte cavernenartige Räume enthält. In der Eichel des Kitzlers endet das Corpus cavernosum mit einer soliden Spitze.

Der Bau der Kitzlereichel ist ähnlich wie bei der Hündin. Auch hier ist die obere Fläche derselben mit der Schleimhaut des Vestibulum verschmolzen, während die untere Fläche der Kitzlergrube zugewendet ist und letzterer streckenweise dicht anliegt. Das Corpus cavernosum clitoridis wird, soweit es in der Glans gelegen ist, von allen Seiten von einem stark entwickelten Schwellgewebe umgeben. Die obere Fläche deckt die mediane Abtheilung der Corp. cavern. vestibuli, welche aus einer 3—4fachen Lage grösserer und kleinerer Cavernen zusammengesetzt ist. Die Cavernen an den beiden Seitenflächen sind grösser, meist jedoch nur in doppelter Lage vorhanden. Zwischen denselben, besonders in der äusseren, dem epithelialen Ueberzuge angrenzenden Lage befinden sich Pacini'sche Körperchen, die theils in der Längsrichtung, theils in transversaler Richtung zur Clitoriseichel gelagert sind. Gegen die Spitze der Clitoriseichel nehmen die Cavernen an Zahl und Grösse ab und fehlen an der äussersten Spitze vollkommen.

Kaninchen.

Bei dem Kaninchen zeigen die beiden Hälften des von oben nach unten zu abgeplatteten Corpus cavernosum clitoridis, unmittelbar nach der Verschmelzung der beiden Wurzeln, vollkommen die Structur der Corpora cavernosa penis. Von einer 0,30 Mm. starken, bindegewebigen Albuginea, an deren unterer und seitlicher Aussenfläche sich

die Fasern des *M. erector clitoridis* inseriren, strahlen zahlreiche, mit muskulösen Elementen und arteriellen Gefässen ausgestattete Balken in das Innere, welche sich theilen, mit anderen verschmelzen und auf diese Weise ein complicirtes System von cavernösen Räumen bilden und begrenzen. Die beiden Hälften des Schwellkörpers werden durch ein 0,50 Mm. breites Septum, welches die Structur der Albuginea besitzt, von einander getrennt. Die obere Fläche des *Corpus cavernosum* deckt ein Venennetz, welches die Vagina ringsum umgiebt. In den hierauf folgenden Schnittserien finden sich ausser den angegebenen Elementen noch Fettzellen in den Balken eingelagert. Dieselben kommen besonders an jenen Stellen des Schwellkörpers zur Beobachtung, welche in der Nähe der Seitenränder desselben gelegen sind, und liegen anfangs nur spärlich, einzeln oder in Gruppen zu zwei oder drei in der bindegewebigen Grundlage der Trabekel. Weiter nach der Spitze zu und nachdem das mediane Septum verschwunden und an Stelle desselben ein vielfach durchbrochenes Balkenwerk getreten ist, nimmt die Zahl derselben beträchtlich zu, so dass die angegebenen Stellen zum grössten Theil aus Fett bestehen, zwischen dem sich schmale Züge des auseinander gedrängten Balkengewebes hinziehen. Die cavernösen Räume sind hierbei zu schmalen Spalten comprimirt. Hinter der Insertion des *M. erector clitoridis* verlaufen an der unteren Fläche des *Corpus cavernosum* jederseits zwei starke Gefässe, eine Arterie und eine Vene, begleitet von mehreren, ebenfalls longitudinal verlaufenden Nervenzweigen. In der Nähe der Spitze treten die angeführten Gebilde mehr auf die Seitenflächen des Organs, welches hier eine mehr drehrunde Gestalt angenommen hat. Die Albuginea besitzt an der Spitze des Schwellkörpers ausser einer inneren Lage circular verlaufender noch eine äussere, fast ebenso starke Schicht longitudinal angeordneter Bindegewebsbündel. Im Schwellgewebe sind hier Fettzellen seltener und dann nur vereinzelt wahrzunehmen. Im Gewebe der Glans, welches sich makro- und mikroskopisch so verhält wie bei der Hündin, konnten Nervenendorgane nicht wahrgenommen werden, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass Rauber an der Clitoris des Kaninchens Pacini'sche Körperchen beobachtet hat. Bense (l. c.) will ferner Wollustkörperchen in grosser Anzahl gesehen haben.

Die vorliegenden, an acht verschiedenen Hausthierspecies ausgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass, mit Ausnahme der Stute, das Balkengewebe der Corpora cavernosa clitoridis Fettzellen enthält, die bei einigen Thierspecies in so enormen Mengen auftreten, dass die Structur eines cavernösen Gewebes fast vollständig zu Grunde gegangen ist oder wenigstens auf den ersten Blick zu fehlen scheint. Am aller auffälligsten ist dies bei der Clitoris der Hündin der Fall, wo die Corpora cavernosa das Aussehen und die Structur eines derben Fettstranges angenommen haben, welcher, wie es scheint, von den Veterinär Anatomen garnicht mehr zur Clitoris gehörig gerechnet worden ist. Franck (l. c.) giebt an, dass der Kitzler des Fleischfressers sehr klein ist. Leisering (l. c.) hebt weiterhin hervor, dass der Kitzler der Hündin, da er „von einem starken Fettkörper getragen wird,“ scheinbar sehr entwickelt ist. Dieser Fettkörper ist, wie die vorliegenden Untersuchungen wohl zweifellos ergeben haben, das Corpus cavernosum der Clitoris, welches schliesslich in eine solide, in der Eichel endende Spitze ausläuft und durch das Vorhandensein spaltförmiger, von Bindegewebszügen begrenzter Cavernen an den Bau eines Schwellkörpers erinnert. Nach der Hündin folgen, was den Grad der Fetteinlagerung in die Balken des cavernösen Gewebes anbelangt, das Schwein, das Rind, die Katze, das Kaninchen. Am wenigsten abweichend von dem gewöhnlichen Bau eines Schwellkörpers verhalten sich die Corpora cavernosa vom Schaf und von der Ziege, wo sich nur eine geringe Anzahl von Fettzellen in den Trabekeln vorgefunden hat. Die Einlagerung von Fett in das Gewebe der Corpora cavernosa clitoridis ist übrigens schon früher bei anderen Thierspecies gefunden worden. So berichtet Joh. Müller¹⁾, welcher sich in seiner Physiologie gegen die Erectionsfähigkeit der Clitoris auch beim menschlichen Weibe ausspricht, dass er im Körper des $3\frac{1}{2}$ Zoll langen Kitzlers von Atelesweibchen gar kein erectiles Gefüge, sondern nur dichtes Fett gefunden habe. Eigenthümlich ist es ferner, dass bei sämtlichen untersuchten Species die Fetteinlagerung vorzugsweise die peripherischen Abtheilungen des Schwellkörpers betrifft, während die centralen Theile entweder die normale Structur eines Schwellkörpers zeigen, wie beim Rinde, der Katze, dem Kanin-

¹⁾ Joh. Müller, Ueber zwei verschiedene Typen in dem Bau der männlichen erectilen Geschlechtsorgane etc.

chen, oder doch nur verhältnissmässig spärliche Fettzellen, wie beim Schwein aufweisen. Es ist hierbei allerdings nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, und die Entwicklungsgeschichte dieses Organs liefert für diese Annahme einige Belege, dass mit zunehmendem Alter auch die erst erwähnten Partien immer mehr der Fettinfiltration anheimfallen.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass in jenen Fällen, wo das Schwellgewebe und namentlich die wesentlichsten Bestandtheile desselben, die Balken unter der massenhaften Einlagerung von Fett ihr normales Verhalten verloren haben, von einer Erectionsfähigkeit des fraglichen Organs, wie diese von einigen Veterinärphysiologen, von denen ich nur Gurlt und Weiss anführen will, behauptet wird, nicht die Rede sein kann. Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Prof. Dr. Eckhard sind von demselben vorgenommene Versuche, die Corpora cavernosa der Clitoris der Hündin durch Reizung der Nervi erigentes zur Erection zu bringen, vollständig misslungen. Wenn demgegenüber Kobelt (l. c.) hervorhebt, dass der bei häufigen Hündinnen in die Schamtheile eingeführte untersuchende Finger auf eine starre gesteiifte Clitoris trifft, so ist diese Beobachtung meiner Ansicht nach nicht dahin zu deuten, dass diese gesteiifte Clitoris die Folge der geschlechtlichen Erregung ist, sondern dass sie überhaupt immer vorhanden ist, da derselben das schwammige Gewebe vollkommen fehlt und die eingelagerten, dicht gedrängten, von Bindegewebszügen durchzogenen und von einer derben bindegewebigen Hülle umschlossenen Fettzellen ihr diese Steifigkeit, die auch am Cadaver noch vorhanden ist, verleihen.

Wenn wir somit eine Erectionsfähigkeit der Corpora cavernosa der Clitoris bei den meisten Hausthieren in Abrede stellen müssen, so folgt hieraus noch nicht die Richtigkeit der am Eingange citirten Ansicht Franck's, dass die Clitoris kein Wollustorgan ist, sondern nur ein Residuum der ursprünglich bei beiden Geschlechtern gleichen embryonalen Anlage. Es spricht gegen diese Anschauung einmal der auffallende Nervenreichthum der Clitoriseichel, der viel grösser ist, wie bei der Glans penis, ferner das Vorhandensein von eigenthümlichen Nervenendorganen bei den meisten Hausthierspecies und endlich das Vorhandensein eines durch die zahlreichen Venen hergestellten Schwellgewebes an der Glans clitoridis bei sämmtlichen untersuchten Thieren.

Nach dem Vorgang von Kobelt (l. c.) pflegt man die Wollust-

organe ihrer Function nach in solche einzutheilen, welche zur Erregung des Wollustgefühls im eigenen Organismus bestimmt sind und die Kobelt als „passive Wollustorgane“ bezeichnet, und ferner in solche, deren Zweck die Erzeugung des Wollustgefühls im andersgeschlechtlichen Körper bildet, die „transitiven Wollustorgane“ Kobelt's. Zu den passiven männlichen Wollustorganen werden die Glans penis, das Corpus spongiosum urethrae gerechnet, zu den passiven weiblichen die Glans clitoridis, die Pars intermedia und der Bulbus vestibuli; transitives männliches Organ ist das Corpus cavernosum penis, welches dem Corpus cavernosum clitoris gegenübergestellt wird. Acceptiren wir diese Eintheilung für die vorliegenden Verhältnisse, so wäre hiernach das transitive weibliche Wollustorgan, das Corpus cavernosum, weil ohne jede Bedeutung, verkümmert. Es verfettet theilweise, wie so manches andere Organ, welches functionslos geworden ist. Die Glans clitoridis hingegen, das passive Wollustorgan, ist seiner Function gemäss ausgebildet, da es nicht nur mit einem Schwellgewebe ausgestattet ist, sondern auch mit einem ausgezeichnet entwickelten Nervennetz, dass zweifellos zur Auslösung bestimmter Gefühlseindrücke bestimmt ist. Es ist hierbei nicht unwahrscheinlich, dass das Blut aus den Venennetzen, die um die Corp. cavern. clitoridis gelegen sind und mit den Schwellkörpern des Vorhofes in Verbindung stehen, in das Schwellgewebe der Kitzlereichel gedrängt wird und die Empfindlichkeit der letzteren erhöht.

Auffallend ist die von dem soeben besprochenen Befunde vollständig abweichende Structur der Clitoris der Stute, in deren Schwellkörpern wir ohne Weiteres die charakteristische Structur eines cavernösen Gewebes erkannt haben. Wodurch dieser Unterschied herbeigeführt worden ist, muss vorläufig dahingestellt bleiben. Vielleicht liegen hier Eigenthümlichkeiten in der Entwicklung vor, die noch erforscht werden müssen. Der Umstand, dass das Corpus cavernosum penis bei den männlichen Hausthieren beträchtliche Unterschiede hinsichtlich des Baues seiner Trabekeln, sowie der Menge und der Einlagerung der in denselben enthaltenen contractilen Elemente aufweist, macht diese Annahme wenigstens nicht unwahrscheinlich. Es ist mir bis jetzt wegen Mangel an dem nöthigen Untersuchungsmaterial nicht möglich gewesen, dieser Frage näher zu treten. Sie soll in Verbindung mit einer anderen, der Untersuchung der Entwicklung der Corpora cavernosa penis, der Gegenstand einer anderen Arbeit sein.

Von Interesse erschien weiter die Untersuchung der Frage, zu

welcher Zeit diese eigenthümliche Veränderung an den Schwellkörpern der angeführten Thierspecies und in welcher Weise dieselbe zunächst auftritt. Ueber die Entwicklung der Clitoris wissen wir im Allgemeinen nur wenig. Nach Bischoff¹⁾ und Kölliker²⁾ erhebt sich zunächst vor der Grube, welche die Cloakenöffnung umgiebt, ein kleiner Wulst, der sich zu einem immer stärker vorspringenden, nach unten concav gekrümmten Körper umwandelt und an seiner unteren Fläche eine Furche oder Spalte zeigt, welche bis zur Aftergrube verläuft. Dieser Körper ist die Anlage der Clitoris oder des Penis, die jetzt noch vollkommen einander gleichen. Während sich dieser Wulst nur beim männlichen Thiere durch fortwährendes Wachsthum und durch Schliessung der an seiner unteren Fläche gelegenen Furche zum Penis ausbildet, bleibt er bei dem weiblichen Geschlecht bei seiner ursprünglichen Anlage stehen und wird von den aus den Genitalfalten sich entwickelnden Schamlippen, die auch das Präputium bilden, mit dem weiteren Wachsthum der Frucht mehr und mehr bedeckt. Ueber die mikroskopische Structur dieser ersten Anlage der Clitoris liegen meines Wissens keine besonderen Untersuchungen vor. Es handelte sich also zunächst darum, den Bau der Clitoris beim Fötus festzustellen und sodann die weiteren Veränderungen zu studiren, welche derselbe später bei der extrauterinen Entwicklung des Thieres durchmacht. Die Untersuchungen, die zur Erledigung dieser Aufgaben vorgenommen wurden, erstreckten sich auf einen 8 Cm. langen, etwa 8 Wochen alten Schweinefötus, einen 12 Wochen alten Ziegenfötus von 15 Cm. Länge, einen Rinderfötus von 24 Cm. Länge (etwa 16 Wochen alt), einen Rinderfötus von 28 Cm. Länge (ca. 18 Wochen alt), auf ein neugeborenes, 8 Tage altes Kalb, einen neugeborenen Hund, einen 2 $\frac{1}{2}$ Wochen, einen 5 Wochen, einen 8 Wochen, einen 4 Monate alten Hund³⁾, sowie auf ein etwa 3 Monate altes Schwein. Sie ergaben folgende Resultate:

Bei dem zuerst angeführten Fötus befindet sich in der unteren Commissur der Vulva ein aus derselben hervorragender, verhältniss-

¹⁾ Bischoff, Die Entwicklungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen. 1842.

²⁾ Kölliker, Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. 1879.

³⁾ Die vier letzterwähnten Präparate stammten von einem Wurf junger Hunde, deren Geburt genau bekannt war und die zu den angegebenen Zeitpunkten getödtet wurden.

mässig grosser, eiförmiger Fortsatz, die Clitoris. Bei der mikroskopischen Untersuchung desselben zeigt sich inmitten des Gewebes desselben eine rundliche, dunklere, strangförmige Gewebsmasse von 0,60 Mm. Durchmesser, die Anlage des Corp. cavernosum clitoridis. In der Nähe desselben und rings um dasselbe herum liegen längs und quer durchschnittene Venen, die besonders an der oberen Fläche des Corp. cavernosum stark entwickelt und hier auch in mehrfacher Lage vorhanden sind und sich von hier aus nach beiden Seiten auf die Seitenwand des Vorhofes fortsetzen. In seiner vorderen Partie erscheint das Corp. cavernosum bereits gewunden und besteht in seinem peripherischen Theil aus dicht an einander liegenden, concentrisch um die Schwellkörperanlage angeordneten, spindelförmigen Zellen mit ovalem oder rundem Kern, der Anlage der späteren Albuginea. Der von letzterer umgebene Innenraum ist von ähnlichen oder auch mehr rundlichen Zellen mit runden oder ovalen granulirten Kernen ausgefüllt, die dicht neben einander liegen und im Allgemeinen eine radiäre Anordnung erkennen lassen. Das Corp. cavernosum ist vollkommen gefässlos. An seiner Oberfläche wird der in Rede stehende Fortsatz von einer mehrschichtigen Lage eines cubischen, vollsaftigen Epithels bedeckt. Einstülpungen des letzteren in das darunter befindliche Gewebe, wie dies bei dem erwachsenen Schwein der Fall ist, sind noch nicht zu beobachten.

Bei dem etwas älteren Ziegenfötus liegen ähnliche Verhältnisse vor. Inmitten des angeführten Fortsatzes befindet sich die Anlage des Corpus cavernosum, welches aus meist radiär angeordneten spindelförmigen Zellen mit runden oder ovalen Kernen besteht. An der Grenze zwischen dem dichter gefügten Zellengewebe der Schwellkörperanlage und dem lockeren der Clitoriseichel findet sich ein schmaler Kranz von concentrisch um den Schwellkörper angeordneten spindelförmigen Zellen vor. Das Gewebe der Clitoriseichel besteht aus denselben Elementen, wie das Corp. cavernosum. Dieselben liegen hier jedoch beträchtlich lockerer, so dass das Eichelgewebe bedeutend heller erscheint, wie jenes der Schwellkörperanlage. Das Epithel der Oberfläche der Clitoriseichel wie bei dem Schweinefötus.

Auch bei den beiden Rindsföten zeigte sich die Clitoris im Verhältniss zur Vulva ausserordentlich stark entwickelt, so dass sie letztere fast vollständig ausfüllte. Die mikroskopische Untersuchung des Corp. cavernosum clitoridis ergiebt bei dem jüngeren Fötus, dass dasselbe, bereits stark geschlängelt, einen Durchmesser von 1 Mm. besitzt. Die 0,06 Mm. starke Albuginea ist in ähnlicher Weise wie

bei dem Schweine- und Ziegenfötus gebaut, nur dass hier die Zellen langgezogener, die elliptischen Kerne mehr abgeplattet erscheinen. In den Zellenmassen, welche den Innenraum ausfüllen, markiren sich bereits deutlich schmale Züge, die von der Albuginea ihren Ursprung nehmen und sich während ihres weiteren Verlaufes mit anderen verbinden und hellere, spaltenartige Räume begrenzen. Diese Züge bestehen in ihrem axialen Theile aus dicht neben einander gelagerten Spindelzellen mit länglichen Kernen, während die oberflächlichen Abtheilungen dicht gedrängte Rund- oder auch polygonale Zellen mit rundlichen Kernen aufweisen, welche auch zum Theil die vorhin erwähnten spaltartigen Lücken ausfüllen. Diese letzteren werden gegen die Spitze des Corp. cavernosum seltener und das Gewebe desselben wird hier fast nur von Spindelzellen gebildet. Die Clitoriseichel, deren Oberfläche noch vollständig glatt erscheint und von einem mehrschichtigen cubischen Epithel überzogen wird, besteht aus einem feingestreiften, zellenreichen, von zahlreichen Gefässen durchzogenen Gewebe, welche letzteren ihren Ursprung von stärkeren, in der Nähe der Albuginea corp. cavern. gelegenen Arterien nehmen und sich in der Nähe der Eicheloberfläche in Capillaren auflösen. Stellenweise treten auch feine Arterien an die Albuginea heran, durchbohren dieselben in schräger Richtung und lösen sich dann in Capillaren auf.

Das Corpus cavernosum des älteren Rindsfötus zeigt in seiner hinteren Abtheilung, besonders aber in jener in der Clitoriseichel befindlichen, eine ähnliche Structur, nur dass hier die spindelförmigen Zellen noch plattgedrückter erscheinen und der vollaftige elliptische Kern derselben eine stäbchenähnliche Gestalt angenommen hat. In dem vorderen, dem Ursprung des Schwellkörpers nahe gelegenen Theil zeigt die Albuginea bereits eine fibrilläre Structur; ebenso treten in dem Trabekelgewebe schmale, fibrillär gestreifte Züge mit spindel- oder stäbchenförmigen Kernen hervor, die theils in der Längsrichtung, vorzugsweise aber in transversaler Richtung verlaufen, sich oft spalten und mit anderen Zügen in Verbindung treten. Sie kommen besonders gut entwickelt in dem centralen Theil des Corpus cavernosum zur Beobachtung; in der Nähe der Albuginea sind dagegen nur vereinzelte, zarte Fibrillenzüge bemerkbar, welche wie die centralen in dem Balkengewebe eingebettet sind. Dieses letztere besteht aus rundlichen, spindelförmigen oder polygonalen Zellen, die in einer hellen, homogenen Grundsubstanz eingelagert sind.

Bei einem 8 Tage alten neugeborenen Kalbe endlich haben

die Trabekeln in den centralen Abtheilungen des Corpus cavernosum bereits vollkommen das Aussehen und den Bau der Trabekel bei dem erwachsenen Thiere erlangt. Die Balken, welche eine Stärke von 0,10—0,14 Mm. erreichen, lösen sich nach der Peripherie in dünnere, mit zahlreichen zelligen Elementen ausgestattete Züge auf, welche in der Nähe der Albuginea schon vereinzelt 0,04 Mm. grosse Fettzellen in ihrem Gewebe aufweisen. In der Clitoriseichel zeigt das Corpus cavernosum dieselbe Structur, wie in den vorderen Abtheilungen der Clitoris bei dem 18 Wochen alten Fötus.

Am besten konnten die einzelnen Stadien in der Entwicklung des Corpus cavernosum der Clitoris bei der Hündin verfolgt werden, wo Schnittserien aus verschiedenen, genau bekannten Altersperioden zur Disposition standen.

Die makroskopischen Verhältnisse sind bei dem neugeborenen Hunde dieselben, wie bei dem erwachsenen. Die geräumige Kitzlergrube wird von einer Schleimhautfalte überbrückt, welche an ihrer oberen Fläche eine mediane Furche, an ihrer unteren Fläche eine wulstartige Verdickung zeigt, in welche die 0,4 Mm. starke Spitze des Clitorisschwellkörpers gelegen ist. Diese letztere wird von dem daranstossenden Schleimhautgewebe durch einen schmalen (0,03 Mm.), hellen, ringförmigen Spalt getrennt und besteht aus dicht gedrängten Embryonalzellen, welche in der Peripherie, in einer etwa 0,03 Mm. breiten Schicht eine spindelförmige Gestalt und eine concentrische Lagerung erkennen lassen. Das umgebende Gewebe der Schleimhautfalte besteht aus einem kernreichen, fibrillären Bindegewebsstratum, welches von zahlreichen dünnwandigen Blutgefässen durchzogen wird. In unmittelbarer Nähe der Spitze der Schwellkörperanlage wird dieses Gewebe äusserst locker und besteht aus spindelförmigen Zellen, welche die Verbindung der Clitoris mit dem umgebenden Gewebe vermitteln und den oben erwähnten hellen Ring um die Spitze bilden. Zu beiden Seiten des Corpus cavernosum verlaufen mehrere ziemlich starke Nervenzweige, dicht neben einander gelegen. Im weiteren Verlauf des Corpus cavernosum nach dessen Ursprung zu verbreitert sich dasselbe ganz beträchtlich und erreicht eine Stärke von 2 Mm. im transversalen Durchmesser und eine Höhe von 0,8 Mm., letztere in der medianen Abtheilung desselben gemessen, welche stärker ist wie die beiden seitlichen, so dass das quer durchschnittene Corpus cavernosum eine dreieckige Gestalt besitzt. Eine Theilung in zwei seitliche, symmetrische Hälften erscheint angedeutet. Der Bau des Corpus caver-

nosum wie an der Spitze. An keiner Stelle sind Blutgefäße innerhalb des letzteren wahrzunehmen.

Bei dem 2 $\frac{1}{2}$ Wochen alten Hunde erreicht das Corpus cavernosum in der Nähe seiner Insertion am Sitzbein einen Querdurchmesser von 2,40 Mm., einen Höhendurchmesser von 1,40 Mm. und zerfällt durch ein 0,20 Mm. breites medianes Septum in zwei seitliche Hälften. Bereits bei schwacher Vergrößerung hebt sich letzteres sowohl wie die Albuginea durch ihr helleres Aussehen von den übrigen Abtheilungen der Schwellkörperanlage ab. Die Albuginea besitzt eine Stärke von 0,30 Mm. und besteht aus spindelförmigen Zellen, welche mit ihrer Längsaxe parallel zur Oberfläche des Corp. cavernosum angeordnet sind. Das eigentliche Schwellgewebe zeigt denselben Bau, wie er oben bei dem jüngeren Rinderfötus beschrieben ist. Andeutungen von spaltartigen Lücken sind bereits vorhanden.

Bei dem 5 Wochen alten Hunde ist die ursprünglich glatte Oberfläche der Kitzlereichel sowohl wie die der Kitzlergrube in zahlreiche longitudinale, fast 1 Mm. hohe Falten gelegt. Die Albuginea der Schwellkörperanlage verhält sich wie bei dem 2 $\frac{1}{2}$ Wochen alten Hunde, ist jedoch weniger zellenreich und deutlich fibrillär gestreift. Bemerkenswerth ist ferner, dass die dem Schwellkörper nahe liegenden Abtheilungen der Albuginea sich durch eine mehr lockere, kernreichere Beschaffenheit auszeichnen. Das Corp. cavernosum besteht aus 0,090 Mm. starken Balken, welche meist ovale Cavernen umgeben und häufig Gefäße führen. Der Bau dieser Trabekeln stimmt im Allgemeinen mit dem bei dem älteren Rinderfötus angegebenen überein. An der die Cavernen begrenzenden Oberfläche derselben liegen platte Zellen mit verhältnissmässig grossen runden Kernen. Vereinzelte Fettzellen kommen zuweilen im Balkengewebe zur Beobachtung.

Das Corp. cavernosum der 8 Wochen alten Hündin zeigt einen ähnlichen Bau. Auch hier besteht dasselbe aus zwei, durch ein 0,60 Mm. breites Septum getrennten Hälften. Die Structur der Albuginea und des Trabekelgewebes wie vorher. Die von letzteren begrenzten Cavernen sind zahlreicher und rundlich oder spaltförmig gestaltet. In der Gegend, in welcher sich später der sogen. Eichelknollen befindet, sind zahlreiche kleine cavernöse Räume vorhanden, welche das Corp. cavernosum an seiner oberen und den beiden Seitenflächen umgeben.

Bei einer 4 Monate alten Hündin endlich besitzt das Corp. cavernosum an der Stelle, wo die Verschmelzung der Kitzlereichel mit dem

Boden der Kitzlergrube eingetreten ist, einen Querdurchmesser von 4 Mm. und einen Höhendurchmesser in der Medianebene von 2,40 Mm. Ein vollständiges medianes Septum trennt dasselbe in zwei Hälften. Seine Structur stimmt fast vollständig mit jener des erwachsenen Thieres überein. Die Albuginea, die hier kernreicher erscheint wie bei dem letzteren, umgiebt ein Gewebe, welches fast nur aus Fettzellen zusammengesetzt ist. Nur in den lateralen Abtheilungen des Corp. cavernosum finden sich noch Reste des ursprünglichen Gewebes in Form von Balken vor, die in ähnlicher Weise zusammengesetzt sind, wie bei den jüngeren Thieren, und nicht nur spaltförmige Cavernen begrenzen, sondern auch häufig Gefässe führen, die quer durch die Albuginea hindurchtreten, um sich an dem Ursprung der Balken in feinere Zweige aufzulösen. Vereinzelte Fettzellen kommen auch inmitten des Gewebes dieser Balken vor. Die die einzelnen Fettzellen oder Fettzellengruppen begrenzenden fibrillären Züge zeichnen sich durch einen grösseren Kernreichthum vor den bezüglichen Verhältnissen bei der erwachsenen Hündin aus. Ebenso ist auch hier bemerkenswerth, dass jene Abtheilungen der Albuginea, welche an das Schwellgewebe stossen, sich durch eine lockere Structur und durch das Vorhandensein zahlreicher zelliger Elemente auszeichnen. Nach der Spitze verschmälert sich das Corp. cavernosum allmählich, wobei die Einlagerung von Fettzellen seltener wird, und schliesslich das Schwellkörpergewebe aus dicht gedrängten Embryonalzellen zusammengesetzt ist.

Auch bei einem 3 Monate alten Schwein hat die Verfettung des Corp. cavern. clitoridis schon eine ziemliche Ausdehnung erreicht. In der Mitte desselben finden sich hier grössere, mit Blut erfüllte Räume, die von soliden, aus spindelförmigen Zellen bestehenden Balken begrenzt werden. Gegen die Peripherie lösen sich die letzteren in schmale Züge auf, zwischen welchen Fettzellen eingelagert sind. Die ursprünglich zwischen den Balken gelegenen Räume sind zu schmalen Spalten comprimirt, die von einem Endothelbelag ausgekleidet sind. Gegen die Spitze des bereits stark geschlängelten und seitlich comprimirten Schwellkörpers hört die Einlagerung von Fettzellen ebenfalls auf. Es besteht hier das Schwellgewebe aus einer 0,12 Mm. starken kernreichen Albuginea, von welcher schmale Querbalken abgehen, die spaltartige Räume begrenzen und aus einem zellen- und kernreichen Gewebe mit zahlreichen, in der Längsrichtung verlaufenden Gefässen zusammengesetzt sind.

Fassen wir die Resultate der vorstehenden entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen kurz zusammen, so haben die letzteren ergeben, dass bei den untersuchten Thierspecies das Corpus cavernosum clitoridis in seiner ersten Anlage aus einem soliden, aus dicht an einander liegenden Embryonalzellen aufgebauten und ganz gefässlosen Strange besteht. Die zelligen Elemente desselben zeigen in seiner Peripherie eine concentrische Anordnung, während sie in den centralen Theilen mehr unregelmässig liegen, im Allgemeinen jedoch, besonders bei älteren Föten, transversale, von einer Seite der Albuginea zur anderen verlaufende Zellenreihen darstellen. Im weiteren Verlaufe der Entwicklung nimmt die Stärke der peripherischen concentrischen Zellenlagen zu, und es entwickelt sich hieraus die Albuginea, welche zunächst noch aus einem äusserst zellen- und kernreichen Gewebe besteht. In dem Innern der Schwellkörperanlage verwandeln sich die erwähnten Zellenreihen in transversale Balken, die aus spindelförmigen Zellen mit elliptischen oder runden Kernen bestehend mit einander in Verbindung treten und schmale Spalten begrenzen, die zum Theil noch von polygonalen Zellen mit runden Kernen ausgefüllt werden, wie sie sich auch in ähnlicher Gestalt an der Oberfläche der Balken vorfinden. Das Gewebe dieser letzteren sowohl, wie jenes der Albuginea erhält dann weiterhin eine fibrilläre Structur, und die erwähnten elliptischen oder rundlichen Kerne werden abgeplattet und spindelförmig. Der Zeitpunkt, zu welchem diese Umwandlung stattfindet, ist bei den verschiedenen Thierspecies verschieden. Bei dem Rinde erfolgt sie bereits während der intrauterinen Entwicklung, bei der Hündin erst extrauterin im Alter von $2\frac{1}{2}$ bis 5 Wochen. Sobald Blutgefässe in das Schwellgewebe hineingelangt sind, treten zunächst in den peripherischen, in der Nähe der Albuginea gelegenen Balken noch Einlagerungen von Fettzellen auf, die anfangs nur sparsam zur Beobachtung kommen, später immer reichlicher werden, so dass, wie wir gesehen haben, das Schwellgewebe der Clitoris bei einer 4monatlichen Hündin oder bei einem 3monatlichen Schwein fast vollständig verfettet ist und bereits dieselbe Structur wie bei dem erwachsenen Thiere aufweist. Durch die Verfettung ihrer zelligen Elemente erlangen die Balken bedeutend grössere Dimensionen wie vorher, und es findet hierdurch eine Compression der zwischen ihnen gelegenen Hohlräume zu ganz schmalen, leicht zu übersehenden Spalten statt, deren Umgebung indess, wie

bei den übrigen Cavernen, mit einem Endothel ausgekleidet ist. Bemerkenswerth ist ferner, dass die Einlagerung von Fettzellen immer in der Nähe der Wurzeln der Clitoris beginnt und von hier aus gegen die Spitze des Corpus cavernosum fortschreitet, und es ist wohl anzunehmen, dass das weitere Wachsthum der Clitoris in der Weise vor sich geht, dass zunächst eine Wucherung der in der Spitze des Corpus cavernosum und unter der Albuginea gelegenen Embryonalzellen stattfindet, welcher dann die Verfettung der einzelnen Zellen folgt.

Die Venennetze der Clitoriseichel, die wir bei dem erwachsenen Thiere kennen gelernt haben, finden sich schon frühzeitig vor, ebenso auch die zahlreichen Nerven, welche mit dem Corpus cavernosum in die Glans eintreten und sich hier auflösen. Nervenendkörperchen konnten jedoch, selbst bei dem 3 Monate alten Schwein, bei welcher Thierspecies sie doch so reichlich und constant vorkommen, nicht aufgefunden werden, ein Umstand, welcher wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass sich diese Körperchen erst mit beginnender Geschlechtsreife entwickeln, und damit auch die Richtigkeit der oben dargestellten Anschauung über die physiologische Function der Clitoriseichel beweist.

Die gegebene Darstellung der Entwicklung der Corpora cavernosa clitoridis steht endlich im Widerspruch mit den allgemein geltenden Anschauungen über die Entwicklung der Schwellkörper überhaupt. Gewöhnlich nimmt man an, dass sowohl die cavernösen Körper der Genitalien, wie auch die in ihrem Bau mit denselben übereinstimmenden cavernösen Geschwülste, sich in der Weise entwickeln, dass zuerst dicht neben einander umschriebene Erweiterungen kleiner venöser Gefässe entstehen, deren allmählich verdünnte oder selbst ganz verschwindende Wandungen an den Stellen, wo dieselben an einander stossen, resorbirt werden, oder durch zahlreiche und rasch auf einander folgende Anastomosen ungleich weiter Gefässe, oder endlich dadurch, dass die Gefässwand sich auflockert und in ein schwammiges Gewebe umbildet (Eberth, in Stricker's Handbuch der Lehre von den Geweben. 1871). Diese Hypothesen lassen sich mit unserem Befunde in keiner Weise vereinigen. Statt eines oder zahlreicher Gefässe haben wir vielmehr als erste Anlage des Corpus cavernosum der Clitoris einen soliden, vollständig gefässlosen, aus dicht gedrängten embryonalen Zellen bestehenden Strang gefunden, in welchem Hohlräume erst später in Form von Spalten auftreten, deren Entstehung auf eine Art von Schrumpfung des embryo-

nalcn Gewebes zurückzuführen ist, und erst mit der Bildung dieser Räume treten Gefässe auf, welche ihren Ursprung ausserhalb der Albuginea von den zahlreichen dort verlaufenden grösseren Gefässen nehmen und durch die letztere in die Balken des Corpus cavernosum eintreten. Es würde dieses Verhalten somit mit einer anderen, von Rokitansky aufgestellten, von Virchow¹⁾ bekämpften Hypothese übereinstimmen, der zufolge sich zuerst die cavernösen Räume ganz unabhängig von den Gefässen aus dem Bindegewebe entwickeln und dann secundär mit den Gefässen in Verbindung treten, während die Balken des Maschengewebes sich durch selbstständiges Wachstum, durch sprossen- und kolbenartiges Auswachsen des Bindegewebes vermehren. Die Ansicht Rokitansky's, dass in diesen Räumen auch Blut ausserhalb des Kreislaufes aus den Bindegewebszellen sich bilde, kann freilich nicht durch unseren Befund gestützt werden und ist wohl überhaupt nicht haltbar. Dagegen ist die Annahme, dass die ursprünglich mit lymphatischer Flüssigkeit gefüllten Cavernen mit den sich in den Balken entwickelnden und weiter ausbreitenden Blutgefässen anfangs durch die Saftcanäle des Bindegewebes, später durch Capillaren in Verbindung treten, durchaus nicht von der Hand zu weisen. Auch Perls²⁾ weist auf die Möglichkeit hin, dass zuweilen wohl auch die Lymphräume des Bindegewebes sich zu blutgefüllten cavernösen Räumen umgestalten können, und erinnert daran, dass E. Neumann in einem Nasenrachenpolypen, welcher theilweise aus cavernösem Gewebe bestand, in den Uebergangsstellen zwischen dem cavernösen und dem einfach fibrösen Gewebe ein mit Blutkörperchen erfülltes Netzwerk fand, welches an Stelle des „Bindegewebskörperchennetzes“ getreten war und dessen Uebergang in dieses an der Grenze der cavernösen Entartung sich deutlich verfolgen liess, und dass ferner Lücke zwei Fälle von mit cavernöser Geschwulst combinirtem Cystenhygrom des Halses beschrieben hat, in denen die Cysten theilweise mit Blut gefüllt waren und mit den cavernösen Hohlräumen communicirten.

Ich muss es vorläufig dahingestellt sein lassen, ob dieselben oder ähnliche Verhältnisse bei der Entwicklung der Corpora cavernosa clitoridis der Stute und der Corpora cavernosa penis der männlichen Hausthiere vorliegen. Es war mir, wie bereits erwähnt, nicht

¹⁾ Virchow, Die krankhaften Geschwülste. Angiome.

²⁾ Perls, Lehrbuch der allgemeinen patholog. Anatomie. 1871, I, S. 439.

möglich, das zur Erledigung dieser Frage nothwendige Material herbeizuschaffen. Ich bin bislang nur in der Lage gewesen, den Penis eines etwa 12 Wochen alten Ziegenfötus und einiger etwa ebenso alter Rinderföten zu untersuchen. Was ich dort gefunden, würde allerdings dafür sprechen, dass auch die Entwicklung der Corpora cavernosa penis in ähnlicher Weise vor sich geht, wie bei der Clitoris, nur dass hier die Ausbildung der cavernösen Räume viel früher beginnt wie bei letzterer. Hoffentlich gelingt es mir in nächster Zeit, die fraglichen Verhältnisse bei den übrigen Thierspecies studiren und darüber Genaueres berichten zu können.

Erklärung der Abbildungen (Taf. I).

Figur 1. Querschnitt durch das Corpus cavernosum clitoridis von der Stute. a a Trabekel des Schwellkörpers; b b Cavernen; c c longitudinal verlaufende Muskelbündel; d Arterie; e Albuginea.

Figur 2. Querschnitt aus dem centralen Theil des Corpus cavernosum der Clitoris vom Rinde. a a Balkengewebe; b spaltförmige Caverne; c c Blutgefäße; d d Fettzellen. (Leitz Oc. 1, Obj. 7.)

Figur 3. Schnitt durch die Glans des Kitzlers vom Schwein. a a a Genitalnervkörperchen; b Albuginea des Corpus cavernosum; c Fettzellen desselben; d d Cavernen; e Gewebe der Glans; f Epithel der Oberfläche derselben.

Figur 4. Querschnitt aus dem Corpus cavernosum der Clitoris der Hündin. a Albuginea; b Septum; c c Cavernen.

Figur 5. Querschnitt durch die Clitoris der Katze. a Albuginea des Corpus cavernosum clitoridis; b centraler, durch das Corpus cavernosum sich binziehender Strang; c Caverne in demselben; d Gefäß; e Fettzellen; f f f cavernöse Räume ausserhalb der Albuginea, zum Theil mit Blut gefüllt; g Pacinisches Körperchen.

II.

Ueber den Rothlauf der Schweine und die Impfung desselben.

Von

Dr. Schütz,

Professor an der Königl. Thierarzneischule zu Berlin.

(Fortsetzung.)

Nachdem nun erwiesen war, dass es eine parasitäre, durch die beschriebenen feinen Bacillen bedingte Krankheit der Schweine giebt, kam es noch darauf an, das Vorkommen und die Ausbreitung dieser Seuche unter den Schweinen Norddeutschlands genauer zu ermitteln. Loeffler hat sich in seiner inzwischen veröffentlichten Arbeit: „Experimentelle Untersuchungen über Schweinerothlauf, ausgeführt in der Zeit vom Juli 1882 bis December 1883 im Kaiserlichen Gesundheitsamt“¹⁾, wie folgt, geäußert: „Der bei uns in Deutschland herrschende Rothlauf ist, wie der gleichartige Befund bei allen meinen aus verschiedenen Gegenden stammenden Fällen beweist, zweifelsohne die durch die feinen, den Mäusesepticämiebacillen ähnlichen Stäbchen bedingte Krankheit etc.“

Diese Ansicht dürfte zutreffend sein, denn sie wird auch durch die Ergebnisse meiner Untersuchungen gestützt, die unabhängig von den Loeffler'schen an erkrankten, namentlich aber an gestorbenen Schweinen ausgeführt sind²⁾.

Am 21. Mai d. J. wurden mir durch die Freundlichkeit des Herrn Collegen Eggeling 3 rothlaufkranke Schweine vom Viehhof in Rummelsburg bei Berlin geschickt. Diese Schweine waren am

¹⁾ Arbeiten aus d. Kaiserl. Gesundheitsamt, I. Bd., 1. u. 2. Heft, 1885, S. 46.

²⁾ Herr Repetitor Lüpke hat die Obductionen der Schweine ausgeführt und die hierbei ermittelten Befunde in den nachstehenden Protocollen beschrieben.

20. Mai in Westpreussen verladen, per Eisenbahn nach Rummelsburg transportirt und hier krank ausgeladen worden. Nachdem Herr Eggeling die Erkrankung der Schweine bestätigt hatte, wurden sie auf einen Wagen gelegt und sofort in das pathologische Institut der Königl. Thierarzneischule gefahren. Unterwegs war ein Schwein gestorben, die beiden anderen lebten bei ihrer Ankunft. Die eine Stunde nach dem Tode des ersten ausgeführte Obduction lieferte folgendes Resultat:

Schwein 1. Castrirtes männliches graues Schwein, mit vielen runden schwarzen Flecken auf dem Rücken, gekreuzter Landschlag (kleine englische Rasse mit Landschwein), ca. 4 Monate alt.

Maul, Nase, Ohren, untere Seite des Halses, Bauch und innere Schenkelflächen diffus matt bläulichroth. Die Bauchhöhle enthielt 50 Grm. klarer, gelblich gefärbter Flüssigkeit, in der zarte Fibrinfäden schwammen. Die Magenschleimhaut war mit einer dünnen Schicht zähen Schleimes bedeckt, welcher am Pylorus durch Galle stark gelb gefärbt, sonst durch Beimengung von Futtertheilen sehr getrübt war und durch einen mässig kräftigen Wasserstrahl nicht entfernt werden konnte. Am Fundusdrüsentheil war die Schleimhaut trübe, geschwollen, faltig und lebhaft roth gefärbt. Die Röthung war auf den Höhen der Falten gesättigt, ja, stellenweise dunkel zu nennen. Auf der Zwölffingerdarmschleimhaut lag gleichfalls etwas mit Galle imprägnirter Schleim; selbst die Schleimhautoberfläche war im Anfangstheil des Darmes gallig gefärbt. Die Schleimhaut lag in Längsfalten, war etwas trübe und weiterhin auch geröthet. Der übrige Theil der Darmschleimhaut grauroth, stellenweise ins Bläuliche spielend und leicht getrübt. Die Peyer'schen Haufen machten sich als beetartig hervorragende, flache Schwellungen, welche im Allgemeinen blauroth aussahen, bemerkbar. Mehrere waren mit dunkelrothen, grieskorngrossen Fleckchen regelmässig besät; hier und da waren hirsekorn-grosse, trübe, graugelbe Knötchen in ihnen nachzuweisen. Die ganze Darmschleimhaut war im Uebrigen mit kleinen dunkelrothen, umschriebenen Herden besetzt, deren grösste den Umfang eines Hirsekorns hatten. Die Zahl der Herde wechselte etwas in den verschiedenen Darmtheilen. Ferner sah man noch in den Darmhäuten hanfkorn-grosse, dunkelrothe, flache Knoten, welche eine hirsekorn-grosse Oeffnung in der Schleimhaut zeigten und sich als dunkelrothe Flecke an der Serosa bemerklich machten. In ähnlichen und etwas grösseren Knoten steckten an der Schleimhautseite des

Dünndarms platte, längliche Würmer, welche sehr fest hafteten. Ihre Länge variierte von 2,5 bis 10 Cm., die Breite übertraf 5 Mm. kaum. Die Zahl der Würmer betrug 15. Echinorhynchus gigas. Die Milz leicht geschwollen, blauroth, etwas weich; die Schnittfläche hügelig, die Pulpa dunkel blauroth, weich; Trabekel schwer erkennbar. Die Leber schwach geschwollen, ziemlich fest und bläulich braunroth. Schnittfläche glatt, sehr blutreich. Stellenweise Gruppen von Acini, welche dunkel braunroth aussahen; die übrigen Abschnitte der Leber graubraun und trübe. Die Nieren etwas vergrössert, dunkel grauroth, mässig fest; Schnittfläche glatt, Markschiebt roth, Grenzschiebt dunkel grauroth, Rindenschiebt grauroth, trübe, mit mohnkorngrossen, dunkelrothen Flecken zerstreut besetzt. In beiden Pleurasäcken 20 Grm. gelblicher, klarer Flüssigkeit. Pleura glatt, mehrere kleine Venen mit Blut gefüllt. Das Blut in den Vor- und Herzkammern noch flüssig. Der linke Ventrikel etwas dilatirt und hypertrophisch. Der Herzmuskel stellenweise mit grösseren grauen, trüben Flecken versehen. Die halbmondförmigen Klappen der Mitralis verkürzt, mindestens 2 Mm. dick, mit abgerundeten, verdickten Rändern. An beiden Lungen viele umschriebene, periphere Partien (besonders an den hinteren Lappen), welche bläulichroth aussahen und deren Oberfläche in einem etwas niedrigeren Niveau lag als die Umgebung. Im hinteren Ende der Hauptbronchien und in den zu den erwähnten Lungenpartien führenden kleinen Bronchien eine grosse Anzahl von Strongylus paradoxus. Alle übrigen Lungenpartien waren geröthet und sehr feucht. Die Mesenterialdrüsen etwas vergrössert, äusserlich geröthet, etwas weich; auf der Schnittfläche grauweiss und roth gefleckt.

Die während der Obduction ausgeführte Untersuchung der Flüssigkeit der Bauchhöhle, des Blutes und der Milz ergab, dass letztere sehr viele, die Flüssigkeit in der Bauchhöhle und das Blut dagegen nur wenige feine Bacillen enthielten.

Aus dem Transsudat, dem Blute und der Milz wurden Culturen der Bacillen in Fleischwasser-Pepton-Gelatine hergestellt.

Das zweite Schwein starb eine Stunde nach der Ablieferung an das pathologische Institut und wurde gleich nach dem Tode obducirt. Hierbei ergab sich Folgendes:

Schwein 2. Castrirtes männliches graues Schwein von dem Schlage und Alter wie No. 1.

Am Kopfe (Nase, Ohren und Maul), an der unteren Seite des

Halses, den inneren Schenkelflächen und am Bauch diffus blauroth gefärbt; stellenweise (Bauch) war die Farbe dunkelblau. In der Bauchhöhle 48 Grm. Transsudat, gelblich, trüb. Am Magen dieselben Abweichungen, nur von geringerer Intensität wie im vorigen Falle. Die Schleimhaut des ganzen Darmcanals grauroth, die Peyer'schen Haufen kaum merklich geschwollen. Hier und da fand sich an Stelle eines Follikels eine kleine Grube, die übrigen Follikel stellten etwa mohnsamengrosse Fleckchen dar, welche von feinen rothen Ringen umgeben waren, die in ihrer Gesammtheit ein zierliches Netz bildeten. Im Dünndarm einige Exemplare von *Ascaris lumbricoides*, im Dickdarm eine grössere Anzahl von *Trichocephalus crenatus*. Die Leber war etwas vergrössert, bläulich braunroth, mässig fest, die Ränder abgerundet. Die Acini etwas vergrössert und trübe. Die Schnittfläche der Leber glatt und sehr blutreich. Die Milz etwas geschwollen, blauroth; die Schnittfläche hügelig, die Pulpa bläulich rothbraun, etwas weich; die Trabekeln schlecht zu erkennen. Nieren nicht merklich vergrössert; im Uebrigen wie bei No. 1. Dasselbe galt von den mesenterialen Lymphdrüsen. In den Pleurasäcken ein Esslöffel voll Transsudat. Lungen stark geröthet und sehr feucht. Bronchien, Luftröhre, Kehlkopf und Nasengänge mit feinblasigem, röthlichem Schaum erfüllt. Das Blut in den Herzhöhlen und grossen Gefässen noch nicht geronnen, gerann aber nach der Entleerung schnell. Herzmuskel graubraun, trüb; unter dem Endocard des linken Ventrikels kleine blutige Herde.

Während der Obduction wurden Transsudat der Bauchhöhle, Blut und Milz auf die Anwesenheit der feinen Bacillen geprüft. Hierbei ergab sich, dass das Transsudat nur wenige, das Blut viele und die Milz sehr viele Bacillen enthielt.

Ferner wurden geringe Mengen des Transsudats und des Blutes auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine und sehr winzige Stückchen der Milz auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine und sterilisirtes Pepton-Rindfleischinfus ausgesät, um neue Reinculturen der Bacillen herzustellen, die zu den weiter unten angegebenen Versuchen benutzt worden sind.

Das dritte Schwein starb in der Nacht vom 21. zum 22. Mai. Die Ergebnisse der Nachmittags 5 Uhr ausgeführten Obduction sind folgende:

Schwein 3. Castrirtes männliches graues Schwein, gekreuzter Landschlag (kleine englische Rasse mit Landschwein), 4—5 Monate alt.

Die äussere Haut am Kopfe, an den Ohren, am Bauche und an

der Innenfläche der Extremitäten diffus blauroth gefärbt; die Färbung war von verschiedener Intensität. In der Bauchhöhle 75 Grm. gelblicher, leicht getrübtter Flüssigkeit. Der mit Fundusdrüsen besetzte Theil der Magenschleimhaut etwas geschwollen, trübe und stark geröthet. Auf dem Schlundtheile der Magenschleimhaut, besonders nach der kleinen Curvatur zu, waren die oberflächlichen Schichten der Schleimhaut in Form schorfartiger Massen von gelbbrauner Farbe abgestorben. Die necrotischen Schleimhautstücke hatten einen Durchmesser von 6—8 Mm. und hingen mit der gesunden Schleimhaut locker zusammen. Ihre Ränder hatten sich bereits abgelöst, und nach Entfernung der abgestorbenen Stücke blieben flache Substanzverluste zurück, die grauroth gefärbt und mit glatten Rändern ausgestattet waren. Die Schleimhaut des Dünndarms war grauroth, etwas trübe und zeigte eine geringe Anzahl mohnsamen- bis grieskorngrosser blutiger Flecke. Die Peyer'schen Haufen und die Solitär-follikel wenig geschwollen, grau und trübe. In einigen Peyer'schen Haufen wurden mehrere mohnsamengrosse dunkelrothe Flecke nachgewiesen. Die Dickdarmschleimhaut hatte ein schieferiges Aussehen. Die subserösen Venen waren stark gefüllt. Auf den Querfalten der Schleimhaut des Blinddarmes sah man vielfach graugrüne, trübe Massen, welche ziemlich fest hafteten. Diese Massen konnten mit Hülfe des Messers in Form einer zusammenhängenden Haut abgehoben werden, worauf dann in der obersten Schicht der Schleimhaut ein flacher Defect sichtbar wurde, der grau gefärbt war. Die nächste Umgebung dieser Defecte war roth und trübe; die Milz vergrössert, dunkelblau, etwas weich, ihre Ränder abgerundet; die Schnittfläche hügelig, bläulich rothbraun, Pulpa vermehrt, Trabeculargewebe nicht sichtbar. Die Leber vergrössert, graubraun, ziemlich fest; die Schnittfläche glatt, glänzend und blutreich. In den Venen flüssiges Blut. Die Acini vergrössert, mit breiter, graubrauner, trüber Peripherie; kleinere Gruppen und vereinzelte Acini sehen gleichmässig dunkelroth aus. Die Nieren wenig vergrössert, grauroth und ziemlich fest; die Schnittfläche glatt und saftreich; von der gerötheten Markschiebt gingen radiär schmale, graue, etwas trübe Streifen in die ziemlich breit erscheinende, etwas trübe Rinde. In beiden Brustfellsäcken 45 Grm. trüber Flüssigkeit. Das in den Herzhöhlen enthaltene Blut zum Theil geronnen; das Herzfleisch trüb, graubraun; die halbmondförmigen Klappen der Mitralis verkürzt und verdickt. Die Lungen ungefähr in der Expirationsgrösse. Das Brustfell überall glatt und

durchsichtig. Fast die ganze Oberfläche des mittleren und hinteren Lappens der rechten Lunge blauroth; diese Theile fühlen sich etwas derb an, die Oberfläche der übrigen Theile rosa, letztere überragten erstere; die Schnittfläche der erstgedachten Abschnitte war glatt, glänzend, grau resp. gelblichroth, nur wenig lufthaltig und knisterte schwach beim Einschneiden. Die Bronchialwände waren verdickt und in den Lumina derselben war neben feinblasigem weissen Schaum ziemlich viel gelblicher, trüber Schleim nachzuweisen. In den hinteren Partien der Hauptbronchien fand sich eine grössere Anzahl von *Strongylus paradoxus*. Auf seitlichen Druck trat etwas feinblasiger, röthlicher Schaum über die Schnittfläche. Auf der Schnittfläche der übrigen Lungentheile fanden sich ausser dem feinblasigen röthlichen Schaum keine Abweichungen. An den beiden Lappen der linken Lunge waren nur kleinere Theile in der beschriebenen Weise verändert. Im Hauptbronchus und dessen Verzweigungen wurden zusammenhängende Haufen in einander verschlungener und von zähem schaumigen Schleim eingehüllter Palisadenwürmer (*Strongyl. parad.*) ermittelt. Die Lymphdrüsen des Mesenteriums waren etwas vergrössert, weich und an ihren Kapseln stark geröthet; Schnittfläche von einem intensiv rothen Rande umgeben, grau, dunkelroth gefleckt und trübe.

Die während der Obduction stattgehabte Untersuchung von Ausstrichpräparaten der Transsudate, des Blutes und der Milz zeigte, dass die Transsudate nur einige, das Blut eine grössere Anzahl und die Milz sehr viele feine Bacillen enthielten.

Transsudate, Blut und Milz wurden, wie bei den vorstehenden beiden Schweinen, zur Aussaat auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine benutzt.

Bis zum 27. Mai war in sämtlichen Gelatineröhrchen eine reichliche Wucherung der feinen Stäbchen nachzuweisen. Um die Impfstiche hatte sich ein trüber Saum gebildet, der von verzweigten spitzen Fortsätzen umgeben war. An einzelnen Fortsätzen war bereits eine wolkenartige Auflösung eingetreten. (Culturen, bei denen die wolkenartige Auflösung der Fortsätze noch nicht eingetreten war, erinnerten lebhaft an die Form eines Tannenbaumes.) Hiernach wachsen die Culturen in derselben Weise wie die, welche ich aus der Schweinemilz und durch Aussaat der in den Pasteur'schen Vaccins enthaltenen feinen Bacillen in Fleischwasser-Pepton-Gelatine hergestellt hatte. Das mit Milzstückchen des Schweins 2 besäte sterilisirte

Pepton-Rindfleischinfus war sehr stark getrübt. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Culturen auf Deckgläschen wurde festgestellt, dass in ihnen nur die feinen Bacillen gewachsen waren.

Mit der Pepton-Rindfleischinfuscultur wurde zunächst ein neues Kölbchen, welches 20 Grm. neutralisirtes und sterilisirtes Pepton-Rindfleischinfus enthielt, besät und der Rest am 27. Mai zur Impfung benutzt bei: 1 Hunde, 1 Katze, 2 Mäusen, 2 Tauben, 2 Meerschweinchen und 1 Kaninchen.

Der Hund, die Katze und die Meerschweinchen erkrankten nicht; die Mäuse, Tauben und das Kaninchen dagegen starben. In der nachstehenden Tabelle ist die Zeit angegeben, wann der Tod der geimpften Thiere eingetreten ist:

1. Maus	mit 2 Oesen der Rindfleischinfuscultur,	gestorben am	5. Tage,
2. -	- 2 - - - -	- - - -	5. -
1. Taube	- 2 - - - -	- - - -	3. -
2. -	- 2 - - - -	- - - -	4. -
1. Kaninchen	- 3 - - - -	- - - -	11. -

Die Mäuse wurden am Rücken, die Tauben an der Brust und das Kaninchen am rechten Ohr geimpft. Bei den Mäusen und den Tauben ergab die Obduction die oft mitgetheilten Befunde. Im Blute und in den Milzen der Mäuse fanden sich viele Bacillen, ebenso im Blute der Tauben. Von Interesse war der Krankheitsverlauf bei dem geimpften Kaninchen: Das geimpfte Ohr röthete sich am 1. Tage und war am 2. Tage gleichzeitig angeschwollen und heiss, auch hing es seitlich am Kopfe. In den nächsten Tagen kroch der nach der Impfung entstandene entzündliche Process auf den Grund der Ohrmuschel, dann auf den Kopf und über die linke Seite fort bis auf den Hals. Die Lider des rechten Auges waren angeschwollen und bedeckten dasselbe, die Conjunctiva sonderte eine schleimig-eiterige Masse ab. Dabei war das Thier traurig, frass nicht und sass still in einer Ecke des Käfigs. Am 7. Tage waren der ganze Hals, die Schultern und der vordere Abschnitt der Brust angeschwollen, und unter allmählicher Zunahme der Athemnoth trat der Tod am 11. Tage ein.

Die gleich nach dem Tode ausgeführte Obduction ergab Folgendes: Das Ohr 1 Cm. dick; das subcutane Gewebe am Ohr, am Kopfe, namentlich an der rechten Seite desselben, am Halse, an den Schultern und an der Brust mit einer trüben Flüssigkeit getränkt. Die Trübung der Flüssigkeit war durch die Gegenwart von Rundzellen

bedingt. In der Flüssigkeit viele feine Bacillen. Die Lymphdrüsen um den Schlundkopf vergrößert, weich und roth gefärbt. Schnittfläche grauroth, feucht und glänzend. In derselben Weise verändert waren die trachealen, bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen. Das Gewebe aller Lymphdrüsen mit feinen Bacillen reichlich durchsetzt. Beide Brustfellsäcke mit trüber Flüssigkeit und gallertig geronnenen Fibrinmassen gefüllt. In der Flüssigkeit und in den Fibrinmassen waren Bacillen nachzuweisen. Das Brustfell fleckig geröthet. Lungen hellroth und feucht. Bronchien und Luftröhre mit Schaum gefüllt. In der Bauchhöhle eine geringe Menge trüber Flüssigkeit. Die Schleimhaut des Magens und des Darmes grauroth. Die Lymphapparate in der Schleimhaut des Darmes wenig geschwollen. Die mesenterialen Lymphdrüsen vergrößert und leicht geröthet. Nieren und Leber graubraun und getrübt. Milz vergrößert, weich und blau-roth. Herz und Körpermuskeln trübe. Im Blute und in allen Organen fanden sich Bacillen vor, besonders zahlreich zeigten sie sich in der Milz. Die Untersuchung der Exsudate des Blutes und der Körperorgane wurde auf Deckgläschen in der bekannten Weise ausgeführt.

Der Krankheitsverlauf und der Obductionsbefund lassen erkennen, dass der bei den Kaninchen nach der Impfung entstandene rothlaufartige Process in der Richtung der Lymphbahnen bis zur Brust fortgeschritten war und durch Uebergreifen auf das Mediastinum die Pleuritis sero-fibrinosa hervorgerufen hatte. Da ferner in den erkrankten Theilen, besonders in den Lymphdrüsen, die feinen Bacillen des Rothlaufs nachzuweisen waren, so können nur die letzteren als die ursächlichen Erreger des Processes angesehen werden. Beachtet man noch den Zustand der übrigen Organe, so ist auch dargethan, dass das Kaninchen an einer allgemeinen Infection gelitten hatte. Hierfür sprechen die Erkrankungen der grossen Parenchyme, wie Milz, Leber, Nieren etc. Nach dem Ergebniss der an den verschiedenen Organen vorgenommenen Untersuchung kann es ferner nicht zweifelhaft sein, dass die allgemeine Infection auch durch die Bacillen, und zwar durch die Aufnahme derselben in das Blut zu Stande gekommen war.

Hiernach treten nach der Verimpfung der Rothlaufbacillen bei Kaninchen drei Möglichkeitsn ein: entweder entsteht am geimpften Ohr ein rothlaufartiger Process, der sich bald wieder zurückbildet, oder es schliesst sich an die Impfung eine tödtlich verlaufende allge-

meine Infection, oder der örtliche Process an der Impfstelle breitet sich bis zur Brust aus, um eine Pleuritis hervorzurufen, und ist gleichzeitig mit einer allgemeinen Infection verbunden.

Nachdem die Pepton-Rindfleischinfuscultur am 27. Mai zur Aussaat auf anderes sterilisirtes Infus benutzt worden war, wurden mit ihr am 3. Juni 2 Mäuse, 2 Tauben und 2 Kaninchen geimpft. Aus der folgenden Zusammenstellung ergibt sich, wieviel von der Infuscultur zur Verimpfung kam und wann die geimpften Thiere gestorben bezw. erkrankt sind:

1. Maus	mit 1 Oese	der Rindfleischinfuscultur,	gestorben am 4. Tage,
2. -	- 1 - -	-	- - 4. -
1. Taube	- 1 - -	-	- - 4. -
2. -	- 1 - -	-	- - 4. -
1. Kaninchen	- 2 Oesen	-	-
2. -	- 2 - -	-	-

} beide zwar erkrankt,
} aber wieder genesen.

Alle Thiere wurden in der bekannten Weise geimpft. Die bei der Obduction der Mäuse und Tauben vorgefundenen Veränderungen entsprachen den bisherigen; auch konnten in allen Organen dieser Thiere, namentlich in der Milz, die feinen Bacillen nachgewiesen werden. Ich will dabei noch bemerken, dass das Blut von einer der Mäuse so bacillenreich war, wie ich es bisher überhaupt noch nicht beobachtet hatte. Bei den Kaninchen schollen die geimpften Ohren an und die Schwellung breitete sich bis zum Kopfe aus; dann trat Abschwellen, Erblassen und Genesung ein.

In der mit dem Blute der Mäuse und Tauben geimpften Fleischwasser-Pepton-Gelatine wuchsen wieder neue Culturen der feinen Bacillen.

Mithin wurden im Blute, in der Milz etc. der drei Schweine Organismen nachgewiesen, die in ihrer Form, im Verhalten gegen Farbstoffe und in ihrer Wachstumsart mit den aus der Schweinemilz in Sinsheim und aus den Vaccins von Pasteur gezüchteten übereinstimmen. Die aus den Milzstückchen des Schweins 2 hergestellten Reinculturen dieser Bacillen haben die mit ihnen geimpften Mäuse in 3—5 Tagen und die Tauben in fast gleicher Zeit getödtet. Bei den geimpften Kaninchen sind die bekannten Krankheitserscheinungen beobachtet worden, geimpfte Meerschweinchen dagegen sind gesund geblieben.

Dasselbe aber haben wir von der Wirkung der Rothlaufbacillen kennen gelernt. Hierzu kommt, dass die Obduction der in Rede

stehenden und der am 5. resp. 6. Mai gestorbenen Schweine zu übereinstimmenden Ergebnissen geführt haben. Es ist daher mit Sicherheit dargethan, dass die Krankheit, welche den Tod der drei Schweine herbeigeführt hat, mit dem Rothlauf, d. h. mit der unter den Schweinen des Grossherzogthums Baden und der in Frankreich vorkommenden Seuche identisch ist.

Nachdem diese Identität festgestellt und die Virulenz der aus den Milzstückchen des Schweins 2 in Pepton-Rindfleischinfus gezüchteten Bacillen durch die vorstehenden Impfversuche ermittelt war, beschloss ich, die Immunität der mit den abgeschwächten Rothlaufbacillen geimpften beiden Schweine nochmals zu controliren. Zu diesem Zweck wurde die am 3. Juni hergestellte Pepton-Rindfleischinfuscultur die stets bei 35° C. gehalten und üppig gewachsen war, am 11. Juni auf ihre Reinheit geprüft und nach Feststellung derselben jedem Schwein eine Spritze voll an der inneren Schenkelfläche durch Herrn Roloff eingepfist. Den Erfolg haben wir bereits kennen gelernt: die Schweine zeigten hiernach weder örtliche noch allgemeine Krankheitserscheinungen (Bd. XI, S. 377).

Nunmehr könnte ich die Reihe meiner Abhandlungen über den Rothlauf der Schweine schliessen, wenn ich nicht die Verpflichtung fühlte, aus der grossen Summe der von mir gesammelten Obductionsberichte noch einige zu veröffentlichen, welche für die Schlussbetrachtungen nicht ohne Bedeutung sein dürften.

Am 25. Mai, Vormittags 10 Uhr, wurde ein Schwein, welches in einem Orte bei Berlin gehalten worden und Nachts vorher gestorben war, im pathologischen Institut obducirt. Die Obduction lieferte das Nachstehende:

Schwein 4. Graues weibliches Schwein der veredelten Landrasse, ca. 5 Monate alt.

Die ganze äussere Haut blauroth gefärbt. Die Intensität der Farbe wechselte etwas. An den gesättigt gefärbten Stellen erstreckte sich die bläuliche Färbung auch noch 1—2 Cm. tief ins Unterhautgewebe. In der Bauchhöhle etwas trübe, gelbliche Flüssigkeit. Das Bauchfell nicht verändert. Im dickbreiigen Mageninhalt 6 Exemplare von *Ascaris lumbricoides*. Der Fundusdrüsentheil der Magenschleimhaut war hügelig geschwollen, trüb und umschrieben fleckig geröthet. Ein Theil der Hügel war dunkelroth, ein anderer grauroth und ein dritter fast grau. Die gleich gefärbten Hügel bildeten Gruppen oder Zonen. Der Pylorusdrüsentheil war glatt, geschwollen, lebhaft grau-

roth gefärbt und trübe. Die Schleimhaut des Zwölffingerdarms und die der ersten beiden Meter des Leerdarms deutlich geschwollen, grau-roth, trübe und in Falten gelegt, deren Kämme intensiv roth waren. Auf der Schleimhaut lag etwas gelbbrauner, zäher, trüber Schleim. Bei genauerer Betrachtung sah man viele mohnsamen- bis grieskorn-grosse, dunkelrothe Flecke. Die Schleimhaut des übrigen Theils des Dünndarms war etwas trübe, grau-roth, stellenweise in Falten gelegt und mit rothen Flecken besetzt. Die Peyer'schen Haufen waren beet-artig geschwollen, bläulich gefärbt, und die Follikel stellten kleine, graue, trübe Flecke dar. Die Schleimhaut des Dickdarms sah im Allgemeinen schieferig aus, war stellenweise geröthet, etwas geschwollen und trübe. Die solitären Follikel verhielten sich wie die der Peyer'schen Haufen. Die Leber geschwollen, bläulichbraun, mässig fest. Die Schnittfläche glatt und feucht. Die Acini sehr deutlich vergrössert, graubraun und trübe; bei einigen sah man noch ein dunkelbraunes Centrum. Die Milz leicht geschwollen, bläulich, etwas weich; Schnittfläche hügelig; Pulpa vermehrt, bläulichbraun; Balken-gewebe nicht sichtbar. Die Nieren nur wenig vergrössert, grau-roth, fest. Schnittfläche glatt, saftreich. Mark-schicht dunkelroth, mit grauen, radiären, feinen Streifen. Die Rinden-schicht etwas verbreitert und leicht getrübt; hier und da grieskorn-grosse, dunkelrothe, umschriebene Herde. Die Brustfellsäcke enthielten eine sehr geringe Menge leicht getrübtter Flüssigkeit. Das Brustfell und der Herzbeutel unverändert. Der Herzmuskel fast trocken, fest. Auf der Schnittfläche scharf abgesetzte, graue, trübe Flecke, die bei näherer Untersuchung fein gestreift waren. Sonst keine Abweichungen. Die Lungen waren in der Expirationsgrösse, rosa und knisterten beim Anfassen. Die Schnittfläche glatt, rosa; auf seitlichen Druck tritt sehr wenig röthlicher Schaum auf dieselbe. In der Luftröhre und den grossen Bronchien etwas feinblasiger, weisser Schaum. Die Lymphdrüsen an den Kniefalten und in den Mesenterien äusserst lebhaft roth, etwas vergrössert und weich; auf der Schnittfläche ein intensiv dunkelrother, schmaler Rand, in dem eine grauröthliche, trübe Masse eingeschlossen war, die hier und da einen schmalen, rothen Strich erkennen liess.

Das Blut enthielt nach dem Ergebnisse der mikroskopischen Prüfung nur wenige, die Milz dagegen viele Bacillen.

Ein anderes Schwein desselben Besitzers war fast um dieselbe

Zeit gestorben und zeigte am 26. Mai, Vormittags 11 Uhr, folgende anatomische Abweichungen:

Schwein 5. Graues weibliches Schwein der veredelten Landrasse, ca. 5 Monate alt.

Die äussere Haut kaum merklich bläulich gefärbt. In der Bauchhöhle eine sehr geringe Menge trüber Flüssigkeit. Die Schleimhaut des Magens diffus dunkel geröthet, etwas geschwollen und trübe. Im Zwölffingerdarm war die Schleimhaut oberflächlich mit Galle imbibirt. Die Schleimhaut in den vorderen Abschnitten des Leerdarms grau-roth und etwas trübe, in den hinteren Abschnitten desselben und im Hüftdarm gleichzeitig geschwollen und in Falten gelegt. Kleine grieskorn-grosse, dunkelrothe Herde fanden sich nur in den geschwollenen Partien der Dünndarmschleimhaut. Die Peyer'schen Haufen leicht geschwollen und bläulichroth; die Follikel zum Theil als graue, trübe Knötchen sichtbar, zum Theil herausgefallen. Die Dickdarmschleimhaut war durchweg dunkelroth und trübe. An ganz kleinen blutigen Herden war überall eine grosse Zahl vorhanden, auch viele derselben an dem serösen Ueberzuge des Dickdarms gut zu erkennen. Die Leber etwas geschwollen, bläulich braunroth und ziemlich fest; die Schnittfläche glatt, glänzend. Die Acini vergrössert und fast ganz bräunlichgrau oder grau gefärbt. Die Milz schwach vergrössert, bläulichbraun, mässig fest; Schnittfläche hügelig, Pulpa nicht weich, das Balkengewebe noch zu sehen. Die Nieren wenig vergrössert, grau-roth, fest. Die Schnittfläche glatt und saftreich. Die Marksubstanz dunkelroth, die Rindenschicht trübe, dunkel grau-roth und mit vielen kleinen, blutigen Herden durchsetzt. In den Brustfellsäcken etwas trübe Flüssigkeit. Der Herzmuskel fest. Die Schnittfläche matt glänzend und ins Graue spielend. Die graue Farbe trat fleckweise auf. Unter dem Endocardium des linken Ventrikels viele kleine blutige Herde. Das Blut in den Herzhöhlen und in den grossen Gefässen fest geronnen. Die Lungen ungefähr in der Exspirationsgrösse, rosa, beim Darüberstreichen etwas knisternd. Auf die Schnittfläche trat auf Druck nur eine geringe Menge von röthlichem Schaum. In den Bronchien und in der Luftröhre etwas feinblasiger Schaum. Die Gekrösdrüsen etwas vergrössert, ziemlich fest und äusserlich stark geröthet. Die Schnittfläche opak, grau bezw. grau-roth gefärbt, die Peripherie dunkelroth.

Das Blut arm, die Milz dagegen reich an Bacillen.

Am 1. Juli starb einem anderen Besitzer aus demselben Orte

ein Schwein, welches am folgenden Tage, Vormittags 10 Uhr, obducirt wurde. Der hierbei erhobene Befund war folgender:

Schwein 6. Castrirtes männliches Schwein des kleinen gemischten Schlages, grau, 5—6 Monate alt.

Todtenstarre nur noch an den Extremitäten. Die Haut am Halse und auf dem Rücken diffus dunkel blauroth, am Bauch viele, an den Gliedmassen wenige dergleichen umschriebene Flecke, die zum Theil nur klein waren. Am intensivsten war die Färbung in den obersten Schichten der Cutis; die Epidermis löste sich stellenweise in grösseren Fetzen ab, dies war in grosser Ausdehnung am Rücken der Fall. An einzelnen der am Bauche gelegenen Flecke sah man Spuren von angetrocknetem, gelblichen Exsudat in Form eines sehr zarten Schorfes. Die tieferen Schichten der Cutis zeigten eine starke Injection ihrer Gefässe; eine eben solche Füllung der Gefässe war auch hier und da im grösseren Umfange in den äusseren Schichten des Unterhautfettgewebes vorhanden. In der Bauchhöhle eine geringe Menge einer grauröthlichen, lackfarbigen, etwas trüben Flüssigkeit. Die sichtbaren Gefässe sehr stark mit dunkelrothem, zum Theil geronnenem Blute gefüllt. Der mässig gefüllte Darmcanal enthielt meist Gase, unter den wenigen Inhaltmassen anderer Art verhältnissmässig viel Sand. Magen- und Darmschleimhaut waren schmutzig-grau, etwas trübe, stellenweise leicht geröthet; die Peyer'schen Haufen hyperplastisch, sonst keine wesentlichen Abweichungen. Die Leber geschwollen, bläulich braunroth, mässig fest, ihre Ränder abgerundet. Die Schnittfläche glatt, blutreich; die Acini waren vergrössert, deutlich grau und besonders im peripheren Theile trübe. Die Milz blauroth, geschwollen, etwas weich; die Schnittfläche hügelig; die Pulpa deutlich vermehrt, etwas weich; Trabeculargewebe und Malpighi'sche Körperchen schwer zu erkennen. Die Nieren etwas vergrössert, graubraun, ziemlich fest. Die Schnittfläche glatt, die Gefässe stark gefüllt. Die Marksubstanz dunkelroth, die Grenzschicht ebenso mit einem Stich ins Graue. Die Rindenschicht graubraun und trübe, hier und da stark gefüllte Gefässe. In den Brustfellsäcken und im Herzbeutel kein abnormer Inhalt. Der linke Ventrikel fast leer, in den übrigen Abtheilungen des Herzens nur kleine, meist dunkelrothe, ziemlich feste Blutgerinnsel. Unter dem Endocardium des linken Ventrikels grössere blutige Herde, Herzfleisch trübe. Die Lungen ungefähr in der Expirationsgrösse, grauroth, wenig knisternd. Die Schnittfläche glatt, spiegelnd, auf seitlichen Druck kam feinblasiger Schaum aus den Bronchien. In

den Blutgefässen weiche, dunkelrothe Gerinnsel. Die grösseren Bronchien und die Luftröhre gefüllt mit etwas zähem, feinblasigen Schaum, der stellenweise mehr oder weniger roth gefärbt war. In den mittleren Partien der beiden Hauptbronchien ein dunkelrothes Blutgerinnsel von der Dicke eines Federkiels, welches sich an seinem hinteren Ende verzweigt. Auch die kleineren Bronchien enthalten derartige Gerinnsel. In der Schleimhaut des Kehlkopfes einige umschriebene, dunkelrothe Flecke. Sämmtliche Lymphdrüsen vergrössert, etwas weich, äusserlich dunkelroth; Schnittfläche leicht vorquellend, Peripherie der Drüsen dunkelroth, das Drüsenparenchym grau bezw. grauroth und trübe.

In den aus allen Theilen des Gefässsystems untersuchten Blutproben wurden Bacillen ermittelt; die Milz war reichlich von ihnen durchsetzt.

Am 3. Juli wurde mir ein Schwein aus einem anderen Orte bei Berlin zur Obduction übersandt, welches vor circa 6 Stunden gestorben war.

Schwein 7. Castrirtes männliches Schwein des gemischten Landschlages, ca. 6 Monate alt, schwarz, mit 3 Finger breitem Gürtel.

Todtenstarre am Halse und an den Extremitäten. Die Haut an der unteren Seite des Halses, an der Unterbrust und am Bauche war diffus bläulichroth gefärbt. Die Blutgefässe der Haut stark injicirt. Die grösseren Gefässe der Unterhaut mit dunkelrothem Blute prall gefüllt. In der Bauchhöhle eine geringe Menge trüber, gelblich gefärbter Flüssigkeit. Magen- und Darmschleimhaut getrübt, stellenweise auch leicht diffus geröthet. Die Peyer'schen Haufen und Solitär-follikel wenig geschwollen. Die Leber geschwollen, blauroth, mit einem Stich ins Braune, mässig fest, die Ränder abgerundet. Die Schnittfläche glatt, sehr saftreich; die Acini erheblich vergrössert und sehr trübe. Die Milz stark geschwollen, bläulich-rothbraun, etwas weich; die Pulpa vermehrt, die Trabekel kaum erkennbar. Die Nieren etwas vergrössert, grau-rothbraun, mässig fest; die Schnittfläche glatt und saftreich. Die Gefässe ungewöhnlich gefüllt. Die Markstrahlen machten sich als trübe, grauweisse Streifen bis zur Peripherie deutlich bemerkbar. Die Abschnitte der gewundenen Canäle trübe. In den Brustfellsäcken eine sehr geringe Menge trüber Flüssigkeit. In den Herzhöhlen dunkelrothes, meist flüssiges Blut, welches an der Luft bald gerann. Die Farbe des Herzmuskels ins Graue spielend. Lungen in der Expirationsgrösse, schmutzig rosa, kaum knisternd.

Schnittfläche glatt, spiegelnd, auf Druck trat feinblasiger Schaum auf die Schnittfläche. Luftröhre und Bronchien mit weissem Schaum gefüllt. Die Lymphdrüsen sämmtlich etwas vergrössert, die Kapseln wenig geröthet, das Drüsenparenchym markig geschwollen.

Im Blut wenige, in der Milz sehr viele Bacillen.

Fassen wir die Befunde zusammen, welche sich aus den vorstehenden Obductionsprotocollen ergeben, so können wir eine sichere anatomische Grundlage für die als Rothlauf bezeichnete Infectionskrankheit der Schweine herstellen. Bei allen Thieren waren erkrankt: der Magen, der Darmcanal (die Solitärfoellikel, die Peyersehen Haufen), die mesenterialen Lymphdrüsen, die Milz, die Leber, die Nieren, das Herz und die Haut. Die Veränderungen, welche sich an den genannten Organen nachweisen liessen, fallen durchweg in das Gebiet der acuten Entzündungsprocesse, die sich in den einzelnen Fällen nur im Grade der Heftigkeit von einander unterscheiden. Bei den meisten Schweinen lag eine hämorrhagische, bei Schwein 6 dagegen eine einfache Entzündung des Magens und Darms vor; die Schweine 1, 2, 4, 5, 6 waren mit einer hämorrhagischen, die Schweine 3 und 7 mit einer gewöhnlichen Nephritis parenchymatosa bzw. catarrhalis behaftet. Dasselbe wiederholte sich bei den Erkrankungen der mesenterialen Lymphdrüsen und der äusseren Haut. Hierzu kamen dann die Hepatitis und Myocarditis parenchymatosa, der hyperämische Milztumor und das Lungenödem, die bei keinem Thiere fehlten.

Auch will ich noch hinzufügen, dass die Muskeln aller von mir untersuchten Schweine sehr trüb, brüchig, mässig feucht und oft grau-roth gefärbt waren (Myositis parenchymatosa).

Nur bei einem Schwein (3) bestand Diphtherie des Magens und des Darms.

Hiernach ist der Rothlauf der Schweine eine unter den Symptomen der Septicämie verlaufende Krankheit, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der in den Körper eingeführte Krankheitserreger sich vermehrt und, auf andere Schweine übertragen, wieder dieselbe Krankheit hervorruft, und dass gleichzeitig eine toxische Infection besteht, welche auf den ganzen Körper wirkt und die Veränderungen in den grossen Parenchymen, wie Leber, Nieren etc., herbeiführt. Der Rothlauf ist mithin eine fortpflanzungsfähige und dyskrasische Krankheit, der eine bacilläre und toxische Infection zu Grunde liegt. Für letztere sprechen nach meiner Ansicht zwei Umstände. Zunächst die

schweren klinischen Erscheinungen der erkrankten Thiere bei der verhältnissmässig geringen Anzahl der im Blute und in den meisten Gewebsflüssigkeiten nachweisbaren Bacillen, ferner der Umstand, dass der Rothlauf bei manchen Schweinen langsamer, bei anderen dagegen schneller verläuft, und dass es gerade die ersteren Fälle sind, in denen die Menge der im Blute und in den Gewebssäften aufzufindenden Bacillen eine grössere ist. In diesen Fällen kann man nur schliessen, dass die üppigere Wucherung und das Auftreten grösserer Bacillennengen im Blute und in den Organen durch die längere Dauer der Krankheit ermöglicht war. Wenn daher bei einem im Uebrigen übereinstimmenden anatomischen Befunde viele Thiere schnell zu Grunde gehen, so ist kaum noch eine andere Deutung gerechtfertigt, als dass die toxische Infection von besonderer Bedeutung für den Verlauf der Krankheit ist.

Das Wachsen der Rothlaufbacillen in Fleischwasser-Pepton-Gelatine lehrt, dass sie dabei Stoffe verbrauchen; denn wenn man die Reagensglasculturen kürzere Zeit stehen lässt, so bildet sich, wie bereits erwähnt, an dem oberen Ende des Impfstiches eine kleine trichterförmige Vertiefung, die sich allmählich in der Richtung desselben ausbreitet und schliesslich einen canalartigen Hohlraum von verschiedenem Durchmesser darstellt, der mit dem unteren Ende des Impfstiches abschliesst, inmitten der Gelatinemasse liegt und von der wolkenartig ausgebreiteten Cultur umschlossen ist. Diese Veränderung hat sich nach Ablauf von etwa 4 Wochen ausgebildet. Auch lässt sich an der Gelatine, welche an die Vertiefung bzw. den Hohlraum stösst, eine geringe Verflüssigung nachweisen. Ich bin aber der Ansicht, dass die Rothlaufbacillen nicht nur Stoffe verbrauchen, sondern auch produciren. Derartige Stoffwechselproducte der Mikroorganismen sind in grösserer Zahl bekannt geworden: manche sind flüchtig und von intensivem Geruch, andere giftig und noch andere gefärbt. Bei der Fäulniss thierischer Flüssigkeiten und Gewebe bilden sich Gifte (Ptomaine), die Gegenstand besonderer Untersuchung gewesen und als Stoffwechselproducte wuchernder Bacterien erkannt sind. Mit der Annahme, dass die Rothlaufbacillen spezifische, giftig wirkende Stoffwechselproducte liefern, glaube ich den verschiedenen Verlauf der Krankheit und die Symptome derselben am leichtesten erklären zu können. Die giftigen Substanzen gelangen mit den Bacillen in das Blut, in dem sich die letzteren nicht nur weiter vermehren, sondern auch fort und fort neue Mengen ihrer Stoffwechsel-

producte erzeugen, und mit dem Blute in alle Organe des Körpers, um in ihnen weitere Veränderungen hervorzurufen.

Von der Widerstandsfähigkeit der Schweine gegen dieses Gift wird es abhängen, ob sie die Bacillenvegetation, deren Product der Rothlauf doch ist, überstehen und ob sie langsam oder schnell zu Grunde gehen. Das Gift muss ferner specifische Beziehungen zu den nervösen Centralapparaten und dem Herzen besitzen; und zwar sprechen hierfür die schwere Eingenommenheit des Kopfes, die hochgradigen Störungen in der Bewegung, die unverkennbar an lähmungsartige Zustände des Hintertheils erinnern, und der Umstand, dass alle Thiere an Lähmung des Herzens mit consecutivem Lungenödem zu Grunde gehen. Hiernach komme ich zu dem Schlusse, dass der Symptomencomplex des Rothlaufs der Schweine im Wesentlichen als eine Vergiftung anzusehen ist, und es würde mir eine geringe Mühe machen, eine grössere Zahl von Fällen mitzutheilen, in denen durch namhafte Thierärzte der Stäbchenrothlauf für eine Vergiftung mit Pökelbrühe und Heringslake gehalten worden ist. Die Möglichkeit einer Verwechslung des Rothlaufs mit anderen Krankheiten ist nach der Entdeckung der Rothlaufbacillen beseitigt, denn es kommt nunmehr nur darauf an, dass die Obduktionen der Schweine vollständig ausgeführt und dass in zweifelhaften Fällen der Nachweis der Rothlaufbacillen im Blute und in den Gewebssäften, z. B. in der Milz, geführt wird. Hiergegen könnte man einwenden, dass der Nachweis der feinen Bacillen zum Zwecke einer zuverlässigen Diagnose in der thierärztlichen Praxis kaum ausführbar, und dass dies namentlich für die Fälle zutrefte, in denen eine schnelle Entscheidung nothwendig sei. Diesen Einwand kann ich nicht vollständig abweisen, und deshalb habe ich mich bemüht, die für die Erkennung des Rothlaufs entscheidenden Punkte aus dem groben anatomischen Bilde desselben hervorzuheben, um den Bedürfnissen der praktischen, speciell der beamteten Thierärzte besser zu genügen. Dies glaube ich auch erreicht zu haben.

Die anatomischen Abweichungen der Organe, welche beim Stäbchenrothlauf der Schweine vorliegen, sind das Product einer allgemeinen Infection des Körpers, und dabei ist die Frage: von welcher Stelle (Haut, Lungen, Darm) diese Infection eigeleitet wird, zunächst von untergeordneter Bedeutung. Die wissenschaftliche Erfahrung lehrt, dass die Körperorgane bei den verschiedenen Infectionskrankheiten nicht gleichmässig befallen sind, dass z. B. bei der einen die Milzschwellung gering, bei der anderen dagegen sehr stark ist; dass

bei manchen Infectionen nur die specifischen Elemente der Organe verändert, während bei anderen die bindegewebigen Bestandtheile gleichzeitig mit betroffen sind. Bei dem Stäbchenrothlauf der Schweine steht mit ihren infectiösen Veränderungen die Milz im Vordergrund, und bisher habe ich unter der grossen Summe der zur Obduction gekommenen Fälle keinen angetroffen, der ein abweichendes Verhalten in dieser Beziehung gezeigt hätte. Die Milz ist vergrössert, prall, ihre Kapsel mehr oder weniger gespannt und verdünnt. Die Vergrösserung findet nach allen Richtungen, namentlich aber im Dickendurchmesser statt. Die Milz ist blauroth oder kirschroth gefärbt und brüchig. Die Brüchigkeit erreicht aber niemals den Grad, dass die Milz erweicht zu nennen ist. Die Durchschnittsfläche ist ebenfalls kirschroth und bei geringeren Schwellungen glatt, bei stärkeren jedoch mit flachen, abgerundeten, etwa linsengrossen Erhabenheiten besetzt, die dem Ausbreitungsgebiete der Penicilli entsprechen. Die Vergrösserung der Milz ist durch Neubildung von Milzzellen (parenchymatöse Schwellung) und durch starke Hyperämie (hyperämische Schwellung) bedingt und letztere die Ursache, dass die Milz blau gefärbt ist. Das Essentiale ist aber nicht die Hyperämie, sondern die Zunahme an Gewebsmasse, wodurch die Entfernungen zwischen den Malpighi'schen Körperchen vergrössert und letztere schliesslich ganz verdeckt werden. Hat der frische Durchschnitt der Milz einige Zeit an der Luft gelegen, so tritt Oxydation des Blutes und dadurch eine Veränderung der Farbe ein — sie wird hellroth.

Die Vergrösserung und Hyperämie der Milz beweisen, dass eine reizende Substanz auf sie eingewirkt hat, und wenn man beachtet, dass das Milzgewebe gleichzeitig oft von ganz erstaunlich grossen Mengen von Rothlaufbacillen durchsetzt ist, so ist man gezwungen, die Milzschwellung auf die Einwirkung der Rothlaufbacillen und ihre Stoffwechselproducte zu beziehen.

Es sind ferner schwer erkrankt der Magen und Darm mit den sich anschliessenden Lymphapparaten (Peyer'schen Haufen, solitären Follikeln und mesenterialen Lymphdrüsen) und die Nieren. An Magen und Darm wird eine acute Entzündung wahrgenommen, die in der Regel mit Blutungen verbunden ist, seltener tritt Diphtherie auf. Rechnen wir zu den erwähnten 7 Schweinen die beiden hinzu, welche nach der Impfung mit den Milzbacillen aus Baden gestorben waren, so waren unter 9 Fällen 6 mit Gastro-Enteritis haemorrhagica, 3 mit Gastro-Enteritis catarrhalis und 1 mit Gastro-Enteritis diph-

theritica behaftet. Mithin ist der Verdauungscanal in jedem Falle erkrankt, die Art seiner Erkrankung aber verschieden, worüber offenbar die Menge der einwirkenden Rothlaufbacillen entscheidet. Ich will dabei noch auf eine andere Abweichung aufmerksam machen. Sehr häufig sind die drüsigen Bestandtheile der Magen- und Darmschleimhaut (Fundus-, Pylorus- und Lieberkühn'sche Drüsen) mit-ergriffen, so dass eine ausgeprägte Gastro-Enteritis glandularis acuta zu constatiren ist. In diesen Fällen ist die Schleimhaut der Fundusdrüsen- und Pylorusdrüsenregion (Ellenberger), namentlich die der ersteren stark geschwollen, trübe und an der Oberfläche hügelig; die Hügel entsprechen den durch trübe Schwellung vergrösserten Fundusdrüsen. Dazu kommen die Schwellungen der Peyer'schen Haufen und der Solitärfollikel, die beim Schwein bekanntlich schon in der Schleimhaut des Magens nachzuweisen sind, und die Abweichungen an den Mesenterialdrüsen. In den letzteren konnte ich sehr oft beobachten, dass die Abschnitte der Lymphdrüsen am schwersten ergriffen waren, welche um die Einmündungsstellen der Lymphgefäße ihre Lage hatten. Die Solitärfollikel und Peyer'schen Haufen sind in den stärksten Graden der Schwellung weiss und trübe (markige Schwellung), erstere bilden dann flache, beinahe linsengrosse Knötchen, letztere flache, beetartige Hervorragungen, die oft mit punktförmigen, hämorrhagischen Flecken besetzt sind. Fast bei jeder Obduction lässt sich nachweisen, dass die engen Partien des Darmcanals und die in das Lumen desselben stark hervortretenden Theile (Kämme der Falten, Zottenspitzen), ferner die hinteren Abschnitte des Dünndarms und der Blinddarm mit dem anstossenden Theil des Colon am heftigsten erkrankt sind, während die übrigen Partien des Darmes geringere Veränderungen erkennen lassen. Macht man Schnitte durch die Darmschleimhaut und färbt dieselben, so kann man feststellen, dass das Epithel der Schleimhaut verloren gegangen, dass die Darmoberfläche mit Bacillen bedeckt ist, und dass letztere selbst in den Zotten und in den tieferen Abschnitten der Schleimhaut enthalten sind. In den Blut- und Lymphgefässen fanden sich die Bacillen oft in dichten Massen vor. Diese Zustände wurden nicht nur im Dünn-, sondern auch im Dickdarm beobachtet. Ebenso fehlten die Bacillen in den Solitärfollikeln und in den Peyer'schen Haufen niemals, ja, sie wurden in diesen oft in so grossen Mengen angetroffen, dass die Lymphapparate des Darmes als die Invasionsstellen des Rothlaufinfectionsstoffes anzusehen sein

dürften. Eine massenhafte Einwanderung von Bacillen wurde auch in den mesenterialen Lymphdrüsen ermittelt.

Die Veränderungen in den Nieren wechseln ebenfalls zwischen leichten und schweren, denn in den beschriebenen 7 Fällen lag bei 5 eine Nephritis haemorrhagica und bei 2 eine Nephritis parenchymatosa vor. Beide Formen der Nephritis können sich noch mit einer Nephritis catarrhalis vergesellschaften, wie die Obductionen der Schweine No. 3, 4 und 5 beweisen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Nieren grösser, an der Oberfläche glatt, dunkel grauroth gefärbt und trübe sind, und dass in der dunkel graurothen Masse grössere und kleinere, punktförmige Blutungen liegen. Dabei sind die Nieren ziemlich derb, zuweilen schlaff, aber niemals weich, ein Beweis, dass die bindegewebigen Bestandtheile derselben fast garnicht betroffen sind.

Weniger schwer befallen sind: die Leber, das Herz und die Muskeln. Die Leber ist etwas vergrössert, namentlich im Dickendurchmesser, trübe und graubraun; das Herzfleisch verfärbt, wobei das Roth der Musculatur ins Graue übergeht. Die graue Farbe zeigt sich nicht an der ganzen Musculatur des Herzens, sondern tritt fleckweise auf. Die Körpermuskeln befinden sich im Zustande der trüben Schwellung, d. h. sie sind gleichmässig grauroth, undurchsichtig, weniger fest und bei der mikroskopischen Untersuchung körnig.

Hieran schliesst sich die rothe und blaurothe Verfärbung der Haut, die im Anfang und in den leichteren Fällen der Krankheit gewöhnlich nur fleckweise auftritt, in Fällen mit tödtlichem Verlauf dagegen fast immer über mehr oder weniger grosse Abschnitte des Körpers sich ausbreitet. Dass die Röthung der Haut nicht nur auf einer Stauung in den Venen, sondern zum Theil auf einer wirklichen, echten entzündlichen Hyperämie beruht, lässt sich schon bei einer genauen Prüfung der rothen und blaurothen Flecke erkennen. Die Haut ist nämlich an den gerötheten Stellen nicht selten gleichzeitig leicht geschwollen und glänzend, so z. B. an den Augenlidern, wo das subcutane Gewebe locker und weitmaschig ist. Namentlich aber spricht hierfür die später folgende Desquamation und das theilweise Ausfallen der Haare (cf. Bd. XI, S. 375) an den geröthet gewesenen Hautabschnitten, die nur durch eine erhebliche Schädigung der Ernährung, also des Stoffwechsels der Haut, erklärt werden können. Denn solche Schädigungen werden wohl durch entzündliche Circulationsstörungen, aber nicht durch einfache Stauungen, auch wenn sie mehrere Tage anhalten, bedingt. Später allerdings, wenn die Erkrankung des Herzens

und der Muskeln zugenommen hat, mithin die Triebkraft des Herzens und die inspiratorischen Bewegungen verschlechtert sind, nimmt die Stromgeschwindigkeit des Blutes ab und es tritt Stauung in den Venen ein. Zu dieser Zeit kann die Verfärbung der Haut eine allgemeine werden, die besonders an den tiefer gelegenen Theilen des Körpers, an der Schnauze, der unteren Seite des Halses, des Bauches und an den Extremitäten hervortritt. Dasselbe sehen wir aber auch sehr häufig an Schweinen, die mit Pneumonien etc. behaftet waren und suffocatorisch zu Grunde gegangen sind, und schon lange ist deshalb die rothe, besser blaurothe, diffuse Färbung der Haut als ein charakteristisches Zeichen des Rothlaufs der Schweine nicht mehr angesehen worden.

Hiernach ist der Befund der feinen Bacillen in der Milz oder im Blute der gestorbenen Schweine das wichtigste Merkmal für die Erkennung des Rothlaufs. Kann der Nachweis der Bacillen nach Lage der Umstände nicht geführt werden, so entscheiden die durch die allgemeine Infection hervorgerufenen schweren Veränderungen der Körperorgane, die sich ihrem Werthe nach, wie folgt, anordnen lassen:

- 1) acuter hyperämischer Milztumor;
- 2) hämorrhagische (diphtheritische) Magen-Darmentzündung;
- 3) hämorrhagische (parenchymatöse) Nierenentzündung;
- 4) parenchymatöse Entzündung der Leber, des Herzens und der Muskeln;
- 5) entzündliche und Stauungshyperämie der Haut;
- 6) geringe Transsudation in die Bauch-, Brustfell- und Herzbeutelhöhlen.

Bisher habe ich keinen Fall kennen gelernt, der unter Beachtung der vorstehenden Abweichungen nicht mit Sicherheit hätte erkannt werden können. Dabei will ich bemerken, dass ca. 100 Schweine in dieser Richtung von mir untersucht worden sind, und dass bei allen die Anwesenheit der feinen Bacillen, um die Richtigkeit der Diagnose zu prüfen, nachgewiesen worden ist. Ob meine Angaben über die Sectionsbefunde mit den bisher veröffentlichten übereinstimmen oder nicht, lasse ich vollkommen unerörtert, da ich mir aus einer derartigen Prüfung keinen Nutzen für die Sache versprechen kann. Dagegen will ich noch anführen, dass auch die Impfung von weissen Mäusen ein Hilfsmittel für die Feststellung des Rothlaufs der Schweine abgiebt. Denn aus den vorstehenden Versuchen ergibt sich, dass nach der Verimpfung von Blut oder kleinen Milzstückchen der an

Rothlauf gestorbenen Schweine auf weisse Mäuse eine Krankheit bei letzteren entsteht, welche durch die mitgetheilten klinischen Erscheinungen und den Verlauf charakterisirt ist. Die Mäuse erkranken ca. 24 Stunden nach der Impfung: sie verlieren ihre Munterkeit, sitzen mit gekrümmtem Rücken am Boden des Glases, zeigen ein gesträubtes Haar und athmen beschleunigt. Dabei sondert die Con-junctiva eine schleimige Flüssigkeit ab, die an den Rändern der Augenlider antrocknet und letztere verklebt. Die Menge des abge-sonderten Secrets ist zuweilen so gross, dass die äussere Fläche der Augenlider mit einer durchsichtigen, glasigen Masse bedeckt ist, die nach dem Antrocknen einen krustenartigen Belag darstellt. Neben den allgemeinen Krankheitserscheinungen ist das Verkleben der Augenlider das wichtigste Merkmal für die Erkennung der Krankheit. Hierzu kommt der stets tödtliche Verlauf des Leidens. In der Regel tritt der Tod nach einer etwa 4tägigen Krankheitsdauer unter langsamer Suffocation ein.

III.

Ueber Antipyrin.

Von

H. Frick.

(Aus dem Spital für kleine Hausthiere der Kgl. Thierarzneischule zu Berlin.)

Obwohl manche Autoren gemäss ihrer Ansicht von der Unschädlichkeit des Fiebers für den Körper eine Behandlung der krankhaften Temperatursteigerung für überflüssig halten, so sind auf der anderen Seite auch viele Kliniker der Ansicht, dass eine Erhöhung der Körpertemperatur, namentlich wenn sie längere Zeit besteht, Veränderungen im Körper hervorruft, die auf den Verlauf der Krankheit und besonders auf den Kräftefond von wesentlichem Einfluss sind. Diejenigen, welche die Bedeutung des Fiebers in Abrede stellen, stützen sich auf die Erfahrung, dass Thiere, die Tage lang einer Temperatur von 44—45° ausgesetzt waren, nicht zu Grunde gegangen sind, sondern sich sogar ganz munter gezeigt haben; aber es ist doch wohl ein gewaltiger Unterschied, ob die Eigenwärme eines Thieres durch Wärmezufuhr von aussen erhöht wird, der Organismus also rein passiv ist, oder ob das betreffende Thier sich selbst auf eine höhere Temperatur bringt, und zwar dadurch, dass es activ leistet, d. h. von seinen eigenen Organbestandtheilen verbrennt. Schon das Bestreben, brauchbarere Fiebermittel, als wir bisher besaßen, zu finden, ist doch wohl ein Beweis, dass die Bedeutung des Fiebers nicht zu unterschätzen ist. Am hiesigen Spital für kleine Hausthiere ist viel mit den bekannten Antipyreticis experimentirt worden, doch ohne wesentlichen Erfolg; Natrium salicylicum, Natrium jodicum, Acidum salicylicum, selbst das in letzter Zeit vielgenannte Kairin, hatten nicht die erhoffte Eigenschaft; letzteres Mittel hatte sogar die üble Nebenwirkung, dass

schon Dosen, die noch keinen temperaturherabsetzenden Effect entfalteten, heftige Magendarmreizungen, ja sehr häufig selbst den Tod im Gefolge hatten.

Es ist daher als ein bedeutsamer Fortschritt der Therapie anzusehen, dass man es jetzt in der Hand hat, fieberhafte Temperaturen sicher herabzusetzen, und zwar mit Hülfe des von Knorr in Erlangen auf synthetischem Wege dargestellten Antipyrin.

Die ersten Versuche mit Antipyrin hat Filehne¹⁾ angestellt, und zwar bei kranken Menschen. Er gab das Mittel per os in der Weise, dass zunächst 2 Grm. einverleibt wurden und dann in Zwischenräumen von 1 Stunde die übrigen 3 Grm. folgten. So erlangte Filehne einen Temperaturabfall bis auf 38° und eine Apyrexie von 7—20 Stunden.

Nach dem Vorgange von Filehne und mit demselben Erfolg wandten das Antipyrin an: Guttman²⁾, May³⁾, Falkenhain⁴⁾, Rank⁵⁾, Alexander⁶⁾, Busch⁷⁾, Penzoldt und Sartorius⁸⁾, Noorden⁹⁾, Cahn¹⁰⁾. Von diesen Autoren sah Falkenhain ein Sinken der Temperatur bis auf 34,8° und einmal ein Steigen derselben um 0,3°; im Uebrigen war die antipyretische Wirkung eine sehr prompte. Rank wandte in einem Falle, da Erbrechen die innerliche Verabreichung des Mittels contraindicirte, das Antipyrin subcutan an mit ebenfalls gutem Erfolg. Alexander¹¹⁾ sah nach der subcutanen Injection Abscesse entstehen, sowie als Nebenerscheinung bei der Antipyrinmedication ein Exanthem. Dasselbe Exanthem beobachteten Secchi¹²⁾, Ernst¹³⁾, Bielschowsky¹⁴⁾.

Von den sonst in der Literatur vorliegenden Angaben über

¹⁾ Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 7.

²⁾ Berliner klin. Wochenschr., 1884, No. 20.

³⁾ Deutsche med. Wochenschr., 1884, No. 24—26.

⁴⁾ Berliner klin. Wochenschr., 1884, No. 24.

⁵⁾ Deutsche med. Wochenschr., 1884, No. 24.

⁶⁾ Breslauer ärztl. Zeitschr., 1884, No. 11.

⁷⁾ Berliner klin. Wochenschr., 1884, No. 27.

⁸⁾ Ibidem, No. 30.

⁹⁾ Ibidem, No. 32.

¹⁰⁾ Ibidem, No. 36.

¹¹⁾ Breslauer ärztl. Zeitschr., 1884, 26. Juli.

¹²⁾ Ibidem, 9. August.

¹³⁾ Centralbl. f. klin. Med., 1884, 16. August.

¹⁴⁾ Breslauer ärztl. Zeitschr., 1884, 23. August.

Wirkungsweise und Anwendung des Antipyrin verdient die Arbeit Demme's¹⁾ eine eingehendere Besprechung.

Demme hat sich durch Thierexperimente von der toxischen Wirkung des Antipyrin Kenntniss verschafft; seine Versuche zerfallen in zwei Klassen:

a) Bei Fröschen und Kaninchen, denen das Herz freigelegt war, wurde subcutan eine grosse Dosis Antipyrin injicirt; es stellte sich hierbei sehr schnell Steigerung der Pulsfrequenz, erhöhte Reflexerregbarkeit ein, ähnlich wie beim Strychnin, die schliesslich in volle Anästhesie überging, und dann trat plötzlicher Herzstillstand ein.

b) Wurden denselben Thieren mehrere kleine Dosen innerhalb einiger Stunden einverleibt, so kam es auch zu toxischer Wirkung, jedoch viel langsamer, und zwar erfolgten dann zuerst die nervösen Erscheinungen (erhöhte Reflexerregbarkeit mit schliesslicher Anästhesie) und zuletzt steigerte sich die Pulsfrequenz, erst sehr spät trat endlich Herzstillstand ein.

Dass bei diesen Intoxicationen nicht die betreffenden Organe selbst, sondern nur ihre nervösen Apparate eine Veränderung erlitten, bewies Demme folgendermassen: War bei einem Frosch das Herz durch Antipyrin zum Stillstand gebracht, so genügte es, wenn Blut, das kein Antipyrin enthielt, in das Herz eingeführt wurde, um wieder regelmässige Contractionen hervorzurufen. Dasselbe Resultat, d. h. Wiederbelebung der schon lange sistirenden Herzthätigkeit, erhielt Demme durch geringe Dosen von Coffein.

Was die Druckverhältnisse im Gefässsystem bei Anwendung von Antipyrin betrifft, so konnte anfänglich eine Steigerung des Blutdruckes und dann ein allmähliches Sinken desselben bis auf Null constatirt werden. Aus den Versuchen geht hervor, dass die Ursache hierfür in einer primären Reizung und darauf folgenden Lähmung des vasomotorischen Centrums zu suchen ist.

Endlich hat Demme gefunden, dass das Blut der an Antipyrin-intoxication eingegangenen Thiere länger der Fäulniss widersteht, als anderes Blut ohne Antipyrin; er führt dies auf eine antibacterielle Wirkung des Antipyrin zurück, doch wahrscheinlich mit Unrecht. Es mag nämlich hier eingefügt werden, um nicht später auf diesen Punkt zurückkommen zu müssen, dass, wie die Versuche von Herrn Prof.

¹⁾ Fortsohr. d. Med., Bd. 2, No. 20 u. 21.

Dr. Möller ergeben haben, Milzbrandbacillen in einer Nährlösung, der 5 pCt. Antipyrin zugesetzt waren, ungestört wachsen.

In Bezug auf die therapeutische Verwendung des Antipyrin hat Demme ebenfalls zahlreiche Beobachtungen mitgetheilt. Die Anwendung des Mittels erstreckte sich auf folgende Leiden:

Pneumonia catarrhalis,
Pneumonia crouposa,
Typhus abdominalis,
Erysipelas,
Scarlatina,
Diphtheria faucium,
Polyarthritus rheumatica acuta,
Phthisis pulmonum,
Tuberculosis miliaris acuta.

Unter den mit diesen Krankheiten behafteten Patienten befanden sich Individuen von 6 Monaten bis zu 14 Jahren, und von diesen erhielten selbst die jüngsten bis zu 0,5 Grm. pro die, während die älteren bis zu 2 Grm. pro die bekamen, und Alle ertrugen das Mittel gut. Die Application geschah stets per os, nur zweimal wurde die subcutane Injection angewendet. Ebenso wie die oben genannten Autoren beobachtete Demme ein Sinken der Temperatur bis zur Norm, ja selbst unter diese. Meist erfolgte dieser Abfall innerhalb 3 Stunden nach der Verabreichung des Mittels und hielt über 24 Stunden an. Mit Ausnahme der Polyarthritus rheumatica acuta wurde nie eine Einwirkung auf locale Processe gesehen. Bei genanntem Leiden sah Demme die heftigsten Schmerzen in den Gelenken sehr bald schwinden, so dass die Patienten leichte Bewegungen ausführen konnten; desgleichen nahm auch die Schwellung und Füllung in den Gelenken ganz beträchtlich ab. Als Nebenerscheinung beobachtete auch Demme das oben erwähnte Exanthem.

Wie bereits oben erwähnt, ist das Antipyrin auf synthetischem Wege dargestellt worden, und zwar ist es ein Chinolinderivat, seiner chemischen Constitution nach Dimethyloxychinin. Es ist ein weisses, krystallinisches Pulver von nicht gerade unangenehm bitterem Geschmack und ohne Geruch; es löst sich ausserordentlich leicht, schon in gleichen Theilen kalten und in der Hälfte lauwarmen Wassers.

Da das Antipyrin in der Thierheilkunde bisher noch keine therapeutische Verwendung gefunden, so habe ich auf Anrathen des Herrn Prof. Dr. Möller, der mir bereitwilligst das im hiesigen Spital für

kleine Hausthiere vorhandene Krankenmaterial zur Verfügung stellte, und dem ich dafür meinen Dank abstatte, Versuche mit genanntem Mittel angestellt, deren Resultat weiter unten folgen wird. In dem vorhandenen Krankenmaterial, dass ja nur in Hunden bestand, lag leider der Umstand begründet, dass eine Erforschung der Wirkung des Antipyrin auf Circulation und Respiration nicht möglich war. Erfahrungsgemäss regen sich nämlich Hunde, wenn man sie ergreift oder auch nur längere Zeit festhält, derartig auf, dass ein Urtheil über Puls- und Athemfrequenz ausser jeder Möglichkeit liegt. Aus diesem Grunde musste ich mich lediglich darauf beschränken, die temperaturherabsetzende Wirkung des Antipyrin, sowie seine locale Wirkung bei subcutaner Injection zu studiren. Zu diesem Zweck habe ich, abweichend von der in der humanen Medicin gebräuchlichen Applicationsweise per os, die subcutane angewendet, jedoch bin ich, wie ich gleich bemerken will, gegen das Ende meiner Versuche hiervon abgekommen und habe auch per os applicirt; die Gründe sollen weiter unten angegeben werden. Anfangs verabreichte ich nur kleine Dosen (0,5 Antipyrin in 5,0 Aqua dest.), bin aber allmählich zu grösseren übergegangen, so dass ich schliesslich, selbst bei kleinen Hunden, bis zu 2,0 Antipyrin in 4,0 Aq. dest. gelöst applicirte und die Tagesdosis 5 Grm. Antipyrin betrug. Die Temperaturmessungen sind halbstündlich, sofern nichts Besonderes angegeben ist, mit einem richtiggehenden Maximalthermometer ausgeführt; das Thermometer verblieb immer 5 Minuten im Rectum. Für die Anwendung des Antipyrin kamen folgende Leiden in Betracht:

- 1) Staube in ihren einzelnen Formen und mit den verschiedensten Complicationen;
- 2) Peritonitis acuta;
- 3) acuter Muskelrheumatismus.

Es mögen nun erst die einzelnen Versuche angeführt werden, um aus denselben nachher einen Schluss zu ziehen.

Versuch 1. Braune Jagdhündin mit katarrhalischer Form der Staube.

1. December, Nm. 2 Uhr — Min.	Temp. 40,0 ⁰	sucutan 0,5 Antipyrin in 5 Grm. Aq. dest.
- 2 - 30 -	- 40,0	
- 3 - — -	- 39,8	
- 3 - 30 -	- 39,6	
- 4 - — -	- 39,3	

1. December, Nm. 4 Uhr 30 Min.	Temp.	39,3 ⁰	
2. December, Vm. 9 - — -	-	39,3	
	Nm. 3 - — -	-	39,3
3. December, Vm. 9 - — -	-	40,2	
	- 10 - 30 -	-	40,5
			subcutan 0,5 Antipyrin in 5 Aq. dest.
	- 11 - — -	-	40,4
	- 11 - 30 -	-	39,9
	- 12 - — -	-	39,8
	Nm. 2 - — -	-	39,7
	- 3 - — -	-	38,9
	- 4 - — -	-	39,0
4. December, Vm. 10 - — -	-	39,5	
	Nm. 3 - — -	-	39,5

Versuch 2. Heller Pintscher mit Staupe, complicirt mit schwerer Pneumonie.

31. Januar, Nm. 4 Uhr 30 Min.	Temp.	40,5 ⁰	subcutan 0,5 Antipyrin in 5,0 Aq. dest.
	- 5 - — -	-	40,0
	- 6 - — -	-	39,1
	- 7 - — -	-	40,3
1. Februar, Vm. 10 - — -	-	38,8	

Versuch 3. Schwarzer Dachshund mit Staupe.

29. October, Vm. 11 Uhr 15 Min.	Temp.	40,7 ⁰	0,5 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
	- 12 - — -	-	39,1
	Nm. 2 - 30 -	-	39,1
	- 2 - 45 -	-	39,1
			0,5 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
	- 4 - — -	-	38,9
30. October, Vm. 10 - — -	-	40,0	0,5 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
	- 11 - 30 -	-	40,0
	Nm. 1 - 30 -	-	39,8
	- 3 - — -	-	39,2
	- 3 - 30 -	-	39,2
			0,5 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
	- 4 - 30 -	-	39,2

Versuch 4. Gelber Mops mit Staupe, Complication Pneumonie.

6. Februar, Vm. 10 Uhr.	Temp.	40,0 ⁰	0,7 Antip. in 7,0 Aq. dest. subcutan.
	- 12 - -	-	39,1
	Nm. 1 - -	-	38,8
	- 2 - -	-	38,8
	- 3 - -	-	39,0

Versuch 5. Graugelber Leonberger mit katarrhalischer Form der Staupe, Complication Pneumonie.

3. Februar, Vm. 11 Uhr 30 Min.	Temp. 40,0°	0,7 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
- 12 - — -	- 39,4	
Nm. 1 - — -	- 39,0	
- 1 - 30 -	- 38,9	
- 2 - — -	- 38,7	
- 2 - 30 -	- 38,6	
- 3 - — -	- 38,6	

Versuch 6. Irischer Hirtenhund mit katarrhalischer Form der Staupe.

10. Februar, Vm. 11 Uhr 45 Min.	Temp. 40,3°	0,7 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
Nm. 1 - — -	- 39,4	
- 2 - — -	- 39,5	
- 3 - — -	- 39,9	
11. Februar, - 3 - 30 -	- 40,9	1,0 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
- 4 - 30 -	- 40,2	
- 5 - 30 -	- 40,0	
- 6 - 30 -	- 40,5	

Versuch 7. Brauner Pintscher mit Staupe, Complication Pneumonie.

2. Februar, Vm. 10 Uhr — Min.	Temp. 40,2°	0,5 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
- 11 - — -	- 40,1	
- 12 - — -	- 39,6	
Nm. 1 - — -	- 39,6	
- 2 - — -	- 39,6	
- 3 - — -	- 39,8	
4. Februar, Vm. 10 - — -	- 40,0	0,7 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
Nm. 12 - 30 -	- 39,3	
- 1 - 30 -	- 38,7	
- 2 - 30 -	- 38,7	
- 3 - 30 -	- 39,2	
5. Februar, Vm. 10 - — -	- 40,0	0,7 Antip. in 5,0 Aq. dest. subcutan.
- 11 - — -	- 39,2	
Nm. 1 - — -	- 38,9	
- 2 - — -	- 39,2	

Versuch 8. Ulmer Dogge mit Staupe, Complication schwere Pneumonie.

1	Uhr	—	Min.	Nm.	Temp.	40,0 ⁰	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. subcutan.
2	-	—	-	-	-	40,0	
2	-	45	-	-	-	39,8	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. subcutan.
4	-	—	-	-	-	39,6	
5	-	—	-	-	-	39,7	1,0 Antip. in 2,0 Aq. dest. subcutan.
6	-	15	-	-	-	39,5	
7	-	15	-	-	-	39,5	
8	-	—	-	-	-	39,6	

Versuch 9. Mops mit katarrhalischer Form der Staupe.

1	Uhr	—	Min.	Nm.	Temp.	38,9 ⁰	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. subcutan.
2	-	—	-	-	-	38,2	
2	-	45	-	-	-	38,1	
4	-	—	-	-	-	37,7	
5	-	—	-	-	-	37,9	1,0 Antip. in 2,0 Aq. dest. subcutan.
6	-	15	-	-	-	37,7	
7	-	15	-	-	-	39,5	

Nach 3 Tagen war an der Injectionsstelle ein Abscess entstanden.

Versuch 10. Mops mit acutem Rheumatismus der Halsmuskeln.

11	Uhr	30	Min.	Vm.	Temp.	39,1 ⁰	1,0 Antip. in 2,0 Aq. dest. subcutan.
12	-	15	-	Nm.	-	38,9	Schmerzen in den Halsmuskeln fort, Muskeln nicht mehr contrahirt, Beweglichkeit ungestört.
12	-	45	-	-	-	39,0	1,0 Antip. in 2,0 Aq. dest. subcutan.
1	-	30	-	-	-	39,3	
2	-	15	-	-	-	39,2	

Am 4. Tage musste ein an der Injectionsstelle entstandener Abscess geöffnet werden.

Versuch 11. Ulmer Dogge mit acuter Peritonitis.

11	Uhr	30	Min.	Vm.	Temp.	40,0 ⁰	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. per os.
12	-	15	-	Nm.	-	39,7	
1	-	—	-	-	-	39,6	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. per os.
2	-	—	-	-	-	39,4	
3	-	—	-	-	-	39,3	
4	-	—	-	-	-	39,3	
8	-	—	-	-	-	39,6	

Versuch 12. Brauner Jagdhund mit Staupe, Complication Pneumonie.

12	Uhr	—	Min.	Mitt.	Temp.	40,1 ⁰	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. per os.
1	-	—	-	Nm.	-	40,0	
2	-	—	-	-	-	39,0	

3	Uhr	—	Min.	Nm.	Temp.	38,9 ^o	
4	-	15	-	-	-	39,1	
5	-	15	-	-	-	39,2 ^o	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. per os.
6	-	15	-	-	-	39,2	
7	-	15	-	-	-	38,9	
8	-	15	-	-	-	39,6	

Versuch 13. Ulmer Dogge mit Staupe, Complication Pneumonie.

12	Uhr	45	Min.	Nm.	Temp.	40,4 ^o	2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. per os.
2	-	—	-	-	-	39,8	Dieselbe Dosis Antipyryn.
3	-	15	-	-	-	39,6	1,0 Antip. in 2,0 Aq. dest. per os.
4	-	—	-	-	-	39,3	
5	-	—	-	-	-	39,5	
6	-	—	-	-	-	39,5	

Hiermit mag die Casuistik beendet sein; denn wollte ich alle angestellten Versuche hier anführen, so würde das die Arbeit unnöthig ausdehnen; ich werde daher erst später noch einige Versuche beschreiben, die besonderes Interesse beanspruchen.

Aus dem soeben Mitgetheilten ergibt sich, dass das Antipyryn die krankhaft erhöhte Eigenwärme ganz sicher herabsetzt, daher wählte auch Filehne (l. c.) den Namen Antipyryn, und zwar erfolgt der Temperaturabfall ohne Rücksicht auf die Natur der Krankheit. Insofern scheint das Leiden von Einfluss auf die Wirkung zu sein, als im Allgemeinen der Temperaturabfall um so geringer wird, je stärker ausgesprochen die Localaffectionen sind; jedoch ist dies nicht die Regel, wie ja zahlreiche Ausnahmen bei obigen Versuchen zeigen. Denselben Einfluss der Art der Erkrankung kann man auch auf die Dauer der Apyrexie annehmen; dieselbe ist, auch wieder allgemein, um so kürzer, je heftiger die locale Erkrankung ist. Leider ist ein beträchtlicher Unterschied in der Dauer der Apyrexie bei Hunden und Menschen; denn fast nie konnte ich eine Apyrexie von über 24 Stunden constatiren, wie dies von Menschen vielfach berichtet wird. Der Einwand, dass die Dosis bei meinen Versuchen vielleicht nicht gross genug war, fällt in sich zusammen, wenn man erwägt, dass bei Hunden 5 Grm. pro die als Maximaldosis zu betrachten ist, wie unten noch näher gezeigt werden wird.

Von Bedeutung für die Therapie scheint mir terner die antirheumatische Wirkung des Antipyryn zu sein, wie aus Versuch 10 hervorgeht, wo bereits nach einer halben Stunde alle Symptome des Leidens

geschwunden waren. Genauere Erfahrungen fehlen mir indess noch in Betreff des Rheumatismus; jedoch zeigen die Versuche von Demme (l. c.), dass bei acutem Gelenkrheumatismus ebenfalls eine günstige Wirkung zu erwarten ist.

Auf den Verlauf localer Leiden hat die Antipyrintherapie mit Ausnahme des acuten Rheumatismus gar keine Wirkung, denn die in obigen Versuchen vorhandenen Pneumonien verliefen genau so, als wenn kein Antipyrin verabreicht wäre.

Schliesslich wäre noch die locale Wirkung, welche bei subcutaner Application auftritt, zu erwähnen. Bereits in den Literaturangaben aus der humanen Medicin wird von Abscessen berichtet, die bei subcutanen Injectionen von Antipyrin sich einstellten. Auch ich habe in Versuch 9 und 10 die gleiche Erfahrung gemacht, während in den früheren Versuchen diese Folgen nicht bemerkt wurden. Bevor ich auf die Ursachen näher eingehe, will ich einen Versuch anführen, der nach mehreren Richtungen interessant ist und auch anzudeuten scheint, wo die Ursachen für die Abscessbildung bei subcutaner Injection des Antipyrin zu suchen sind.

Versuch 14. Pintscher, der gesund ist.

1885	Uhr	Min.	Temp.	Bemerkungen.
11. August.	Vm.	11 15	38,2 ⁰	Der Hund erhält rechterseits auf der Höhe der Rippenwölbung 2,0 Antip. in 4,0 Aq. dest. subcutan. An der correspondirenden Stelle der linken Seite 2,0 Antipyrin in 10,0 Aq. dest. ebenfalls subcutan.
-	12	—	38,5	
Nm.	1	15	38,8	Erbrechen von schaumigem Speichel, stärkere Athemfrequenz, Reflexerregbarkeit erhöht, ähnlich wie nach Strychningaben, Appetit fehlt, ebenso Durst, apathisch.
-	2	15	38,4	Geringes Taumeln beim Gange, sonst wie um 1 Uhr 15 Min.
-	3	15	38,4	Mässiges Speicheln, Reflexerregbarkeit etwas geringer als um 2 Uhr 15 Min., Appetit fehlt gänzlich, Theilnahmslosigkeit geringer.
-	4	15	38,2	Status idem.
-	5	15	38,1	Der Zustand nähert sich allmählich der

1885	Uhr	Min.	Temp.	Bemerkungen.
				Norm, mit Ausnahme des Appetits, der noch immer fehlt.
11. August.	Nm.	6 15	38,1	
	-	7 15	38,5 ⁰	Keine Krankheitserscheinungen, nur der Appetit fehlt.
12. August.	Vm.	8 —	38,3	Appetit vorhanden, sonst normal.
13. August.	Geringe Anschwellung an der rechten Injectionsstelle im Umfange eines Thalers, linkerseits alles normal.			
14. August.	An der rechten Seite, concentrisch um die Injectionsstelle, eine in der Subcutis gelegene und an der Haut adhärirende Anschwellung, die eine wallartige Begrenzung und ein fluctuirendes Centrum zeigt; Schmerzen fehlen.			
15. August.	Beim Einschneiden in die bewusste Stelle zeigt sich die Subcutis eitrig infiltrirt im Umfange eines Thalers.			

Versuch 15. Pintscher mit acutem Rheumatismus der Halsmuskeln.

1885	Uhr	Min.	Temp.	Bemerkungen.
21. September.	Vm.	11 45	39,5 ⁰	Hals wird steif gehalten, Kopf gestreckt, geringer Druck auf die Halsmuskeln ist äusserst schmerzhaft. Pat. erhält subcutan 1,0 Atp., und zwar auf der linken Brustwand 0,5 Antip. in 5,0 Aq. dest., auf der rechten 0,5 Antip. in 1,0 Aq. dest.
	Nm.	12 30	39,1	
	-	1 45	38,1	Schmerzen weg, Hals beweglich, Kopfhaltung normal.
	-	2 45	38,2	
	-	3 45	38,5	
	-	4 45	38,7	Es wird 1,0 Antip. in 5,0 Aq. dest. per os gegeben.
	-	5 45	38,6	
22. September.	Vm.	8 30	39,8	Schmerzen wieder stark, Hals und Kopf gestreckt.
	-	9 30	39,1	Pat. bekommt 1,0 Antipyrin per os in Pillenform.
	-	11 45	38,6	Die Schmerzen haben bedeutend nachgelassen, Beweglichkeit und Haltung von Kopf und Hals wieder normal.
	Nm.	1 15	38,4	
	-	2 15	38,6	Innerlich 1,0 Antipyrin in Pillenform.
	-	3 15	38,6	
	-	5 —	38,6	

1885

Bemerkungen.

23. September. Rechtsseitige Injectionsstelle etwas geschwollen, vermehrt warm.
 24. September. Status idem.
 25. September. Rechterseits eine beetförmige Schwellung der Haut von Markstückgrösse.
 27. September. Es hat sich rechts ein wallnussgrosser Abscess gebildet.

An der Hand dieser Versuche scheint sich das Zustandekommen der Abscesse bei subcutaner Anwendung des Antipyrin ganz einfach dahin zu erklären, dass, da beide Injectionen — die rechts- und linksseitige — zu gleicher Zeit und unter gleichen Bedingungen ausgeführt zwei verschiedene Resultate ergaben, die Concentration der Lösung entscheidend ist, ob eine örtliche Wirkung erfolgt oder nicht. Es dürfte sich daher empfehlen, bei subcutaner Anwendung des Antipyrin letzteres mindestens mit der 4fachen Menge des Lösungsmittels zu injiciren, will man keine örtliche Wirkung, d. h. keine Abscessbildung haben. So ist es auch wahrscheinlich zu erklären, dass ich im Anfang meiner Versuche, als ich also das Antipyrin im Verhältniss von 1 : 5—10 Aq. dest. subcutan applicirte, keine Abscesse erhielt, letztere sich aber sofort einstellten, als ich zu grösseren Dosen in Concentrationen von 1 : 2 schritt.

Ueberdies zeigt Versuch 14 im Widerspruch zur Angabe Vogel's ¹⁾, dass das Antipyrin auch normale Temperaturen erniedrigen soll, dass toxische Dosen eine Steigerung der normalen Temperatur bewirken, d. h. dass Gaben, welche 5 Grm. pro die überschreiten, für Hunde als giftig zu betrachten sind, und neben den Symptomen, wie sie schon Demme (l. c.) beschrieb, auch eine geringfügige Steigerung der Temperatur hervorrufen.

Aus den obigen Angaben folgt:

- 1) Antipyrin setzt fieberhafte Körpertemperaturen, gleichgültig, welchen Ursprunges sie sind, sicher herab;
- 2) es ist, wie die Salicylsäure, Specificum für Rheumatismus, hat jedoch keinen Einfluss auf Localleiden;
- 3) concentrirte Lösungen (1 : 1—2) erzeugen bei subcutaner Application locale Reizungen mit Abscessbildung, letztere kann vermieden werden durch verdünnte Lösungen (1 : 4—5);

¹⁾ Encyclopädie der gesamt. Thierheilkunde u. Viehzucht, Bd. 2, S. 185.

- 4) die Wirkung ist dieselbe, ob subcutan oder per os applicirt wird;
- 5) als Maximaldosis für Hunde sind 5 Grm. zu betrachten, höhere Dosen wirken toxisch.

Da wir also im Antipyrin ein so sicheres Antipyreticum und Antirheumaticum haben, so wäre es wünschenswerth, wenn weitere Versuche mit dem Mittel auch bei unseren anderen Hausthieren angestellt würden; mir fehlte bisher leider das Material dazu.

Mittheilungen
aus den
amtlichen Veterinär-Sanitätsberichten.
Berichtsjahr 1883/84.

Zusammengestellt von
Dr. J. Esser und Dr. W. Schütz.

I. Allgemeine Krankheiten.

A. Seuchen im Sinne des Gesetzes vom 23. Juni 1880.

Milzbrand.

Kr.-Th. Stöhr in Thorn berichtet über die häufigen Milzbrandfälle in seinem Wirkungskreise, als deren Ursache er die mangelhafte Beseitigung der Cadaver und die Gleichgültigkeit der Bewohner gegen die Seuche ansieht. Der folgende Fall illustriert die dortigen Verhältnisse zur Genüge:

Ein am Milzbrand verendeter Ochse, welcher, mit roher Carbonsäure stark übergossen, vergraben worden war, wurde von den Tagelöhnern des Gutes ausgegraben und zum grossen Theil verzehrt. Der Besitzer, auf den Carbonsäuregeruch in den Häusern der Tagelöhner aufmerksam gemacht, liess die Grabstelle untersuchen und fand dieselbe leer. Einige Zeit darauf fand man beim Herausnehmen von Zuckerrübenschnitzeln aus der Miethe Hautstücke des erwähnten Ochsen, die zweifellos in der Absicht dahin gebracht waren, durch häufige Todesfälle stets zu frischem Fleisch zu gelangen.

Es haben sich während des Berichtsjahres Infectionen bei der Behandlung milzbrandkranker Thiere resp. Thiercadaver zugezogen: 33 Personen, hiervon sind 4 Personen gestorben. Die Fälle vertheilen sich auf die einzelnen Provinzen, wie folgt:

	Zahl der inficirten M e n s c h e n	Zahl der gestorbenen
Ostpreussen	2	—
Brandenburg	5	1
Pommern	3	—
Posen	5	1
Schlesien	9	1
Sachsen	1	—
Hannover	3	—
Westfalen	2	1
Rheinprovinz	3	—
Summa	33	4

Tollwuth.

In der Ortschaft Grondischken erlagen der Wuth in der Zeit vom 26. Juni bis 10. September 1883: 47 Stück Rindvieh. Hierzu bemerkt Dep.-Th. Kühnert: Erwägt man, dass sich die Verluste in Folge der Tollwuth in einer einzigen Ortschaft auf mehr als 7000 Mark berechnen lassen, so sollte die schon oft aber immer vergeblich gestellte Forderung regelmässig geführter Hundecataster und einer strengen Beaufsichtigung aller Hunde für eine vollständig begründete wohl erachtet werden, ganz abgesehen von der Gefahr, die für Gesundheit und Leben des Menschen durch das oft ganz unbeachtet bleibende Auftreten der Tollwuth bei Hunden bedingt wird.

Es sind von tollenen Hunden 74 Personen während des Berichtsjahres gebissen worden. An Wasserscheu erkrankt und gestorben sind 4 Personen. Die Incubation betrug 21, 39, 77 und 156 Tage. Die Fälle vertheilen sich folgendermassen auf die einzelnen Provinzen:

	Zahl der gebissenen M e n s c h e n	Zahl der gestorbenen
Ostpreussen	12	—
Brandenburg	5	—
Posen	11	—
Schlesien	35	4
Westfalen	8	—
Rheinprovinz	3	—
Summa	74	4

Rotz.

Kr.-Th. Jäger in Ragnit berichtet, dass unter den Pferden der zu Tauroggen (ca. 20 Km. von der preussischen Grenze entfernt) cantonnirenden Grenzwachtrbrigade die Rotzkrankheit schon seit Jahren herrsche und Anlass zur Verbreitung der Seuche über die Grenzen

des Militärbezirks hinaus gebe, da der grosse Pferdebestand der Brigade längs der preussischen Landesgrenze von der Ostsee bis zum Memelstrom vertheilt sei. Zur Fortdauer und Conservirung der Rotzkrankheit trage besonders das Tauroggener Lazareth bei; dasselbe stehe unter Leitung eines thierärztlichen Routiniers, eines sogenannten Feldscheerers. Für die verdächtigen und zweifellos rotzigen Pferde wären zwar besondere Ställe bestimmt, von einer vollständigen Isolirung solcher Pferde könne aber nicht die Rede sein.

Im Reg.-Bez. Stettin wurden 2 Menschen mit Rotzgift an den Armen, im Reg.-Bez. Koblenz 1 Mensch an der Hand inficirt und geheilt. Dagegen starb im Reg.-Bez. Potsdam 1 Mensch an der Rotzkrankheit.

Maul- und Klauenseuche.¹⁾

Eine Arbeiterfrau, welche barfuss die Ställe reinigte, in denen Thiere, die an der Maul- und Klauenseuche litten, standen, wurde von einem Bläschenausschlag an beiden Fersen ergriffen. Kr.-Th. Günther-Oels.

Aus den Reg.-Bez. Bromberg, Posen und Hannover werden Fälle berichtet, dass Kinder, welche die rohe Milch von an der Maul- und Klauenseuche erkrankten Kühen getrunken hatten, an apthösem Ausschlage im Munde und an acuter Gastro-enteritis erkrankt sind.

Lungenseuche.

Von dem 38 Zugochsen zählenden Bestande der Cichoriendarre zu Halle erkrankte unter den Erscheinungen der Lungenseuche ein Ochse, welcher am 18. Juli 1883 auf Veranlassung des Besitzers geschlachtet wurde, und bei welchem durch die Section Lungenseuche constatirt wurde. Weitere offenbare Erkrankungsfälle sind während der Observation nicht vorgekommen, obschon von der Impfung kein Gebrauch gemacht worden ist. Dagegen mussten von 52 gleichfalls nicht geimpften Rindern eines Gutes, unter welchen am 7. April 1883 die Lungenseuche constatirt wurde, bis zum 28. Juni ej. a. 42 Stück auf polizeiliche Anordnung wegen Lungenseuche geschlachtet werden, wobei sich in den meisten Fällen alte Lungenseucheprocesses fanden. Die übrigen 10 Thiere, welche der Besitzer schlachten liess, erwiesen sich bei der Section nicht lungenseuchekrank. Kr.-Th. Enke-Halle.

¹⁾ In Bd. XI, Heft 4, S. 305. Zeile 2 von unten ist Klauenseuche statt Morderlinke zu setzen.

Unter einem aus 164 Stück bestehenden und wiederholt geimpften Rindviehbestande traten im Ganzen nur 3 offenbare Erkrankungsfälle auf, und in einem anderen Gehöft desselben Ortes, wo 95 nicht geimpfte Rinder standen, kam überhaupt nur ein Erkrankungsfall vor. In allen 4 Fällen wurden stark in der Rückbildung begriffene Lungenseucheproducte gefunden. Hieraus darf wohl der Schluss gezogen werden, dass die Seuche in beiden Gehöften bei ihrer amtlichen Feststellung bereits im Erlöschen begriffen gewesen ist. Kr.-Th. Stern.

Kr.-Th. Eggeling-Wernigerode hat die Erfahrung gemacht, dass die Annahme, die Impfung schade im Allgemeinen der Tilgung der Lungenseuche nicht, eine ganz irrige ist. Derselbe berichtet: „Ich habe Thiere, bei denen die Impfung eine ganz ungewöhnlich starke Reaction hervorgebracht, denen die Impfgeschwulst bis an den After hinanreichte, auf polizeiliche Anordnung tödten lassen und bei der Obduction Lungenseucheerkrankungen in den Lungen gefunden, die viel älteren Datums waren als die Ausführung der Impfung. Ein beamteter Thierarzt, der gegen Lungenseuche impft, wird aber kein Thier mit solcher Impfgeschwulst tödten lassen; er lässt vielmehr solche Thiere durchseuchen und schiebt den vorhandenen Husten den Folgen der Impfung zu. Das ganze vielgepriesene Resultat so mancher ausgeführter Impfung beruht nur in dem Durchseuchenlassen, und deshalb schon sollte überhaupt die Impfung polizeilich verboten werden.“

Auf einem Gute wurde Lungenseuche bei einem Ochsen constatirt und gleich anderen Tages der ganze Bestand, nämlich 126 Ochsen, geimpft. Einen Monat später mussten noch 2 Ochsen wegen Lungenseuche getödtet werden; bei den übrigen 124 Ochsen sind keine sichtbaren Erscheinungen der Lungenseuche mehr aufgetreten.

Auf einem anderen Gute wurde ebenfalls Lungenseuche bei 2 Ochsen durch die Section constatirt. Die übrigen 98 Stück wurden unter Stallsperrung gestellt und blieben gesund, trotzdem hier nicht geimpft wurde. Kr.-Th. Vollers-Norderdithmarschen.

Kr.-Th. Eggeling-Nieder-Barnim berichtet: Auf einem Gute nebst zugehörigem Vorwerk, mit einem Gesamttrindviehbestande von 178 Haupt, brach die Lungenseuche aus. Davon wurden 131 Stück auf polizeiliche Anordnung getödtet und alle mit Lungenseuche behaftet befunden, mit Ausnahme eines jungen Bullen, der stark tuberculös war. Zur Feststellung der Diagnose legt Berichterstatter den thermometrischen Messungen hohen Werth bei und giebt in Uebereinstimmung mit dem Kr.-Th. Klein-Teltow an, dass nach Ausbruch

der Seuche in einem Viehbestande die weiteren Erkrankungsfälle mit dem Thermometer selbst dann mit Sicherheit constatirt werden können, wenn Auscultation und Percussion keinen Aufschluss geben.

Derselbe Berichterstatter beobachtete, dass eine Kuh, welche in einem Seuchestall eingestellt war, 15 Tage nachher sich krank zeigte und bei der Section ganz frische Veränderungen in den Lungen hatte, die der Lungenseuche eigen sind. Er zieht daraus den Schluss, dass die Incubationszeit bei der Lungenseuche 14 Tage betrage.

Räude der Pferde.

Kr.-Th. Moerlin-Greifenhagen empfiehlt verdünnte Schwefelsäure (1:24) als vorzügliches Mittel zur Heilung von Pferderäude. Eine 4—6malige Waschung des ganzen Pferdes mit diesem Mittel soll auch in den vorgeschrittensten Fällen zur Heilung führen. Wenn die Haut mit Borke bedeckt ist, muss zunächst ein Seifenbad angewandt werden.

Dep.-Th. Prof. Dr. Richter-Königsberg berichtet über das Herrschen der Pferderäude in dem dortigen Regierungsbezirk, wie folgt: Leider wird wohl die Räude unter unerheblichen Schwankungen in unserem Bezirk der Ausbreitung nach den vornehmsten Platz unter den Thierseuchen innebehalten. Die Ursache liegt hier zunächst besonders darin, dass überall eine grosse Anzahl von kleinen Besitzern vorhanden ist, welche aus der Fuhrwerkerei ihren Haupt- oder Nebenerwerb gewinnen. Strenger Handarbeit abgeneigt, halten viele Leute elende Pferde, mit welchen sie gewissermassen einem geschäftigen Müssiggang obliegen und ihrer Neigung zu Pferdehandel und Tausch fröhnen.

An den Anblick solcher elenden, mit Schrunden bedeckten Thiere fast gewöhnt, verhält sich das grosse Publicum ziemlich gleichgültig dagegen und auch die ausübende niedere Polizei wendet nur geringe Aufmerksamkeit auf sie. Die Kur liegt fast ausschliesslich in den Händen von Puschern, welche oft zeitweilig den Ausschlag mindern, aber ihn schon darum nicht dauernd beseitigen, weil sie der nothwendigen Desinfection der Ställe, Geräthschaften, Wagen und Geschirre ihre Thätigkeit nicht zuwenden, auch davon keine Kenntniss haben.

Räude der Schafe.

Der Erfolg der Badekur war im Ganzen günstig. Von den 972 dem Heilverfahren unterworfenen Herden erwiesen sich 825 bei den

Revisionen als rein, 63 noch als verdächtig und 84 noch als räudekrank. Der günstige Erfolg war jedoch nicht überall nachhaltig, da ein grösserer Theil der im vorigen Jahre gereinigten Bestände wiederum verseucht ist. Der Badekur muss stets eine Schmierkur der räudigen Hautstellen vorausgehen; denn durch jene wird hauptsächlich das getilgt, was man nicht sieht, durch diese das, was man sieht. Abgesehen von der Unterlassung dieser Vorkur ist der Wiederausbruch der Seuche in solchen Beständen, die dem vorgeschriebenen Heilverfahren unterworfen worden sind, auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Zunächst sind in Folge des grossen Widerstrebens der Schafbesitzer gegen das ganze Tilgungsverfahren und bei der allgemeinen Verbreitung der Seuche manche Verheimlichungen der Räude trotz polizeilicher und thierärztlicher Untersuchungen vorgekommen und so verseuchte Bestände dem Heilverfahren entzogen worden, durch deren Verkauf geheilte Bestände später wieder inficirt wurden. Auch ist die Ausführung des Heilverfahrens stellenweise mangelhaft gewesen. Einestheils ist die Desinficirung unterblieben oder nicht vollständig gemacht, anderentheils haben sich die Besitzer nicht selten zu möglichst niedrigen Preisen schlechte Arzneien beschafft, weil sie von der Ansicht ausgingen, das vorgeschriebene Heilverfahren nutze nichts. Weiterhin ist in nicht seltenen Fällen das Scheeren der Lämmer unterblieben bezw. die Badekur erst vorgenommen worden, als die Wolle wieder 5 Cm. lang und länger geworden war. Aber auch da, wo das Baden bald nach dem Scheeren stattfand und die Arzneien in genügender Menge und von guter Beschaffenheit vorhanden waren, mögen noch mancherlei Unregelmässigkeiten vorgekommen sein bei dem Badegeschäft selbst und den nachhaltigen Erfolg der Verfahrens vereitelt haben. Dep.-Th. Dr. Steinbach-Münster.

Dep.-Th. Prof. Dr. Jacobi-Erfurt berichtet, dass die Kreisthierärzte zwar der Badekur einen mangelhaften Erfolg zuschreiben, die Räude jedoch im Reg-Bez. Erfurt schon vor Einleitung des allgemeinen Tilgungsverfahrens lange nicht mehr die Verbreitung gehabt habe, wie in früheren Jahren. Zu dieser günstigen Sachlage habe der veränderte landwirthschaftliche Betrieb, die verminderte Schafhaltung und die Beschaffung besserer Rassen beigetragen. Der Berichterstatter führt weiter aus: „In der sogenannten Schmiergegend giebt es sogar einzelne Schäfereien, in denen durch aufmerksame Behandlung die Schafe längst rein geworden und seit Jahr und Tag nicht mehr geschmiert worden sind.“

Durch die Badekur ist nur stellenweise der gewünschte Erfolg erzielt worden. Als Ursache dieses Misserfolges ist die aus Unkenntniss, Vorurtheil und Fahrlässigkeit herbeigeführte mangelhafte und unrichtige Anwendung der Bäder zu beschuldigen. Wo das Kurverfahren richtig durchgeführt worden ist, da hat es sich auch meistens bewährt. Besondere Schwierigkeiten bei der Tilgung der Räude bereiten die Genossenschaftsherden, zu denen oft 30 und mehr Interessenten gehören, die ihre Schafe nur zur Winterzeit im Stalle haben, im Sommer sich aber gar nicht um dieselben kümmern. Im Winter wird aber hier gerade viel mit Schafen gehandelt, so dass die im Frühjahr wieder vereinigte Genossenschaftsherde ganz anders zusammengesetzt ist, als sie es im Herbst war. Es ist eine Thatsache, dass auf den meisten Gütern, wo nur die überzähligen Schafe alljährlich abgesetzt werden, jedoch kein Zukauf stattfindet, die Räude durch anhaltende energische Schmierkuren vollständig getilgt ist. Als Referent diese Thatsache bezweifelte, wurden seitens mehrerer Besitzer nicht nur erhebliche Prämien ausgelobt für das Auffinden eines räudigen Schafes, sondern dieselben gaben auch mit ihren Schäfern vor den zustehenden Behörden die eidliche Versicherung ab, dass schon seit mehreren Jahren kein Schaf in der Herde mittelst der Schmierkur behandelt worden sei. Kr.-Th. Prof. Dr. Esser-Göttingen.

Kr.-Th. Schrulle-Lüdinghausen. Den mit dem Auflösen von Carbolsäure beschäftigten Leuten, die wunde Stellen an den Händen hatten, floss von dem aufgelösten Carbol etwas in die Wunde. Einige Stunden nachher, nachdem die Leute mit dem Baden der Schafe beschäftigt gewesen, spürten dieselben einen brennenden Schmerz an den Händen. Letztere sowohl wie die Arme schwellen bedeutend an, so dass die Leute in ärztliche Behandlung gegeben werden mussten. An der Stelle, von wo aus die Infection erfolgt war, fielen nach mehreren Tagen grosse Hautstücke brandig aus.

B. Sonstige allgemeine Krankheiten.

Pressekrankheit (Hautwassersucht).

Kr.-Th. Dralle-Einbeck hat die sogen. Pressekrankheit sehr oft beobachtet und fand im 1. Stadium derselben stets die Symptome des Magenkatarrhs. Die Thiere zeigen sich lecksüchtig, fieberlos; der abgesetzte Koth ist zähe, pechartig, mit Schleim überzogen. Bei der

Section findet man Schwellung der Schleimhaut des vierten Magens und hämorrhagische Erosionen auf derselben.

Im 2. Stadium treten die Symptome des Magenkatarrhs deutlicher hervor, das Auge verliert den Glanz, das Haar wird struppig, die Schultern sind abgelenkt. Die Vorderschenkel bekommen allmählich eine andere Stellung, die Vorderknie stehen mehr einwärts und die Zehe biegt sich immer mehr nach auswärts. Die Ausleerungen sind verschieden, entweder dünnflüssig oder pechartig, mit Blut gemischt; die Temperatur ist selten erhöht, meistens unternormal.

Bei der Section finden sich im Labmagen meistens Sand, Steine etc., in der Schleimhaut mehr oder weniger tiefe Geschwüre. Das Bindegewebe der Schenkel und mehr oder weniger des ganzen Körpers ist mit einer gelblichen Flüssigkeit gefüllt.

Im 3. Stadium wird der Kopf vorgestreckt, der Vorderkörper erscheint breiter, die vier Schenkel sind stark geschwollen, der Gang schwerfällig. Die Thiere brechen häufig zusammen und sind dann unvermögend, wieder aufzustehen. Der Leib ist aufgezo-gen, die Fäces sind pechartig, häufig wird nur etwas schwarzes Blut mit grosser Beschwerde entleert.

Bei der Section finden sich wesentlich dieselben Erscheinungen wie im 2. Stadium. Meistens ist soviel Flüssigkeit im Bindegewebe vorhanden, dass in 12 Stunden aus dem in vier Theile zerlegten Körper 5—10 Liter abfließen. Die von dem Fleisch gekochte Bouillon ist wie Leimwasser und wird beim Erkalten gallertartig.

Lupinose.

Nach dreimaliger Verfütterung von Lupinenstroh an Mutterschafe erkrankten nicht nur letztere, sondern auch deren 4 Wochen alte Lämmer an Lupinose. Eingesäuerte Lupinen sind im Kreise Ost-Sternberg seit vielen Jahren ohne jeglichen Nachtheil an Schafe verfüttert worden. Kr.-Th. Wegener-Ost-Sternberg.

Derselbe Berichterstatter sah die Lupinenkrankheit bei 3 Pferden und 3 Fohlen auftreten, welche 8 Tage hindurch 3 resp. 1½ Kgrm. Lupinenstroh erhalten hatten. Die Thiere erholten sich erst nach längerer Zeit. Die Therapie bestand in der Anwendung von Calomel und Glaubersalz, Application kalter Klystiere und kalter Umschläge auf den Kopf.

Nach den im Laufe des Sommers 1883 vom Landrathsamt zu Wittenberg angestellten Ermittlungen sind im letzten Jahre im Kreise

Wittenberg ca. 3500 Schafe an Lupinose zu Grunde gegangen, von denen der grösste Theil auf den Fläming fällt. Bei dem Rindvieh und den Pferden waren Todesfälle selten. Kr.-Th. Pirl.

Tuberculose.

Bei einem 14 Tage alten Kalbe wurde das Rippenfell mit massenhaften Perlknoten (Tuberkeln) besetzt gefunden. Die Kuh, von welcher dasselbe stammte, war in hohem Grade mit Tuberculose behaftet. Kr.-Th. Prof. Dr. Esser.

Auf einem Gute stand eine angekaufte alte Kuh, welche viel hustete und reichlich eiterigen Schleim auswarf, mit jungen Kälbern zusammen, von denen 5 nach und nach an Tuberculose verschiedener Organe eingingen. Die Kuh wurde später geschlachtet und an den Lungen bei der Obduction im hohen Grade tuberculös befunden. Von den Kälbern hatten 2 bedeutende Veränderungen an den oberen Luftröhrendrüsen (neben dem Kehlkopf), welche grosse Geschwülste darstellten. Bei einem derselben fand der Referent sogar, dass die benachbarten Knochen (Hinterhaupts-, Keil-, Schläfen- und Zungenbein) und die Kehlkopfsknorpel in Mitleidenschaft gezogen waren. In der Nähe der Knochen waren eiterige, tuberculöse Massen mit spongiöser Knochensubstanz durchsetzt. Kr.-Th. Ruthe-Swinemünde.

Bleichsucht der Lämmer.

Kr.-Th. Schwanefeldt-Kulm beobachtete, dass seit mehreren Jahren auf einer Königl. Domäne die Lämmer erkranken, cachektisch werden und sterben, wenn sie von den Müttern entwöhnt werden und das mit einem dicklichen Schleim belegte Wasser aus einem cysternenartigen Brunnen, welcher aus einem moderhaltigen See gespeist wird, als Getränk erhalten. Mit der Verabreichung gesunden Wassers kamen Neuerkrankungen nicht mehr vor. An umgestandenen Thieren hat Schwanefeldt an Leber und Lunge Organveränderungen beobachtet, die er, wie folgt, beschreibt: Die Leber stark vergrössert, gelblich und mürbe; die Gallenblase sehr gross und straff gefüllt. Die unteren Ränder der Lungen sind oft in Fingerbreite schwarz gefärbt, derb und zäh; diese Stellen vergrössern sich allmählich und nehmen dann eine graurothe verwischte Farbe an. Das Lungengewebe ist im Bereich dieser Veränderung stets luftleer und hat seine charakteristische Beschaffenheit verloren.

Diphtherie der Hühner.

Dep.-Th. Gips beobachtete bei einem in der Nähe der Stadt wohnenden Wirth, wo die Kinder an Diphtheritis litten, dass die Hühner dadurch erkrankten, dass sie die auf den Düngerhof geworfenen Sputa, welche die Kranken entleert hatten, frassen. Die Thiere erschienen durch verminderte Munterkeit und Appetitlosigkeit krank und gaben den Sitz der Krankheit durch Krächzen, Schnarchen und Niesen zu erkennen, wobei sie eigenthümliche Bewegungen mit dem Kopfe machten, auch wohl durch Kratzen am Kopfe mit den Füßen sich Erleichterung zu verschaffen suchten. Hierbei entleerte sich aus der Nase und dem Halse eine schleimige Masse, welche theilweise an den Oeffnungen festtrocknete. Fast alle Thiere erlagen ihrem Leiden.

C. Intoxicationen.

Vergiftung durch Baumwollensamenkuchen. Auf einem Gute erhielt das Rindvieh mit Einschluss der Kälber Baumwollensamenkuchen, welche unzerkleinert in ein grosses Wasserfass geschüttet und nach erfolgter Auflösung im Getränk gegeben wurden. Die älteren Thiere bekamen ungefähr 1 Pfund, die Kälber nicht über $\frac{1}{3}$ Pfund pro Tag und Kopf. Von letzteren erkrankten in Folge dessen 8 Stück, wovon 3 starben. Die Section ergab Folgendes: In der Bauchhöhle mehrere Liter einer braun gefärbten Flüssigkeit, der ganze Dünndarm diffus dunkel geröthet, die grossen Blutgefässe stark gefüllt, die Darmschleimhaut geschwollen und mit einer übelriechenden, blutig erscheinenden Masse belegt. Leber zum grössten Theil hellgelb, stark vergrössert und verdickt, Lebersubstanz weich und mürbe. Milz nicht sichtbar verändert. Beide Nieren vergrössert und erweicht. In der Harnblase Spuren eines blutigen Urins. In der Brusthöhle ca. 2 Liter einer dunkelrothen Flüssigkeit. Der Herzbeutel bis zur Hälfte mit einer blutigen Flüssigkeit gefüllt. Lungen wenig zusammengefallen, ödematös; interlobuläres Emphysem in grösserer Ausdehnung vorhanden. In den grösseren Bronchien blutiger Schaum. Die Umfläche des Herzens mit blutigen Herden wie besät; dasselbe giebt sich auch beim Oeffnen der Herzkammern an der inneren Herzauskleidung zu erkennen. Beide Herz- und Vorkammern ziemlich stark mit Blut angefüllt, dass zum Theil geronnen ist. Das Herzfleisch blass, mürbe, wie gekocht.

Die Kuchen, die vielfach ein missfarbiges Aussehen hatten, bestanden aus gröblich zerkleinertem Baumwollensamen. Ein grosser Theil dieser Kuchen besass einen mehr oder minder dicken Ueberzug von Baumwolle und Spuren eines Schimmelbelages, auch lagen auf der Oberfläche wie auf der Bruchfläche viele, mehrere Centimeter lange Haarenden. Dep.-Th. Gips.

300 zur Mast aufgestellte halbjährige Lämmer erhielten pro Tag und Stück 250 Grm. Baumwollensamenmehl als Beifutter. Nach Verlauf einiger Tage zeigten sich die Thiere krank; sie hatten Tympanitis und heftige, meistens blutige Diarrhoe. Im Verlauf von 2—3 Tagen starb ungefähr der dritte Theil. Die Section bot die Erscheinungen einer acuten Gastro-enteritis. Das Baumwollensamenmehl erschien von tadelloser Beschaffenheit und wurde von den Zugochsen ohne Nachtheil aufgenommen. Kr.-Th. Prof. Dr. Esser-Göttingen.

In Folge der Verfütterung von Baumwollensamenkuchenmehl sah Kr.-Th. Schwanfefeldt auf mehreren Gütern die Kälber erkranken und sterben. Während die Ochsen und Kühe bei dieser Fütterung gediehen, liessen die Kälber bald im Fressen nach, lagen viel, zeigten sich traurig, setzten nur eine geringe Quantität Koth ab und starben schliesslich. Bei der Obduction fand sich intensive Gelbfärbung der Musculatur und Leber; letztere schien vergrössert, die Gallenblase ausgedehnt und mit grünbräunlicher Galle angefüllt. Nach Einstellung dieser Fütterung hörte das Erkranken auf.

Bleiintoxication bei Pferden. Auf 3 im Kreise Düren gelegenen Gütern erkrankten im Verlauf von 2 Jahren die Pferde an Paralyse des Larynx in Folge der Aufnahme der auf den Pflanzen sich ablagernden Bleidämpfe der dortigen Bergwerke. Die Thiere haben dabei gute Fresslust und sehen meistens wohlgenährt aus, werden jedoch der bedeutenden Respirationsbeschwerden wegen schliesslich gänzlich arbeitsunfähig. Die Obduction solcher Thiere liefert negative Befunde. Kr.-Th. Krichels.

Hierzu bemerkt Dep.-Th. Dr. Schmidt: Die erwähnte Calamität herrscht auch in Stolberg und den benachbarten Ortschaften, so dass alljährlich eine ziemliche Anzahl Pferde als absolut arbeitsunfähig abgeschafft werden muss. In den Cadavern wird von den Chemikern stets Blei nachgewiesen, und zwar vorherrschend viel in den grossen Drüsen: Niere, Leber, Milz. Werden derartig erkrankte Thiere in eine andere, bleifreie Gegend versetzt, so wird, wie die Analyse derartiger Cadaver ergab, das Blei eliminirt, aber die Wirkung bleibt

bestehen, d. h. die Pferde leiden nach wie vor an jener charakteristischen Athmungsbeschwerde. Durch die Tracheotomie werden die Athmungsbeschwerden sofort beseitigt und die Thiere häufig wieder ganz brauchbar gemacht.

Von dem gewöhnlichen Kehlkopfspfeifen unterscheidet sich jenes durch Blei verursachte ganz wesentlich. Während die Thiere der ersteren Art beim Eintritt der Ruhe sich rasch wieder erholen, ist dieses bei der Bleivergiftung umgekehrt der Fall. Wenige Schritte in der Bewegung genügen in der Regel, ein ernstliches Pfeifen zu erzeugen. Werden die Thiere jetzt sofort in Ruhe gestellt, so steigert sich dennoch das Pfeifen immer mehr und mehr bis zum Brüllen mit weit geöffnetem Maul, starkem Schweissausbruch etc.; kurz, es treten Symptome der grössten Erstickungsgefahr ein, wobei die Thiere meist hinstürzen. Erst allmählich erholen sich die Patienten wieder. In einzelnen Fällen genügte heftiges Anrufen oder Drohen mit der Peitsche im Stalle, die angegebenen Symptome alsbald hervorzurufen. Die Differenzialdiagnose ist in der Verschiedenheit der auftretenden Athmungsbeschwerden stets gesichert, selbst wenn man nicht weiss, dass ein solches Pferd aus einer Bleigegend stammt.

Drei Kühe, welche des Durchfalls halber ca. 800 Grm. sog. Schlemmkreide mit dem Trank erhalten hatten, erkrankten am folgenden Tage und verendeten sämmtlich im Verlauf von 4 Tagen. Der Rest der noch vorhandenen Schlemmkreide erwies sich bei der chemischen Analyse als eine Masse, die zum grössten Theil aus Bleiweiss und zum geringeren Theil aus schwefelsaurem Kalk bestand. Kr.-Th. Pirl-Wittenberg.

Acht an Lecksucht leidende Kühe hatten durch ein Versehen des Kaufmanns statt Schlemmkreide Bleiweiss erhalten, und zwar 60 bis 70 Grm. pro Stück. In Folge dessen erkrankten sämmtliche Thiere so heftig unter den Erscheinungen der Bleivergiftung, dass nur eins mit dem Leben davon kam, die übrigen 7 im Verlauf von 2 Tagen verendeten. Kr.-Th. Leistikow-Jerichow II.

Vergiftung durch Pökelbrühe. Die 20 Schweine einer Dampfbrauerei hatten die Brühe aus einem Tags zuvor geleerten Pökelfass mit dem Futter erhalten, worauf sämmtliche Thiere erkrankten. Sie lagen in Krämpfen oder gingen mit den Vorderfüssen an den Wänden in die Höhe, kauten und speichelten fortwährend, zitterten am ganzen Leibe und verriethen durch ihr Benehmen auffallende Angst und Schmerzen. Innerhalb 24 Stunden starb der grössere

Theil; nur einige, welche die angebotene saure Milch nahmen, genasen. Am 4. Tage schlachteten mehrere Brauburschen eins der kranken Schweine, welches noch immer nicht fressen wollte. Nachtheilige Folgen sind von dem Genuss des Fleisches und der Wurst nicht beobachtet worden. Kr.-Th. Liebener-Delitzsch.

Vergiftung durch Oleanderblätter. 2 Stück Jungvieh und 2 Kühe erkrankten unter Indigestionserscheinungen. Als Ursache wurde ermittelt, dass die Thiere Gras erhalten hatten, dem Oleanderblätter beigemischt waren. Die beiden Stück Jungvieh starben innerhalb 24 Stunden, während die Kühe genasen. Die Symptome waren im Wesentlichen folgende: Geringe tympanitische Auftreibung, hohes Fieber, Geifern, Kolikerscheinungen, später grosse Hinfälligkeit und Abspannung. Bei der Obduction wurden die genannten Blätter im ersten Magen constatirt. Ausserdem fanden sich die Erscheinungen einer acuten Gastro-enteritis. Das Blut war dunkelroth und dünnflüssig, nur im Herzen und in den grösseren Gefässen fanden sich kleine lockere Gerinnsel. Kr.-Th. Esser-Jülich.

Tod in Folge Fütterung von Weizenmehl. In einer grossen Gutswirtschaft erkrankten im November v. J. nach dem Genuss von zu Futterzwecken aus einem Mühlenetablissement gekauftem Weizenmehl No. 3 in schneller Folge über 30 Mastschweine und starben nach 2—6 tägigem Kranksein, wobei sie sich matt zeigten, wenig oder garnichts fressen und anfangs verstopft waren. Die Schleimhäute erschienen blaugrau und bei einigen dieser Thiere waren die Ohren ödematös geschwollen. Zuchtschweine, die von dem Mehl nichts erhalten hatten, blieben gesund. Die Obduction ergab nur übelriechenden Mageninhalt und geringe Röthung und Schwellung der Magen- und Darmschleimhaut. Das von diesem Mehl gebackene Brod war wegen seines scharfen und bitteren Geschmacks ungeniessbar. Durch die chemische Untersuchung konnte nichts Schädliches constatirt werden.

Lähmungserscheinungen nach der Verfütterung von *Arundo fragmites*. 4 Pferde erkrankten auf einem Bauerngehöft fast gleichzeitig unter eigenthümlichen Lähmungserscheinungen. Die Thiere, welche sich bei der Untersuchung im Stalle äusserst munter zeigten, waren frei von Fieber und erhöhter Temperatur; auch liess die Fress- und Sauf lust bei denselben nichts zu wünschen übrig. Sie vermochten sich jedoch kaum aufrecht zu erhalten, taumelten, wenn sie eine Vorwärts- oder Seitenbewegung im Stalle ausführen wollten,

von der einen Seite zur anderen und stürzten dabei auch zuweilen nieder. Die Krankheit war erst zum Vorschein gekommen, nachdem man einige Tage lang junges Rohr (*Arundo fragmites*) als Häcksel geschnitten und in grossen Massen verfüttert hatte. Die Pferde sollen dieses Futter in den ersten Tagen mit besonderer Vorliebe verzehrt, bald jedoch verschmäht und jedem anderen Futter den Vorzug gegeben haben. Bei der Untersuchung des Rohrhäcksel sah man demselben oberflächlich nichts Krankhaftes an. Es hatte eine lebhaft grüne Farbe, nur war der Geruch desselben etwas dumpfig. Nach Entfernung der äusseren Hülse jedoch zeigte sich der innere Kern des Halmes schmutzig-gelblich gefärbt und mit schwärzlichen Flecken versehen, auf welchen sich mit blossem Auge deutlich Pilzbildungen erkennen liessen. Nach Aussetzung dieses Futters und der Verabreichung von *Nux vomica* waren nach 10 Tagen die lähmungsartigen Erscheinungen wieder vollständig verschwunden.

(Fortsetzung folgt.)

Referate und Kritiken.

Seuchenhaftes Auftreten von Ergotismus. First annual report of the bureau of animal industry for the year of 1884. Washington 1885. p. 175 ff. und p. 310 ff.

Im Winter 1883 84 brach unter den Rindern in Coffey County, Kansas, an mehreren Orten eine Krankheit aus, welche von den zugezogenen Thierärzten für die böseste Form der Maul- und Klauenseuche gehalten wurde. Diese Diagnose war von sonst zuverlässigen Thierärzten (Dr. Holcombe etc.) gestellt und von Autoren (Dr. M'Eachran, Dr. Trumbower etc.) bestätigt worden.

Die durch diese Diagnose unter den Interessenten hervorgerufene Panik veranlasste die Bundesregierung zu ungesäumtem Einschreiten. Dr. Salmon, zur directen Informirung des Ministers für Landwirthschaft in die Seuchegegend gesandt, erklärte nach gründlicher Untersuchung, dass die obige Diagnose irrig sei und dass die kranken Thiere mit dem Ergotismus behaftet wären.

Zur zweifellosen Entscheidung der Frage, welche Diagnose nun die richtige sei, wurden von der Staatsbehörde unter Leitung von Prof. Law eingehendere Untersuchungen und Uebertragungsversuche angestellt, welche die Richtigkeit des Salmon'schen Urtheils vollauf bestätigten. Gelegentlich seiner Reisen nach Kansas brachte Dr. Salmon auch in Erfahrung, dass noch in einigen anderen Staaten Erkrankungen derselben Art unter dem Rindvieh vorhanden waren, so z. B. in Missouri und Illinois. Seine Untersuchungen in diesen Staaten führten zu denselben Ergebnissen.

Den allgemeinen Symptomencomplex zeichnet Salmon folgendermassen: In Illinois waren die ersten Erscheinungen Diarrhoe, Lahmheit an einzelnen oder mehreren Gliedmassen und Steifheit, Kälte und Gefühllosigkeit an den unteren, im Absterben begriffenen Theilen der letzteren. In Kansas fehlten die Störungen im Digestionsapparat; die Erscheinungen an den Füßen waren überall gleichartige und die Entwicklung der Veränderungen an den Füßen genau dieselbe. Die Schnürung in der Haut an der Grenze des absterbenden Theiles war besonders in den schwereren Fällen so augenfällig, dass einige Besitzer das vermeintliche Band durchschnitten in der Meinung, die dadurch behinderte Circulation wieder herzustellen. Die Abschnürung war aber nicht die Ursache, sondern die Folge des Absterbens; die Operateure hatten also Ursache und Wirkung verwechselt.

An dem oberen Rande des Bandes stellte sich dann ein Riss in der Haut

ein, welcher nach Massgabe der Widerstandsfähigkeit der bezüglichlichen Theile (Sehnen etc.) sich allmählich gegen den Knochen zu fortsetzte und die todten von den lebenden Theilen trennte. Die Demarcation geschah gewöhnlich in der Nähe eines Gelenkes. An dem Ende des Beinstumpfes sah man eine verhältnissmässig ebene Oberfläche, welche gut heilte. Einige Thiere verloren blos eine Zehe; die Trennung geschah dann entweder zwischen Klauen- und Kronenbein oder zwischen dem letzteren und dem Fesselbein. Andere büssteten alle Zehenglieder ein, während in den schwersten Fällen der Fuss bis zum oberen Drittel des Metatarsus brandig wurde und abfiel. Die von einigen Thierärzten an der Krone beobachteten Blasen waren Erscheinungen, welche der Gangrän angehören. Uebrigens war ihr Vorkommen eine Seltenheit, denn Salmon hat bei den vielen Thieren, welche er untersuchte, nie welche gefunden. Er sah auch nie Abscesse oder Eiter- und Geschwürsbildung an den Füßen. Die Gangrän war nicht allein auf die unteren Enden der Gliedmassen beschränkt, sondern bei den meisten kranken Thieren stellten sich auch geringe Verluste an der Schwanzspitze ein; bei einer ganzen Anzahl hatten diese Verluste sogar eine Länge von 2—6 Zoll. Die Demarcationslinie war hier gleichfalls scharf. Dass Theile eines Ohres der Gangrän verfielen, ist selten gesehen worden.

Die interessantesten, bisher noch nie beschriebenen Erscheinungen waren die Veränderungen auf der Maulschleimhaut. Bei einigen Thieren bestanden sie in diffus rother Verfärbung; öfter sah man dunkelrothe umschriebene Flecke von 8 Mm. bis 2,5 Cm. im Durchmesser, noch öfter waren Substanzverluste — Erosionen — vorhanden von 1—1,3 Cm. im Durchmesser. Blasen hat Salmon auch hier nicht gesehen, ebenso werden erhebliche Entzündungen noch Geschwürsflächen. Die Defecte waren dunkelroth, flachrandig und ihre Umgebung nicht merklich geröthet, sie betrafen nur die oberste Schicht der Schleimhaut. Einer besonderen Läsion der Maulschleimhaut, welche bei nur wenigen Kranken beobachtet wurde, ist noch Erwähnung zu thun. In diesen Fällen war eine unregelmässig geformte Schleimhautpartie von 2,5—5 Cm. Durchmesser abgehoben, hart, gefühllos, runzelig an der Oberfläche und gelb oder blassroth gefärbt. Die Farbe der mortificirten Schleimhaut war durch die Maulflüssigkeit ausgezogen worden. Die Schleimhaut des Anus und der Vagina war im Allgemeinen roth, mit Schleim bedeckt und wies Epitheldefecte auf. In Missouri ist bisweilen Abortus vorgekommen. Das Allgemeinbefinden war nicht wesentlich beeinträchtigt; nur in wenigen Fällen kamen erhöhte Temperaturen vor, die höchste von Dr. Trumbower beobachtete betrug 40,5° C. Erosionen im Maule wurden auch häufig bei Thieren wahrgenommen, welche nach vorübergehender Lahmheit und Steifigkeit in den unteren Gliedern der Füße genasen.

Den Beweis der Richtigkeit seiner Diagnose begründet Salmon in erster Reihe auf der meist plötzlich eintretenden, umschriebenen trockenen Gangrän. Ein Absterben dieser Art wird bei localen Entzündungsprocessen nicht beobachtet.

Seine Untersuchungen des Heues, mit welchem die verseuchten Bestände gefüttert wurden, ergaben ungewöhnliche Mengen von Mutterkorn in bestimmten Grasarten.

In Kansas war es besonders der wilde Roggen (*Elymus virginicus*, *varietas submuticus*), in Missouri und Illinois *Agrostis vulgaris* und *Phleum*, welche er

besonders damit behaftet fand. In manchen Aehren von Elymus war jedes Korn durch den Pilz ersetzt; dem Gewichte nach bestanden 10—12 pCt. der Aehren aus Mutterkorn. Nach Salmon's Schätzung kamen auf eine Ration von 20 Pfund Heu ca. 120 Grm. Mutterkorn. In Missouri und Illinois ermittelte er durch Wahrscheinlichkeitsfactoren das Gewichtsverhältniss des Mutterkorns zu den übrigen Bestandtheilen des Heues = 1:75.

Da die Untersuchung auf andere Agentien, welche geeignet sind, trockene Gangrän zu machen, einen negativen Befund ergab, so folgert Salmon auf Grund seiner positiven Befunde, dass das mit Mutterkorn behaftete Heu, welches in den meisten Fällen das Hauptnahrungsmittel der betreffenden Viehbestände war, die beschriebenen Krankheitserscheinungen verursacht habe.

Er fügt hinzu, dass das Heu von 1883 in hervorragendem Masse Mutterkorn enthielt, wohingegen er in dem Heu vom Vorjahre nur einzelne Körner aufzufinden im Stande war. Er machte auch die Beobachtung, dass diejenigen Rinder verseuchter Bestände, welche mit letzterem Heu vorwiegend gefüttert worden waren, keinerlei Krankheitserscheinungen zeigten. In Illinois war Agrostisheu allgemein auffallend billig, weil man die Erfahrung gemacht hatte, dass das Vieh dieses Heu nicht gern fresse und dabei nicht gedeihe. Die reiferen Gräser des Heues von 1883 enthielten am meisten Mutterkorn, während früh geschnittene fast frei davon waren.

Die Rindviehställe sind im Westen Amerikas meist sehr primitive Einrichtungen, so dass die Thiere vor dem Einfluss der Kälte und schlechter Witterung nur einen mangelhaften Schutz geniessen. Dazu kommt noch, dass bei Frostwetter häufig nicht hinreichend für Trinkwasser gesorgt ist; denn die in die Eisdecke von Bächen und Teichen gemachten Oeffnungen, an welchen die Rinder gewöhnlich nach Belieben ihren Durst stillen, werden nicht genugsam frei gehalten. Auch ist im Winter das Wasser so kalt, dass die Thiere aus diesem Grunde ihr Wasserbedürfniss unvollkommen befriedigen. Zuverlässige Beobachtungen haben zweifellos gezeigt, dass alle diese ungünstigen Umstände zum Zustandekommen der Gangrän beigetragen haben. Es wurde ferner auch festgestellt, dass bei warmer Witterung unter sonst gleichen Verhältnissen viel weniger Erkrankungen eintraten.

Prof. Law und Andere haben gleiche Erkrankungen beobachtet, und sie waren im Stande, den Nachweis zu führen, dass sie ursächlich auf Mutterkorn bezogen werden mussten.

Die Differentialdiagnose zwischen Ergotismus und Maul- und Klauenseuche, die Naturgeschichte, chemische Zusammensetzung und Wirkung des Mutterkorns und die Geschichte des Ergotismus sind schliesslich sehr ausführlich abgehandelt und vorzügliche Abbildungen dem Text reichlich beigegeben worden. Lüpke.

Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in den Niederlanden während des Jahres 1884. (Niederl. Vet.-Ber. f. d. J. 1884.)

1. Lungenseuche. Während des Jahres 1884 sind im Ganzen 28 Ausbrüche der Lungenseuche beobachtet worden; von denselben entfallen:

13 auf die Provinz Südholland,
 6 - - - Limburg,
 8 - - - Seeland,
 1 - - - Nordbrabant.

Es erkrankten an Lungenseuche zusammen 234 Stück Rindvieh; davon:

167 in Südholland,
 14 - Limburg,
 52 - Seeland.
 1 - Nordbrabant.

Als (der Ansteckung) verdächtig wurden 3050 Stück Rindvieh getödtet; darunter:

2932 in Südholland,
 82 - Limburg,
 29 - Seeland.
 7 - Nordbrabant.

Bei 202 von diesen 3050 Stück Rindvieh — mithin bei fast 7 pCt. — wurde die Lungenseuche durch die Section festgestellt.

An Entschädigung für auf polizeiliche Anordnung getödtete kranke und verdächtige Thiere wurden gezahlt:

714599 Gulden 9 Cents,

oder nach Abzug des Erlöses für das Fleisch und die Häute der getödteten Thiere im Betrage von 367709 Gulden 10 Cents:

346889 Gulden 99 Cents.

In Südholland, ausserhalb des Spoelinguistricts, beschränkte sich das Vorkommen der Seuche auf 2 Gehöfte, von denen eines in der unmittelbaren Nachbarschaft des Spoelinguistricts liegt.

Im Spoelinguistrict, jedoch ausserhalb des abgesperrten Theiles desselben, wurden Ausbrüche der Lungenseuche unter 11 Viehbeständen beobachtet, welche sich auf 4 Ortschaften vertheilen. Im abgesperrten Theil des Spoelinguistricts sind 134 an Lungenseuche erkrankte und 2625 der Ansteckung verdächtige Stück Rindvieh auf polizeiliche Anordnung getödtet worden, welche zusammen 68 Besitzern gehörten. Unter den Thieren des Spoelinguistricts, welche in den Schlachthäusern von Schiedam, Overschie und Delfshaven geschlachtet wurden, erwiesen sich 134 mit der Lungenseuche behaftet. Im abgesperrten Theil des Spoelinguistricts wurden auf polizeiliche Anordnung 4769 Stück Rindvieh geimpft, von denen 59 Stück (1.23 pCt.) in Folge der Impfung starben. In Schiedam blieb fast kein Viehbestand von der Lungenseuche verschont; es ist demgemäss häufig erforderlich gewesen, grössere verseuchte und behufs Tilgung der Krankheit selbst solche Viehbestände abzuschlachten, welche noch frei von Lungenseuche waren, jedoch Besitzern gehörten, deren Gehöfte unmittelbar an die verseuchten grenzen. Die Seuche gewann in einzelnen Beständen eine grosse Verbreitung, wahrscheinlich weil die Thiere mit dem Fortschreiten der Mastung vielfach innerhalb der Ställe umgestellt werden; sie brach öfter als in früheren Jahren auf Weiden, namentlich solchen aus, welche verseuchten Hütungen oder den Schlachthäusern für krankes bzw. verdächtiges Vieh benachbart lagen.

Die Ausbrüche in der Provinz Limburg sind viel zahlreicher als in den vorhergegangenen Jahren gewesen; von 1878—1883 incl. war die Provinz

sogar vollkommen seuchefrei geblieben. Der erste Ausbruch Anfangs Juli 1884 in der Gemeinde Roosteren wird auf Einschleppung der Lungenseuche aus dem preussischen Grenzorte Havert¹⁾, Kr. Heinsberg. Reg.-Bez. Aachen, zurückgeführt. Die Seuche verbreitete sich auf im Ganzen 13 Bestände in 5 Gemeinden und wurde durch Abschachtung bis zum December 1884 getilgt. Der im December beobachtete letzte Ausbruch in Scharn kann auch durch Einschleppung aus dem benachbarten belgischen Seucheorte Lanaken veranlasst worden sein; ausserdem liegt der belgische Ort Hasselt, in welchem die Lungenseuche seit 40 Jahren stationär ist, nicht weit von den Seucheorten der Provinz Limburg entfernt.

In der Provinz Seeland gab die grosse Weide Prosperpolder, welche zum Theil einer belgischen, zum Theil einer niederländischen Gemeinde gehört, zu den grössten Besorgnissen Veranlassung, weil das Durcheinanderlaufen des Viehs beider Gemeinden schwer zu verhüten war. Die Besorgniss stieg, als in Erfahrung gebracht wurde, dass in der Umgegend von Antwerpen viele Fälle von Lungenseuche vorgekommen seien. Am 5. August gelangte der erste Fall von Lungenseuche auf diesem Terrain zur Kenntniss der Behörden, und bis zum 21. November 1884 sind 2 Stück Rindvieh gefallen und 45 erkrankte Stück auf polizeiliche Anordnung getödtet worden. Wegen der grossen Stückzahl der betreffenden Herden (367 Stück) konnte man die Seuche nicht durch Tödtung aller der Ansteckung verdächtigen Thiere tilgen, es ist jedoch sorgfältig auf Abspernung dieser Rindviehstücke geachtet worden. Auf demselben Terrain kam nach dem 21. November ein weiterer Fall von Lungenseuche im Stalle eines Arbeiters vor; in der Nähe des betreffenden Hauses war ein an Lungenseuche leidendes Stück Rindvieh getödtet worden. Die Krankheit wurde durch Abschachten dieses Viehbestandes und zweier zwar noch nicht verseuchter, jedoch der Ansteckung verdächtiger Bestände getilgt. Abgesehen vom Prosperpolder ist die Lungenseuche in der Provinz Seeland nur unter einem Bestande zu Sasput aufgetreten; sie wurde durch Abschachten des ganzen Bestandes getilgt. Ein im Jahre vorher in Südholland auf dem Markte in Rotterdam gekaufter Stier hat aller Wahrscheinlichkeit nach die Einschleppung vermittelt.

In der Provinz Nordbrabant blieb die Lungenseuche auf einen Viehbestand der Gemeinde Steenberger beschränkt, sie wurde durch Abschachten des ganzen Bestandes getilgt. Letzterer gehörte einem Eigenthümer, welcher Handel, namentlich mit Schlachtvieh betreibt. Das zuerst erkrankte Rind ist vermuthlich in einem Stalle zu Rotterdam (Prov. Südholland) angesteckt worden.

Von Dr. Nolen in Rotterdam und von dem Thierarzt Poels, unter dessen Leitung die Impfung der Lungenseuche im Spolingdistrict steht, sind Untersuchungen über die Krankheitserreger der Lungenseuche angestellt worden, über deren Resultate die Genannten im Wesentlichen Folgendes berichtet haben.

In den Lungen lungenseuchekrankter Rinder findet sich in ungemein grosser Anzahl ein sowohl durch das Mikroskop, als auch durch Culturen nachweisbarer und zu den Mikrococcen gehörender Spaltpilz, welcher morphologisch und mikro-

¹⁾ In Havert ist die Lungenseuche Ende 1883 constatirt, dieselbe verbreitete sich daselbst nach und nach auf 14 Bestände, die Einschleppung soll durch eine kurz vorher im benachbarten Holland angekaufte Kuh erfolgt sein.

chemisch keine charakteristischen, dagegen biologisch Merkmale zeigt, welche bei keinem anderen Mikroorganismus — abgesehen von dem der croupösen Pneumonie des Menschen — zu beobachten sind.

Der Mikrocooccus ist während einer bestimmten Entwicklungsperiode von einer Hülle umgeben, welche in Gentianaviolett und in Methylenblau farblos bleibt, wird jedoch selbst durch die genannten Farbstoffe sehr intensiv gefärbt. Auch andere Farbstoffe werden von dem Mikrocooccus und seiner Hülle aufgenommen. In dem nicht geronnenen Exsudat der Lungen finden sich die Mikrocoocccen meist ohne Hülle und in den kranken Lungen überhaupt zahlreicher vor, als die Anthraxbacillen in dem Milzblute milzbrandkranker Thiere; dieselben müssen ebenso, wie die letzteren beim Milzbrande, als das Contagium der Lungenseuche angesprochen werden. Sie sind auch in der Brusthöhle vorhanden. Bilden sich in den Exsudaten der letzteren Gerinnsel, so trifft man die Mikroorganismen hauptsächlich in diesen, während sie in dem nunmehr klar gewordenen Theil des Exsudats vergeblich gesucht werden.

Bei Culturen entwickeln sich die Mikrocoocccen in einer Temperatur von 37°C. schnell auf Blutserum, welches nicht flüssig bleibt, sondern durch die Mikrocoocccen zum Gerinnen gebracht wird; langsamer erfolgt die Entwicklung in der Zimmertemperatur auf Fleischinfusum-Pepton-Gelatine, viel schneller jedoch auf letzterer, wenn die Temperatur in dem Thermostat von Arsonval auf 37°C. erhöht wird. Die Gelatine, welche in dem Thermostat flüssig ist, wird nach dem Erkalten wieder fest. Als eine constante Eigenthümlichkeit der Culturen dieses Mikroorganismus ist zu bezeichnen, dass in denselben eine charakteristische Gelbfärbung auftritt. Die weitere genauere Untersuchung dieses Farbstoffes wird in Aussicht gestellt.

Werden Reinculturen der Mikrocoocccen in den Schwanz — nach dem gebräuchlichen Verfahren — eingepflegt, so treten regelmässig örtliche Reaction und Entzündung ein. es entsteht eine auf die Impfstelle beschränkt bleibende Geschwulst, in deren Gewebe die Mikrocoocccen nachweisbar und zu isoliren sind. Mithin müssen sich die Mikroorganismen in der Geschwulst weiter entwickeln und vermehren. Bösartige Anschwellungen, wie sie sich bei der gewöhnlichen Impfung öfter einstellen, werden bei Impfungen mit Reinculturen niemals beobachtet.

Ausser dem erwähnten Mikroorganismus finden sich in den Lungen lungenseuchekrankter Rinder constant — wenn auch in geringerer Anzahl — zwei andere Spaltpilze, welche nicht als Krankheitserreger der Lungenseuche angesehen werden können. jedoch zweifellos einen Einfluss auf das Entstehen bösartiger Anschwellungen nach der Impfung besitzen. Der Impfstoff enthält namentlich fast immer Sporen eines Mikroorganismus, welcher in dem Bericht nicht näher beschrieben werden kann, jedoch morphologisch einem bekannten Spaltpilz (Bacillus) gleicht, Blutserum bezw. Gelatine flüssig macht und sich in bösartigen Impfgeschwulsten nachweisen und isoliren lässt, während dieses bezüglich des zuerst erwähnten Mikrocooccus nicht gelingt. Der Bacillus zeigt bei kleinen Thieren keine pathogenen Eigenschaften, sondern erzeugt bei denselben nur Septicämie. Die Eigenthümlichkeiten des oben erwähnten zweiten in den Lungen enthaltenen Mikroorganismus sind noch nicht hinreichend studirt und können demgemäss nicht näher angegeben werden.

Aus diesen Untersuchungen folgern die Berichterstatter:

dass die Ansicht, nach welcher die mitunter bösartigen Folgen der Impfung dem Contagium der Lungenseuche zugeschrieben werden, wahrscheinlich eine irrthümliche ist;

um so mehr, da dieses Contagium nicht in den Exsudaten, welche sich bei anderen Lungenentzündungen bilden, vorhanden ist, solche Exsudate jedoch, wenn sie eingeimpft werden, Anschwellungen und selbst den Tod zu veranlassen im Stande sind.

Bei Durchführung der vorjährigen allgemeinen Lungenseucheimpfung im Spoelingsdistrict bot sich vielfach Gelegenheit dar, die Folgen der Impfung näher zu studiren. Es wurde dabei die Ueberzeugung gewonnen, dass die Verschiedenheiten der örtlichen Reaction und des eintretenden Allgemeinleidens nicht durch dieselben Ursachen — nicht durch denselben Mikroorganismus — hervorgerufen sein können.

Die bekannte, schon von Dr. Willems hervorgehobene Thatsache, dass der Impfstoff nach ein- bis zweitägigem Stehen virulenter wird, darf nicht dem Contagium der Lungenseuche zugeschrieben werden. Der Mikroccoccus des letzteren lässt sich aus altem Impfstoff nur mit Mühe cultiviren, während die beiden zuletzt genannten Spaltpilze sich bis zum Eintritt der Fäulniss vermehren. In dem Exsudat aus der Brusthöhle fanden die Berichterstatter stets nur die Mikroccocci, und mit diesem Exsudat ausgeführte Impfungen hatten nie bösartige Folgen. Die örtliche Reaction an der Impfstelle, welche erforderlich ist, um einen Schutz gegen die Lungenseuche zu verleihen, wird durch die Mikroccocci bewirkt, welche sich in dem reinen Impfstoff überdies nur sparsam vorfinden. Bei der Impfung sollte daher nicht das reine Serum, sondern das Exsudat vor der Gerinnung oder das Gerinnsel selbst benutzt werden. Die unter diesen Gesichtspunkten ausgeführten Impfungen lieferten günstige Resultate.

Die Berichterstatter bemerken, dass die von ihnen gefundenen Mikroccocci mit denen von Bruijlands und Verriest in Loewen nachgewiesenen schon aus dem Grunde nicht übereinstimmen, weil dieselben eine viel höhere Temperatur ertragen. Eingehendere Veröffentlichungen über die Mikroorganismen werden in Aussicht gestellt.

Ueber den Stand der Lungenseuche in dem Spoelingsdistrict der Provinz Südholland liegt ausserdem ein ausführlicher, auf Untersuchungen an Ort und Stelle beruhender Bericht vor, dem wir folgende Bemerkungen entnehmen.

Das gleichmässige Fortbestehen der Lungenseuche in dem District trotz der allgemeinen Impfung und trotz der Tödtung aller erkrankten und häufig auch aller der Ansteckung verdächtigen Thiere ist namentlich auf die Thatsache, dass nicht jedes geimpfte Thier dem Ansteckungsstoff der Lungenseuche widersteht, und auf die lange Zeit zurückzuführen, welche in vielen Fällen bis zur sicheren Constatirung der Seuchenausbrüche verstreicht. Der Umfang und die Verhältnisse der Viehhaltung in dem Spoelingsdistrict gestatten nicht immer die Anordnung, dass alle der Ansteckung verdächtigen Thiere getödtet werden. Der im Ganzen wenig umfangreiche Bezirk ist sehr reich an Vieh, welches einem beständigen Wechsel durch Kauf und Verkauf unterliegt. Die schlechte

bauliche Beschaffenheit der meisten Viehställe, welche vielfach dicht neben einander liegen oder in directer Verbindung stehen, gestattet oft nicht die energische Durchführung der Massregeln, welche zur Verhütung einer weiteren Verbreitung der Seuche getroffen werden müssen. Auch die Nachbarschaft der Schlachthäuser für krankes bezw. verdächtiges Vieh hat mitunter Anlass zu Verschleppungen der Lungenseuche gegeben. Zu diesen Uebelständen kommen noch mangelhafte Beachtung oder Uebertretungen der Vorschriften des Seuchengesetzes hinzu. Die Durchführung der Impfung hat in den Jahren 1880—1883, hauptsächlich wegen Mangel an guter Lymphe, zum Theil viel zu wünschen übrig gelassen. Entgegen den Bestimmungen ist eine grosse Zahl Vieh ungeimpft geblieben oder viel zu spät geimpft worden.

Die Berichterstatter schlagen aus diesen Gründen vor: die Lungenseuche in dem Spoeledistrict zu tilgen durch die ineinander greifenden Massregeln der Impfung aller im Bezirk vorhandenen bezw. in denselben eingeführten und des Abschlachten aller erkrankten und der Ansteckung verdächtigen Stück Rindvieh. Mit diesen Massregeln wäre noch eine sorgfältige Desinfection zu verbinden.

2. Maul- und Klauenseuche. Nur sehr wenige Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche sind während des Jahres 1884 in den Provinzen Overijssel, Südholland, Seeland, Friesland und Limburg beobachtet worden. Die übrigen Provinzen blieben seuchefrei. Die Krankheit herrschte während derselben Zeit in den benachbarten Ländern stark verbreitet unter den Wiederkäuern und noch mehr unter den Schweinen. Das unter dem 9. April erlassene Verbot der Ein- und Durchfuhr von Schweinen hatte die Bestimmung, eine Einschleppung der Seuche nach den Niederlanden zu verhindern.

3. Rotz-Wurmkrankheit. Nach dem Bericht wurde die Rotz-Wurmkrankheit bei zusammen 62 Pferden (von denen 2 der Armee gehörten) und bei 1 Maulthier constatirt. Die Fälle vertheilen sich auf alle Provinzen, mit Ausnahme von Drenthe, Groningen und Limburg. Nirgends erlangte die Krankheit eine weite Verbreitung unter den verseuchten Beständen.

4. Räude der Pferde und Schafe. In Südholland waren 9 Pferde eines Bestandes räudekrank; ausserdem ist dieser Hautausschlag nur noch bei einem Pferde beobachtet worden.

Bei Schafen wurde die Räude constatirt unter folgenden Beständen: Südholland 2, Nordholland 29, Utrecht 2, Friesland 22, Groningen 5, zusammen 60 Herden.

5. Milzbrand. Der Bericht enthält folgende Angaben über das Vorkommen von Milzbranderkrankungen:

Provinz	Gemeinden	Stück Rindvieh	Pferde	Schweine
Nordbrabant in	20	42	1	1
Gelderland und Overijssel -	8	14	—	2
Südholland -	11	12	—	—
Nordholland -	3	3	—	—
Utrecht -	2	3	—	—
Friesland -	6	28	—	—
Groningen -	1	1	—	—
Limburg -	17	45	—	—

In keinem Orte erlangte der Milzbrand eine grössere Verbreitung, das Auftreten der Krankheit blieb durchweg ein sporadisches. Vier Menschen erkrankten in Folge von Milzbrandinfection; von denselben ist ein Fleischer, welcher eine milzbrandkranke Kuh geschlachtet hatte, gestorben. Unter den nach Pasteur's Verfahren zum Schutz gegen den Milzbrand geimpften Stück Rindvieh kam keine Erkrankung vor.

6. Tollwuth. Das Auftreten der Tollwuth beschränkte sich auf 3 Hunde in der Provinz Gelderland und auf 8 Hunde und 1 Katze in der Provinz Limburg. In der Provinz Drenthe wurde ein todt aufgefundenener Hund für tollwuthverdächtig erklärt. Zwei herrenlos umherschweifende tolle Hunde in Gelderland sollen aus Deutschland übergelaufen sein. Bei den anderen Thieren sind Fälle von Tollwuth nicht vorgekommen; ebenso wenig ist etwas über Erkrankung eines Menschen an Wasserscheu bekannt geworden.

Schafpocken sind 1884 in den Niederlanden nicht constatirt worden.
Müller.

Ueber die im Jahre 1884 in Preussen auf Trichinen und Finnen untersuchten Schweine. Nach amtlichen Quellen mitgetheilt von Dr. Hermann Eulenberg. Vierteljahresschr. für gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätswesen, N. F., 43. Bd., 2. H., S. 305 ff.

In dem Geschäftsjahr 1884 kam auf 1741 geschlachtete Schweine ein trichinöses. Dieser Befund entspricht jedoch noch immer nicht den thatsächlichen Verhältnissen; denn in vielen Kreisen fehlt die obligatorische Fleischschau noch gänzlich, in anderen ist sie höchstens nur in einzelnen Städten eingeführt. So fehlt sie gänzlich in den Reg.-Bez. Schleswig, Sigmaringen, Aachen und Köslin. In den Reg.-Bez. Danzig, Stettin u. a. besteht sie nur in einigen Kreisen und Städten. Im Allgemeinen ist das Vorkommen der Trichinosis der Schweine in den östlichen Regierungsbezirken der preussischen Monarchie öfter zu constatiren als in den westlichen.

Die meisten trichinösen Schweine fanden sich im Reg.-Bez. Posen. Hier kamen auf 154004 untersuchte Schweine 744 Fälle von Trichinosis, es wäre dies also ein Verhältniss wie 1:193; am meisten waren hierbei bethelligt die Kreise Schroda mit einem Verhältniss wie 1:68 und Schrimm mit 1:86. Ein ebenfalls sehr ungünstiges Verhältniss fand sich im Reg.-Bez. Bromberg, wo auf 43345 untersuchte 161 trichinöse Schweine kamen, also wie 1:269. Hier waren namentlich die Kreise Gnesen und Inowraclaw betroffen (1:101 bezw. 1:145). Auch in den Regierungsbezirken der Provinz Preussen ist die Anzahl der trichinös befundenen Schweine noch eine verhältnissmässig hohe. Die Verhältnisse stellen sich hier, wie folgt: Königsberg 1:507, Gumbinnen 1:600 und Marienwerder 1:631. In letzterem Regierungsbezirk wurde dieses ungünstige Verhältniss hauptsächlich durch den Kreis Thorn herbeigeführt, in welchem unter 360 Schweinen ein trichinöses angetroffen wurde. Die Kreise Flatow, Schlochau und Konitz sind dagegen trichinenfrei gewesen. Günstiger stellt sich das Verhältniss in der Provinz Pommern. Im Reg.-Bez. Stral-

sund ist sogar unter den untersuchten Schweinen kein einziges trichinöses zu verzeichnen gewesen; letzterer bildet daher gegenüber den anderen östlichen und nördlichen Regierungsbezirken eine Ausnahme. Auch in Schlesien sind noch verhältnissmässig viel Schweine trichinös befunden worden. In dem westlichen Theil der preussischen Monarchie waren einzelne Regierungs- und Landdrostei-bezirke völlig trichinonfrei, nämlich die Reg.- bezw. Landdr.-Bez. Münster, Stade, Osnabrück und Aurich. Im Reg.-Bez. Düssel-dorf kommt auf 57882 untersuchte Schweine nur ein trichinöses, im Reg.-Bez. Wiesbaden 1 auf 20672. Dieses günstige Verhältniss in den letzteren beiden Regierungsbezirken ist jedoch nicht für den ganzen Bezirk massgebend, da sich die obligatorische Fleischbeschau in ihnen nur auf die grossen Städte beschränkt, in den kleineren Städten und auf dem Lande wird dagegen gar keine Fleischbeschau ausgeübt. Auch in der Provinz Westfalen sind nur wenige Schweine trichinös befunden worden; hier stellen sich die Verhältnisse für den Reg.-Bez. Minden wie 1:30146 und Arn-sberg wie 1:12362. Münster blieb, wie schon erwähnt, trichinenfrei. In der Provinz Sachsen war die Zahl der Trichinosisfälle in den beiden Reg.-Bez. Merseburg und Magdeburg wieder eine etwas grössere; in ersterem kamen auf 5404 und in letzterem auf 4136 untersuchte Schweine je ein trichinöses. Auf dem Central-vieh-hof in Berlin wurden 258538 Schweine untersucht und darunter 196 trichinös befunden (1:1311).

Die Untersuchung der amerikanischen Speckseiten ergab verhältnissmässig sehr viele trichinöse. Im Reg.-Bez. Stettin wurden 1724 Stück untersucht, hierunter waren 41 trichinös. Im Reg.-Bez. Minden wurden 130 amerikanische Speckseiten und Fleischpräparate trichinös befunden. Weitere Angaben hierüber fehlen jedoch, und daher kann die Gesamtzahl der untersuchten und der trichinös befundenen Speckseiten nicht näher bezeichnet werden.

Erkrankungen an Trichinosis bei Menschen. Eine grössere Trichinosis-epidemie kam im Monat Mai im Reg.-Bez. Merseburg vor. In dem Dorfe Strenz-naundorf mit 600 Einwohnern erkrankten 82 Personen, davon starben 12; in den benachbarten Orten Belleben und Alsleben erkrankten ebenfalls 4 Personen. Zu diesen 86 Erkrankungen hatte ein Schwein, welches am 2. Mai in Streuz-naundorf geschlachtet worden war, Anlass gegeben. Dieses Schwein war vorher von dem Fleischbeschauer untersucht und für trichinenfrei erklärt worden, bei der späteren Untersuchung hatten sich jedoch in sämtlichen Fleischwaaren, die von diesem Schwein stammten, zahlreiche Trichinen vorgefunden; der betreffende Fleischbeschauer wurde daher einer harten Strafe unterzogen. Im Uebrigen sind in der Monarchie nur vereinzelte Fälle von Trichinosis bei Menschen bekannt geworden; so in Berge, Reg.-Bez. Frankfurt a. O., in Berlin, in den Kreisen Grauden-z und Marienwerder. In letzteren beiden Kreisen erkrankten 7 bezw. 10 Personen, davon starben 3 bezw. 1 Person.

Obgleich von verschiedenen Seiten die Ansicht ausgesprochen worden ist, dass die obligatorische Fleischbeschau überflüssig sei, wenn nur der Genuss des rohen Schweinefleisches vermieden werde, so ist dieselbe doch aus dem Grunde schon als Nothwendigkeit anzuerkennen, weil sie das Hauptmittel ist, die Trichinosis unter den Schweinen nachzuweisen, das schädliche Fleisch zu vernichten und dadurch anderweitigen Nachtheilen desselben vorzubeugen.

Ueber das Vorkommen der Finnen ist ebenfalls eine grosse Anzahl Zahlen angegeben, aus denen hervorgeht, dass sich dieselben überall vorfanden. Nur der Reg.-Bez. Stralsund machte hierin wieder eine Ausnahme. Die meisten finnigen Schweine wurden im Reg.-Bez. Königsberg gefunden, hier stellte sich das Verhältniss wie 1:117. Das günstigste Verhältniss bot der Reg.-Bez. Münster mit 1:2141. Auf dem Berliner Centralviehhof waren es namentlich die russischen Schweine, die am häufigsten finnenhaltig befunden wurden; hier kamen auf 177 untersuchte Schweine ein finniges. Auf den Berliner Wochenmärkten und Bahnhöfen wurden 509 Kgrm. finniges Schweinefleisch beschlagnahmt. Den Grund, weshalb in den südlichen Provinzen weniger finnige Schweine vorkommen als in den nördlichen, sucht Eulenberg darin, dass in den ersteren nur geschlossene Dörfer vorhanden sind, während in den letzteren die einzelnen Gehöfte zerstreut liegen, und die Schweine dadurch Gelegenheit finden, auf den Höfen überall umherzuwühlen.

Die unschädliche Beseitigung der finnig befundenen Schweine entbehrt eines einheitlichen Verfahrens, da in einzelnen Orten immer noch die Fleischbeschauer und die Polizeidiener über das grössere und geringere Mass der im Fleisch vorhandenen Finnen und somit auch über die Geniessbarkeit des Fleisches zu entscheiden haben. In anderen Orten wieder ist dies Sache der approbirten Thierärzte.

Bezüglich der Fleischbeschauer selbst sind mehrfach Entlassungen und sonstige Bestrafungen wegen ungenügender Kenntnisse bezw. wegen begangener Vorschriftswidrigkeiten vorgekommen.

Fleischschauämter unter thierärztlicher Leitung wurden in Wollin und Gartz errichtet.

Im Uebrigen sind nach dem übereinstimmenden Urtheil der Physiker die Trichinenbeschauer auf Grund der Prüfungen befähigt, Trichinen aufzufinden. Ein Uebersehen von Trichinen kann nur in einer leichtfertigen Handlungsweise begründet sein.

Der Gebührensatz für die Untersuchung beträgt in den grösseren Städten meist 1 Mark, auf dem Lande jedoch 50—75 Pfg.

Eine neue Verordnung der Regierung bestimmt, dass die Hälfte der zu untersuchenden Präparate den Zwerchfellspeilern entnommen werde, da diese Muskeln die meisten Trichinen, und zwar auch noch dann enthalten, wenn in anderen Muskeln gar keine aufzufinden sind.

Bezüglich des Stempels hat der Farbenstempel die weiteste Verbreitung gefunden, da 2000 Abdrücke damit ausgeführt werden können. Preusse.

Méthode pour prévenir la rage après morsure. Par M. L. Pasteur. Académie des sciences, séance du 26 Octobre 1885. Rev. vétér., Déc. 1885.

Bekanntlich ist Pasteur in der Erforschung der Wuthkrankheit seit Jahren thätig. Ist es ihm bisher auch nicht gelungen, die Ursache derselben nachzuweisen, so haben doch die Ergebnisse seiner Forschungen hochwichtige Aufschlüsse über das Wesen der Krankheit sowohl, wie über das Verhalten und den

Sitz des derselben zu Grunde liegenden Ansteckungsstoffes geliefert (s. 4. Jahresbericht von Ellenberger u. Schütz).

Neben der Ergründung streng wissenschaftlicher Fragen hatte sich P. von vornherein die Aufgabe gestellt, möglichst bald ein Verfahren zu ermitteln, durch welches man im Stande sein würde, diese fürchterliche Krankheit mit Erfolg zu bekämpfen. Nach unserer gegenwärtigen Kenntniss vom Contagium vivum und der uns gegen dasselbe zu Gebote stehenden Mittel heisst dies: den Körper gegen das Krankheitsgift unempfänglich zu machen bezw. nach erfolgter Uebertragung des Wuthgiftes, sei es durch künstliche Inoculation, sei es durch den Biss toller Hunde etc., den Ausbruch der Krankheit zu verhindern.

Durch Verimpfung abgeschwächten Virus war es P. schon vor einigen Jahren gelungen, die beabsichtigte Immunität zu erzeugen. Allein, das von ihm befolgte Verfahren war nach seinem eigenen Ausspruch unpraktisch, nicht sicher genug und involvirte Unfälle. Von 20 Versuchsthieren (Hunden) war er nur im Stande, etwa 15—16 immun zu machen, und die Ausführung des Verfahrens nahm 3—4 Monate in Anspruch.

Am 26. October 1885 hat nun P. der Akademie der Wissenschaften zu Paris eine Methode demonstrirt, von welcher er wörtlich Folgendes sagt: „Nach unzähligen Experimenten bin ich zu einer praktischen und prompten prophylaktischen Methode gekommen, deren Erfolge bei Hunden schon so zahlreich und sicher sind, dass ich volles Vertrauen in ihre allgemeine Anwendbarkeit auf alle Thiere und selbst auf den Menschen setze.“

Diese neue Pasteur'sche Methode beruht im Wesentlichen auf den nachstehenden Thatsachen:

Impft man mittelst der Trepanation der Schädelhöhle einem Kaninchen Hirnmasse (Medulla oblongata) von einem tollen Hunde unter die Dura mater, so wird der Impfling im Mittel nach 15 Tagen wuthkrank. Impft man das Virus von Kaninchen auf Kaninchen in derselben Weise fort, so verringert sich die Incubationszeit stetig, die Virulenz des Wuthgiftes steigert sich. Nach 20—25 Uebertragungen beobachtet man bereits Incubationszeiten von 8 Tagen, welche sich durch fernere 20—25 Uebertragungen constant erhalten. Dann tritt eine 7tägige Dauer ein, bevor die Krankheit nach der Impfung zum Ausbruch kommt. Auf dieser Höhe hält sich die Incubationszeit mit einer frappanten Sicherheit in einer Reihe von 90 Uebertragungen. Bei dieser Zahl ist P. gegenwärtig angelangt; aber es ist kaum anzunehmen, dass die Incubationsdauer sich bei fortgesetzten Versuchen noch um ein Geringes herabsetzen lässt.

Die Hirnmassen dieser wuthkranken Kaninchen mit der 7tägigen Incubationsdauer sind durch und durch wuthinfect.

Wenn man von solcher Hirnsubstanz kleine, längliche Stücke unter den höchsten Cautelen der Reinlichkeit abschneidet und sie in trockener Luft aufhängt, so schwindet die Virulenz darin allmählich und erlischt plötzlich ganz. Die Dauer dieses Vorganges ist in etwas abhängig von der Dicke der Gehirnstücke, viel mehr aber von der äusseren Temperatur: je niedriger die Temperatur ist, desto dauerhafter erhält sich die Virulenz des Contagiums.

Hiernach ist man in der Lage, sowohl ein ungemein starkes als ein äusserst schwaches Wuthgift zu erzeugen und alle Nüancirungen in der Virulenz herzu-

stellen, welche zwischen beiden Extremen liegen. Die Abschwächung des Wuthcontagiums wird in der Weise bewirkt, dass man eine Anzahl Kölbchen nimmt — deren Luft trocken erhalten wird, indem man Pottaschestückchen hineinbringt — und jeden Tag in je einem derselben ein Stückchen von dem Gehirn eines Kaninchens aufhängt, welches nach 7 tägiger Incubation an der Wuthkrankheit gestorben ist.

Nunmehr lässt sich ein Hund in verhältnissmässig kurzer Zeit auf folgende Weise gegen die Wuthkrankheit unempfindlich machen: An jedem Tage injicirt man dem Versuchsthier subcutan eine Pravaz'sche Spritze voll sterilisirter Bouillon, in welcher man ein kleines Stück der ausgetrockneten Hirnmasse zerrieben hat. Um sicher zu sein, dass die erste Impfung unschädlich ist, beginnt man dabei mit einem Stückchen, welches an einem vom Operationstage möglichst weit entfernten Tage (14 Tage) in sein Kölbchen hineingekommen ist. An den folgenden Tagen führt man dieselbe Operation, regelmässig fortschreitend, mit frischeren Hirnmassen aus, indem man in der Regel diejenige Probe wählt, welche 2 Tage jünger ist als die vorige, bis man endlich zu sehr virulenter Masse gelangt, welche sich erst 1 oder 2 Tage in Präparation befindet.

Auf diese Weise hat P. ohne jeglichen Misserfolg über 50 Hunde immun gemacht und zahlreiche andere nach erfolgtem Biss durch wuthkranke vor dem Ausbruch der Krankheit bewahrt. Nach derselben Methode hat er auch bereits im Juli 1885 einen 9jähr. Knaben aus der Umgegend von Schlettstadt (Elsass) behandelt, welcher vor $2\frac{1}{2}$ Tagen von einem tollen Hunde übel zugerichtet und ihm mit dem Ansuchen um Schutz gegen den Ausbruch der Wuthkrankheit zugeführt worden war. Der Knabe war nach dem Urtheil ärztlicher Autoritäten (Vulpian) in der höchsten Gefahr, der Tollwuth zum Opfer zu fallen. Trotzdem jenem Knaben bei dem Vorbauungsverfahren schliesslich viel stärkeres Wuthgift eingepflicht wurde, als durch den Biss toller Hunde übertragen werden kann, so ist er doch weder während der Behandlung noch späterhin an der Wuth erkrankt.

Hiernach hat es den Anschein, dass P. durch das von ihm bei der Präventivimpfung von Hunden befolgte Verfahren stets Immunität gegen die Tollwuth erzeugen kann, und dass ferner von tollen Hunden etc. gebissene Thiere und Menschen durch Anwendung der P.'schen Behandlung vor dem Ausbruch der Krankheit bewahrt werden können. Ueber die Dauer der erlangten Unempfindlichkeit sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Ob und inwieweit beim Menschen die Nothimpfung nach erfolgtem Biss von Nutzen ist, hängt von einer Reihe von Nebenumständen ab und kann daher erst dann einer bestimmten Beurtheilung unterzogen werden, wenn hinlängliches Erfahrungsmaterial vorliegen wird.

Lüpke.

Grundriss der Geschichte der Thierheilkunde. Für Thierärzte und Studierende bearbeitet von Dr. Friedrich Eichbaum, Professor der Veterinär-Medicin an der Universität Giessen. Berlin 1885, Verlag von Paul Parey.

Mit dem vorstehenden Werke hat der Verf. in der That eine lange empfundene Lücke in der thierärztlichen Literatur ausgefüllt. Es fehlte nicht allein den Studirenden an einem Leitfaden für das Studium der Geschichte der Thierheil-

kunde, sondern auch allen Thierärzten an einem diese Disciplin behandelnden Werke. Jeder, der sich über die Geschichte unserer Wissenschaft und einzelner Theile derselben eingehend orientiren wollte, hatte bisher mühsame und zeitraubende Quellenstudien zu machen. Der Verf. hat uns mit dem vorstehenden, sehr vollständigen Werke dieser Mühe enthoben, und schulden wir ihm daher unseren Dank.

Verf. theilt die Geschichte der Thierheilkunde in vier Perioden ein.

Die erste Periode umfasst das Alterthum bis zum Jahre 466 n. Chr. In diesem Abschnitt ist die gesammte alte, auf uns überkommene Literatur eingehend besprochen worden. Zwei kurze Capitel über die in der alten griechischen und römischen Literatur mitgetheilten Thierseuchen und über den thierärztlichen Stand im Alterthum schliessen diesen Theil.

In der zweiten Periode wird der Stand der Thierheilkunde und das Vorkommen von Viehseuchen im Mittelalter — von 476—1500 — besprochen und eine kurze geschichtliche Darstellung der Entwicklung des Hufbeschlages gegeben.

Der dritte Abschnitt reicht vom Beginn der Neuzeit bis zur Gründung von thierärztlichen Lehranstalten — 1500—1762. Er enthält zunächst eine kurze Abhandlung über die Fortschritte der Medicin und deren Einfluss auf die wieder erwachende Thierheilkunde und bespricht dann die in dem genannten Zeitabschnitt in Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und England erschienenen thierärztlichen Schriften, sowie die vorgekommenen Seuchen.

Die vierte Periode, welche mit der Errichtung der thierärztlichen Lehranstalten beginnt und bis auf die Jetztzeit reicht, nimmt den grössten Theil des Werkes ein. Nach allgemeinen historischen Angaben über die Errichtung und die Verhältnisse der Thierarzneischulen, behandelt der Verf. die Geschichte aller in- und ausländischen thierärztlichen Lehranstalten besonders und schliesst hieran ein sehr eingehendes Capitel über die Entwicklung der Veterinärmedicin unter dem Einfluss der Thierarzneischulen. Bei der Besprechung der Fortschritte in den einzelnen Disciplinen ist die Literatur sehr vollständig und gewissenhaft angegeben worden. Hiernach folgen kurze historische Mittheilungen über das Auftreten der einzelnen Thierseuchen. In einem letzten Capitel dieser Periode sind endlich die Entwicklung des Veterinärwesens in den einzelnen Staaten, sowie die Standesverhältnisse der beamteten und der Militärthierärzte, und endlich das thierärztliche Vereinswesen besprochen worden. Zu einer eingehenderen Mittheilung des Inhalts eignet sich die Materie nicht.

Es ist rühmend hervorzuheben, dass der Verf. sich an keiner Stelle auf weilläufige Ausführungen und kritische Beleuchtungen der Ansichten Anderer, wozu die Geschichte der Thierheilkunde eine so ausgiebige Veranlassung bietet, eingelassen hat. Alle einzelnen Abschnitte des Werkes zeichnen sich durch kurze Darstellung, aber auch durch grosse Vollständigkeit aus. Diese Vollständigkeit ist um so mehr anzuerkennen, als der Verf. nur wenige literarische Vorarbeiten benutzen konnte und daher auf das mühevollste Studium der ganzen thierärztlichen und eines Theiles der medicinischen Literatur angewiesen war. Eggeling.

Personal-Notizen.

Ernennungen und Versetzungen.

Der Kreisthierarzt O. P. P. Heyne zu Obornik, Reg.-Bez. Posen, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte zum Kreisthierarzt für den Stadt- und Landkreis Bromberg, sowie für den die Polizeidistricte Labischin, Znin und den östlichen Polizeidistrict Schubin umfassenden Theil des Kreises Schubin, und zum commissarischen Departements-Thierarzt für den Reg.-Bez. Bromberg mit dem Amtswohnsitz in Bromberg.

Der Amtsthierarzt T. Kleinpaul in Benkendorf zum commissarische Kreisthierarzt des Kreises Johannisburg, Reg.-Bez. Gumbinnen.

Der Polizei-Thierarzt Dr. C. A. F. Lemke in Berlin zum commissarischen Kreisthierarzt des Kreises Halberstadt, Reg.-Bez. Magdeburg, unter Anweisung seines Amtswohnsitzes in Halberstadt.

Der Rossarzt E. Rosenfeld in Beeskow zum commissarischen Kreisthierarzt des Kreises Stuhm, Reg.-Bez. Marienwerder, mit dem Amtswohnsitz in Christburg.

Der Departements-Thierarzt C. A. W. Schmidt in Bromberg, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Rossarzt bei der Reichs Posthaltereie in Berlin.

Der Kreisthierarzt D. Vollers zu Altona, Reg.-Bez. Schleswig, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Staats-Thierarzt in Hamburg.

Der Kreisthierarzt Klein in Schleiden, Reg.-Bez. Aachen, hat seinen Amtswohnsitz von Manell nach Call verlegt.

Definitiv übertragen wurde die bisher commissarisch verwaltete Kreisthierarztstelle:

der Kreise	den Kreisthierärzten
Steinfurt	Dopheide in Burgsteinfurt.
Lehe und Geestemünde	Nicol in Geestemünde.

Ordens-Verleihungen.

Dem Ober-Rossarzt beim Oldenburg. Drag.-Rgmt. No. 19, Deigendesch in Oldenburg, das Ritterkreuz 2. Cl. des Grossherzogl. Hess. Verdienst-Ordens Philipps des Grossmüthigen.

Vacanzen.

(Die mit * bezeichneten Vacanzen sind seit dem Erscheinen von Bd. XI, Heft 5 u. 6 dieses Archivs hinzugetreten oder von Neuem ausgeschrieben).

Regierungs-Bezirk	Kreisthierarztstellen des Kreises	G e h a l t.	Zuschuss aus Kreis- resp. Com- munalmitteln.
Königsberg	Heilsberg	600 Mark	300 Mark
"	Fischhausen	600 "	300 "
Frankfurt	Züllichau-Schwiebus ¹⁾	600 "	— "
Köslin	Bublitz	600 "	— "
Posen	Obornik *	600 "	— "
Breslau	Steinau	600 "	— "
Liegnitz	Hoyerswerda	600 "	600 "
Oppeln	Grottkau	600 "	— "
Schleswig	Altona *	600 "	— "
Osnabrück	Bersenbrück	600 "	— "
Arnsberg	Arnsberg	600 "	— "
Kassel	Hünfeld	600 "	— "
Trier	Prüm	900 "	600 "

Veränderungen im militär-rossärztlichen Personal.**Beförderungen.**

Zum Ober-Rossarzt ist ernannt:

Der Rossarzt Cleve vom Thüring. Ul.-Rgmt. No. 6 beim Magdeburg. Drag.-Rgmt. No. 6.

Zu Rossärzten sind ernannt:

Die Unter-Rossärzte: Enders vom Braunschweig. Hus.-Rgmt. No. 17; Höpfner vom 2. Brandenburg. Ul.-Rgmt. No. 11; Rödiger vom Schlesw.-Holst. Feld.-Art.-Rgmt. No. 9; Schmitz vom Magdeburg. Kür.-Rgmt. No. 7.

Anstellungen.

Die Unter-Rossärzte: Bergemann beim 1. Garde-Ul.-Rgmt.; Ehlert beim Pomm. Hus.-Rgmt. (Blücher-Hus.) No. 5; Engelke beim Neumärk. Drag.-Rgmt. No. 3; Ewers beim Schles. Feld.-Art.-Rgmt. No. 6; Gallenkamp beim Königs-Hus. Rgmt. (1. Rhein.) No. 7.

Die einj.-frei. Unter-Rossärzte: Fredrich beim Niederschles. Train-Bat. No. 5; Heinrich beim Brandenburg. Train-Bat. No. 3.

¹⁾ Mit dem Amtswohnsitz in Schwiebus.

Versetzungen.

Der Ober-Rossarzt Hahn vom Magdeburg. Drag.-Rgmt. No. 6 zum Schleswig-Holst. Ul.-Rgmt. No. 15.

Die Rossärzte: Erdtmann vom 1. Rhein. Feld-Art.-Rgmt. No. 8 zum 1. Brandenburg. Feld-Art.-Rgmt. No. 3 (General-Feldzeugmstr.); Hay vom 1. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Garde-Drag.-Rgmt.) No. 23 zum 2. Schles. Hus.-Rgmt. No. 6; Müllerskowski vom Kurmärk. Drag.-Rgmt. No. 14 zur Grossherzogl. Hess. Train-Comp.

Abgegangen.

Die Rossärzte: Kohlmann vom 1. Hess. Hus.-Rgmt. No. 13; Schenk von der Grossherzogl. Hess. Train-Comp.

Der charakterisirte Rossarzt Lange vom 1. Garde-Ul.-Rgmt.

Der einj.-freiw. Unter-Rossarzt Engel vom 1. Hannov. Feld-Art.-Rgmt. No. 10.

Verzeichniss der Thierärzte,

welche in Gemässheit der Bekanntmachung vom 25. Sept. 1869 (Bundesgesetzbl. S. 635) und der Bekanntmachung vom 5. März 1875 (Centralbl. f. d. Deutsche Reich S. 167) während des Prüfungsjahres 1884 85 von den zuständigen Centralbehörden approbirt wurden.

I. Preussen.

A. T. Baranski, Fraustadt; E. Bass, Berlin; H. K. Becker, Dobergast, Kr. Weissenfels; O. A. L. Bergin, Treptow a. R. in Pommern; K. J. Beschorner, Glatz; K. Bettenhäuser, Dörnhagen; F. R. A. Bierbach, Tennstedt, Kr. Langensalza; F. Bittner, Königshütte; P. J. Buchwald, Frankfurt a. O.; F. K. Christ, Sangerhausen; B. A. Dillhof, Bockel; F. W. J. Engel, Hannover; K. A. Evers, Schöninsel in Mecklenburg; P. Falk, Berlin; A. Franzenburg, St. Margarethen; E. R. Fredrich, Rudki Mühle, Kr. Mogilno; F. Füchsel, Schkölen, Kr. Weissenfels; E. H. H. Gott, Lühnde; A. Gramlich, Münchhausen, Kr. Oppeln; T. Grewe, Horrem, Kr. Bergheim; M. O. R. Hamann, Schweidnitz; E. J. G. Hayn, Rohnstock; O. R. W. Heinrich, Lauban; F. M. Henschel, Berlin; J. K. Herrmann, Lixheim; O. Hertel, Charlottenburg; H. Jantzen, Wolgast in Pommern; H. Kissuth, Graudenz; K. Knopf, Ranis; A. H. Krüger, Lötzen in Ostpreussen; G. A. J. Kubel, Berlin; P. G. W. Lehnhardt, Wittenberg; L. A. R. Lorenz, Ornontowitz; E. G. Matthaey, Jastrow, Kr. Deutsch-Krone; F. M. May, Lentsch; J. Mierswa, Neustadt in Ob.-Schlesien; G. A. A. Moricinski, Leipzig; B. Nave, Ebersdorf, Kr. Habelschwerdt; G. Peschke, Reichenbach in Schlesien; K. R. A. Petsch, Fraustadt in Posen; E. G. Pitz, Nieder-Ingelheim; P. M. Rahneberg, Weseram, Kr. West-Havelland; H. Reimers, Brockdorf; K. Reinhardt, Hoppenstedt; F. E. Reinke, Ebersfelde; C. E. Rekate, Hannover; W. J. Richter, Lugau, Kr. Luckau; M. K. J. Rummel, Posen; H. C. H. Sand, Bodenwöhr in Bayern;

E. K. Scharsich, Lauchstedt, Kr. Merseburg; K. L. Scholtz, Tost, Kr. Gleiwitz; O. Schuberth, Grottkau in Ob.-Schlesien; L. R. E. Schulz, Strussow, Kr. Bütow; K. A. Schwarz, Neukirch; K. G. A. A. Stolle, Hannover; F. H. Vilmar, Beberbeck; K. J. Wahrendorff, Anklam; J. Wessendorf, Veltrup bei Burgsteinfurt; J. H. Wilkens, Pier, Kr. Düren; A. P. v. Wilkonski, Berlin; P. E. W. Witte, Potsdam.

II. Bayern.

F. Denzlinger, Buchheim in Baden; H. Dörnhöffer, Bayreuth; J. Fischer, München; P. Froeber, Kreuzwertheim; G. Gehri, Biengen in Baden; G. Hermann, Windsbach; K. Herold, Plattling; A. Kamm, Weissenburg a. S.; B. Kögl, Reichenhall; J. Krug, Neubauhof; V. Kugler, Landshut; M. Rieck, Weida; J. Rössert, Romansthal; R. Tracht, Detmold; B. Vogel, Rothenburg a. T.; F. Voltz, Kaiserslautern; H. Wöhner, Koburg; M. Wörner, Bamberg.

III. Sachsen.

O. P. Beier, Arnfeld; F. A. Encke, Zeulenroda; P. H. Moses, Wildentaube; M. E. Müller, Nieder-Arnsdorf; H. R. Rossmann, Stulbach; A. J. W. Strohn, Bochum; O. B. Thurm, Kriebitzsch; F. F. R. Traut, Heubach; J. J. F. Uder, Grossenhain.

IV. Württemberg.

W. Beeh, Heubach, Oberamt Gmünd; M. Dambacher, Ulm; H. Hofstadt, Imsbach in Bayern; P. Medert, Scharhof in Baden; L. Nagel, Stuttgart; F. Oppel, Heldburg in S.-Meiningen; K. Osswald, Wertheim in Baden; E. Schachinger, Hochfelden im Elsass.

V. Hessen.

E. Neunhöffer, Künzelsau in Württemberg.

IV.

Eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Oxyhämoglobins im Blute der Haussäugethiere.

Vom

Königl. Sächs. Bezirksthierarzt **Georg Müller** in Flocha.

Der wichtigste chemische Bestandtheil des Blutes der Vertebraten ist das Hämoglobin, dessen empirische Formel von Preyer (Die Blutkrystalle. Jena 1871, S. 65) zu $C_{600}H_{960}N_{154}FeS_3O_{179}$, von Hüfner (Journal für praktische Chemie. N. F. XXII, S. 362) zu $C_{636}H_{1025}N_{164}FeS_3O_{189}$ berechnet worden ist, und zwar wichtig deshalb, weil dieses eisenhaltige Proteid dazu bestimmt ist, Sauerstoff aus der eingeathmeten Luft locker chemisch zu binden und den wichtigen Oxydationsvorgängen im Thierkörper dienstbar zu machen. Während seines schnellen Laufes durch das respiratorische Capillarnetz bindet das Blut Sauerstoff und giebt diesen während seines Circulirens durch die Capillaren zum grössten Theil wieder ab; der Stoff, welcher dergestalt die Vermittlerrolle zwischen der Luft und den animalen Geweben zu übernehmen hat, ist eben das Hämoglobin, welches bekanntlich in den rothen Blutkörperchen enthalten ist und eine ganz eigenthümliche, niemals weiter beobachtete Doppelseigenschaft besitzt, nämlich: eine energische chemische Affinität, gepaart mit relativer Unbeständigkeit. Ein Gramm reducirtes Hämoglobin absorbirte nach Preyer (l. c. S. 133) unabhängig vom Druck in wässriger Lösung im Mittel aus drei Versuchen 1,3 Ccm. Sauerstoff, nach Hoppe-Seyler (Phys. Chemie. Berlin 1881, S. 382) 1,68 Ccm. und nach Hüfner (l. c. S. 363) 1,202 Ccm. bei 0° und 1 Mtr. Druck.

Da nun die Absorptionsfähigkeit des Blutes für Sauerstoff abhängig ist vom Gehalt an Hämoglobin, und da weiter von der Menge

des den Körpergeweben zugeführten Sauerstoffes die Lebenskraft des Individuums überhaupt abhängt, so muss es für den Arzt — den Physiologen wie den Kliniker — höchst wichtig sein, den Hämoglobin-gehalt des Blutes sicher und nach Befinden auch möglichst schnell feststellen zu können.

In der That haben sich denn auch sehr bald nach der wirklichen¹⁾ Entdeckung des Hämoglobins durch Otto Funcke (Zeitschrift f. rat. Medicin. N. F. 1851, I, S. 185) zahlreiche Forscher bemüht, den Hämoglobingehalt der verschiedenen Blutarten festzustellen, und es ist im Laufe der Jahre eine grosse Reihe von Methoden zur Hämoglobinbestimmung empfohlen worden.

Es sei mir zunächst gestattet, aus den Untersuchungen, welche betreffs der Hämoglobinmenge im Blute angestellt worden sind, folgende besonders charakteristische Zahlen hervorzuheben:

Nach Preyer (Annal. Chem. et Pharm., CXL, p. 187) enthalten 100 Grm. Blut an Hämoglobin, nach der spectrokopischen Methode untersucht:

Hund	Hammel	Ochs	Schwein	Huhn	Ente
13,8	11,2	11,4—13	12—14,1	8,5—12,7	8,1;

dagegen mittelst der Eisenbestimmung berechnet:

Hund	Hammel	Ochs	Schwein	Huhn	Ente
13,3	11,2	13,6	14,3	9—9,8	9,3.

Nach Ssubbotin und Forster (Zeitschr. f. Biologie, Bd. VII, S. 435) ist das Blut ausgewachsener Thiere reicher an Hämoglobin, als das junger. Sie fanden im Ochsenblute 10 und 12 pCt., im Kalbsblute 8,9 pCt., beim ausgewachsenen Hunde 13,8 pCt., beim vierwöchentlichen Hunde 3,4 pCt. Hämoglobin. Von ebendenselben Forschern wurde festgestellt, dass das Blut der Herbivoren weniger Hämoglobin enthält, als dasjenige der Carnivoren; im Kaninchenblute wurden 8,41 pCt., im Hundeblyute 13,8 pCt. Hämoglobin gefunden. Bei den mit Fleisch oder eiweissreicher Nahrung gefütterten Hunden betrug der Hämoglobingehalt 13,75 pCt., bei Fütterung mit stickstofffreien Stoffen 11,65 und 9,5 pCt.; das Blut eines nur mit Brod gefütterten Hundes hatte einen Hämoglobingehalt von 9,37 pCt., das eines anderen von 10,32 pCt.

¹⁾ Die Entdecker der Blutkrystalle sind Hünefeld (Der Chemismus in der thier. Organisation. Leipzig 1840, S. 7 u. 8) und Reichert (Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., 1849, S. 197—251).

Von Becquerel und Rodier (Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes. Deutsch von Eisenmann. Erlangen 1845) wurden Blutuntersuchungen vorgenommen, aus denen Preyer (Die Blutkrystalle. Jena 1871) die Hämoglobinmenge, wie folgt, berechnete:

gesunde Frau	schwangere Frau	gesunder Mann	Greis
11,57—13,69	8,81—11,67	12,09—15,97	13,45;

ferner:

Plethora	Olichämie	Chlorose	Pneumonie
12,95—13,02	8,71	7,59	11,74—12,19.

Diese wenigen Zahlen dürften genügen, die hohe Wichtigkeit darzutun, welche die Kenntniss des Hämoglobingehaltes im Blute in physiologischer und pathologischer Beziehung hat, und es sei mir nunmehr gestattet, mit Uebergang der chemischen Eigenschaften des Hämoglobins direct zur möglichst gedrängten Besprechung der verschiedenen Untersuchungsmethoden des Blutes auf seinen Hämoglobingehalt überzugehen, jedoch die Bemerkung vorauszuschicken, dass alle bisherigen und zukünftigen Angaben in dieser Abhandlung sich, wenn nicht ausdrücklich anderes angegeben ist, auf das Oxyhämoglobin oder Sauerstoffhämoglobin beziehen.

I. Theil.

Methoden der Oxyhämoglobinbestimmung im Blute.

Dieselben lassen sich in folgende Klassen theilen:

A. Chemische Methoden.

1. Bestimmung des Oxyhämoglobins durch den Eisengehalt.
2. Bestimmung des Oxyhämoglobins durch die Menge des gebildeten Hämatins.
3. Bestimmung des Oxyhämoglobins nach der Menge des von der Hämoglobinlösung aufgenommenen Sauerstoffes, und zwar:
 - a) nach Claude Bernard durch Verdrängung des Sauerstoffes mittelst Kohlenoxyd;
 - b) nach Gréhant durch Auspumpung des Sauerstoffes;
 - c) nach Schützenberger durch Bestimmung des Sauerstoffes mittelst hydroschwefliger Säure.

4. Bestimmung des Oxyhämoglobins durch die entfärbende Eigenschaft des Chlors.
- B. Spectroskopische Methoden.
5. u. 6. Die spectroskopischen Methoden von Preyer und Lesser.
- C. Spectrophotometrische Methoden.
7. u. 8. Die spectrophotometrischen Methoden von Vierordt und Hüfner.
- D. Colorimetrische Methoden.
9. u. 10. Die Methoden von Hoppe-Seyler und von Worm-Müller.
11. Das Colorimeter von Dubosq (Verfahren von Jolyet und Laffont).
12. Das Chromocytometer von Bizzozero.
13. u. 14. Die Verfahren von Welcker und Hayem.
15. u. 16. Die Hämochromometer von Quincke und Malassez.
17. Das Globulimeter von Mantegazza.

A. Chemische Methoden.

1. Bestimmung des Oxyhämoglobins aus dem Eisengehalt des Blutes.

Diese Methode fusst auf der Annahme, dass das Hämoglobin genau 0,42 pCt. Eisen enthält, das im Blute enthaltene Eisen aber ausschliesslich dem Hämoglobin angehört, und besteht, wie ich später ausführlich darlegen werde, darin, dass eine bestimmte Menge Blutes eingäschert, das in der Asche enthaltene Eisen in Lösung übergeführt und schliesslich auf massanalytischem Wege mittelst Permanganat bestimmt wird.

Die Einwände, welche man gegen die Methode ins Feld führt, sind folgende:

- 1) Es ist nicht vollkommen erwiesen, dass sämtliche Hämoglobine denselben Eisengehalt haben.

Hoppe-Seyler (Handbuch der phys. u. path.-chem. Analyse. Berlin 1883) giebt eine Zusammenstellung, aus welcher hervorgeht, dass das Hämoglobin des Menschen und des Rindes 0,42 pCt., des Hundes 0,43 pCt. (nach Hoppe-Seyler; Preyer fand nur 0,42 pCt.), des Pferdes 0,47 pCt. (Kossel), des Meerschweinchens 0,48 pCt., des Eichhörnchens 0,59 pCt., der Gans 0,43 pCt., des

Schweins 0,43 pCt. Eisen enthält. Die Zahl 0,42 würde somit nur für die Hämoglobine des Menschen und des Rindes, vielleicht auch noch des Hundes passen, während für die anderen Thierarten der Divisor ein anderer sein müsste. Indessen liegen betreffs dieser so wenige Analysen vor, dass es kaum räthlich sein dürfte, von dem allgemeinen Usus, die Zahl 0,42 als feststehend für sämtliche Thierarten anzunehmen, abzuweichen. (Vergl. auch Preyer, Die Blutkry-stalle. Jena 1871, S. 117, u. a. a. O.)

- 2) Es ist nicht vollkommen erwiesen, dass das ganze im Blute vorkommende Eisen allein nur im Hämoglobin enthalten ist.

Man sucht diesen Einwand gegen die Methode dadurch zu begründen, dass der Harn constant Spuren von Eisen enthält und dass somit auch im Blutserum Eisen enthalten sein muss. Boussingault (Sur la repartition du fer dans les matériaux du sang. Compt. rend., T. LXXV, 1872) hat gefunden, dass in 100 Grm. Blutserumasche 0,086 Grm. Eisen enthalten ist, während Weber (Phys. Chemie von Gorup-Besanez, S. 361) in der gleichen Aschenmenge 0,26 Grm. Eisen fand. Es ist indessen sehr leicht möglich, dass das im Serum gefundene Eisen aus Verunreinigungen mit Hämoglobin herrührt (vergl. auch Lambling, Des procédés de dosage de l'hémoglobine. Nancy 1882, p. 21). Jedenfalls — und das dürfte den angeführten Vorwurf gegen die Methode sehr mässigen — ist die im Blutserum im normalen Zustande auftretende Eisenmenge eine äusserst geringe.

- 3) Der Eisengehalt des Blutes ist so gering, dass die unbedeutenden aber unvermeidlichen Fehler, welche bei der Analyse gemacht werden, bedeutende Fehler in der Berechnung des Oxyhämoglobins hervorrufen, da, wenn man durch E die Menge des in der Asche von 100 Grm. Blut gefundenen Eisens bezeichnet, die Hämoglobinmenge x, welche diesem Eisen entspricht, ist

$$x = \frac{100}{0,42} \cdot E \text{ oder } E \times 238,095.$$

Der geringste Fehler wird sich also um das 238fache vervielfältigen müssen! Indessen ist die Sache nicht so schlimm, denn bei Veraschung grösserer Mengen Blut — 100 bis 200 Grm. — und Anwendung der Titrirmethode werden die Fehler auf ein Minimum reducirt. Der grösste Fehler in den von Pelouze (Sur l'analyse volumétrique du fer contenu dans le sang. Compt. rendus, T. 60, 1865)

vorgenommenen Eisenbestimmungen betrug 0,0014 pro 100 Grm. Blut, entsprechend einem Unterschied von 0,33 pCt. Hämoglobin, während die Bluteisenbestimmungen von Lambling (*Des procédés de dosage de l'hémoglobine. Nancy 1862*) eine Differenz von 0,0013 Eisen oder 0,31 Hämoglobin zeigten.

Ungeachtet dieser drei Einwände, welche zum Theil ja mit Recht gegen die Methode der Hämoglobinbestimmung nach dem Eisengehalt angeführt werden, ist dieselbe durchaus überall da nicht zu entbehren, wo es sich um eine Controle der anderen Methoden zur Hämoglobinbestimmung handelt.


Das zumeist angewendete Verfahren der Eisenbestimmung im Blute ist zuerst von Pelouze (*Compt. rend., XV, 1865, p. 880—884*) beschrieben worden und besteht in folgenden Manipulationen:

Man verdampft in einer geräumigen Platinschale eine genau abgemessene Menge Blutes, angenommen z. B. 100 Grm. Der Rückstand wird unter langsamer Steigerung der Hitze einige Stunden hindurch verascht und dann in der Wärme mit 10 Ccm. Salzsäure, welche mit einigen Theilen Wasser verdünnt ist, versetzt. Die resultirende klare Flüssigkeit wird mit destillirtem Wasser bis auf 500 Ccm. verdünnt, mit 10 Ccm. einer 10proc. Lösung von schwefligsaurem Natron versetzt und danach kurze Zeit tüchtig gekocht. Nach dem Erkalten der Flüssigkeit wird das in derselben als Oxydul enthaltene Eisen durch Titriren mittelst Chamäleonlösung bestimmt.

Dieses Verfahren erleidet Abänderungen entweder dadurch, dass der salzsaure Auszug in einer Platinschale mit überschüssiger reiner Schwefelsäure versetzt, über kleiner Flamme ohne Sieden verdampft, der erhaltene Rückstand in Wasser gelöst, ungefähr 20 Ccm. einer Lösung von schwefliger Säure zugesetzt und so lange in schwachem Sieden erhalten wird, bis weder Lakmuspapier noch Geruch Spuren von schwefliger Säure nachweisen lassen (*Hoppe-Seyler, Handbuch der phys. und path. chem. Analyse. Berlin 1883, S. 336*), oder dadurch, dass man zur Vermeidung des lästigen Aufblähens des Trockenrückstandes bei der Veraschung denselben 12—24 Stunden einem Heissluftbade von 120° aussetzt und ferner behufs sicherer Auflösung sämtlichen in der Asche enthaltenen Eisens die Asche mit 20 bis 30 Ccm. Salzsäure kurze Zeit energisch erhitzt (*Lambling, Des procédés de dosage de l'hémoglobine. Nancy 1882, p. 19*), oder schliesslich dadurch, dass man die salzsaure Lösung des Eisens mit Schwefel-

säure abraucht und die Oxydsolution mittelst chemisch reinen Zinks völlig reducirt.

In allen Fällen ist schliesslich das Eisen als Oxydulsalz in der Lösung vorhanden, und es erübrigt nun die Bestimmung desselben mittelst des oxydimetrischen Verfahrens. Dasselbe beruht darauf, dass Eisenoxydulsalze durch Uebermangansäure in Eisenoxydsalze umgewandelt werden, während die Uebermangansäure in der sauren Lösung in Manganoxydulsalz übergeht, denn



Man stellt sich die Massflüssigkeit so dar, dass man 1 Grm. Kaliumpermanganat in 1 Ltr. Wasser löst, eine empirische Lösung, von welcher 0,1 Grm. reinsten weichen Eisendrahtes (sog. Blumendrahtes) nach seiner Auflösung in verdünnter Schwefelsäure 52,2 Ccm. bis zum Eintritt der rothen Farbe gebrauchen muss. Betreffs der eigentlichen Technik des Verfahrens verweise ich auf Dr. Geissler (Grundriss der pharmaceutischen Massanalyse. Berlin 1884, S. 61—71) und beschränke mich hier nur darauf, zu bemerken, dass man behufs Prüfung der Permanganatlösung auf ihre Richtigkeit eine Lösung von Eisensulfat durch Auflösen von genau 0,1 Grm. reinsten Eisendrahtes in 5 Ccm. verdünnter Schwefelsäure und 20 Ccm. Wasser anfertigt, dieselbe mit einer entsprechenden Menge Wassers verdünnt und dann aus einer grösseren, in $2,_{10}$ Ccm. getheilten Glashahnbürette die Chamäleonlösung allmählich zufließen lässt. Erst verschwindet die rothe Farbe des Permanganats beim Eintritt in die Flüssigkeit sofort, später erst beim Umschwenken, endlich bleibt sie bestehen. Die Titration ist beendet, sobald die rothe Farbe sich eine Minute lang hält. Ist das Verhältniss festgestellt, so kann durch tropfenweises Zufügen der Permanganatlösung zu der Bluteisenlösung bis zum Bestehen der rothen Farbe und einfachem Regel-de-tri-Ansatz der Eisengehalt leicht berechnet werden.

In Nachfolgendem erlaube ich mir, den Gang einer Eisenanalyse zu beschreiben, welche ich mit Pferdeblut vorgenommen habe:

225,4 Grm. Pferdeblut (ich arbeitete absichtlich mit so grossen Mengen, um Irrthümer möglichst zu vermeiden) wurden aufs Sorgfältigste eingedampft und bei 100—105° C. bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Es resultirte 54,4 Grm. = 24,1 pCt. Blutpulver. Danach wurde ein genau abgewogenes Quantum (ca. 100 Grm. Blut entsprechend) langsam verkohlt, verascht und das Eisen mittelst reiner Salzsäure in Lösung gebracht. Ein Theil der Lösung wurde für die

gewichtsanalytische Trennung und Bestimmung durch Abdampfen auf dem Wasserbade vom grösseren Säureüberschuss befreit, dann mit Weinsäure, Chlorammonium und Ammoniak versetzt und hierauf das Eisen mittelst Schwefelammonium als Schwefeleisen gefällt und so von Phosphorsäure etc. getrennt. Das durch Filtration erhaltene, gut ausgewaschene Schwefeleisen wurde in Salpetersalzsäure gelöst, das Eisenchlorid mit Ammoniak als Hydrat gefällt und hierauf als Eisenoxyd zur Wägung gebracht.

Die zweite Hälfte der salzsauren Lösung wurde für die massanalytische Bestimmung mit Schwefelsäure abgeraucht und die so entstandene Oxydsolution mittelst chemisch reinen (absolut eisenfreien!) Zinks völlig reducirt. Die weitere Bestimmung wurde mittelst frisch eingestellter Permanganatlösung nach bekannter Manier ausgeführt.

Es resultirten Eisenoxyd (Fe_2O_3) Procente:

durch Wägung	durch Titiren
0,081 Grm.	0,083 Grm.

Die Differenzen sind sehr gering, so dass der Mittelwerth von 0,082 pCt. Eisenoxyd = 0,0574 Eisen allen Anforderungen genügen dürfte. Berechnet man, von der Annahme ausgehend, dass das Hämoglobin des Pferdeblutes 0,42 pCt. Eisen enthält, den Gehalt an Hämoglobin, so würde sich die Zahl 13,66 ergeben. Dagegen würde man die Zahl 12,21 erhalten, wenn man nach Kossel den Eisengehalt des Pferdehämoglobins zu 0,47 pCt. annehmen wollte.

2. Bestimmung des Oxyhämoglobins durch die Menge des gebildeten Hämatins.

Dieses von Brozeit empfohlene Verfahren beruht auf der Umwandlung des Hämoglobins in Hämatin, wobei man von der Annahme ausgeht, dass 1 Grm. Hämatin 21,31 Grm. Hämoglobin entspricht, wenn, was wohl kaum zweifelhaft ist, sämtliches Hämoglobineisen bei der Spaltung sich im Hämatin wiederfindet. Die Zusammensetzung des trockenen Hämatins ist nämlich nach Hoppe-Seyler $\text{C}_{68}\text{H}_{90}\text{N}_8\text{Fe}_2\text{O}_{10}$, so dass sein Moleculargewicht ein Multiplum von 635 ist. Das Verfahren erfordert indessen eine grosse Menge Blut und ziemlich lange Zeit, so dass es sich nicht einzubürgern vermochte.

3. Bestimmung des Oxyhämoglobins nach der Menge des vom Blute aufgenommenen Sauerstoffes.

Die hierher gehörigen Methoden sind in Deutschland kaum in Anwendung gekommen. Sie bestehen in der Bestimmung des Hämoglobins im Blute durch Messung der Sauerstoffabsorption durch dasselbe und gründen sich auf die Annahme, dass der Hämoglobingehalt des Blutes in constantem Verhältniss steht zu der Maximalmenge des vom Blute absorbirten Sauerstoffs oder — mit den Worten Gréhant's — zu der respiratorischen Capacität des Blutes.

Allein abgesehen von der Thatsache, dass auch im Blutserum kleine Mengen Sauerstoff physikalisch gebunden vorkommen, ist die Hauptfrage: wieviel Sauerstoff wird von 1 Grm. Hämoglobin gebunden? zwar theoretisch, aber nicht experimentell mit genügender Sicherheit beantwortet worden. Während theoretisch die Menge des von 1 Grm. trockenen Hämoglobins locker gebundenen Sauerstoffs 1,6738 Ccm. betragen müsste, fand Hoppe-Seyler (Med. chem. Untersuchungen, Heft II, 1868, S. 191) die Zahl 1,68 Ccm., Dubkowsky (Med. chem. Untersuchungen, Heft I, 1866, S. 117) 1,56, Preyer (De hemoglobine observationes et experimenta. Bonn 1866, p. 19) 1,80—1,72—1,62, Hüfner (Zeitschrift f. phys. Chemie, Bd. I, 1877, S. 117) 1,52—1,59—1,74.

Die Messung des Sauerstoffes im Blute bewirkt Claude Bernard (cf. Lambling, Des procédés de dosage de l'hémoglobine. Nancy 1882, p. 31) durch Verdrängung des Sauerstoffes mittelst Kohlenoxydgas, Gréhant (Dosage de l'hémoglobine par l'oxygène absorbé. Compt. rend., LXXV, 1872) durch Auspumpung des Sauerstoffes mittelst der Quecksilberluftpumpe, Schützenberger (Bulletin de la Société chimique, XX, 1873) durch Zuhülfenahme der sauerstoffbindenden Eigenschaften der hydroschwefligen Säure. Sämmtliche Methoden erfordern mehr oder weniger complicirte Apparate.

4. Bestimmung des Oxyhämoglobins durch die entfärbende Eigenschaft des Chlors.

Wenn man eine Blutlösung mit Chlorwasser versetzt, färbt sie sich ohne Trübung zunächst schwarzbraun, dann gelbbraun, schmutzig grünlichgelb, schliesslich grünlichgrau. Um nun diese Eigenschaft des Chlorwassers zur Hämoglobinbestimmung verwenden zu können, muss man zunächst feststellen, wieviel Cubikcentimeter eines Chlorwassers

von bestimmter Stärke nöthig sind, um eine Hämoglobinlösung von bekannter Concentration zu entfärben. Quinquaud (Société de Biologie, Mai 1882), der Vater dieser Methode, benutzt zur Prüfung des Chlorwassers auf seinen Chlorgehalt eine Normallösung von 6,187 Grm. arseniger Säure und 3,312 Grm. Natriumcarbonat in 250 Grm. dest. Wassers und hat experimentell festgestellt, dass 5,5 Ccm. eines Chlorwassers, von welchem 10 Ccm. gerade genügend sind, in 4 Ccm. der Normaltitrirlösung das Natriumarsenit in Natriumarsenat zu verwandeln, 0,085 Grm. krystallinisches und bei 100° getrocknetes Hämoglobin entfärben. Die Berechnung ist nunmehr sehr einfach. Angenommen, man fände bei der Titrirung des Chlorwassers, dass 4 Ccm. der Normallösung 11,3 Ccm. Chlorwasser zur Umwandlung des Arsenit in Arsenat beanspruchen, und fände ferner, dass 1 Ccm. Blut zu seiner Entfärbung 11,1 Ccm. dieses Chlorwassers beansprucht, so würde man durch Aufstellung der beiden Gleichungen:

$$1) \quad 11,3 : 11,1 = 10 : x, \text{ also } x = 9,82,$$

$$2) \quad 5,5 : 0,085 = 9,82 : x, \text{ also } x = 0,1517,$$

leicht ausrechnen können, dass in 1 Ccm. des untersuchten Blutes 0,1517 Grm. Hämoglobin oder in 100 Ccm. 15,17 Grm. Hämoglobin vorhanden waren.

Diese Quinquaud'sche Methode hat zwar den Vortheil grösster Einfachheit, allein den Nachtheil, dass die Chlorwirkung längst vollendet ist, ehe die Schlussfärbung (in grünlichgrau) eintritt, und dass die Temperatur der Flüssigkeiten und der Umgebung, die Concentration des Chlorwassers, das mehr oder weniger schnelle Zutropfen des Chlorwassers zum Blute das Resultat oft nicht unerheblich beeinflussen (cf. auch Lambling, Des Procédés de dosage de l'hémoglobine. Nancy 1882, S. 70).


B. Spectroskopische Methoden.

Wenn man eine concentrirte Oxyhämoglobinlösung in einem sog. Hämatinometer, d. h. einem Glaskästchen, welches aus zwei planparallelen Glasplatten besteht, die durch einen metallenen Rahmen gegen die abgeschliffenen Ränder eines U förmigen, genau 1 Cm. breiten Glasplattenstückes gepresst werden, durch das Spectroskop betrachtet, so findet man im Spectrum nur rothe Strahlen; verdünnt man aber die Lösung, so findet eine schnelle Aufhellung im Gelb bis zur Fraunhofer'schen Linie D, dann im Grün zwischen E und F statt, während

zu gleicher Zeit etwa in der Mitte zwischen D und E ein heller gelbgrüner Streifen erscheint. Bei weiterem Verdünnen hellt sich allmählich das ganze Spectrum bis zum Violett auf, und es hinterbleiben nur zwischen D und b zwei sehr charakteristische Absorptionsstreifen α und β , welche man mit dem Namen „Oxyhämoglobinbänder“ oder kurzweg „Blutbänder“ belegt hat, und von denen der näher bei D liegende Streifen dunkler und schärfer begrenzt ist, als der andere.

Diese Oxyhämoglobinbänder entdeckte zuerst Hoppe-Seyler im Jahre 1862 an dem mit Wasser an der Luft stark verdünnten Blute warmblütiger Thiere und fand, dass sie noch erkennbar sind, wenn 1 Grm. trockenen Oxyhämoglobins ca. 10000 Ccm. Wasser in einer Schicht von 1 Cm. Dicke vom directen Sonnenlicht durchstrahlt wird. (Med. chem. Untersuchungen, 1862, II. Bd., S. 199).

Verdünnt man das Blut noch weiter, so wird zuerst der bei E gelegene Streifen ausgelöscht, und erst nach einer Verdünnung von über 0,003 pCt. (Preyer) verschwindet auch der andere. Durch beifolgende, von mir auf Grund zahlreicher Messungen entworfene Zeichnung habe ich versucht, die Breite der Oxyhämoglobinbänder in verschieden starken Lösungen ersichtlich zu machen.



Ausser den Absorptionen zwischen D und b findet sich noch eine schlecht begrenzte Absorption im Violett, welche bei Zunahme der Concentration der Oxyhämoglobinlösung allmählich bis zum Blau vordringt.

Stokes war der erste, welcher darauf aufmerksam machte, dass der Gehalt des Hämoglobins an locker gebundenem Sauerstoff einen fundamentalen Einfluss auf das Spectrum hat. Er fand nämlich, dass das Hämoglobin in zwei Zuständen der Oxydation existirt, welche durch die Farbe und das Spectrum unterscheidbar sind, dass das sauerstoffhaltige Hämoglobin durch reducirende Substanzen in das sauerstofffreie und dieses durch Schütteln mit atmosphärischer Luft wieder in Sauerstoffhämoglobin umgewandelt werden kann (Phil. Magazin, Ser. 4, No. 190, 1864, p. 391—400). Wenn man nämlich eine Oxyhämoglobinlösung mit reducirenden Agentien — Gemischen von Eisenvitriol, Weinsteinsäure und überschüssigem Ammoniak, Schwefelammonium oder ammoniakalischen Lösungen von weinsteinsaurem Zinnoxidul — behandelt, so verschwinden die beiden Absorptionsbänder des Oxyhämoglobins und statt ihrer entsteht zwischen ihren Plätzen ein breiter Schatten mit schlecht begrenzten Rändern, das von Stokes entdeckte sog. Reductionsband. Ausserdem bemerkt man, dass viel mehr Blau und weniger Grün sichtbar ist als vorher. Diese Schatten verschwinden, sobald durch Schütteln mit Luft die Hämoglobinlösung wiederum oxydirt, und die Oxyhämoglobinbänder treten von Neuem in die Erscheinung.

Auf dieses Verhalten der Oxyhämoglobinlösung vor dem Spectroskop beruhen die Methoden von Preyer und Lesser.

5. Preyer's Spectroskopische Methode.

Diese Methode beruht darauf, dass concentrirte Lösungen des Oxyhämoglobins nur für Roth durchsichtig sind, während weniger concentrirte Lösungen auch Gelb und Grün hindurchlassen. Verdünnt man daher eine abgemessene Blutmenge vor dem Spalt eines gewöhnlichen Spectralapparates so lange mit Wasser, bis im Spectrum Grün auftritt, so kann man aus der Verdünnung einen Schluss auf den Farbstoffgehalt machen. Je stärker die zur Sichtbarmachung einer bestimmten Spectralregion nöthige Verdünnung, desto höher ist der Farbstoffgehalt.

Die Verdünnung drückt man aus durch das Verhältniss der ursprünglichen Volumina zu den durch Verdünnung erzielten. Ist z. B. das ursprüngliche Volumen b , das zugesetzte Wasserquantum w , so ist die Verdünnung $\frac{w+b}{b}$. Ist R der bekannte Farbstoffgehalt einer als Norm angenommenen Blutlösung, welche gerade bei 1 Ccm.

Dicke Grün hindurchlässt, so ist der Procentgehalt (x) des geprüften Blutes

$$x = \frac{R(w + b)}{b}.$$

Den Werth von R bestimmt man ein für allemal, indem man sich aus noch feuchtem umkrystallisirten Oxyhämoglobin eine Lösung herstellt, welche bei 1 Ctm. Dicke gerade das Grün in der Gegend von b durchgehen lässt. Den Hämoglobingehalt dieser Lösung stellt man dann durch Eindunsten über Schwefelsäure, Trocknen bei 100° und Wägen fest.

Man braucht, um die Methode auszuführen, einen einfachen Spectralapparat ohne Scala und mit unveränderlichem Spalt, eine fein graduirte, genau calibrierte Bürette und ebensolche Pipette, welche in $\frac{1}{100}$ Ccm. getheilt sind oder wenigstens $\frac{1}{100}$ Ccm. mit Sicherheit zu schätzen gestatten, und eine constante Lichtquelle mit unveränderlicher Entfernung vom Spalt. Preyer und Henning (Poggendorfs Annalen 149, 349) benutzen als solche eine Petroleumlampe. Behufs der Bestimmung wird das Blut anhaltend mit atmosphärischer Luft geschüttelt und entfasert, $\frac{1}{2}$ Ccm. davon abgemessen und nach Verdünnung mit genau demselben Volumen Wasser (um das Pipettiren und die gleichförmige Mischung zu erleichtern) in ein sogen. Hämatinometer, dessen planparallele Glaswandungen genau 1 Ctm. von einander abstehen, gebracht. Hierauf lässt man aus der getheilten Bürette so lange Wasser unter Umrühren zutropfeln, bis nach dem sehr bald sichtbar werdenden Roth auch Grün in die Erscheinung tritt. Das verbrauchte Wasserquantum wird dann abgelesen und in obige Formel eingefügt. R ist nach Preyer 0,8 pCt.

Nöthig ist es, das Blut während der Operation fortwährend umzurühren, damit die Blutkörperchen sich nicht setzen und oben farbstoffarme, unten farbstoffreiche Schichten entstehen. Nach dem Defibriniren darf das Blut nicht colirt oder filtrirt werden, weil dadurch ein Theil der Blutkörperchen (nach Preyer ist ein Verlust von über 1 pCt. Hämoglobin zu fürchten) zurückgehalten werden würde.

Preyer hat nach seinem Verfahren eine grössere Anzahl Blutfarbstoffbestimmungen ausgeführt, welche in seinem Werke „Die Blutkrystalle“, Jena 1871, S. 126—129 sich verzeichnet finden.

In einer Besprechung dieser Methode äussert sich Hoppe-Seyler (Handbuch der phys.-path.-chem. Analyse. Berlin 1883, S. 439) folgendermassen: „Dieses Verfahren ist, da man eine constante Licht-

quelle auf längere Zeit in der einfachen angegebenen Weise unmöglich erhalten kann und da man auch den Spectralapparat kaum so constant erhalten kann, als es nöthig wäre, überhaupt nur in der Weise zu gebrauchen, dass man stets frische reine Oxyhämoglobinlösung zum Vergleiche bereit hält. Das Verfahren würde sich noch vereinfachen lassen durch Anwendung eines spitzen Hohlprisma mit der Blutlösung oder Oxyhämoglobinlösung gefüllt, horizontal vor dem Spalte verschiebbar, mit einer Scala an der einen Seite desselben, doch hat auch diese Veränderung noch keine wesentlichen Vortheile gebracht.“ Weiter empfiehlt Hoppe-Seyler den Zusatz einer Spur Aetzkali zum destillirten Wasser, mit dem die gemessene Blutportion verdünnt wird, weil hierdurch Trübungen vermieden werden, die einen Fehler in der Bestimmung bedingen müssen, indem sie Licht durch Zerstreuung entfernen.

6. Lesser's spectroscopische Methode.

Dieses Verfahren gründet sich darauf, dass die Breite der Blutbänder abhängig ist von dem Gehalte des Blutes an Oxyhämoglobin und dass die nach D gelegene Grenze des α -Bandes sich dieser Linie um so mehr nähert, als der Gehalt des Blutes an Farbstoff zunimmt, hat sich aber nicht einzubürgern verbürgern vermocht. Lesser (Archiv f. Anat. u. Physiol., phys. Abth., 1878) beobachtet vor dem Spalt des Spectroskops mittelst eines Vergleichungsprismas und zweier gleich starker Lichtquellen zu gleicher Zeit die Spectren einer Oxyhämoglobinlösung von bekanntem Gehalte und des zu prüfenden Blutes. Letzteres wird durch Zutropfen von destillirtem Wasser so lange verdünnt, bis die Breite der Oxyhämoglobinbänder in beiden Flüssigkeiten eine gleiche ist.

C. Spectrophotometrische Methoden.

Eine Lösung ist um so undurchsichtiger, d. h. um so undurchdringlicher für das Licht, je mehr sie färbende Substanz enthält. Selbstverständlich gilt dies nur für diejenigen Lichtstrahlen, welche von dem betr. Farbstoff absorbirt werden. Man kann danach aus der Intensität der Färbung einer Lösung ungefähr einen Schluss auf ihren Gehalt an Farbstoff ziehen, vorausgesetzt, dass man über die Färbung einer Lösung von bestimmter Concentration bereits Erfahrungen gesammelt hat. Nun ist diese Methode insofern einer grossen Genauig-

keit fähig, als die Schwächung des Lichts durch Absorption beim Durchgange durch Lösungen einem ganz bestimmten Gesetz, dem sog. Absorptionsgesetz folgt.

Angenommen, das Licht habe die Stärke 1 und würde beim Durchgange durch eine Flüssigkeitsschicht von der Dicke 1 auf $\frac{1}{n}$ reducirt, so wird es, wenn es mit der Intensität $\frac{1}{n}$ in eine zweite gleiche Flüssigkeitsschicht eintritt, nach dem Durchgange wiederum auf $\frac{1}{n}$ reducirt werden, d. h. auf $\frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$. Geht nun das Licht von dieser Stärke durch eine dritte gleiche Flüssigkeitsschicht, so wird es wiederum auf $\frac{1}{n}$ reducirt, seine Stärke ist dann $\frac{1}{n^3}$. Somit ist beim Durchgange durch x Flüssigkeitsschichten die Intensität J des übrigbleibenden Lichtes (1) $J = \frac{1}{n^x}$.

Das Experiment lehrt, dass die Schwächung des Lichtes beim Durchgange durch eine Farbstofflösung, ausgedrückt in Bruchtheilen der ursprünglichen Lichtintensität, immer dieselbe ist, gleichviel, ob die ursprüngliche Lichtintensität stark oder schwach war. Handelt es sich darum, verschieden starke Lösungen eines und desselben Farbstoffes auf ihre lichtbrechende Kraft zu vergleichen, so genügt es, die Schichtdicke jeder derselben anzugeben, welche nöthig ist, die Intensität des auffallenden Lichtes auf einen bestimmten Bruchtheil zu reduciren. Braucht man z. B. eine 3 Ctm. dicke Schicht von einer gewissen Anilinrothlösung, um das gelbe Licht auf $\frac{1}{10}$ seiner ursprünglichen Intensität zu reduciren, und von einer zweiten solchen Lösung für denselben Erfolg nur eine Schicht von 1,5 Ctm., so ist die lichtschwächende Kraft der ersten Lösung offenbar erheblich geringer, als die der letzten. Je dünner die Schicht ist, welche man anwenden muss, um durchgehendes Licht bis auf $\frac{1}{10}$ seiner ursprünglichen Intensität zu reduciren, je grösser ist ihre lichtschwächende Kraft. Der reciproke Werth der Schichtdicke ist demnach ein Kriterium für die lichtschwächende Kraft der Substanz. Der reciproke Werth nun der Schichtdicke, welche das Licht durchstrahlen muss, um bis auf $\frac{1}{10}$ seiner ursprünglichen Intensität abgeschwächt zu werden, wird von Bunsen der Extinctionscoefficient genannt. Derselbe kann für irgend eine beliebige Farb-

stofflösung leicht berechnet werden, wenn man im Stande ist, die Lichtschwächung genau zu messen.

Die Lichtintensität J ist nach Durchstrahlung einer Farbstofflösung von der Schichtdicke x :

$$J = \frac{1}{n^x} \text{ also}$$

$$(2) \frac{1}{J} = n^x$$

$$x \log n = -\log J$$

$$(3) \log n = -\frac{\log J}{x}.$$

Nimmt man an, der Extinctionscoefficient sei a , so ist sein reciproker Werth gleich der Dicke der Flüssigkeitsschicht, welche die Lichtstärke auf $\frac{1}{10}$ reducirt; setzt man daher in die Gleichung 2 für J den Werth $\frac{1}{10}$, für x den Werth $\frac{1}{a}$, so erhält man

$$10 = n^{\frac{1}{a}}$$

$$\log 10 = \frac{\log n}{a}$$

$$\text{oder, da } \log 10 = 1 \\ a = \log n;$$

setzt man für $\log n$ den Werth a in die Gleichung 3, so wird

$$a = \frac{-\log J}{x}.$$

Wird die Dicke der Schicht gleich 1, so ist

$$a = -\log J.$$

Mit anderen Worten: man erhält den Extinctionscoefficienten, wenn man den negativen Logarithmus der Lichtstärke bestimmt, welche beim Durchgange durch die Dickeneinheit, d. h. durch einen Centimeter Flüssigkeitsdicke, übrig bleibt, indem man die ursprüngliche Lichtstärke gleich 1 setzt. Angenommen, man findet hinter einer centimeterdicken Lösung die Intensität des auffallenden Lichtes gesunken auf $\frac{3}{5}$, so ist der Extinctionscoefficient

$$a = -(\log 3 - \log 5) = \log 5 - \log 3.$$

Die Lichtschwächung ist aber nicht nur abhängig von der Dicke der Farbstofflösung, sondern auch von deren Gehalt an Farbstoff;

eine Lösung, welche dreimal soviel färbende Substanz enthält, als eine andere Lösung desselben Stoffes, wird bei $\frac{1}{3}$ der Dicke dieselbe absorbirende Kraft ausüben, wie die Lösung von einfachem Gehalt, denn in beiden Fällen begegnet der Lichtstrahl bei seinem Durchgange gleich vielen lichtschwächenden Molekülen. Der Extinctionscoefficient wird also im letzteren Falle nach der Formel $a = \frac{-\log J}{x}$ dreimal

grösser sein. Daraus geht hervor, dass der Extinctionscoefficient dem Gehalt an färbender Substanz proportional ist. Bezeichnet man den Gehalt an färbender Substanz mit c , den Extinctionscoefficienten mit a , so ist für Lösungen verschiedener Concentration $a : a' = c : c'$ oder $\frac{c}{a} = \frac{c'}{a'}$, gleich einer Constanten: A .

Dieses Verhältniss bezeichnet Vierordt mit dem Namen Absorptionsverhältniss. Man kann die Constante ermitteln, indem man eine Lösung von bekannter Concentration herstellt und von dieser den Extinctionscoefficienten optisch bestimmt. Man hat dann den Werth $\frac{c}{a} = A$.

Hat man die Zahl einmal bestimmt, so ist es leicht, aus dem beobachteten Extinctionscoefficienten einer anderen Lösung und der Gleichung $\frac{c}{a} = A$ die Concentration c der Lösung sofort zu berechnen.

Da aber die meisten Körper keineswegs alle, sondern nur gewisse farbige Strahlen des Sonnenlichts absorbiren und sich die Schwächung, welche das Gesamtlicht erfährt, nach der Schwächung jeder Einzelfarbe richtet, so gilt das Absorptionsgesetz nur für homogenes Licht. Man bedient sich deshalb zur Messung der Lichtschwächungen eines continuirlichen Spectrums, von dem man einen bestimmten schmalen Theil auswählt, dessen Absorption durch den zu prüfenden Körper eine besonders ausgezeichnete ist.

Die quantitative Spectralanalyse durch die Lichtabsorption kommt demnach auf die Aufgabe hinaus, die Lichtschwächung, welche irgend eine Substanz auf einen bestimmten Theil eines continuirlichen Spectrums ausübt, genau zu bestimmen. Die Helligkeit eines Spectrums wird bestimmt durch das Quantum von Strahlen, welches ein leuchtender Punkt vor dem Spalt durch diesen auf die Collimatorlinse sendet. Je grösser der Spalt ist, ein um so grösseres Strahlen-

quantum kann hindurchgehen, und wird dasselbe bei unveränderter Spaltlänge offenbar der Spaltbreite proportionirt sein. Was aber für einen leuchtenden Punkt gilt, gilt auch für ein System solcher, d. h. für eine leuchtende Flamme.

Dies sind die Grundprincipien, auf welche sich die Anwendung des Spectralapparates zur Photometrie der Absorptionsspectren gründet. Es kann nicht meine Aufgabe sein, eingehend die Untersuchungsmethoden von Vierordt und Hüfner zu beschreiben. Die Beschreibung der zum Theil sehr complicirten Apparate könnte nur durch Abbildungen, welche allein mehrere Seiten einnehmen würden, verständlich sein, so dass ich mich darauf beschränken muss, einige wenige Andeutungen zu geben, betreffs des Weiteren aber auf die Originalarbeiten — K. Vierordt, Die Anwendung des Spectralapparates zur Photometrie der Absorptionsspectren, Tübingen 1873. Derselbe, Die quantitative Spectralanalyse in ihrer Anwendung auf Physiologie, Physik, Chemie und Technologie, Tübingen 1876. Hüfner, Journal für prakt. Chemie. N. F. Bd. 16, S. 290. Derselbe, Zeitschrift für physiolog. Chemie, Bd. 3, S. 1 — sowie auf die vorzüglichen Sammelwerke von W. Vogel, Praktische Spectralanalyse irdischer Stoffe, Nördlingen 1877, und Branly, Dosages de l'hémoglobine par les procédés optiques, Paris 1882, zu verweisen. Hier nur das Wesentlichste:

Zwischen eine constante Lichtquelle (Lampenlicht) und den Spalt des Spectroskops wird die zu untersuchende Farbstofflösung so eingefügt, dass die untere Hälfte des Spaltes Licht erhält, welches durch die Farbstofflösung gegangen, also durch dieselbe abgeschwächt ist, während die obere Hälfte Licht erhält, welches die Farbstofflösung nicht passirt hat. Von beiden wird im Spectroskop ein Spectrum entworfen, von dem jedoch durch einen am Kopfe des Fernrohres angebrachten Spalt nur ein bestimmter enger Abschnitt zur Beobachtung gelangt, so dass man nahezu einfarbiges Licht erhält, welches zur Hälfte abgeschwächt, zur Hälfte ungeschwächt erscheint. Es wird nun die ungeschwächte Hälfte entweder durch Verengerung des betreffenden Spaltabschnittes, nach Befinden unter Zuhülfenahme von Rauchgläsern (K. v. Vierordt'sche Methode), oder durch Drehung eines im Fernrohr angebrachten Nicol'schen Prismas, wobei das Licht für die betreffende Spalthälfte durch Reflexion polarisirt ist (Hüfner'sche, Glahn'sche, Branly'sche Methode), soweit verdunkelt, bis die Lichtintensität beider Hälften des Spectralabschnittes

gleiche Helligkeit besitzt, und dann an ad hoc angebrachten Scalen abgelesen, wie gross die Lichtentziehung hat sein müssen.

In seiner Besprechung dieser spectrophotometrischen Methoden sagt Hoppe-Seyler (Handbuch der phys. und path. chem. Analyse, Berlin 1883, S. 22): „Da es sich bei diesen Bestimmungen lediglich um Gleichstellung der Helligkeit handelt, ist nicht wohl einzusehen, welchen Nutzen das Spectroskop, d. h. die Beschränkung der Absorptionsmessung auf einen schmalen Spectralabschnitt leisten soll. Bei constanter Beleuchtung wird ohne Spectroskop die Gesammtheit der Lichtabsorptionen und hiermit der Gehalt an Farbstoff mindestens ebenso genau als mit Hülfe des Spectrums in einem schmalen Streifen desselben bestimmt werden können. Theoretisch würde nur auf photometrischem Wege die Bestimmung mehrerer Farbstoffe neben einander in einer und derselben Lösung ausgeführt werden können, aber auch nur unter der Bedingung, entweder dass jeder derselben in einem besonderen Spectralabschnitt kräftige Absorption ausübte, in denen sämtliche übrigen nur wenig Licht absorbirten, und nun in jedem dieser Abschnitte Bestimmungen der Absorption ausgeführt würden, oder zweitens, dass bis auf die in solchen Abschnitten bestimmbareren Farbstoffe die übrigen auf anderen Wegen bestimmt werden könnten.“

D. Colorimetrische Methoden.

Die hierher gehörigen Methoden zur Prüfung des Blutes auf seinen Hämoglobingehalt basiren auf der Voraussetzung, dass zwei Lösungen, welche unter den gleichen Bedingungen den gleichen optischen Effect geben, auch den gleichen Gehalt an Farbstoff besitzen müssen, leiden aber an dem Nachtheil, dass, selbst wenn die Lösungen sehr verdünnt sind, nur der Geübte im Stande ist, feine Farbenabstufungen mit Sicherheit zu unterscheiden, zumal die Unterscheidungsempfindlichkeit des Auges gerade für Roth und Orange sehr gering ist.

Man kann die colorimetrischen Methoden in zwei Hauptgruppen theilen, und zwar:

- a) in solche, bei denen das zu prüfende Blut so lange mit Wasser verdünnt wird, bis es eine gewisse, einem bekannten Blutfarbstoffgehalt entsprechende Färbung erlangt hat (Methoden von Hoppe-Seyler, Worm-Müller, Jolyet und Laffont, Bizzozero); und
- b) in solche, bei denen das Blut in eine Lösung (Verdünnung)

von bestimmter Concentration gebracht und mit einer Reihe von Farbenproben, welche bekannten Oxyhämoglobingehalten entsprechen, verglichen wird (Methoden von Weleker, Hayem, Quincke, Mantegazza, Malassez).

Der Kürze halber werde ich nur die Methode des Genaueren beschreiben, welche allseitig als die beste aller colorimetrischen Methoden anerkannt wird, nämlich

die Methode von Hoppe-Seyler.

Man stellt aus Meerschweinchen- oder Pferdeblut krystallisiertes Oxyhämoglobin dar, reinigt es durch Umkrystallisiren, löst dann bei 0° in Wasser und filtrirt. Von dieser concentrirten Normallösung bringt man 20 Ccm. in eine Porcellanschale, verdunstet auf dem Wasserbade, später im Luftbade bei 120° zur völligen Trockne und wägt nach dem Erkalten über Schwefelsäure. Von der übrigen, nunmehr betreffs ihres Oxyhämoglobingehalts genau bekannten Lösung, die in gut verschlossenen kleinen Flaschen zu verwahren ist, werden 10 Ccm. mit 10—60 Ccm. Wasser verdünnt, die Mischung gut umgeschüttelt und als verdünnte Normallösung bezeichnet. Um mittelst dieser Lösung den Gehalt eines Blutes an Oxyhämoglobin zu bestimmen, wird eine kleine, genau abgewogene Quantität des am besten vorher defibrinirten Blutes (etwa 1—20 Grm. oder noch weniger) mit viel Wasser verdünnt, so dass 20 Grm. Blut etwa auf 400 Ccm. verdünnt werden, und schreitet man nun zur Farbenvergleihung. Man bedient sich dazu am besten zweier sog. Hämatinometer (s. früher). Den einen dieser Glaskästen füllt man mit der verdünnten Normallösung, in den anderen bringt man 10 Ccm. der verdünnten Blutlösung, lässt dann aus einer graduirten Bürette unter Umrühren so lange Wasser zufließen, bis die Färbung beider Flüssigkeiten einander gleich geworden ist, und liest ab, wieviel Wasser zu 10 Ccm. Blutlösung hinzugefügt wurde. Ist die Färbung beider Flüssigkeiten die gleiche, so enthalten beide in gleicher Quantität auch gleich viel Oxyhämoglobin, und es ist daher der Gehalt des Blutes an diesem Farbstoff leicht zu berechnen.

„Es wurden z. B. 20,1862 Grm. defibrinirten Hundebutes mit Wasser auf 400 Ccm. verdünnt, von dieser Mischung mussten 10 Ccm. mit 38 Ccm. Wasser verdünnt werden, um gleiche Farbe mit der verdünnten Normallösung zu erhalten. Hiernach würden die 400 Ccm. Blutlösung auf 1920 Ccm. verdünnt werden müssen, um die gleiche

Farbe mit der Normallösung zu erhalten. Da nun die Normallösung in 100 Ccm. 0,145 Grm. Oxyhämoglobin enthielt, so würden in 1920 Ccm. Blutlösung von gleicher Färbung 2,784 Grm. Oxyhämoglobin enthalten sein, und da diese Lösung aus 20,1862 Grm. Blut gewonnen war, so enthielt also das defibrinirte Blut 13,79 pCt. Oxyhämoglobin“ (Hoppe-Seyler, Handbuch der phys. path. chem. Analyse. Berlin 1883, S. 135—137).

Da sich die Normalhämoglobinlösung nur kurze Zeit unzersetzt erhält und somit sehr häufig, wenn niedrige Temperatur nicht herstellbar ist, sogar von Tag zu Tag neu bereitet werden muss, ihre Darstellung überdies sehr zeitraubend ist, schlägt Preyer (Die Blutkrystalle, Jena 1871, S. 122) vor, statt der Normalhämoglobinlösung eine Normalhämatinlösung zu bereiten und, behufs Farbenvergleichs erst sämtliches Hämoglobin in Hämatin durch Erwärmen des abgewogenen Blutes mit Essigsäure und Uebersättigen mit verdünnter Natronlauge nach dem Erkalten überzuführen. Die Normalhämatinlösung würde allerdings lange haltbar sein; Preyer zweifelt jedoch, ob in jedem Falle bei Behandlung des Blutes in der angegebenen Weise sämtliches Hämoglobin in Hämatin übergeführt werden kann, und ob wirklich die theoretische Menge Hämatin in jedem einzelnen Versuche geliefert wird. Noch umständlicher als die Ueberführung des Hämoglobins in Hämatin würde es sein, wenn man die Bestimmung mit Kohlenoxydhämoglobin ausführen wollte, welches allerdings nach Hoppe-Seyler (l. c. S. 137) sich in seiner Lösung in geschlossener Flasche in 25 Jahren nicht verändert. Man würde dann Kohlenoxyd durch die Normallösung unmittelbar vor dem Einschliessen und ebenso durch das zu untersuchende Blut leiten müssen.

In ähnlicher Weise wie Hoppe-Seyler verfahren Worm-Müller, Jolyet und Laffont. Ersterer setzt zu einer bestimmten Menge Wasser allmählich und unter stetem Umrühren das zu prüfende Blut, bis eine typische Färbung erreicht ist; letztere benutzen zur Vergleichung farbiges Glas und bedienen sich dabei des Dubosq'schen Colorimeters, eines ziemlich complicirten Apparates, dessen Beschreibung ohne Abbildung schwer verständlich sein würde (Société de Biologie, 1877, sowie Lambling, Des procédés de dosage de l'hémoglobine, Nancy 1882, p. 75—89), während Bizzozero einen von ihm Chromocytometer getauften Apparat construiert hat, welcher nichts weiter ist als ein Donné'sches Lactoskop von sehr kleinen Dimensionen (Atti d. R. Acad. de Scienze di Torino, Mai 1879). Zur Ver-

gleichung benutzt Bizzozero auf einem Objectträger fixirtes Kaninchenblut (von unbekanntem Hämoglobingehalt!).

Nach der Methode von Welcker wird das zu untersuchende Blut mit Wasser in eine bestimmte Verdünnung gebracht und mit einer Reihe mehr oder weniger concentrirter Blutlösungen von bekanntem (besser: geschätztem) Gehalt an Blutkörperchen verglichen. Da sich indessen die Normalblutlösungen schnell zersetzen, lässt Welcker dieselben in bestimmter Weise auf gut geleimtem Papier eintrocknen und stellt so Blutflecken her, deren jeder einer Blutlösung von bekanntem Blutkörperchengehalt entspricht. Um Blut zu prüfen, verdünnt man dasselbe mit Wasser, lässt es in der vorgeschriebenen Weise auf Papier eintrocknen und vergleicht mit den Normalblutflecken (Vierteljahresschr. f. d. prakt. Heilkunde, 44. Bd., 1854). Da die von Welcker benutzten Normalblutlösungen nur auf ihren Gehalt an Blutkörperchen, nicht aber auf ihren Hämoglobingehalt bestimmt sind, aus der Menge der Blutkörperchen in einem Blute aber nur ein sehr relativer Schluss auf den Hämoglobingehalt desselben gezogen werden kann, dürfte die Welcker'sche Methode nicht mit den anderen Methoden concurriren können.

Ebenso wenig kann das von Quincke (Berliner klin. Wochenschr., 32, 1878) construirte Hämochromometer strengeren Anforderungen gerecht werden. Dasselbe besteht im Wesentlichen aus 20 neben einander aufgestellten dünnen Röhren, welche an beiden Enden zugeschmolzen und mit Lösungen von Picrocarmin in verschiedenen Concentrationsgraden gefüllt sind. Zur Bestimmung des Hämoglobingehalts genügt 1 Tropfen Blut, der mit Liq. ammon. caust. verdünnt wird. Quincke geht bei der Graduirung des Apparates von der Voraussetzung aus, dass die Färbung einer 8proc. Picrocarminlösung genau derjenigen des normalen menschlichen Blutes entspricht, ohne indessen eine genaue Analyse des betreffenden Blutes vorgenommen zu haben; es dürfte somit das kleine Instrument recht gut zur Vergleichung verschiedener Blutproben, nicht aber zur genauen Bestimmung des Hämoglobingehalts zu verwenden sein.

Malassez (Archiv de Physiolog., 1877) vergleicht die zu prüfende Blutlösung mittelst eines farbigen Prismas; Hayem (Société de Biologie, 1877) hat einen Apparat construiert, der sich am besten mit dem Heusner'schen Milchspiegel vergleichen lässt; Mantegazza's (aus Lambling, Des procédés de dosage de l'hémoglobine, Nancy 1882, S. 109) Globulimeter beruht darauf, dass man eine Blut-

lösung vor eine Kerzenflamme hält und zwischen das Auge des Beschauers und die Blutlösung mehr oder weniger intensiv blaue Gläser bringt, bis ein Zeitpunkt kommt, wo die Flamme nicht mehr sichtbar ist.

II. Theil.

Die Bestimmung des Oxyhämoglobingehalts mittelst Titirens durch verdünnte Salpetersäure.

Sämmtliche colorimetrische Methoden, von denen, wie wir gesehen haben, nur die von Hoppe-Seyler den wahren Gehalt des Hämoglobins im Blute mit ziemlicher Genauigkeit anzugeben im Stande ist, sind leider nur in sehr beschränkter Weise zu verwenden überall da, wo es sich um Bestimmungen des Hämoglobingehalts in Thierblut handelt. Es ist nämlich Thatsache, dass das Blut jeder einzelnen Thierart seine charakteristische Färbung besitzt und dass das Blut der verschiedenen Thierarten, selbst bei gleichem Hämoglobingehalt und demselben Blutgefäss entnommen, wesentliche Färbungsunterschiede zeigt. Besonders auffällig sind dieselben zwischen dem arteriellen Blute des Hundes, Schweines, Pferdes und Rindes. Ersteres ist am hellsten, letzteres am dunkelsten gefärbt, obgleich der Hämoglobingehalt des Hundesblutes von dem des Rindsblutes nur sehr unwesentlich abweicht. Diese Differenz in der Färbung bleibt auch bei der Verdünnung des Blutes mit Wasser und energischem Schütteln an der Luft bestehen, so dass man, wollte man mittelst einer der colorimetrischen Methoden Untersuchungen von Thierblut vornehmen, für jede Thiergattung ein besonderes Normalblut haben müsste.

Es bleibt somit nichts weiter übrig, als sich zu derartigen Bestimmungen einer der chemischen, spectrokopischen oder spectrophotometrischen Methoden zu bedienen, welche indessen entweder grosse Uebung voraussetzen oder kostspielige Apparate erfordern, alle aber, natürlich mit Ausnahme der sehr schwierigen Bluteisenbestimmung, an dem Uebelstand leiden, dass — wenn Irrthümer vermieden werden sollen — eine Defibrinirung des zu untersuchenden Blutes vorhergehen muss, dies aber die Entnahme einer grösseren Quantität Blutes, z. B. also 20 Grm. voraussetzt. Nun ist es bekannt, dass die Vornahme eines Aderlasses bei gewissen Krankheiten oft die schäd-

lichsten Folgen nach sich zieht und dass durch wiederholte Entnahme selbst relativ geringer Blutmengen die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit alterirt wird.

Aus diesen Gründen habe ich mich seit längerer Zeit einer Methode zur schnellen Oxyhämoglobinbestimmung bedient, welche die Defibrinirung des Blutes unnöthig macht und mit kleinen Mengen — mindestens 0,4 Ccm. — zu arbeiten gestattet. Diese Methode beruht auf folgenden Sätzen:

1. Wenn man Blut in reinem¹⁾ Glycerin auffängt, so tritt eine Gerinnung nicht ein; das anfangs eigenthümlich chokoladenfarbige Gemisch wird nach wenigen Minuten klar und durchsichtig und behält diese Eigenschaft bei weiterem Verdünnen mit Glycerin (nicht mit Wasser!) bei. Die Glycerinblutlösung bleibt, in gut verschlossenen Gefäßen und in dunklem Raume aufbewahrt, sehr lange unzersetzt, und selbst beim Stehen an der Luft waren nach einer Woche die Oxyhämoglobinbanden vollkommen unverändert und nur eine höchst minimale Andeutung einer Absorption machte sich in Roth bemerklich. Beim Schlagen an der Luft wird das Hämoglobin des in Glycerin gelösten Blutes genau so mit Sauerstoff gesättigt, wie dasjenige des intacten oder in Wasser gelösten Blutes.
2. Wenn man zu einer wässerigen oder glycerinhaltigen, mit Sauerstoff gesättigten Blutlösung höchst verdünnte Salpetersäure fließen lässt, so nimmt die Lösung ohne jede Trübung eine braune Färbung an, die Oxyhämoglobinbanden verschwinden vollständig und im Spectrum resultirt ein Säureband in Roth (44—51). Das Spectrum ist somit nach Beendigung des Processes in Gelb und Grün vollkommen ungetrübt.
3. Das Quantum Salpetersäure, welches man braucht, um in einer bestimmten Menge Blutes die Oxyhämoglobinbänder auszulöschen, ist abhängig vom Quantum des in dem Blute enthaltenen Oxyhämoglobins. Die Temperatur der Umgebung und der Flüssigkeiten hat auf die Exactheit der Reaction keinen Einfluss, sobald sie

¹⁾ Nach Verdünnung mit 5 Th. Wasser darf reines Glycerin durch Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium nicht verändert, durch Silbernitrat, Baryumnitrat, Ammoniumoxalat und Chlorcalcium nicht getrübt werden (Metalle, Salz- und Schwefelsäure, Kalk, Oxalsäure). Eine ammoniakalische Silberlösung darf bei gewöhnlicher Temperatur binnen $\frac{1}{4}$ Stunde durch Glycerin nicht reducirt werden (Aldehyd, Ameisensäure, Akrolein).

+ 18° R. nicht übersteigt und nicht unter + 10° R. sinkt. Bei höherer Temperatur würde man weniger, bei niedrigerer mehr Titirflüssigkeit verwenden müssen und somit ungenaue Resultate erzielen.

4. Um diese Eigenthümlichkeit der höchst verdünnten Salpetersäure zur Bestimmung des Oxyhämoglobingehalts im Blute verwenden zu können, muss man ein- für allemal feststellen, wie viele Cubikcentimeter Salpetersäure von bestimmter Verdünnung nöthig sind, um in einer gegebenen Menge Blutes von bekanntem Oxyhämoglobingehalt die Sauerstoffbänder zum Verschwinden zu bringen. Ist dies geschehen, so wird sich in jedem anderen Blute mittelst Titirens durch entsprechend verdünnte Salpetersäure und durch einen einfachen Regel-de-tri-Ansatz der Oxyhämoglobingehalt leicht bestimmen lassen.

Gesetzt z. B. den Fall, man hätte definitiv festgestellt, dass 6,95 Ccm. einer 2proc. wässerigen Lösung von reiner Salpetersäure nöthig sind, um in 0,4 Ccm. eines Blutes von 9,83 pCt. Oxyhämoglobingehalt die Sauerstoffstreifen zum Verschwinden zu bringen, und man würde nur 5,3 Ccm. derselben Lösung brauchen, um in 0,4 Ccm. eines anderen Blutes den gleichen Effect zu erzielen, so würde die Formel lauten:

$$6,95 : 9,83 = 5,3 : x$$

$$x = 7,49,$$

oder, was auf dasselbe hinauskommt, aber arithmetisch richtiger ist:

$$6,95 : 5,3 = 9,83 : x$$

$$x = 7,49.$$

Auf diesen Sätzen beruht die Methode. Am geeignetsten zu ihrer Ausführung haben sich 2proc. Lösungen, also 2proc. Blutglycerinlösungen und 2proc. Salpetersäurelösungen bewährt. Zu jeder Probe wurden 20 Ccm. der Blutlösung — also 0,4 Ccm. Blut — verwendet, und es ergab sich im Mittel aus 20 Proben,

dass 6,95 Ccm. einer 2proc. wässerigen Lösung von Acidum nitricum purum, welches genau den Anforderungen der Pharm. Germ. II. entspricht, also ein specif. Gewicht von 1,185 und einen Säuregehalt von 30 pCt. hat, nöthig sind, um in 0,4 Ccm. eines Blutes von 9,83 pCt. Oxyhämoglobingehalt die Oxyhämoglobinbänder zum Verschwinden zu bringen.

Die Feststellung des Hämoglobingehalts geschah mittelst der

Eisenbestimmung: 473,7 Grm. Rindsblut wurden eingedampft und bei 100—105° C. getrocknet. Es resultirte 100,5 Grm. = 21,2 pCt. Blutpulver. Davon wurde ein genau abgewogenes Quantum, 100 Grm. Blut entsprechend, langsam verkohlt, verascht und das Eisen mittelst reiner Salz- und Salpetersäure in Lösung gebracht. Die salzsaure Lösung wurde mit Schwefelsäure abgeraucht und durch Reduction mit absolut eisenfreiem Zink das Eisenoxyd in Oxydul umgewandelt. Die Titirung mit Kaliumpermanganat ergab einen Procentgehalt an Eisenoxyd von 0,059 Grm., welcher entspricht einem Gehalt an Eisen von 0,0413 Grm. Hieraus berechnet sich ein Gehalt 9,83 Grm. Oxyhämoglobin in 100 Grm. des Blutes.

Zur

Ausführung der Methode

bedarf man:

- 1) eines Spectroskops à vision directe;
- 2) einer gut leuchtenden Petroleumlampe;
- 3) einer in $\frac{1}{20}$ Ccm. getheilten Bürette und eines in $\frac{1}{2}$ Ccm. getheilten Masscylinders;
- 4) eines sogen. Hämatinometers, dessen planparallele Wandungen $\frac{3}{4}$ Cm. voneinander stehen.

Directes Sonnenlicht zur Untersuchung zu verwenden, ist deshalb nicht rathsam, weil die unter dem Namen „Regenbänder“ bekannten atmosphärischen Linien, besonders der selbst bei leidlich trockener Luft rechts von D auftretende breite Schatten, leicht Täuschungen veranlassen können; der Einwand wird natürlich hinfällig, wenn man mit einem Spectroskop à vision directe mit Vergleichungsprisma arbeitet.

Die Dicke der Flüssigkeitsschicht hat auf den Erfolg der Probe keinen ausserordentlichen Einfluss, doch ist es klar, dass der Zeitpunkt des vollständigen Verschwindens der Blutbänder vom Auge um so schneller wahrgenommen werden wird, je dünner die Flüssigkeitsschicht ist.

Bei der Untersuchung von Blut verfare ich in folgender Weise:

In einen in $\frac{1}{2}$ Ccm. getheilten Masscylinder, welcher bis zu einem gewissen Theilstrich mit Glycerin gefüllt ist, lässt man unter stetem Umrühren mittelst eines dünnen Glasstäbchens (am besten direct aus der Ader) eine kleine Menge Blutes fließen, liest die auf-

gefangene Blutmenge ab und verdünnt die ganze Portion oder einen Theil derselben der Art mit Glycerin, dass in 100 Vol. 2 Vol. Blut enthalten sind. Von dieser 2proc. Blutlösung werden 20 Ccm. in ein Hämatinometer gebracht und dasselbe wird dicht vor den Spalt des Spectroskops gestellt. Hierauf lässt man aus der Bürette unter energischem Umrühren so lange 2proc. Salpetersäurelösung zu-tröpfeln, bis die Oxyhämoglobinbänder vollständig verschwunden sind. Ist dieser Moment erreicht, so wird die verbrauchte Salpetersäuremenge abgelesen und, wenn man dieselbe mit *sm* bezeichnet, der Hämoglobingehalt nach der Formel

$$6,95 : 9,83 = sm : x$$

berechnet.

Um die Genauigkeit des Verfahrens zu prüfen, habe ich Pferdeblut zu gleicher Zeit auf meine Methode und direct durch Eisenbestimmung untersucht. Auf dem ersteren Wege erhielt ich folgende Zahlen:

	Blutmenge. Ccm.	Titri- flüssigkeit. Ccm.	Hämoglobin- gehalt. pCt.
1. Probe . . .	0,4	9,75	13,79
2. Probe . . .	0,4	9,70	13,71
3. Probe . . .	0,4	9,60	13,57
4. Probe . . .	0,4	9,70	13,71
5. Probe . . .	0,4	9,65	13,64
Mittel	0,4	9,68	13,68

Behufs der Eisenbestimmung wurden 225,4 Grm. in bekannter Weise getrocknet, verascht, und das Eisenoxyd wurde sowohl auf gewichtsanalytischem als massanalytischem Wege bestimmt. Es ergab sich ein Gehalt von 0,081 pCt. Fe_2O_3 durch Wägung, von 0,083 pCt. Fe_2O_3 durch Titriren mittelst Permanganat. Der Mittelwerth betrug also 0,082 pCt. Fe_2O_3 , welches entspricht 0,0574 pCt. Eisen und 13,66 pCt. Oxyhämoglobin. Stellt man diese letztere Zahl den durch meine Methode gefundenen Zahlen gegenüber, so wird man finden, dass die Differenz nur höchst unbedeutend ist.

Mittelst meines Verfahrens habe ich eine grössere Menge Oxyhämoglobinbestimmungen vorgenommen, von denen ich nachstehend einige folgen lasse. In jeder Probe wurden 20 Ccm. einer 2proc. Blutglycerinlösung, also 0,4 Ccm. Blut verwendet.

Versuchsthier.	Zahl der Proben.	Verbrauchte Titri- flüssigkeit (im Mittel). Ccm.	Oxyhämoglobin. pCt.
1. Rind.			
10 Tage altes männl. Kalb	5	5,99	8,47
2 Jahre altes männl. Rind	5	7,60	11,77
3 Jahre alter Ochse . .	20	6,95	9,83
4 Jahre alter Bulle . .	4	7,98	11,28
4 Jahre alter Ochse . .	5	9,83	13,90
5 Jahre alter Ochse . .	4	8,70	12,30
10 Tage altes weibliches Kalb	4	5,70	8,06
1 Jahr altes weibl. Rind	5	6,05	8,55
3 Jahre alte Kuh . . .	5	7,15	10,11
14 Jahre alte Kuh . . .	7	6,22	8,79
Mittel	.	.	10,206
2. Schaf.			
3 Jahre alter fetter Hammel	4	7,90	11,17
5 Jahre alter fetter Hammel	5	7,54	10,66
2 Jahre alter fetter Hammel	5	7,75	10,96
Mittel	.	.	10,93
3. Pferd.			
16 Jahre alter Wallach	4	8,12	11,48
16 Jahre alte Stute . .	5	9,80	13,86
20 Jahre alte Stute . .	5	9,68	13,68
Mittel	.	.	13,00
4. Hund.			
5 Monate alte Hündin .	4	7,11	10,05
18 Monate alte Hündin	4	7,76	10,97
Mittel	.	.	10,51
5. Schwein.			
Mageres, 1 Jahr altes Schwein (Castrat) . .	5	8,94	12,64
Mässig fettes, 1 Jahr alt. Schwein (Castrat) . .	5	9,87	13,96
Sehr fettes, 1 Jahr altes Schwein (Castrat) . .	5	9,32	13,18
4 Jahre altes weibliches Schwein	4	9,56	13,52
Mittel	.	.	13,32

Es würde das Ziel, welches ich mir für meine Arbeit gesteckt habe, weit überschreiten, wenn ich auf die Consequenzen aus diesen Zahlen eingehen wollte, ich bemerke jedoch, dass ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, auch in Zukunft Hämoglobinbestimmungen sowohl nach meiner Methode als auch nach anderen Methoden, besonders mittelst der Eisenbestimmung, auszuführen; denn nur durch massenhaftes Material wird man im Stande sein, genaue Schlüsse auf den durchschnittlichen Hämoglobingehalt des normalen Thierblutes und des Thierblutes in Krankheiten zu ziehen.

V.

Die Magenverdauung der Schweine.

Von

Ellenberger und V. Hofmeister.

In einem früheren Artikel (dieses Archiv, Bd. XI, S. 249) haben wir die anatomischen Verhältnisse und die mikroskopische Einrichtung des Schweinemagens geschildert und die Resultate unserer über die Frage der Magensaftquellen des Schweins und der physiologischen Wirkungen des Schweinemagensaftes und Fermentgehaltes etc. angestellten Versuche vorgetragen.

Es handelt sich nunmehr darum, die Vorgänge der Magenverdauung, wie sie unter normalen Verhältnissen im Schweinemagen thatsächlich ablaufen, zu studiren.

Diese Studien hätten, wie dies ja vielfach bei anderen Thieren geschehen ist, durch Anlegung von Magen fisteln und Untersuchung der aus diesen zu verschiedenen Verdauungszeiten und bei verschiedener Nahrung gewonnenen Massen geschehen können; wir sind aber der Meinung, dass derartige Versuche keinen genügenden Aufschluss über die Ausgiebigkeit der gesammten Magenverdauung geben und dass sie auch nicht documentiren, ob die Verdauung an verschiedenen Stellen des Magens verschieden abläuft, es sei denn, dass die Fisteln an verschiedenen Punkten des Magens angelegt werden. Letzteres bietet aber sehr grosse Schwierigkeiten, weil die höher gelegenen Partien des Magens nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind. Wir haben deshalb auf die Ausführung der Gasterostomien verzichtet und im Grossen und Ganzen dieselbe Versuchsmethode gewählt, welche wir bei den an Pferden angestellten Experimenten in Anwendung gebracht hatten (dieses Archiv, VIII, 6). Diese Methode besteht im Allgemeinen darin, dass die Thiere, nachdem

der Magen derselben durch Hungern und Wasserverabreichung möglichst leer geworden ist, mit bestimmten Mengen eines Nahrungsmittels, dessen chemische Zusammensetzung vorher analytisch festgestellt worden ist, gefüttert und eine gewisse Zeit nach der Nahrungsaufnahme getötet werden. Der Mageninhalt wird quantitativ bestimmt, auf seine Eigenschaften geprüft und analytisch untersucht. Auch das bereits aus dem Magen nach dem Darm übergetretene Futter wird quantitativ festgestellt und mit in Berechnung gezogen.

Als Versuchsfutter müssten, wenn die Frage hätte allseitig erschöpfend behandelt werden sollen, die sämtlichen naturgemässen Nahrungsmittel der Schweine und Gemische derselben, wie sie landwirtschaftlich verabreicht werden, gewählt werden; wir haben aber unsere Untersuchungen vorläufig auf Experimente mit Körnerfutter beschränkt. Eine weitere Ausdehnung derselben war zunächst nicht möglich, weil schon die mit Körnern angestellten Versuche 8 Versuchsthierc erforderten.

Die Körner wurden trocken, höchstens angefeuchtet verabreicht. Daneben erhielten die Thiere Wasser zum Getränk. Es ist dies eine Fütterungsweise, wie sie z. B. bei Treiberschweinen ganz gewöhnlich ist. Von den gewöhnlichen Körnerfrüchten wählten wir speciell Hafer. Derselbe wurde roh und nicht im gequollenem oder gebrühten oder gekochten Zustande verabreicht, weil wir eine möglichst ausgiebige Speichelsecretion erzielen wollten. Es ist selbstverständlich, dass bei dem Genuss des letztgenannten Futters viel weniger Speichel secernirt und damit wahrscheinlich die amylolytische Verdauungsperiode abgekürzt worden wäre; dies wollten wir aber vermeiden. Wir beabsichtigten, zunächst festzustellen, wie der Schweinemagen rohe Körner verdaut, und gestatten uns im Nachstehenden, die mit Fütterung von rohem Hafer angestellten Experimente in ihrer Ausführung und ihren Resultaten zu schildern und daraus Schlüsse zu ziehen über den Ablauf der Magenverdauung der Schweine bei Körnerfutter. Ueber die Darmverdauung werden wir später berichten.

Zu den Versuchen wurden 8 Schweine benutzt. Die 3 ersten Schweine erhielten den Hafer im angefeuchteten, die 3 nächsten im trockenen Zustande. Den beiden letzten Schweinen wurde vor, während und nach der trockenen Fütterung Trinkwasser zur Aufnahme verabreicht. Die Schweine wurden in der Weise zu dem Versuch vorbereitet, dass sie zunächst einige Tage lang eine Nahrung erhielten, welche von dem Versuchsfutter im Magen und Darm leicht und scharf

unterschieden werden und keinen Anlass zu Verwechslungen geben konnte. Wir wählten speciell Milch, Kleie, Kleie mit Milch, oder Fleisch oder Kalbsknochen oder Heidelbeeren mit Kleie. Die letzten 36 Stunden vor der Fütterung mit dem Versuchsfutter erhielten die Thiere nur Wasser oder klare Fleischbrühe, um für möglichste Entleerung des Magens zu sorgen. Die Schweine wurden dann mit genau gewogenen Mengen eines chemisch analysirten Hafers gefüttert. Man gab 500—1000 Grm. Hafer in einem absolut reinen Gefäss. Dazu ist zu bemerken, dass in den letzten zwei Tagen jede Spur von Streu aus dem Stalle entfernt und überhaupt dafür gesorgt worden war, dass die Thiere nicht fremde Stoffe in den Magen einführen konnten.

Die Schweine wurden je 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 Stunden nach Beendigung der Mahlzeit getödtet. Eine weitere Ausdehnung erschien nicht nothwendig, weil unter normalen Verhältnissen zwischen je zwei Mahlzeiten höchstens ein Zeitraum von 12 Stunden liegt. Gewöhnlich werden die Thiere bekanntlich täglich dreimal, Morgens, Mittags und Abends gefüttert. Demnach liegen ca. 6 und ca. 12 Stunden zwischen je zwei Mahlzeiten, 12 Stunden zwischen der Aben- und Morgenmahlzeit.

Nach dem Schlachten wurde der Magen und Darmcanal möglichst rasch aus dem Körper genommen, der Magen am Pylorus abgeschnürt, abgetrennt und geöffnet. Das Oeffnen geschah vom Schlunde und vom Pylorus und eventuell noch von einer dritten Stelle aus. Der Mageninhalt wurde mit Ausnahme beim 1. Thiere in zwei oder in drei Portionen geschieden. Bei Scheidung in zwei Portionen wurde die eine Portion aus der der Cardia, die andere aus der dem Pylorus zugewendeten Magenhälfte entnommen, so dass die erstere wesentlich aus derjenigen Partie des Magens stammt, welche am höchsten liegt und besondere Drüsen, die frei von Belagzellen, aber auch verschieden von den Pylorusdrüsen sind, stammt (also aus den beiden sogen. Cardiasäcken), während die andere aus dem tiefer gelegenen Theil, der mit Fundus- und Pylorusdrüsen ausgekleidet ist, genommen worden ist. Man gestatte uns, der Kürze halber für die beiden Partien die Namen Cardiahälfte und Pylorushälfte des Magens zu wählen.

Wurde der Mageninhalt in drei Portionen getrennt, dann stammte die dritte Portion aus dem mittleren Theil des Magens, während die

eine Partie wesentlich den beiden Cardiasäcken, die andere wesentlich der Belagzellregion¹⁾ und dem Pylorustheil entnommen war.

Jede Portion wurde ausgepresst, das Ausgepresste filtrirt; das Filtrat stellte dann die Magenflüssigkeit der betreffenden Abschnitte dar. Man erlaube uns, dieselben im nachfolgenden Artikel zuweilen kurzweg als Cardia- und Pylorusflüssigkeit zu bezeichnen. Die Flüssigkeiten wurden auf ihren Pepton-, Säure-, Zucker-, Eiweiss- und Fermentgehalt quantitativ und qualitativ geprüft.

Ausserdem wurden, mit Ausnahme der zwei ersten Versuche, im ganzen Magen die Mengen der gelösten und ungelösten Nährstoffe und der Faser methodisch bestimmt. Die Methode haben wir bereits in einem früheren Artikel („Die Darmverdauung des Pferdes“, dieses Archiv, X, 4 u. 5) geschildert, werden dieselbe aber auch noch in einem späteren Artikel, welcher die Darmverdauung der Schweine behandelt, besprechen. Sie ist für die nachfolgenden Mittheilungen weniger wichtig.

1. Versuch. Nach 24stündigem Hungern erhielt das Thier 600 Grm. Hafer, welche es in einer Stunde verzehrte. Eine Stunde nach dem Fressen wurde das Thier geschlachtet. Der Magen war ziemlich bedeutend angefüllt, der Inhalt krümelig, fast trocken; er bestand aus zerkleinertem Hafer und ausserdem noch aus Bestandtheilen desjenigen Futters, welches 24 Stunden vor der letzten Mahlzeit verabreicht worden war (Kleie und Kalbsknochen). Diese älteren Massen liessen sich ziemlich leicht von dem Hafer scheiden; sie wogen 500 Grm., so dass noch 1225 Grm., welche aus zerkleinertem Hafer, Speichel und Magensaft bestanden, übrigblieben. Diese Masse enthielt 65 pCt. Wasser und 35 pCt. Trockensubstanz. Sie reagirte an der Schlundöffnung alkalisch, weiterhin aber sauer. Das Filtrat der ausgepressten Flüssigkeit der gemischten Masse reagirte sauer und hatte einen Säuregrad von 0.057 pCt., auf Salzsäure bestimmt. Sie enthielt 0.8 pCt. Zucker und 1,5 pCt. lösliches Eiweiss, dagegen kein Pepton.

Der verfütterte Hafer enthielt gar keinen Zucker und nur 0.3 pCt. lösliches Eiweiss. Beides wurde in der Weise bestimmt, dass ein aus gut zerkleinertem Hafer und Wasser hergestellter Brei 24 Stunden in den Brütöfen gestellt, dann ausgepresst und filtrirt wurde; die Flüssigkeit wurde dann auf Zucker und Eiweiss untersucht. Diese eigenthümliche Art der Untersuchung geschah deshalb, um zu zeigen, dass der zerkleinerte Hafer durch Wasser und Körpertemperatur allein keine bedeutende Umwandlung erleidet, dass dies vielmehr nur in Gegenwart besonderer Fermente geschieht. Bei einem anderen Versuch, bei welchem gekauter Hafer ausgepresst und filtrirt wurde, constatirten wir 2 pCt. lösliches Eiweiss, 0,3 pCt. Pepton und Spuren Zucker.

¹⁾ Die Ausdrücke Belagzell- und Fundusdrüsenregion bezeichnen denselben Magenabschnitt.

Um den Mageninhalt auf seinen Fermentgehalt zu prüfen, gelangte ein Theil der filtrirten Flüssigkeit mit Kleister und Fibrin in den Brütöfen. Das Fibrin blieb unverändert; der Kleister wurde verdaut. Der Zuckergehalt der mit Kleister angesetzten Flüssigkeit steigerte sich um das 6fache. Dass kein oder zu wenig Pepsin in der Magenflüssigkeit war, ergab sich daraus, dass dieselbe auch dann noch nicht lösend auf Eiweiss wirkte, wenn ihr die nöthige Menge HCl zugesetzt wurde.

Dieser Versuch beweist:

1. Dass der Magen des Schweins seinen Inhalt lange Zeit behält und dass er in der Regel bei Beginn jeder Mahlzeit noch Theile der vorhergegangenen Mahlzeit enthält. Die frühere Anschauung von der baldigen Entleerung des Magens ist demnach, wenigstens für die Pferde und Schweine, unzutreffend. Bei beiden Thierarten findet man selbst bei 24stündigem Hungern noch Inhalt im Magen.

2. Dass auch beim Schwein der Mageninhalt bei Körnerfutter verhältnissmässig trocken ist. Im speciellen Falle waren nur 65 pCt. Flüssigkeit zugegen.

3. Dass auch beim Schwein in der ersten Zeit nach dem Fressen ein amylolytisches Verdauungsstadium besteht, währenddessen Zucker und Milchsäure gebildet wird.

4. Dass aber auch während dieses Stadiums schon Eiweiss in den löslichen Zustand übergeführt wird. Dies geschieht wahrscheinlich unter der Einwirkung der Säure und unter Einfluss lebender Fermente.

5. Dass aber in diesem Stadium kein Pepton gebildet wird.

6. Dass der Speichel des Schweins und damit sein Mageninhalt ein gut wirkendes diastatisches Ferment enthält.

7. Dass zu Anfang der Verdauung gar kein oder so wenig Pepsin vorhanden ist, dass es nicht in Betracht kommen kann.

8. Dass zu Anfang der Verdauung der Mageninhalt nur so wenig Salzsäure enthält, dass dieselbe mit den gewöhnlichen Farbenreactionen nicht nachweisbar ist.

9. Dass in der ersten Verdauungsstunde der Säuregrad des Mageninhalts ein geringer ist (0,05 pCt.).

2. Versuch. Das Schwein erhielt nach 36stündigem Hungern 860 Grm. Hafer, den es in einer Stunde aufnahm. 2 Stunden nach der Mahlzeit wurde das Thier getödtet. Der Magen wurde rasch der Bauchhöhle entnommen und sofort, im lebenswarmen Zustande, geöffnet. Der Inhalt betrug 1882 Grm. und reagirte überall sauer und war verhältnissmässig trocken (75 pCt. Wasser).

Nun wurde der Inhalt in die vorn angegebenen drei Portionen getrennt und jede Portion für sich untersucht. Dieselben wurden gut ausgepresst; der ausgepresste Saft wurde filtrirt und auf Zucker und lösliches Eiweiss (incl. Pepton)

und auf Pepton untersucht. Man fand: 1) im Cardiatheil 0,8 pCt. Zucker, 0,4 pCt. Eiweiss, kein Pepton; 2) im mittleren Magentheil 0,62 pCt. Zucker, 0,4 pCt. Eiweiss, 0,3 pCt. Pepton; 3) in der Pylorusregion 0,36 pCt. Zucker, 0,4 pCt. Eiweiss, 0,42 pCt. Pepton.

Der Säuregrad betrug, auf HCl berechnet, im Inhalt des Cardiatheils 0,05, in dem der Pylorusregion 0,2 pCt. Die erstgenannte Flüssigkeit zeigte nur Milchsäure-, die letztere Milch- und Salzsäurereaction.

Auf Kleister übte die Magenflüssigkeit der Cardiaregion einen bedeutenden verdauenden Einfluss. Der Zuckergehalt von 5 Ccm. derselben steigerte sich, als dieselben mit etwas Kleister in den Brütöfen eingestellt wurden, um das 6 fache. Der Saft der Pylorusregion verzuckerte nicht; dagegen löste derselbe etwas Fibrin, während dies bei dem Cardiasaft nicht der Fall war.

Die analytische Untersuchung ergab eine bedeutende Verdauung der aufgenommenen Nahrung. Es waren bereits 50 pCt. der Nährstoffe gelöst.

3. Versuch. Dieses Versuchsthier erhielt 750 Grm. Hafer und wurde 3 Stunden post coenam getödtet. Der Mageninhalt betrug 1150 Grm., war trocken (71 pCt. Wasser) und reagirte überall sauer.

In der filtrirten Magenflüssigkeit fand man: 1) im Cardiatheil 0,127 pCt. Säure, 0,625 pCt. Zucker; 2) in der Mitte 0,19 pCt. Säure, 0,625 pCt. Zucker; 3) in der Pylorusregion 0,247 pCt. Säure, 0,274 pCt. Zucker; in den drei Portionen durchschnittlich 0,5 pCt. Eiweiss und 0,6 pCt. Pepton,

Nur in der Pylorusregion war neben der Milchsäure- deutliche Salzsäurereaction nachzuweisen. Die Flüssigkeiten der beiden anderen Regionen zeigten nur Milchsäurereaction. Ebenso fand man in diesen nur Spuren Pepton, während die Pylorusflüssigkeit sehr deutliche Peptonreaction zeigte.

Versuche über das verdauende Vermögen der Flüssigkeiten ergaben: Die Flüssigkeiten der Cardiaregion und der mittleren Magengegend verzuckerten Stärke sehr stark, ihr Zuckergehalt vermehrte sich über Nacht um das 6 fache. Dagegen lösten dieselben kein Fibrin, und dies selbst dann nicht, wenn eine 0,2 proc. Salzsäure zugesetzt wurde. Die der Pylorusgegend entnommene Flüssigkeit löste etwas Fibrin und wirkte auf Kleister nicht ein.

4. Versuch. Nach 24 stündigem Hungern erhielt das Thier 500 Grm. Hafer vorgelegt. 4 Stunden nach beendeter Mahlzeit wurde dasselbe getödtet.

Der dem lebenswarmen Magen entnommene, in die vorn genannten drei Portionen getrennte Inhalt war ziemlich trocken (65 pCt. Wasser), wog 620 Grm. und reagirte überall sauer.

Die Untersuchung des ausgepressten und filtrirten Saftes ergab: 1) im Cardiatheil 0,07 pCt. Säure, 0,37 pCt. Zucker, 0,6 pCt. Eiweiss, 0,4 pCt. Pepton; 2) im mittleren Theil 0,14 pCt. Säure, 0,28 pCt. Zucker, 0,6 pCt. Eiweiss, 0,4 pCt. Pepton; 3) im Pylorustheil 0,23 pCt. Säure, 0,12 pCt. Zucker, 0,6 pCt. Eiweiss, 0,4 pCt. Pepton.

Der 2., 3. und 4. Versuch beweisen, dass der Säuregehalt des Mageninhalts in der 3. und 4. Verdauungsstunde bedeutend ansteigt, und zwar besonders in dem Pylorustheil. Hier ist der Säuregehalt von 0,05 auf 0,23 pCt. gestiegen. Die mit der Magenflüssigkeit an-

gestellten Reactionen thaten dar, dass in der Pylorusflüssigkeit neben der Milchsäure die Salzsäure bereits in nachweisbaren Mengen zugegen ist, während der Cardiaheil noch gar keine Salzsäure enthält. Der Säuregrad seines Inhalts ist noch ein geringer (0,07—0,1 pCt.)

Die Cardiaflüssigkeit verzuckerte Kleister in hohem Grade, die Pylorusflüssigkeit that dies fast nicht.

Fibrin wurde von der Pylorusflüssigkeit etwas angegriffen, von der Cardiaflüssigkeit nicht.

Der Zuckergehalt des Mageninhalts war bedeutend gesunken. Von 0,8 zuerst auf 0,6, dann auf 0,37 pCt. im Cardiasack, und auf 0,12 pCt. im Pylorustheil.

5. Versuch. 6 Stunden nach Beendigung der Aufnahme von 750 Grm. Hafer wurde das Schwein getödtet. Der Magen enthielt nur 780 Grm., deren Wassergehalt 65 pCt. betrug. Ein Theil des genossenen Futters war bereits in den Dünndarm übergetreten und schon bis gegen das Ende desselben vorgerückt. Die Reactionsverhältnisse im Magen waren überall dieselben und reagirte der Mageninhalt selbst direct an der Cardia schon sauer. Auch der Säuregrad war im ganzen Magen derselbe, er betrug 0,28 pCt. Die aus der linken Magenhälfte gewonnene Flüssigkeit zeigte aber nur Milchsäure-, die aus der Pylorushälfte erhaltene auch Salzsäurereactionen. Die erstere Flüssigkeit enthielt ziemlich viel Zucker (0,4 pCt.) und wenig Pepton (0,6 pCt.), die letztere mehr Pepton (0,85 pCt.) und wenig Zucker (0,08 pCt.). Auch bezüglich des Gehalts an löslichen Eiweisskörpern waren beide Flüssigkeiten sehr verschieden unter einander. Die Cardiaflüssigkeit war reich, die Pylorusflüssigkeit arm an denselben. Die Eiweissverdauung ist also in der Pylorushälfte viel weiter vorgeschritten als links; in ihr trifft man mehr Pepton, in der Cardiaflüssigkeit mehr Syntonin, Hemialbumose etc. Die geringen flüssigen Eiweissmengen in der Pylorusregion finden zum Theil auch ihre Erklärung darin, dass hier schon stark resorbirt wird, während dies links nicht der Fall ist.

Die Prüfung auf den Fermentgehalt und die Verdauungsfähigkeit beider Flüssigkeiten ergab folgendes Resultat: Die Cardiaflüssigkeit verzuckerte Kleister. Eine kleine Portion derselben, welche mit Kleister in den Thermostat eingestellt wurde, zeigte eine Vermehrung ihres Zuckergehalts um das 3fache. Die Pylorusflüssigkeit hatte fast keinen Einfluss auf Kleister. Dagegen löste sie Fibrin, während die erstere dies nicht vermochte. Auch bei HCl-Zusatz blieb die Lösung des Fibrins aus. Aus dieser Thatsache folgt, dass linkerseits wenig oder kein Pepsin zugegen ist.

Die Verschiedenheiten in der diastatischen Wirkung sind die Folgen des verschiedenen Säuregehalts. Die angestellten Säurereactionen ergeben, dass in der Cardiahälfte nur Milchsäure-, in der Pylorushälfte auch Salzsäurereaction zugegen war.

Aus den fünf ersten Versuchen ergibt sich, dass der Mageninhalt anfangs im ganzen Magen ziemlich die gleichen Eigenschaften erkennen

lässt, dass aber von der 2.—3. Verdauungsstunde ab eine Scheidung desselben in zwei mit verschiedenen Eigenschaften ausgestattete Portionen, von denen die eine in demjenigen Theil des Magens sitzt, welcher dem Schlunde zugewandt und mehr dorsalwärts gelagert ist, während die andere den tiefer und den gegen den Pylorus gelegenen Theil ausfüllt.

Der Inhalt des Cardiatheils enthält nur Milchsäure und nur geringe Mengen oder gar keine Salzsäure, viel gelöste Eiweisskörper, aber nur ganz geringe Mengen Pepton, kein oder so geringe Mengen Pepsin, dass es ohne Belang ist. Dabei besitzt er ein amylolytisches Vermögen, vermag dagegen feste thierische Eiweisskörper nicht zu lösen.

Der Inhalt des Pylorustheils enthält Salzsäure in leicht nachweisbaren Mengen und Milchsäure, wenig Zucker, viel Pepton und viel Pepsin. Er besitzt kein verzuckerndes Vermögen, löst dagegen Fibrin auf.

6. Versuch. Dieses Thier wurde 8 Stunden nach dem beendeten Genuss von 750 Grm. Hafer geschlachtet. Der Mageninhalt war sehr trocken; er reagirte überall stark sauer und betrug 730 Grm. mit einem Wassergehalt von 65 pCt. Der Säuregrad betrug in der Schlundhälfte des Magens 0,33 pCt., in der Pylorushälfte 0,22 pCt. Dabei röthete aber z. B. die Cardiaflüssigkeit Tropäolin und Helianthin nicht, während dies die Pylorusflüssigkeit that. Letztere färbte Dahlia und Methylviolett grünlich, erstere nicht, u. s. w. Es zeigte also die Cardiaflüssigkeit bei höherem Säuregrade nur Milchsäure- und die Pylorusflüssigkeit auch Salzsäurereaction.

Der Gehalt an löslichem Eiweiss war in der Cardiaflüssigkeit bedeutender als in der Pylorusflüssigkeit.

Die Pylorusflüssigkeit enthielt keinen Zucker, die Cardiaflüssigkeit 0,13 pCt.; die letztere enthielt 1,30 pCt. lösliches Eiweiss (0,32 pCt.) und Pepton (0,98 pCt.), die erstere 0,72 pCt. (0,16 Eiweiss, 0,56 Pepton). Die Cardiaflüssigkeit verzuckerte Kleister in bedeutendem Masse, die Pylorusflüssigkeit vermochte dies nicht. 20 Grm. der Cardiaflüssigkeit mit Kleister in den Brütöfen eingestellt, erhöhten ihren Zuckergehalt um das 5fache bei gleichzeitiger Steigerung des Säuregrades. Die Pylorusflüssigkeit löste dagegen Fibrin auf und wandelte dasselbe in Pepton um, was wieder die Cardiaflüssigkeit nicht that. Fibrin, welches mit der letzteren Flüssigkeit 20 Stunden im Thermostat stand, blieb unverändert. Bei Zusatz von Salzsäure, so dass die Flüssigkeit 0,2 pCt. von derselben enthielt, quoll das Fibrin auf, wie in Säure überhaupt, ging aber nicht in flüssiges Pepton über.

Der vorstehende Versuch ergibt, dass auch 8 Stunden nach der Mahlzeit noch ein bedeutender Unterschied zwischen dem Inhalt der linken und rechten Magenabtheilung nachweisbar ist. Der Unterschied bestand wesentlich darin, dass die rechte Magenabtheilung bedeutende

Mengen Pepsin und Salzsäure enthielt, welche linkerseits fehlten oder in unbedeutenden Mengen zugegen waren. Die Pylorusflüssigkeit löste Fibrin, die Cardiaflüssigkeit nicht; letztere verzuckerte Kleister, erstere nicht.

7. Versuch. Nach 36stündigem Hungern erhielt das Thier 1000 Grm. Hafer. 10 Stunden nach der Mahlzeit wurde es getödtet. Der Mageninhalt betrug 1070 Grm., mit einem Wassergehalt von 70 pCt., und reagirte durchgängig sauer. Der Säuregrad betrug links 0,24, rechts 0,29 pCt. Dabei zeigte die Cardiaflüssigkeit nur Milchsäure-, die Pylorusflüssigkeit auch Salzsäurereaction. Die erstere enthielt 0,4, die letztere 0,1 pCt. Zucker. Die Cardiaflüssigkeit besass noch amylytisches Vermögen, die Pylorusflüssigkeit nicht. 20 Ccm. der Cardiaflüssigkeit, welche 12 Stunden lang mit Kleister in dem Verdauungs-Ofen standen, steigerten ihren Zucker- und Säuregehalt; bei der Pylorusflüssigkeit war dies nicht der Fall. Dagegen löste letztere Fibrin auf und wandelte dasselbe in Pepton um, während dies die Cardiaflüssigkeit nur in ganz unbedeutendem Masse vermochte. Die Cardiaflüssigkeit enthielt 0,8 pCt. Eiweiss und 0,9 pCt. Pepton, die Pylorusflüssigkeit 0,12 pCt. Eiweiss und 0,9 pCt. Pepton, und das Gemisch beider Flüssigkeiten enthielt 1,3 pCt. Eiweiss plus Pepton. Die Cardiaflüssigkeit ist demnach auch in diesem Falle wieder reicher an Eiweisskörpern, als die Pylorusflüssigkeit.

8. Versuch. Dieses Versuchsthier wurde 12 Stunden nach dem Genuss von 1000 Grm. Hafer getödtet. Der Magen war noch ziemlich angefüllt. Der Inhalt betrug 970 Grm., mit einem Wassergehalt von 65 pCt., und reagirte sauer; sein Säuregrad war rechts und links ziemlich gleich und betrug, auf HCl berechnet, 0,2 pCt. Der Inhalt der Cardiahälfte zeigte keine Tropäolin-, Dahlia-, Methylviolett- etc. Reaction, wohl aber der Inhalt der Pylorushälfte, ein Zeichen, dass nur hier Salzsäure in bedeutenderen Mengen vorhanden ist. Beim Stehen beider Flüssigkeiten über Nacht stieg der Zuckergehalt nur in der Cardiaflüssigkeit, indem gelöste Stärke in Zucker umgewandelt wurde, in der Pylorusflüssigkeit dagegen nicht. Die erstere, welche 0,15 pCt. Zucker enthielt, wirkte noch verzuckernd auf Kleister (bei einem 16 Stunden dauernden Digestionsversuch steigerte sich der Zuckergehalt um das 10fache), die letztere, welche zuckerfrei war, vermochte dies nicht. Auf Fibrin wirkten beide Flüssigkeiten lösend und peptonisirend, die erstere aber erst nach HCl-Zusatz ausgiebig.

Der bei Schwein 5, 6, 7 bestehende Unterschied des Eiweissgehalts beider Flüssigkeiten war bei Schwein 8 nicht mehr so bedeutend. Man fand 1,27 pCt. Eiweiss plus Pepton.

Die Versuche 7 und 8 beweisen, dass der zwischen dem Inhalt der Cardia- und Pylorushälfte bestehende Unterschied etwa von der 8. oder 9. Verdauungsstunde ab allmählich verschwindet. Es besteht zwar noch ein Unterschied, derselbe ist aber geringer. Die Cardiaflüssigkeit löst bereits Fibrin auf und verzuckert nur noch wenig; immerhin enthält sie weniger Salzsäure und Pepsin als die Pylorusflüssigkeit, welche gar nicht verzuckernd wirkt.

Schlussbetrachtung.

Die vorstehend in ihren Resultaten niedergelegten Versuche haben zu höchst interessanten und zum Theil überraschenden Ergebnissen geführt. Sie gewähren ganz neue Einblicke in das Capitel der Magenverdauung der Haussäugethiere und fordern zu weiteren Untersuchungen auf. Sie beweisen, dass die von uns gewählte und schon beim Pferde in Anwendung gebrachte Untersuchungsmethode grosse Vortheile hat. Weder durch Versuche mit Anlegung von Fisteln, noch durch solche mit der Magenpumpe, noch durch Experimentiren mit künstlichem Magensaft resp. den Extracten der verschiedenen Schleimhautregionen konnten so genaue Aufschlüsse über den thatsächlichen Ablauf der Magenverdauung erlangt werden, als durch unsere Methode. Sie allein gestattet, sich darüber zu orientiren, wie die Magenverdauung an jeder Stelle des Magens abläuft, und darüber Aufschluss zu erlangen, ob Verschiedenheiten in den Verdaungsprocessen in den einzelnen Magenregionen existiren.

Die überraschenden Resultate unserer Experimente beweisen von Neuem, wie vorsichtig man mit dem Generalisiren und mit dem Theoretisiren sein muss. Sie thun dar, dass es keineswegs überflüssig ist, dieselben Vorgänge bei verschiedenen Thierarten zu studiren, und dass wir auf dem richtigen Wege sind, wenn wir die Verdauungsvorgänge bei jeder einzelnen Hausthierart einer mehr oder weniger eingehenden Prüfung unterziehen.

Sie beweisen aber auch, dass die von uns in einem früheren Artikel gegen die Anschauung, dass in der linken Magenabtheilung des Pferdes andere Vorgänge statthätten als rechts, geltend gemachten Bedenken hinfällig sind. Alles, was wir dort anführten, erschien theoretisch ganz unwiderleglich; das Experiment hat aber bewiesen, dass diese Ausführungen auf unrichtigen Voraussetzungen beruhten.

Wir wollen nicht unterlassen, zu bemerken, dass im Magen des Menschen wegen mancher Eigenthümlichkeiten seines Baues die Verdauungsvorgänge wahrscheinlich anders ablaufen als im Schweinemagen, und dies um so mehr, als die Nahrung des Menschen eine ganz andere ist als die des Schweins. Andererseits darf aber auch nicht verkannt werden, dass unter gewissen Verhältnissen die Magenverdauung des Menschen ähnlich ablaufen wird, dass wenigstens, wie wir dies auch beim Pferde nachgewiesen haben, ein längeres amylolytisches Verdauungsstadium besteht. Dies wird namentlich der Fall sein bei dem grössten Theil der zahlreichen Landbevölkerung, bei einem Theil der Arbeiter, bei den Vegetariern, bei den nur Körner

und Früchte essenden Sonderlingen u. s. w. Wie oft besteht die Mahlzeit des Menschen fast nur aus Brot und Kartoffeln! In diesem Falle wird die Magenverdauung des Menschen zweifellos der des Pferdes und Schweins ähnlich, wenn auch keineswegs gleich sein. Letzteres ist schon deshalb nicht der Fall, weil der Mensch nicht annähernd so viel Speichel secernirt als die genannten Thiere, und weil sein Magen nicht mit gleichen Cardia- oder Schlundsäcken ausgerüstet ist.

Die Resultate unserer Untersuchungen geben, wie ausdrücklich bemerkt sein soll, vorläufig nur und allein Aufschluss darüber, wie die Magenverdauung bei Körnerfutter, und zwar bei sogen. trockener Fütterung vor sich geht. Dass sie bei Fütterung mit Fleisch, mit gekochten Nahrungsmitteln, mit Schlempe u. dgl. gewisse Abänderungen erfahren muss, ist ja ganz selbstverständlich.

Die Resultate unserer 8 Experimente beziehen sich im Wesentlichen auf den Ablauf der Verdauung, auf die Reactionsverhältnisse des Mageninhalts, den Säuregrad, die Säurenatur und den Fermentgehalt desselben, auf die Frage der Magensaftquellen, die Frage der Dauer der Magenverdauung, die Magenbewegungen, die Beschaffenheit des Mageninhalts und die Ausgiebigkeit der gesammten Magenverdauung.

1. Nach den Ergebnissen unserer Experimente läuft die Verdauung der Körner beim Schwein in zwei bis drei Perioden, und zwar in folgender Weise ab:

a) Während der Mahlzeit und 1—2 Stunden nach derselben findet wesentlich nur die Verdauung der Stärke statt. Diese wird in lösliche Stärke, Dextrin und Zucker umgewandelt. Gleichzeitig beginnt die Milchsäuregährung und ein nicht unbedeutender Theil des Zuckers geht in Gährungsmilchsäure über. Ob daneben noch andere Gährungsvorgänge ablaufen und ob auch Cellulose in Gährung übergeführt wird, ob also z. B. die Sumpfgasgährung statthat, entzieht sich zunächst noch unserer Kenntniss. Dass eine Durchfeuchtung, Erweichung, Quellung der Nahrungsmittel und Lösung des in denselben vorhandenen und zugänglich werdenden Löslichen vor sich geht, ist selbstverständlich. In den späteren Zeiten dieser Periode werden auch schon Eiweisskörper löslich gemacht, wenn auch nicht peptonisirt.

Die Lösung der leicht umwandlungsfähigen pflanzlichen Albuminate ist unter den vorliegenden Verhältnissen (der Gegenwart bedeutender Milchsäure-

mengen und von gewissen Mikroorganismen) wohl erklärlich; dass sie thatsächlich stattfindet, beweisen unsere Untersuchungen der filtrirten Magenflüssigkeit. Dieselbe enthält stets nicht unbedeutende Mengen löslicher Eiweisskörper; diese können unmöglich nur dem Speichel und dem Magensaft entstammen; ebenso wenig finden sie sich in dem Hafer resp. in Extracten zermahlener Hafers. Demnach müssen dieselben auf dem Wege der Umwandlung unlöslicher Eiweisskörper in lösliche entstanden sein.

Die in vorstehenden Zeilen geschilderte erste Periode der Verdauung, welche wir in Rücksicht darauf, dass in ihr wesentlich Stärke verdaut wird, die amylytische nennen wollen, wird wesentlich bewirkt durch den beim Kauen secernirten und abgeschluckten Speichel. Wie wir bereits in einem früheren Artikel ausführten, besitzt der Speichel des Schweins das saccharificirende Vermögen in hohem Grade. Er kann seine Wirkung im Magen unter den vorliegenden Verhältnissen unbehindert entfalten. Der Speichel ist stark alkalisch, kann demgemäss die etwa im Magen vorhandene Säure neutralisiren. Deshalb reagirt der Mageninhalt anfangs alkalisch. Dies ist in der Nähe der Cardia ziemlich lange Zeit der Fall. Später wird der Mageninhalt sauer; da die Säure aber anfangs wesentlich durch Milchsäure repräsentirt wird, so kann die Amylyolyse auch bei saurer Reaction noch fortschreiten. Ob bei der Amylyolyse im Magen ausser dem Speichel auch noch andere Momente, z. B. Mikroorganismen und Magensecrete in Betracht kommen, ist zweifelhaft, aber nicht unwahrscheinlich. Wir wollen nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass die Schleimhaut der Cardiasäcke des Schweinemagens, welche mit einer ganz besonderen Art von Drüsen ausgestattet ist, stets etwas diastatisches Ferment enthält; ihr Extract wirkt, wie wir früher schon mittheilten, stets, wenn auch in geringem Grade amylytisch. Ob das amylytische Ferment aber in der Schleimhaut producirt wird, oder ob es vom Speichel stammt und nur imbibirt worden ist, vermögen wir zur Zeit noch nicht mit Sicherheit zu unterscheiden, betonen aber, dass wir die Schleimhaut stets 24 Stunden lang auf das Gründlichste ausgewaschen haben, ehe sie extrahirt wurde, dass demnach die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass das Ferment in ihr producirt war, weil das Imbibirte bei so gründlichem Auswaschen wohl entfernt worden wäre.

Was die Ausgiebigkeit der Verdauung in dieser Periode anlangt, so ergiebt sich diese aus den Resultaten der Analyse des Mageninhalts bei dem 2. Versuchsschwein. Dieses Thier hatte 860 Grm. Hafer aufgenommen, d. h. ca. 73 Grm. Faser, 557 Grm. Kohlehydrate,

93 Grm. Eiweiss. An löslichen Nährstoffen waren in diesen Hafermengen ungefähr enthalten 22,5 pCt. Eiweiss. Bei der Analyse fanden wir im Magen ungelöst vor: 47 Grm. Eiweiss; wir hätten aber ungelöst finden müssen: 70,5 Grm. Eiweiss. Demnach sind in den zwei Stunden Verdauungszeit 34 pCt. der unlöslichen Eiweisskörper in lösliche übergegangen.

Bei Fleischfütterung kommt die amylytische Verdauungsperiode selbstverständlich in Wegfall. Uns erschienen aber Experimente mit reiner Fleischfütterung überflüssig; einmal, weil derartige Experimente bei Hunden schon vielfach angestellt worden sind, und dann auch deshalb, weil der Regel nach die Schweine nicht mit animalischer, sondern mit vegetabilischer Nahrung gefüttert werden.

Interessant würde es sein, wenn noch Versuche mit gequollenem Hafer, mit Kartoffeln und anderen Knollengewächsen und mit Gemischen aus Körnern und Wurzelwerk und aus vegetabilischen und animalischen Nahrungsmitteln angestellt würden. Es wird sich dann vielleicht ergeben, dass auch bei diesen Futtermitteln die Verdauungsperioden ähnlich auftreten wie bei Haferfütterung, dass nur Unterschiede in der Zeitdauer der einzelnen Perioden bestehen. Wir hoffen später in dieser Richtung Ergänzungsversuche anstellen zu können und dürften schon im nächsten Jahre hierzu Gelegenheit finden. Zunächst gestatten wir uns aber, im Nachstehenden die mit Haferfütterung ausgeführten Versuche mit ihren Resultaten weiter zu schildern.

b) Nach der amylytischen Verdauungsperiode, welche, wie angegeben, 1—2—3 Stunden, und wenn wir die Dauer der Mahlzeit, die etwa auf $\frac{1}{2}$ —1 Stunde zu schätzen ist, mitrechnen, 2—3—4 Stunden beträgt, folgt nun nicht etwa, wie wir dies in Bezug auf das Pferd früher angegeben haben, im ganzen Magen eine proteolytische Periode, sondern die amylytische Periode dauert in dem Cardiasack resp. in den der Cardia nahe und dorsal, also höher als die Belagzellregion gelegenen Partien noch lange Zeit fort, während sie nur in den tiefer und dem Pylorus näher liegenden Partien (der Fundusdrüsen- und Pylorusregion) allmählich in die rein proteolytische Periode übergeht. Die zweite Verdauungsperiode ist also eine Periode der gemischten, der proteo- und amylytischen Verdauung. In den Cardiasäcken besteht aber neben der Amylyolyse noch Proteolyse.

Der Milchsäuregehalt ist in den Cardiasäcken ein so bedeutender geworden, dass die Lösung der Eiweisskörper statthaben kann. Dabei wissen wir, dass auch im Speichel Spuren eines peptischen Ferments enthalten sind. Auch ist anzunehmen, dass etwas von dem in der rechten Magenhälfte producierten Pepsin nach der linken Seite gelangt. Wir müssen dabei aber gestehen, dass es uns trotz alledem noch etwas räthselhaft bleibt, durch welche Kräfte resp. Fermente die Proteolyse in dem nicht unbedeutenden Grade, in welchem sie im Cardiasack

thatsächlich stattfindet, bewirkt wird. Der Gehalt der hier vorkommenden Magenflüssigkeiten an Pepsin ist so unbedeutend, dass dieselben, wie die Experimente ergeben, nicht einmal Fibrin und noch viel weniger gekochtes Eiweiss zu lösen vermögen. Die pflanzlichen Eiweisskörper müssen demnach in viel höherem Grade löslich und verdaulich sein als die thierischen, oder es müssen im Magen uns noch unbekanntere verdauungsbefördernde Ursachen gegeben sein, welche bei den künstlichen Verdauungsversuchen fehlen. Diese Bemerkungen gelten auch in Bezug auf die während der amylytischen Periode gegen deren Ende auftretende Proteolyse.

In Bezug auf die in der zweiten Verdauungsperiode ablaufende Proteolyse ergeben unsere Versuche, dass in den höheren Verdauungsstunden in der Cardiahöhle mehr gelöste Eiweisskörper und unter Umständen auch mehr Pepton vorhanden ist als in der Pylorushälfte, trotzdem in letzterer doch bedeutend mehr Eiweiss gelöst wird als in ersterer. Diese Thatsache erklärt sich, wie vorn schon betont wurde, vielleicht daraus, dass die Schleimhaut des Pylorustheils stärker resorbiert als die der Cardiasäcke; sie ist mit Zotten versehen und reich an Lymph- und Blutgefässen. Vielleicht aber erklärt sich dies auch daraus, dass Flüssigkeiten nach dem Duodenum fliessen.

Das vorstehend markirte Versuchsergebniss, welches darthut, dass während der zweiten Verdauungsperiode in den der Cardia nahe liegenden Theilen des Magens andere Verdauungsvorgänge stattfinden, als in den dem Pylorus zugewandten Regionen, hat uns überrascht. Wir waren früher der Meinung, dass eine derartige Scheidung des Mageninhalts nur kurze Zeit und zwar nur während und unmittelbar nach der Mahlzeit bestehen könne, dass aber sehr bald, veranlasst durch die Bewegungen des Magens und die dadurch bewirkten Bewegungen des Inhalts desselben eine vollständige Durchmischung des letzteren eintreten müsse, und dass auch schon in Folge der nothwendig statthabenden Diffusionsvorgänge eine gewisse Gleichmässigkeit der gesammten Magenflüssigkeit um so mehr erzielt werden müsse, als bekanntlich saure Flüssigkeiten sehr lebhaft diffundiren. Unsere Versuche beweisen die Unrichtigkeit dieser Annahme. Sie zeigen vielmehr, dass in dem bei Fütterung von rohen Körnern ziemlich trockenen Mageninhalt viele Stunden lang ein scharfer Unterschied zwischen dem Inhalt der Schlund- und dem der Pylorushälfte des Magens bestehen bleibt, indem der erstere nur Milchsäure, der letztere neben Milchsäure noch reichlich Salzsäure enthält. Der Säuregrad kann unter Umständen links höher sein als rechts, trotzdem aber bleibt der Unterschied in der Säurenatur bestehen.

Man ersieht aus Vorstehendem, dass wir Recht hatten, wenn wir früher angaben, dass im Magen an keiner Stelle längere Zeit neutrale oder alkalische Reaction herrsche, wie dies von dem Schlundsack des Pferdemagens behauptet worden war; dass wir aber mit Unrecht annahmen, dass die Säureverhältnisse im ganzen Magen dieselben seien. Unsere früheren Prüfungen waren insofern mangelhaft, als sie nur mit dem Reagenzpapier angestellt worden waren. Mit den sonstigen Reagenzien (Tropäolin, Helianthin, Cyanin, Rothwein, Eisentinctur, Methylviolett, Dahlia, Aether u. s. w.) hatten wir zwar die Magenflüssigkeit überhaupt, nicht aber die der einzelnen Abschnitte geprüft. Wir haben überhaupt früher auch bei den Untersuchungen auf Zucker, Stärke, Eiweiss, Pepton etc. stets den ganzen Mageninhalt gemischt und das Gemisch analysirt; dies war, wie sich jetzt ergeben hat, fehlerhaft. Wir möchten hierauf alle künftigen Untersucher besonders aufmerksam machen. Soweit uns bekannt, ist die von uns eingeschlagene Untersuchungsmethode, welche den Inhalt der einzelnen Magenregionen zum Gegenstand der Analyse macht und dabei den Gehalt desselben an Säure, Zucker, gelöstem und ungelöstem Eiweiss, Pepton etc. zu den verschiedenen Verdauungsstunden feststellt, vor uns noch niemals in Anwendung gelangt.

Die Dauer der zweiten Verdauungsperiode, in welcher in der Cardiahälfte wesentlich Stärke, in der Pylorushälfte wesentlich Eiweiss verdaut wird, ist offenbar verschieden und nicht unbedeutend. Sie beginnt ungefähr in der 3. Verdauungsstunde und scheint etwa bis zur 9.—12. anhalten zu können.

Beachtenswerth dürfte auch noch sein, dass in dem Falle, wenn der Mageninhalt zufällig sehr viel Flüssigkeit enthält, die Unterschiede der einzelnen Magenabtheilungen mehr oder weniger sich verwischen. Wir sahen dies z. B. bei einem Pferde, welches einen sehr wasserreichen Mageninhalt besass, trotzdem es nur trockene Körner gefressen und die Aufnahme von Trinkwasser versagt hatte. Es lagen hier offenbar krankhafte Verhältnisse vor.

c) Der Periode der gemischten Verdauung muss naturgemäss die der reinen Proteolyse mit Sistiren der Amylyolyse folgen. Diese Verdauungsperiode tritt bei anderen Fütterungen sicherlich auch ein. Ob dies aber auch bei trockener Körnerfütterung der Fall ist, erscheint uns noch zweifelhaft. Bei dieser scheint niemals oder erst nach 12—14 Stunden, d. h. in einer Zeit, welche normaliter nicht zwischen zwei Mahlzeiten liegt, eine derartige Durchmischung des Mageninhalts vorzukommen, bei welcher auch in der Cardiahöhle solche Mengen von Salzsäure zugegen sind, dass sie die Amylyolyse hinderten. Es ist nach unseren Versuchen ganz zweifellos, dass schon in der 2. Verdauungsperiode im ganzen Magen Proteolyse abläuft. Es steht aber ebenso zweifellos fest, dass während der ersten Zeit dieser Periode noch bedeutende Amylyolyse im Cardiasack statthat

und dass dieselbe auch in den späteren Zeiten wenigsten noch statthaben kann. Der Zuckergehalt des Inhalts des Cardiasackes nimmt in den späteren Verdauungsstunden ganz bedeutend ab (wir fanden beim 1ten Schwein 0,8, beim 2ten 0,6, beim 3ten 0,30, beim 4ten 0,57, beim 5ten 0,4, beim 6ten 0,1, beim 7ten 0,4, beim 8ten 0,15 pCt. Zucker), ein Zeichen, dass die Amylolyse sich vermindert. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass sie sistirt. Vielleicht wird mehr Gelöstes nach der Pylorushöhle und dem Darm übergeführt und resorbirt, weil der Inhalt weicher und flüssiger wird u. dgl. Jedenfalls steht soviel fest, dass die Flüssigkeit, welche sich im Cardiasack befindet, selbst in der 12. Verdauungsstunde noch das Vermögen besitzt, amylytisch zu wirken, während dies der Pylorusflüssigkeit schon von der 2. Verdauungsstunde an abgeht. Die Cardiaflüssigkeit vermag in jeder bis zur 12. Verdauungsstunde noch Kleister in Dextrin und Zucker umzuwandeln. In der 12. Verdauungsstunde dürfte aber die Grenze der gemischten Periode gegeben sein, weil wir constatirten, dass die Cardiaflüssigkeit in dieser Stunde schon Fibrin löste und peptonisirte, wenn auch langsam und geringgradig. Eine kurze Zeit darauf dürfte das amylytische Vermögen erloschen sein. Bei knapperer Mahlzeit, geringerer Speichelsecretion etc. tritt natürlich das proteolytische Stadium früher ein.

2. Die vorgenannten Resultate beweisen die Richtigkeit unserer in einem früheren Artikel gemachten Angaben über die Function der Magendrüsen des Schweins.

Wir betonten, dass in der sogen. Cardiahöhle und dem kleinen Blindsack ganz besondere Drüsen vorhanden sind, welche morphologisch weder mit den Fundus- noch mit den Pylorusdrüsen übereinstimmen. Die functionelle Bedeutung dieser Drüsen vermochten wir nicht zweifellos darzuthun. Auf Grund der mit Extracten derselben angestellten Untersuchungen glaubten wir aber bestimmt behaupten zu können, dass dieselben an der Säureproduction sicherlich gar nicht und an der Pepsinbildung höchstwahrscheinlich nicht oder nur ganz unbedeutend theilhaftig seien. Diese Behauptung wird durch unsere neuerlichen Versuche bestätigt und kann nunmehr als unbestreitbare Thatsache angesehen werden.

Wenn die betreffenden Drüsen Salzsäure producirt, so hätte man diese Säure schon kurz nach der Nahrungsaufnahme in der Cardiahöhle und auf der Schleimhaut daselbst finden müssen; dies war aber selbst nach vielen Stunden noch nicht der Fall. Würden sie Pepsinbildner sein, dann müsste doch wenigstens nach mehreren Stunden so viel Pepsin in dem Inhalt der Cardiahöhle nach-

zuweisen sein, dass die aus demselben ausgepresste Flüssigkeit, wenn ihr die nöthige Menge Salzsäure zugesetzt würde, Eiweiss, z. B. Fibrinflocken, in kürzerer Zeit löste. Dies that die Flüssigkeit aber nicht. Sie erlangte erst peptonisirende Eigenschaften in der 10. und 12. Verdauungsstunde.

Welche Functionen die Cardiadrüsen nun thatsächlich haben, bleibt zunächst noch unaufgeklärt. Uns scheint es nicht unwahrscheinlich, dass sie neben Schleim- und anderen Körpern noch ein diastatisches Ferment produciren.

Es soll an dieser Stelle ausdrücklich betont werden, dass wir mit diesen Bemerkungen keineswegs der Anschauung Heidenhain's entgegentreten wollen, welcher annimmt, dass die Pylorusdrüsen an der Pepsinbildung theilhaftig sind. Diese Frage lassen wir dahingestellt sein. Wir betonen nur, dass die Cardiadrüsen des Schweins an der Säurebildung garricht und an der Pepsinbildung ebenfalls nicht oder in so geringem Masse theilhaftig sind, dass dies nicht in Betracht kommen kann. Die Cardiadrüsen sind aber von den Pylorusdrüsen wohl zu unterscheiden. Die Fundusdrüsen produciren Säure und Pepsin in bedeutender Menge. Die Pylorusdrüsen produciren vielleicht Pepsin, aber keine Säure.

3. Was die grobe Beschaffenheit des Mageninhalts anbelangt, so wollen wir nur darauf hinweisen, dass derselbe bei Körnerfutter in der Regel verhältnissmässig trocken ist und gewöhnlich nur 60—70 pCt. Wasser enthält.

4. Die Reaction des Mageninhalts ist nur während und ganz kurze Zeit nach der Mahlzeit in den der Cardia nahe liegenden Inhaltmassen des Magens alkalisch. Bald darauf wird sie im ganzen Magen sauer.

5. Die Dauer der Magenverdauung beim Schwein anlangend, so geht aus unseren Versuchen hervor, dass sich dieselbe nach der nächsten Mahlzeit richtet. Ein Theil des Mageninhalts wird bei einer mässigen Mahlzeit ca. 3—4 Stunden nach derselben nach dem Darmcanal geschafft, was beim Pferde oft schon während des Fressens geschieht. Ein Theil bleibt aber bis zur nächsten Mahlzeit im Magen liegen und wird von den neu ankommenden Massen allmählich verdrängt. Noch nach 24 und 36 Stunden findet man Inhalt im Magen. Am lehrreichsten ist in dieser Beziehung der Versuch 1. Das betreffende Schwein hatte 24 Stunden vor der letzten Mahlzeit Kalbsknochen mit Kleie erhalten. Dasselbe wurde 1 Stunde nach der letzten Mahlzeit getödtet. Den Magen fand man zu ca. $\frac{5}{6}$ mit dem soeben gefütterten Hafer und zu ca. $\frac{1}{6}$ (am Pylorus) mit der 24 Stunden früher gefütterten Kleie und den Kalbsknochen gefüllt. Wäre die letzte Mahlzeit reichlicher gewesen, dann wäre vielleicht der ganze alte

Inhalt nach dem Darm verdrängt worden. Jedenfalls beweist dieser Versuch, dass unter normalen Verhältnissen, wo die Mahlzeiten in ca. 6—10 Stunden aufeinander folgen, bei jeder Mahlzeit noch Reste der früheren im Magen vorhanden sind, wenn die letztere nicht aus ganz leicht verdaulichen Stoffen bestand.

6. In Bezug auf die Bewegungen des Mageninhalts ergeben unsere Versuche, dass die früheren Vorstellungen von einer rotirenden Bewegung desselben oder von einer gründlichen Durchknetung und Durchmischung unrichtig sind. Nach unserer Meinung füllt sich der Magen beim Fressen ungefähr so, wie dies beim Anfüllen desselben resp. des Darmes mit Wurstmassen durch den Fleischer geschieht, etwas modificirt durch die Lagerungsverhältnisse des Magens. Die zuerst eintretenden Massen liegen an der Cardia, sie werden durch die nachrückenden Massen immer weiter gegen den Pylorus geschoben u. s. w. Das in der letzten Zeit, vor Beendigung der Mahlzeit eingetretene Futter bleibt also in der Nähe der Cardia liegen, bis es allmählich nach dem Pylorus vorrücken kann. Die geschieht aber sehr langsam.

Nach Obigem ist es klar, dass dabei jedes gut gekaute und mit viel Speichel abgeschluckte Futter die amylytische Periode durchmacht. Das zuerst Genossene, welches von dem Nachrückenden rasch nach hinten geschoben wird, durchläuft diese Periode in den dem Pylorus zu liegenden Theilen, bis sich dort allmählich genug Salzsäure ansammelt, um die Amylyse zu hindern. Das zuletzt Genossene unterliegt der Amylyse nur in der Cardiahöhle, in welcher es längere Zeit verweilt. Beim Vorrücken dieser Massen in die Pylorushälfte, welches ja erst spät geschieht, findet sich dort schon so viel Salzsäure, dass die Amylyse sofort sistirt.

7. Der Säuregrad¹⁾ des Mageninhalts steigt allmählich an. Unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme ist ein Theil des Mageninhalts (an der Schlundeinmündung) noch alkalisch, der andere schwach sauer. Einige Zeit später ist der ganze Inhalt schwach sauer (0,02 bis 0,05 pCt.); nunmehr steigt der Säuregrad, und zwar in der Pylorushälfte rascher als in den Cardiasäcken, so dass in der 3. Verdauungsstunde links 0,07, rechts 0,2 pCt. zu constatiren waren. Allmählich wird der Säuregrad auch links höher und unter Umständen bedeutender als rechts. Normaliter scheint derselbe 0,3 pCt. in beiden Magenhälften selten zu übersteigen.

¹⁾ Derselbe ist stets durch Titiren bestimmt und auf HCl berechnet worden. Bei Annahme des Vorhandenseins reiner Milchsäure wäre er ca. 3 mal höher anzunehmen als berechnet.

8. Die Säurenatur anlangend, so findet man im ganzen Magen viel Milchsäure, eine Thatsache, auf welche wir schon vor einigen Jahren in Bezug auf das Pferd hingewiesen haben. Salzsäure erscheint erst allmählich in nachweisbaren Mengen im Mageninhalt. Längere Zeit kommt dieselbe nur in der Pylorushälfte vor. In der Cardiahälfte ist sie in den ersten 8—9 Stunden nicht oder nur in Spuren zugegen. Später scheint sie auch hier aufzutreten.

9. An Fermenten findet man im Magen: ein amylolytisches, ein proteolytisches, ein Milchsäure- und ein Labferment. Das amylolytische Ferment ist anfangs im ganzen Magen, später nur links wirksam. Ebenso ist dies mit dem Milchsäureferment der Fall. Das proteolytische Ferment wirkt erst etwa von der 2. Verdauungsstunde ab, und zwar längere Zeit nur in der Pylorushälfte des Magens. Dasselbe scheint anfangs nur hier in wirksamer Menge vorzukommen; später (nach ca. 8 Stunden) scheint es im ganzen Magen vorhanden zu sein und zu wirken.

10. Die Ausgiebigkeit der Magenverdauung ist verschieden, je nachdem, ob die nächste Mahlzeit bald oder später folgt und ob die Mahlzeiten sehr reichhaltig sind oder nicht. Bei rascher Folge reichlicher Mahlzeiten wird natürlich die Magenverdauung bald unterbrochen und muss die Darmverdauung stellvertretend eingreifen. Bei sehr reichlichen Mahlzeiten wird die amylolytische Periode verlängert und die proteolytische abgekürzt, weil der betreffende Säuregrad bei grossen Massen später erreicht wird als bei kleineren. Entscheidend für die Ausgiebigkeit der Amylyolyse ist auch der Kauprocess. Bei gründlichem Kauen trockener Nahrungsmittel wird sie gesteigert, bei wasserreichen und weichen verkürzt. Bei unseren Versuchen zeigte sich die Magenverdauung als recht ergiebig. Eine Darstellung der Ausgiebigkeit der Magenverdauung in Zahlen ist jedoch nur für die ersten Verdauungsstunden resp. nur für diejenige Zeit möglich, während welcher das genossene Futter vollständig im Magen verweilt. Sobald erst der Uebertritt in den Darm erfolgt, können keine reinen Resultate mehr erhalten werden, weil die Masse des Mageninhalts nicht gleichmässig nach dem Darm geschoben wird. Es ist z. B. möglich, dass die feineren Theile resp. das in Flüssigkeiten fein suspendirte rascher den Magen verlassen als die unlöslichen gröberen und rauheren Massen, dass also z. B. beim Hafer freie Stärke und freies Eiweiss, welches die Haferhülsen verlassen hat, aber noch un-

gelöst ist, den Magen rascher verlässt als die Haferhülsen. Es kann aber auch der umgekehrte Fall eintreten.

Eine Untersuchung und Analyse des Mageninhalts kann nach Vorstehendem niemals reine Resultate geben, sobald die Entleerung nach dem Darm begonnen hat. Wollte man diese dadurch verhindern, dass man hinter dem Pylorus eine Ligatur anlegt, dann würde man erst recht unreine und werthlose Resultate erhalten, weil durch die genannte Operation die Magenverdauung bedeutend gestört werden muss.

Bei zwei Versuchsschweinen, bei denen nichts in den Darm übergegangen war, fand man in Bezug auf die Ausgiebigkeit der Magenverdauung Folgendes: 2 Stunden nach Beendigung einer aus 860 Grm. Hafer bestehenden Mahlzeit waren von den aufgenommenen Nahrungstoffen verdaut: 47 Grm. Eiweiss (i. e. 50 pCt. des Genossenen) und 245,4 Grm. Kohlehydrate oder 44 pCt. der Aufnahme. 3 Stunden nach der Mahlzeit waren bei 750 Grm. genossenen Hafers verdaut: 42 Grm. Eiweiss (53 pCt.) und 250 Grm. Kohlehydrate (52 pCt. der Aufnahme). Bei einem 3. Schwein waren 4 Stunden nach der 500 Grm. betragenden Mahlzeit verdaut: 36 Grm. Eiweiss (68 pCt.) und 165 Grm. Kohlehydrate (52 pCt. der Aufnahme); bei diesem Thiere hatte aber der Uebergang der Nahrungsmittel in den Darm schon begonnen, das Resultat ist also nicht mehr ganz rein. Tabellarisch zeigen sich die Verhältnisse wie folgt:

Aufnahme. Hafer. Grm.	Verdaut:				Verdauungszeit.
	Eiweiss.		Kohlehydrate.		
	Grm.	pCt.	Grm.	pCt.	
860	47	50	245	44	1½ Stunden.
750	42	53	250	52	3½ Stunden.
500	36	68	165	52	4½ Stunden (die Dauer der Mahlzeit [½ Std.] ist mitgerechnet.

Für die späteren Stunden liess sich die Berechnung nur derart anstellen, dass man nach Bestimmung der in dem Magen vorhandenen Fasermenge berechnete, welcher Quantität Hafer die betreffende Fasermenge entsprach, und danach die Verdauung weiterhin feststellte. Wir fanden dann bis zur 12. Stunde hin verdaut: an Eiweiss 50, 58, 60, 70 pCt., und an Kohlehydraten 42, 46, 51, 60 pCt., aber nicht in gerader Linie ansteigend, sondern unregelmässig.

Die nähere Erklärung der Berechnungen und der Bedeutung dieser Zahlen geben wir in einem späteren Artikel, welcher sich mit der

gesamten Magen- und Darmverdauung im Zusammenhang beschäftigt. Ohne die gleichzeitige Abhandlung der Darmverdauung und der Resorption sind die vorstehenden Resultate nicht recht verständlich. Für jetzt genügt es uns, festgestellt zu haben, dass im Magen der Schweine bei reiner Körnerfütterung ungefähr 50 pCt. der in den Körnern enthaltenen Eiweisskörper und stickstofflosen organischen Stoffe gelöst werden. Zweifellos wird die Verdauung bei längerer Andauer (über Nacht) noch beträchtlicher und kann bis auf 60, ja bei den Eiweisskörpern bis auf 70 pCt. ansteigen. Dabei ist aber zu beachten, dass die eigentliche Verdauung der Eiweisskörper nicht so bedeutend ist, wie sie unseren Zahlen nach erscheint. Diese drücken vielmehr nur aus, welche Eiweissmenge gelöst worden ist. Im Hafer sind aber lösliche Eiweisskörper enthalten; diese brauchen demnach nicht verdaut zu werden; dies ist nur bei den unlöslichen nothwendig. Aus dieser Thatsache folgt, dass die Verdauung der Eiweisskörper etwas geringer ist als angegeben.

VI.

Beitrag zu der Lehre von den Kernkörperchen.

Von

Prof. Dr. **Ellenberger.**

Die Lehre von der Bedeutung und den Lebenserscheinungen der Kernkörperchen ist noch sehr unvollständig. Während man bis in die neueste Zeit noch annahm, dass diese Gebilde einfache Bläschen seien, sind vor Kurzem einige Beobachtungen gemacht worden, welche beweisen, dass die Kernkörperchen eine grosse Bedeutung für das Kern- und Zellenleben haben, und dass es verschiedene Arten von Kernkörperchen giebt. In Anbetracht der Unvollständigkeit der Kernkörperchenlehre scheint es mir nicht unberechtigt, nachstehend eine kleine Mittheilung über eine Beobachtung zu machen, welche der Studirende Baum und ich an den Kernkörperchen von Leberzellen angestellt haben. Herr Baum hat in dem 29. Jahresbericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen bereits gewisse Resultate seiner, die Leberzellen betreffenden Untersuchungen mitgetheilt und dabei auch das Verhalten des Kernkörperchens besprochen. Wer sich specieller für die angeregte Frage interessirt, sei auf diesen Artikel verwiesen.

Bei unseren Untersuchungen der Leberzellen und ihrer Kerne constatirten wir in Bezug auf die Kernkörperchen Folgendes: In dem Netzwerk der Leberzellkerne, welche von einer mit knötchenartigen Verdickungen und körnigen Anlagerungen ausgestatteten Membran umgeben sind, findet man neben anderen kleineren, anscheinend soliden Körperchen ein, selten zwei grössere bläschenartige Gebilde, welche sich durch bestimmte Reactionen resp. Tinctionsfähigkeiten von anderen Bildungen der Kernsubstanz unterscheiden. Diese Körperchen, welche wohl den Plasmosomen der Pancreaszellen (Ogata,

Gaule) entsprechen, können sowohl ihre Gestalt als auch ihren Ort wechseln. In der Regel erscheinen dieselben rundlich, zuweilen sind sie jedoch auch eckig, zackig, verbreitert u. s. w. Sie liegen entweder central, oder excentrisch, oder ganz peripher. Unter gewissen Verhältnissen rückt das Kernkörperchen an die Peripherie des Kerns und treibt dessen Membran knospenartig vor. Nach einiger Zeit durchbricht es die Kernmembran und gelangt nach aussen. Der Kern erscheint nunmehr abgeblasst und enthält kein Kernkörperchen mehr; letzteres liegt ausserhalb des Kerns, neben demselben. Ueber die Schicksale, welche das Körperchen hier erfährt, und über die Veränderungen, welche der enucleoläre Kern durchmacht, wird später noch berichtet werden, da die Untersuchungen Baum's über diese Frage noch nicht abgeschlossen sind.

Vorerst kommt es mir nur darauf an, festzustellen, dass sich in den Kernen der Leberzellen Körperchen befinden, welche unter gewissen Verhältnissen, über welche später noch genauer berichtet werden soll, aus den Kernen auswandern. Wir haben alle Stadien dieser Auswanderung genau beobachtet und dieselben zuweilen in einem Gesichtsfelde neben einander gesehen. So fanden wir z. B. Kerne mit centralem und peripherem Kernkörperchen, solche mit kleinen Knospen, in denen je ein Kernkörperchen lag, und solche mit durchbrechendem und auch bereits durchgebrochenem Körperchen in einem Gesichtsfelde neben einander. Allerdings ist dies Vorkommniss selten.

Die vorstehend angegebene Beobachtung ist ein neuer Beweis dafür, dass gewisse Kernkörperchen belebt sind und eine bestimmte Bedeutung für das Zelleben haben. Aus den Beobachtungen von Gaule, Ogata und von uns (l. c.) ergibt sich, dass sie bei der Vermehrung der Zellen eine grosse Rolle spielen. Sie stellen oft den Keim eines neuen Kerns, unter Umständen einer neuen Zelle dar. Man könnte auch annehmen, dass bei dem Vorgange der Auswanderung der Kernkörperchen, der eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Ausstossen des Richtungskörperchens aus der Eizelle hat, die Kernkörperchen nur eine passive Rolle spielten, und dass der Vorgang durch Contractionen des Kernleibes bewirkt würde; dies ist aber nach unserer Ansicht nicht der Fall. Wir werden über die Gründe unserer Anschauung und über die Resultate unserer weiteren Beobachtungen später eingehender berichten.

Soviel möchte ich aber noch erwähnen, dass in der Leber viel-

fach Kerne auftreten, welche kein Kernkörperchen resp. Plasmosom enthalten. In diesen hat sich die Kernkörperchensubstanz nicht zu einem differenten Körper formirt, oder es hat sich das früher vorhandene Plasmosom aufgelöst. In solchen Kernen sammelt sich häufig eine körnige, in ihren Reactionen der Kernkörperchensubstanz gleiche Masse an der Peripherie des Kerns in Form einer Sichel- oder Halbmondfigur an. Diese körnigen Sicheln scheinen den Kernkörperchen gleichartig zu sein und aus belebter, bildungsfähiger Masse zu bestehen. Sie kommen am häufigsten beim Schwein vor, können aber auch bei den anderen Haussäugethieren, wenn auch sehr selten, beobachtet werden.

Zum Schluss will ich nicht unterlassen, zu bemerken, dass die erwähnten Beobachtungen sämmtlich an Leberzellen von Haussäugethieren, speciell von Pferd, Rind, Schaf und Schwein gemacht worden sind, und dass wir bis jetzt noch keine klaren karyokinetischen Vorgänge an den Leberzellen dieser Thiere beobachtet haben, aber noch mit weiteren Untersuchungen über etwa vorkommende karyokinetische Vorgänge beschäftigt sind.

Kleinere Mittheilungen.

Blausäurevergiftung bei Schafen. Von Kreisthierarzt Renner in Crefeld.

Die nachstehende Beobachtung einer Vergiftung von Schafen durch Blausäure dürfte wegen der grossen Zahl der in Betracht kommenden Thiere, besonders jedoch wegen der weiteren Folgen der Vergiftung einer Mittheilung an dieser Stelle werth erscheinen. Die toxikologische Literatur enthält gar keine Casuistik, aus welcher ein nachträgliches tödtliches Erkranken der durch Blausäure Vergifteten bekannt geworden ist; vielmehr wird nach den bisherigen Erfahrungen angenommen, dass eine Blausäurevergiftung, falls sie nicht tödtlich gewesen, ohne dauernde nachtheilige Folgen ihren Abschluss findet. Im vorliegenden Falle sind dagegen einige Zeit nach Aufnahme des Giftes Krankheitserscheinungen beobachtet worden, welche nach Lage der Sache die Möglichkeit eines causalen Zusammenhanges mit der Vergiftung nicht ausschliessen.

Vorausgeschickt sei eine kurze Angabe der örtlichen und übrigen Verhältnisse, unter denen die Vergiftung stattgehabt hat. Seit dem vorigen Jahre ist ein in der Nähe von Crefeld befindliches Etablissement im Betriebe, in welchem das in den zahlreichen Färbereien verbrauchte Seifenwasser behufs Wiedergewinnung des darin enthaltenen Oeles einem chemischen Verfahren unterworfen wird. Ein Abzugsrohr leitet die bei jener Fabrikation verbrauchten Flüssigkeiten in einen unmittelbar an dem Etablissement befindlichen offenen Graben; dieser verläuft längs einem öffentlichen, an beiden Seiten durch Grasflächen begrenzten Wege und nimmt seinen Ausgang in den in der Nähe befindlichen, zum Rhein führenden städtischen Canal. Am 20. Januar 1885 trieb der Schäfer eines zu Neuss wohnenden Schafhändlers seine ca. 120 Häupter zählende Herde auf jene als Weideplätze benutzten Grasflächen. Eine grössere Anzahl Schafe sprang bei dieser Gelegenheit in den beschriebenen Graben und trank, obgleich durch den Schäfer sofort vertrieben, von der im Graben befindlichen Flüssigkeit. Fast unmittelbar darauf stürzten 9 jener Thiere hin und drohten unter heftigen Convulsionen zu ersticken. Eines starb in wenigen Minuten, während die übrigen 8 durch den Schäfer geschlachtet wurden. Die am folgenden Tage von Amts wegen vollzogene Obduction hatte folgendes Ergebniss: „Stark ausgeprägte Todtenstarre des nicht aufgetriebenen Cadavers; Blutgefässe dunkles Blut enthaltend. Magen und Därme, letztere mit Ausnahme einiger entzündlich gerötheten, kleineren Stellen, erschienen äusserlich normal. Das Epithel der Pansenschleimhaut grösstentheils dem Mageninhalt anklebend, da, wo dies nicht der Fall, nur noch lose mit der

Cutis in Zusammenhang befindlich; die Cutis von schmutzig gelblicher Farbe und gelockerter Textur. Die Beschaffenheit der Pansenschleimhaut in toto wie wenn sie dem Einfluss der Siedhitze unterworfen gewesen. Die Schleimhaut des Schlundes und Rachens normal. Die Leber von weicher Consistenz und grosser Blutfülle. Die Lunge mit dunklem Blute überfüllt, ihre Consistenz derb, fast fleischartig. Der Herzmuskel von äusserst schlaffer Structur, in seinen Höhlen dunkles, nicht geronnenes Blut. Die Hirngefässe stark mit dunklem Blute gefüllt; die Hirnsubstanz normal, in den Hirnkammern kein Exsudat.“

Mit Rücksicht auf das plötzliche und hochgradige Erkranken einer grösseren Anzahl von Thieren, sowie nach Massgabe des Sectionsbefundes konnte mit ziemlicher Bestimmtheit die Vermuthung einer durch den Grabeninhalt verursachten, scharf narcotischen Vergiftung ausgesprochen werden. Die durch den hiesigen städtischen Chemiker Hr. Dr. Bücking vollzogene chemische Untersuchung des Magen- und Darminhalts ergab indessen ein negatives Resultat. Zwei Tage nach jenem Vorfall starben wieder 2 Schafe, und von da bis zum 2. April fielen in Zwischenzeiten von 2—4 Tagen im Ganzen noch 43 Schafe und 21 Lämmer. Gleichzeitig wurde bei einer grösseren Zahl eine auffällige Ernährungsstörung wahrgenommen, obgleich die Fütterungsverhältnisse sich als vollständig normal erwiesen. Die erkrankenden Thiere zeigten vorwiegend pneumonische Erscheinungen, sie athmeten beschleunigt und stöhnend, husteten matt und äusserten Schmerz beim Druck auf die Brustwandungen. Der Herzschlag war pochend, die Extremitäten eisig kalt. Da wo eine Besserung nicht erfolgte, trat der Tod in 5—7 Tagen ein. Das gegebene Krankheitsbild ähnelte auffallend dem der Lungenseuche des Rindviehs. Die wieder genesenden Thiere erschienen sehr abgemagert, das Vlies äusserst defect, indem die Wolle in grossen Strähnen ausfiel. Eine dermatische Erkrankung erschien unbedingt ausgeschlossen. Die wiederholt an gefallenen und in hochgradig erkranktem Zustande geschlachteten Thieren vollzogene Obduction hatte das beschriebene Ergebniss mit dem Unterschiede einer weniger hochgradigen Erkrankung der Pansenschleimhaut, dagegen einer schärfer ausgeprägten Lungenerkrankung. Die Lungen, im Ganzen sehr hyperämisch, zeigten an den unteren Theilen entweder frische, rothe Hepatisation oder ödematöse Schwellung. Die Bronchienverzweigungen enthielten stellenweise croupöses Exsudat, stellenweise schaumige Flüssigkeit. Es ist hervorzuheben, dass die Herde seit dem 20. Januar nicht mehr in die Nähe jenes Grabens getrieben worden und dass zur Voraussetzung einer infectiösen oder durch einen Parasiten (Lungenwürmer) bedingten Erkrankung durchaus keine Anhaltspunkte gegeben waren. Auch hatte die wiederholte Untersuchung der Contenta und der Magenhäute selbst dasselbe negative Resultat. Das gleichzeitig einer Untersuchung unterworfenen Abzugswasser enthielt bei einer milchig getrübbten Färbung ausser Fettsäure keine giftigen Bestandtheile. Unter denselben Erscheinungen erkrankten und starben zu derselben Zeit eine grössere Anzahl Schafe eines anderen Herdebesitzers, ebenfalls nachdem sie in der Nähe jenes Gebietes gehütet worden waren. Das post hoc, ergo propter hoc trifft in diesem Falle um so mehr zu, weil die sämmtlichen Erkrankten zu den ausgetriebenen Mutterschafen gehörten, während die im Stall zurückbehaltenen Hammel ausnahmslos gesund blieben. Auch blieben diejenigen Mutterschafe, welche Lämmer säugten, entweder gesund oder genesen wieder, während nur die Sauglämmer und nicht

säugenden Schafe ein Opfer der Erkrankung resp. der Vergiftung wurden. Wie schon erwähnt, verhielten sich klinische und Sectionerscheinungen denen bei der ersten Herde festgestellten gleich. Nachdem auch in diesem Falle die chemische Untersuchung des Magen- und Darminhalts, ebenso der wiederholt dem Fabrikabzugsrohr entnommenen Flüssigkeit resultatlos geblieben, gelang es endlich, in letzterer das Vorhandensein von Blausäure zu constatiren, und zwar erwies sich das des Mittags gegen 2 Uhr ausfliessende Wasser blausäurehaltig. Um dieselbe Tageszeit hatte auch die Vergiftung der ersten 9 Schafe stattgefunden. Es wurde ein Gehalt von 0,012 pCt. wasserfreier Blausäure nachgewiesen. Auf Grund der angeführten Thatsachen war inzwischen der Schafbesitzer gegen den Inhaber der Fabrik klagbar geworden. Letzterer hatte, um die der Klage zu Grunde liegenden Behauptungen zu controliren resp. widerlegen zu können, einen auswärtigen Arzt und einen Chemiker desselben Ortes beauftragt, durch einen Versuch an einem Schafe die Wirkung der Blausäure festzustellen. Nach dem Ergebniss dieses Versuches erzeugten 0,02 Grm. wasserfreier Blausäure, vermittelst eines Schlundkatheters eingeflösst, erschwertes Athmen und Zuckungen, welche Erscheinungen indessen sehr bald wieder verschwanden; während 0,05 Grm. in weniger als einer halben Stunde den Tod des Thieres zur Folge hatten. Die Obduction ergab in der Hauptsache ein mit dem früheren übereinstimmendes Resultat. Auch hier wurde Lockerung des Pansenepithels, dunkle Farbe des Blutes und starke Hyperämie der Lungen, ausserdem aber deutlicher Geruch nach bitteren Mandeln wahrgenommen. Dass letztere Eigenthümlichkeit nicht auch früher beobachtet worden, mag wohl dem Umstande zuzuschreiben sein, dass das erste Cadaver hohen Kältegraden ausgesetzt gewesen, überhaupt aber sämtliche Obductionen erst längere Zeit nach Aufnahme des durch seine Flüchtigkeit bekannten Giftes vollzogen worden sind.

Dass nach dem vorstehend Mitgetheilten eine Vergiftung durch Blausäure stattgefunden, kann auf Grund der klinischen und Sectionerscheinungen, besonders aber deshalb nicht bezweifelt werden, weil der angegebene Procentsatz Blausäure zur tödtlichen Vergiftung eines Schafes als ausreichend erachtet werden muss, da man die von einem Schafe aufzunehmende Wassermenge auf mindestens 400—500 Grm. veranschlagen kann. Es entspricht dieses Mengenverhältniss genau dem in dem erwähnten Versuche den Tod eines Schafes bedingenden Blausäurequantum. Was dagegen die einige Zeit nach stattgehabter Giftaufnahme sich einstellenden Erkrankungen betrifft, so ist ein directer Beweis dafür, dass auch sie eine Folge der Vergiftung gewesen, nicht gewonnen worden. Es muss diese Frage daher als eine offene angesehen werden um so mehr, als in der Literatur keine in dieser Beziehung massgebenden Fälle aufzufinden sind. In diesem Sinne haben auch die gerichtlichen Gutachten die an sie gestellte Frage — „ob nach dem gesammten Ergebniss der Beweisaufnahme unter Zugrundelegung der Analyse des Dr. Bücking anzunehmen sei, dass der Tod der dem Kläger nach der Aufstellung in der Klageschrift crepirten Schafe durch den Genuss des in dem Abflusswasser der Fabrik des Beklagten enthaltenen Giftes verursacht worden, bezw. dass die abgeschlachteten Schafe in Folge des Genusses des Wassers in der Weise vergiftet worden, dass ihre Tödtung geboten war“ — beantwortet, und zwar bejahend bezüglich der zuerst gefallenen resp. geschlachteten 9 Schafe, unbestimmt hinsichtlich der späteren Erkrankungs- und Todesfälle. Ueber diese

könne ein bestimmtes Urtheil bei dem Mangel entscheidender literarischer Hülfsmittel nur auf dem Wege eines exacten Versuches gewonnen werden. Will man diese zweifelhaften Vergiftungsfälle als wirkliche Blausäurevergiftungen gelten lassen, so wären die krankhaften Veränderungen in den Lungen als das Resultat einer durch das Gift bewirkten substantiellen Veränderung der Athmungscentren aufzufassen, deren weitere Folgen partielle Lungenlähmung, passive Congestion der Lunge und die Ausgänge der letzteren gewesen sind. Was die Anätzung der Pansenschleimhaut betrifft, so kann diese wohl nur auf den Einfluss der in dem Abzugswasser enthaltenen Fettsäure zurückgeführt werden.

Das chemische Verfahren bei Untersuchung des Abzugswassers war folgendes:

1. Die Wasserprobe wurde mit einer Ferrosulphatlösung (Eisenvitriol), sodann mit Natronlauge versetzt und gekocht: nach dem Erkalten wurde mit Salzsäure schwach angesäuert, und es entstand nun auf Zusatz von Eisenchloridlösung ein reichlicher Niederschlag von Berlinerblau.

2. Ein Theil der Wasserprobe wurde über Borax rectificirt und das nach Blausäure riechende Destillat mit einigen Tropfen Schwefelammonium im Wasserbade verdunstet. der Rückstand in wenig Wasser gelöst, mit einigen Tropfen Salzsäure angesäuert, etwas Eisenchloridlösung zugesetzt, und es trat nun sofort eine blutrothe Färbung ein (Eisenrhodanid).

3. Ein anderer Theil des auf vorstehend beschriebene Weise gewonnenen Destillats wurde mit etwas Kupfervitriollösung versetzt, mit Natronlauge alkalisch gemacht und erhitzt. Nach dem Erkalten wurde mit Schwefelsäure angesäuert, und es entstand nun ein reichlicher Niederschlag von weissem Kupfercyanür.

4. Zu einer Probe des Destillats wurden einige Tropfen einer sehr verdünnten Kupfervitriollösung gesetzt und dann Guajactinctur hinzugefügt. Beim Umschütteln des Gemisches zeigte sich eine blaue Färbung; es gilt diese Reaction auf Blausäure für die empfindlichste.

Um zu ermitteln, dass nur allein Blausäure und wieviel davon vorhanden war, wurden 250 Ccm. nach Zusatz von 1 Grm. gepulvertem Borax der Destillation unterworfen; das Destillat wurde mit Salpetersäure angesäuert und mit Silbernitratlösung versetzt. Es entstand ein reichlicher weisser und käsiger Niederschlag von Cyansilber, welcher in verdünnter Salpetersäure unlöslich, dagegen leicht löslich in Ammoniak war. Das Cyansilber wurde ausgewaschen, bis zum constanten Gewicht bei 100 ° C. getrocknet und gewogen. Das Gewicht betrug 0.159 Grm.; hieraus berechnen sich 0,032 Grm. (0,012 pCt.) Blausäure.

Zur Controle wurde dieses Cyansilber durch Glühen in einem Porzellantiiegel in metallisches Silber übergeführt; letzteres wog 0,1245 Grm. Hieraus berechnen sich für 250 Ccm. Abflusswasser 0.031 Grm. oder wiederum 0,012 pCt. Blausäure.

Zum Nachweise, dass kein Chlor vorliegen konnte, wurde noch folgender Controlversuch angestellt: 250 Grm. destillirten Wassers wurden mit einigen Tropfen Salzsäure und 1 Grm. gepulvertem Borax versetzt. Bei der Destillation ging keine Salzsäure über. Hätte also das Abflusswasser neben Blausäure zugleich auch etwas Salzsäure enthalten, so wäre dieselbe durch den Borax vollständig gebunden worden. Es konnte somit in obigen Versuchen nur einzig und allein Blausäure gefunden worden sein.

Personal-Notizen.

Ernennungen und Versetzungen.

Der Professor und Lehrer an der Thierarzneischule zu Berlin, Dr. Schütz, der Königl. Sächs. Landesthierarzt, Professor und Lehrer an der Thierarzneischule zu Dresden, Dr. Siedamgrotzky, und der Grossherzgl. Bad. Medicinalrath und Landesthierarzt Dr. Lydtin zu Karlsruhe auf die Jahre 1886, 1887 und 1888 zu ausserordentlichen Mitgliedern des Kaiserlichen Gesundheitsamtes in Berlin.

Der Thierarzt R. Schmaltz in Eldagsen zum commissarischen Prosector an der Thierarzneischule zu Berlin.

Der als Prosector bei der Thierarzneischule in Berlin bisher beschäftigte Thierarzt M. Preusse zum commissarischen Kreisthierarzt des Kreises Obornik, Reg. Bez. Posen, mit dem Amtswohnsitz in Obornik.

Der Thierarzt G. Romann zu Leerort zum commissarischen Kreisthierarzt des Kreises Hünfeld, Reg.-Bez. Kassel, mit dem Amtswohnsitz in Hünfeld.

Der Gestüt-Rossarzt H. Ebert in Zirke zum Gestüt-Inspector.

Der Kreisthierarzt Dr. E. A. G. Felisch in Schlochau, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Kreisthierarzt des Kreises Graudenz, Reg.-Bez. Marienwerder.

Der Kreisthierarzt E. F. Pauli in Waldenburg, Reg.-Bez. Breslau, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Kreisthierarzt der 2. Kreisthierarztstelle für den Bezirk Magdeburg-Wolmirstedt, mit dem Amtswohnsitz in Magdeburg.

Der Kreisthierarzt G. Vollers in Wesselburen, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Kreisthierarzt des Stadtkreises Altona (einschliesslich der Beaufsichtigung des Hamburg-Altonaer Viehmarktes), Reg.-Bez. Schleswig, mit dem Amtswohnsitz in Altona.

Der commissarische Kreisthierarzt C. Wittenbrink in Magdeburg, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum commissarischen Kreisthierarzt des Kreises Waldenburg, Reg.-Bez. Breslau, mit dem Amtssitz in Waldenburg.

Der Kreisthierarzt des Kreises Gleiwitz, Koschel, hat seinen Amtswohnsitz von Gleiwitz nach Petersdorf verlegt.

Der interimistische Kreisthierarzt der Kreise Adelnau und Ahrweiler, Ober-Rossarzt a. D. Niobuhr in Ahrweiler, hat seinen Amtswohnsitz nach Neuenahr verlegt.

Definitiv übertragen wurde die bisher commissarisch verwaltete Kreisthierarztstelle:

der Kreise	den Kreisthierärzten
Apenrade-Sonderburg	Struve in Sonderburg;
Dramburg	Kunert in Dramburg.
Münsterberg	Gückel in Münsterberg;

Aus dem Staatsdienst sind geschieden:

Der Kreisthierarzt L. G. Heinsen zu Ratzeburg, Reg.-Bez. Schleswig.
Der Kreisthierarzt Dr. A. L. M. Schmidt in Iserlohn, Reg.-Bez. Arnberg.

Ordens-Verleihungen.

Dem Dr. Schütz, Professor und Lehrer an der Königl. Thierarzneischule in Berlin, der Rothe Adler Orden 4. Cl.

Dem Kreisthierarzt Eberhardt in Fulda, Reg.-Bez. Kassel, der Kronen-Orden 4. Cl.

Dem Corps-Rossarzt bei dem Gardecorps, Haase in Berlin, der Kronen-Orden 4. Cl.

Dem Ober-Rossarzt bei dem 1. Brandenb. Drag.-Rgmt. No. 2, Storbeck in Schwedt a. O., der Kronen-Orden 4. Cl.

Dem Rossarzt beim Schles. Train-Bat. No. 6, Angenheister in Breslau, das Allgemeine Ehrenzeichen.

Dem Rossarzt beim Grossh. Hess. Feld-Art.-Rgmt. No. 5 (Grossh. Art.-Corps), Hoehnke in Bessungen, das Allgemeine Ehrenzeichen.

Dem Rossarzt beim Pomm. Hus.-Rgmt. No. 5 (Blücher-Hus.), Mitzschke in Köslin, das Allgemeine Ehrenzeichen.

Todesfälle.

Der Thierarzt J. F. Döring in Ottensen, Reg.-Bez. Schleswig.

Der Thierarzt A. Cb. Hartmann in Köln.

Der Kreisthierarzt C. F. Jost in Aschersleben, Reg.-Bez. Magdeburg.

Der Kreisthierarzt H. Ch. F. Kluever in Neustadt, Reg.-Bez. Schleswig.

Der Thierarzt C. B. Nitschke in Camen (Hamm), Reg.-Bez. Arnberg.

Der Ober-Rossarzt a. D. C. F. Volck in Berlin.

Nekrolog.

Am 30. November 1885 ist in Paris Henri Marie Bouley, General-Inspector der französischen Thierarzneischulen, im Alter von 71 Jahren nach längerem Leiden an einer Herzkrankheit gestorben. Die Thierheilkunde verliert in ihm einen ihrer hervorragendsten Vertreter, dessen glänzende Eigenschaften nicht nur in Frankreich, sondern bei den Thierärzten aller Länder allgemeine Anerkennung gefunden haben; ebenso werden die Ehren, welche auf den Verstorbenen in so reichem Masse gehäuft wurden, allen Fachgenossen in Erinnerung bleiben.

Bouley wurde als zweiter und jüngster Sohn eines hervorragenden Veterinärs am 17. Mai 1814 in Paris geboren. Er besuchte von 1832 bis 1836 die Thierarzneischule in Alfort und zeichnete sich schon während des Studiums durch seine Talente in so hohem Masse aus, dass ihm in jedem der vier Studienjahre die höchsten Preise ertheilt wurden. Er unterstützte nach Erlangung der Approbation zunächst seinen Vater in dessen umfangreicher Praxis und wurde 1837 zum Assistenten, 1839 zum Professor-Adjuncten und 1845 zum ordentlichen Professor der Klinik an der Thierarzneischule zu Alfort ernannt. In der zuletzt genannten Stellung ist Bouley bis zum 1. Januar 1866 ununterbrochen thätig gewesen. Durch Decret vom 6. Januar 1866 erfolgte seine Ernennung zum General-Inspector der französischen Thierarzneischulen; er ist der Erste, welchem diese höchste, einem Veterinär in Frankreich erreichbare Stelle übertragen wurde, ohne dass derselbe vorher Director einer der drei französischen Thierarzneischulen gewesen war. Er hat dieselbe bis zu seinem Tode bekleidet.

Bouley gehörte zu den Begründern des thierärztlichen Centralvereins und war 33 Jahre lang dessen Generalsecretär. Er redigirte bis zu seinem Tode den „Recueil de médecine vétérinaire“, die älteste und verbreitetste thierärztliche Zeitschrift in Frankreich. Dieselbe enthält ausser zahlreichen Originalartikeln in den meisten Heften eine von Bouley verfasste Chronique, welche Alles, was in der Medicin neu und interessant erschien, zur Besprechung brachte und dem vielfach von dem Verstorbenen gebrauchten Motto „Inventa narrare non inglorium“ vollständig entsprach.

Die Akademie der Medicin, welcher Bouley seit 1855 als Mitglied angehörte, erwählte ihn 1877 zu ihrem Präsidenten. Er ist der zweite Veterinär, welchem diese Ehre zu Theil wurde. Vor ihm hatte der Thierarzt Barthélemy einige Monate lang interimistisch den Vorsitz in der Akademie geführt.

Die Akademie der Wissenschaften, zu deren Mitglied Bouley 1868 erwählt worden war, bezeichnete ihn 1879 als den geeignetsten Nachfolger für den Lehrstuhl, welchen bis dahin der berühmte Physiologe Claude Bernard am naturhistorischen Museum inne gehabt hatte. Vom Ministerium wurde jedoch für Bouley ein besonderer Lehrstuhl der vergleichenden Pathologie am naturhistorischen Museum gegründet. Die an dem letzteren gehaltenen Vorträge sind in zwei Bänden unter dem Titel „Le progrès en médecine par l'experimentation. La nature vivante de la contagion“ 1882—1884 erschienen. Sie suchten in erster Linie klar zu machen, dass sich die Fortschritte in der Medicin nur auf die Resultate von Versuchen stützen können; dass die lediglich auf Beobachtungen von Krankheiten begründeten Hypothesen häufig genug irthümlich bleiben, und dass das genauere Studium der Thierkrankheiten vielfach erst volle Aufklärung über Krankheiten der Menschen zu geben vermag. In den Vorträgen und in dem genannten Werke zeigt sich Bouley namentlich als ein enthusiastischer Verehrer Pasteur's; er verherrlicht mit glänzender Beredsamkeit dessen bahnbrechende Untersuchungen über die Abschwächung der Virulenz gewisser Mikroorganismen.

Bouley wurde am Schlusse seines Lebens die höchste Ehre zu Theil, welche die gelehrte Welt in Frankreich zu übertragen im Stande ist. Er war 1884 Vicepräsident und 1885 Präsident der Akademie der Wissenschaften.

Um einen Einblick in die vielseitige Thätigkeit des Verstorbenen zu geben,

sei noch erwähnt, dass er ein thätiges und eifriges Mitglied der Central-Ackerbaugesellschaft, des Comité consultatif d'hygiène de France, des Vereins für Biologie und Vicepräsident des Vereins für Acclimatisation war.

Von seinen Schriften nennen wir, abgesehen von den bereits genannten Vorträgen „Sur le progrès en médecine par l'experimentation“ und ausser sehr zahlreichen Veröffentlichungen in thierärztlichen und landwirthschaftlichen Journalen, den 1851 herausgegebenen „Traité de l'organisation du pied du cheval“, von welchem wahrhaft classischen Werke leider nur der erste, die Anatomie und Physiologie behandelnde Band erschienen ist, und mehrere Artikel in den bisher erschienenen 13 Bänden des „Dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaire“, welchen Bouley seit 1856 zuerst mit Reynal, dann mit Trasbot, Sanson und Nocard herausgab.

Die Leichenfeier am 2. December 1885 entsprach in jeder Beziehung den Verdiensten und der Stellung des Verstorbenen. Seinem Sarge folgten der Minister des Ackerbaues, fast sämmtliche Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, zahlreiche Mitglieder der Akademie der Medicin und der Ackerbaugesellschaft, die Professoren und Studirenden der Thierarzneischule in Alfort, Deputationen der Thierarzneischulen in Lyon und Toulouse, viele Mitglieder der gelehrten Gesellschaften und Vereine, denen Bouley angehört hatte, und eine grosse Zahl von Männern, deren Namen in den Wissenschaften, Künsten und in der Politik zu den berühmtesten Frankreichs gehören. Die militärischen Ehren wurden mit Rücksicht auf die hohe Classe des Ordens der Ehrenlegion, welche dem Verstorbenen verliehen worden war, durch ein Bataillon Infanterie mit der Fahne und der Musik erwiesen.

Am Grabe wurden Reden gehalten: von Hervé-Mangon für die Akademie der Wissenschaften, von Milne-Edwards für das naturhistorische Museum, von Leblanc für die Akademie der Medicin, von Brouardel für den Gesundheitsrath, von Passy für die Ackerbaugesellschaft, von Goubaux für die Thierarzneischulen, von Sanson für den thierärztlichen Centralverein, von Dumontpallier im Namen des Vereins für Biologie, von Bizot für die Militärthierärzte, von Lefebure für die Civilthierärzte und von Fremy im Namen der persönlichen Freunde. Alle Reden feierten in den wärmsten Ausdrücken die hohen Verdienste, die Talente, die Arbeitskraft, die vielseitige Thätigkeit Bouley's, die Liebenswürdigkeit seines Charakters und die Herzensgüte, welche der Verstorbene gegen Jedermann unausgesetzt bekundet hatte.

Der Unterzeichnete, welcher viermal Gelegenheit gehabt hat, längere Zeit mit Bouley zu verkehren, kann nicht unterlassen hinzuzufügen, dass der Verstorbene durch die Liebenswürdigkeit seiner Umgangsformen, durch seine Talente, durch seine Redegewandtheit und durch die grosse Geschicklichkeit, mit welcher er sich an Debatten betheiligte, den Eindruck einer hervorragenden Persönlichkeit machte. Sein ganzes Wesen zeigte unverkennbar, dass die vielfachen Ehren, mit denen er überhäuft wurde, keinem Würdigeren hätten zu Theil werden können. Auch die deutsche Thierheilkunde wird den grossen Verdiensten des Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Müller.

Vacanzen.

(Die mit * bezeichneten Vacanzen sind seit dem Erscheinen von Bd. XII, Heft 1 dieses Archivs hinzugetreten oder von Neuem ausgeschrieben.)

Regierungs-Bezirk	Kreisthierarztstellen des Kreises	G e h a l t.	Zuschuss aus Kreis- resp. Com- munalmitteln.
Königsberg	Heilsberg	600 Mark	300 Mark
"	Fischhausen	600 "	300 "
Marienwerder	Schlochau *	600 "	600 "
"	Stuhm * ¹⁾	600 "	— "
Frankfurt	Züllichau-Schwiebus ²⁾	600 "	— "
Köslin	Bublitz	600 "	— "
"	Belgard *	600 "	300 "
Breslau	Oels *	600 "	600 "
"	Militsch * ³⁾	600 "	— "
Liegnitz	Hoyerswerda	600 "	600 "
Oppeln	Grottkau	600 "	— "
Magdeburg	Aschersleben *	600 "	— "
Merseburg	Schweinitz * ⁴⁾	600 "	750 "
Schleswig	Oldenburg * ⁵⁾	600 "	— "
"	Norderdithmarschen * ⁶⁾	600 "	— "
"	Herzogthum Lauen- burg * ⁷⁾	600 "	— "
Arnsberg	Arnsberg	600 "	— "
"	Iserlohn *	600 "	300 "

Die Niederlassung eines Thierarztes wird gewünscht:

In Baden-Baden, Grossherzogth. Baden, durch Hr. E. Wentzel daselbst.

In Jablonowo, Kr. Strassburg i. Westpr. Auskunft ertheilt der landwirtschaftliche Verein durch Apotheker Kersandt daselbst.

In Mewe, Kr. Marienwerder. Auskunft ertheilt Thierarzt Schulz in Christburg bezw. Brauereibesitzer Anspach in Mewe.

In Ottersberg, Reg.-Bez. Stade; der Ort offerirt ein Fixum von 300 Mark. Auskunft ertheilt Apotheker Müller in Ottersberg.

- 1) Mit dem Amtswohnsitz in Christburg.
 2) " " " " Schwiebus.
 3) " " " " Trachenberg.
 4) " " " " Herzberg.
 5) " " " " Neustadt i. Holst.
 6) " " " " Wesselburen.
 7) " " " " Ratzeburg.

Die Kreisthierarztstelle in Hoyerswerda, Reg.-Bez. Liegnitz, soll wieder besetzt werden (s. oben Vacanzen). Der Kreis gewährt einen Zuschuss von 600 Mark. In 3 Städten und in 3 ländlichen Ortschaften des Kreises werden zusammen jährlich 32 Viehmärkte, in der Stadt Hoyerswerda ausserdem wöchentliche Fleischmärkte abgehalten; die Beaufsichtigung dieser Märkte wird dem Kreisthierarzt übertragen werden. Bewerbungen sind an das Landratsamt in Hoyerswerda zu richten.

Veränderungen im militär-rossärztlichen Personal.

Beförderungen.

Zum Ober-Rossarzt ist ernannt:

Der Rossarzt Voigt vom 2. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 17 bei demselben Regiment.

Zu Rossärzten sind ernannt:

Die Unter-Rossärzte: Dietrich vom 1. Brandenburg. Ul.-Rgmt. (Kaiser Alexander II. von Russland) No. 3; Hellebrandt vom Leib-Kür.-Rgmt. (Schles.) No. 1; Hübner vom 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9; Rexilius vom Thüring. Hus.-Rgmt. No. 12; Zeitz vom 3. Bad. Drag.-Rgmt. (Prinz Carl) No. 22.

Anstellungen.

Die Unter-Rossärzte: Geitmann beim Schlesw. Feld-Art.-Rgmt. No. 9; Günther beim Magdeburg. Kür.-Rgmt. No. 7; Krause beim 1. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Garde-Drag.-Rgmt.) No. 23; Koesters beim 1. Hess. Hus.-Rgmt. No. 13; Tonndorf beim 2. Westfäl. Hus.-Rgmt. No. 11.

Versetzungen.

Die Rossärzte: Gaedtko vom Train-Bat. No. 15 zum 2. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Leib-Drag.-Rgmt.) No. 24; Gärtner vom Feld-Art.-Rgmt. No. 31 zum Train-Bat. No. 15; Göhring vom Pomm. Hus.-Rgmt. (Blücher-Hus.) No. 5 zum Schlesw.-Holst. Train-Bat. No. 9; Hübner vom 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9 zum 2. Schles. Hus.-Rgmt. No. 6; Schmidt vom 1. Schles. Hus.-Rgmt. No. 4 zum Niederschles. Feld-Art.-Rgmt. No. 5.

Der charakterisirte Rossarzt Bochnig vom 2. Schles. Hus.-Rgmt. No. 6 zum 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9.

Die Unter-Rossärzte: Griesor vom Magdeburg. Feld-Art.-Rgmt. No. 4 zum 1. Rhein. Feld-Art.-Rgmt. No. 8; Lopitsch vom 2. Brandenburg. Ul.-Rgmt. No. 11 zum Magdeburg. Drag.-Rgmt. No. 6; von Müller vom Magdeburg. Drag.-Rgmt. No. 6 zum Magdeburg. Hus.-Rgmt. No. 10; Richter vom Pomm. Kür.-Rgmt. (Königin) No. 2 zum 2. Pomm. Ul.-Rgmt. No. 9; Trautwein vom Brandenburg. Kür.-Rgmt. (Kaiser Nicolaus I. von Russland) No. 6 zum Feld-Art.-Rgmt. No. 31.

Abgegangen.

Die Ober-Rossärzte: Kuhr vom Schlesw.-Holst. Ul.-Rgmt. No. 15; Lubitz vom 2. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 17.

Die Rossärzte: Brilke vom Oldenburg. Drag.-Rgmt. No. 19; Fenner vom Schlesw.-Holst. Hus.-Rgmt. (Kaiser Franz Joseph von Oesterreich, König von Ungarn) No. 16; Meitzner vom 1. Garde-Ul.-Rgmt.; Skorna vom Schlesw.-Holst. Train-Bat. No. 9.

Die charakteris. Rossärzte: Plischke vom 2. Pomm. Ul.-Rgmt. No. 9; Rudloff vom Niederschles. Feld-Art.-Rgmt. No. 5; Siebert vom Magdeburg. Hus.-Rgmt. No. 10.

Der Unter-Rossarzt Borstorff vom Schlesw.-Holst. Drag.-Rgmt. No. 13.

Der dreij.-freiw. Unter-Rossarzt Pährisch vom 2. Westfäl. Hus.-Rgmt. No. 11.

Der einj.-freiw. Unter-Rossarzt Pitz vom Nass. Feld.-Art.-Rgmt. No. 27.

Gestorben.

Der Ober-Rossarzt Kresse vom 2. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Leib-Drag.-Rgmt.) No. 24.

Einladung zur 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Von den Geschäftsführern **der am 18. bis 24. September d. J. in Berlin stattfindenden 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte** mit Einführung der Section für Veterinärmedizin beauftragt, laden wir die Thierärzte Deutschlands zu recht zahlreichem Besuch dieser Versammlung ein und bitten die Herren Collegen, welche Vorträge in der genannten Section zu halten beabsichtigen, uns den Gegenstand der in Aussicht genommenen Vorträge baldgefälligst mittheilen zu wollen.

Müller. Dr. Schütz.

VII.

Die Purkinje'schen Fäden im Herzen der Haussäugethiere.

Von

Dr. **R. Schmaltz,**

Prosector an der Königl. Thierarzneischule in Berlin.

(Hierzu Taf. III u. IV.)

Purkinje¹⁾ hat vor beiläufig 40 Jahren bei Gelegenheit „neurologischer Untersuchungen“ im Schafherzen graue, platte, gelatinöse Fäden entdeckt, welche nach seiner Angabe „aus Reihen von Körnern bestehen, zwischen denen scheinbar quergestreifte Fasern verlaufen, welche wahrscheinlich durch die Querschnitte der Zellwände gebildet werden.“

Er schreibt den Fäden Aehnlichkeit mit dem Knorpelgewebe zu, verwirft aber selbst diese Annahme durch die am Schluss ausgesprochene Vermuthung, es könne sich hierbei um einen „besonderen Bewegungsapparat mit musculösen Wänden“ handeln.

Die nach ihrem Entdecker genannten Purkinje'schen Fäden sind seitdem der Gegenstand einer ganzen Reihe von Specialuntersuchungen gewesen und die darüber vorliegende Literatur ist eine reichhaltige.

Kölliker erwähnt sie in seinem Handbuch der Gewebelehre (1852) und bezeichnet die Körner, aus welchen die Fäden sich zusammensetzen sollen, als Muskelzellen, an welchen er sogar Contractionen beobachtet hat.

Auch v. Hessling²⁾ hält ihre Zugehörigkeit zum Muskelgewebe für erwiesen und beschreibt sie als „Körner, welche von quergestreifter Zwischensubstanz umflochten sind.“ Er überlässt übrigens die Entscheidung, ob die Körner Zellen seien, der Entwicklungsgeschichte.

¹⁾ Archiv für Anatomie und Physiologie von Joh. Müller.

²⁾ Zeitschrift für Zoologie von Siebold und Kölliker.

Reichert¹⁾ fasst die Purkinje'schen Fäden, welche sich aus kurzen, im Innern noch protoplasmahaltigen „Primitivcylindern“ zusammensetzen sollen, in ihrer Gesamtheit als einen besonders functionirenden Muskel auf, der mit dem Myocardium und mit dem Endocardium in Verbindung trete und dessen Wirkungsweise er durch den Namen Tensor endocardii ausdrückt.

Remak²⁾ legt ihnen ebenfalls den Charakter eines selbstständigen Muskels bei, dessen Aufgabe er indess in einer Herabsetzung der Thätigkeit des Endocardium sucht; er spricht von anastomosirenden Muskelfasern, welche von gallertartigen Kugeln unterbrochen seien.

Aeby³⁾ betont dementgegen die Zusammensetzung der Fäden aus Zellen und hält diese für embryonale Muskelzellen, welche unter allmählichem Verbrauch des protoplasmatischen Innern und dementsprechendem Anwachsen der quergestreiften Rinde den Primitivbündeln immer ähnlicher werden. Nach seiner Meinung entwickelt sich das ganze Myocardium aus solchen Zellen, von denen sich Ueberreste in der ursprünglichen Beschaffenheit nur bei einzelnen Thieren über die Fötalzeit hinaus erhalten.

Obermeyer⁴⁾ erklärt die „Körner“ für „kurze cylindrische Muskelbündel, welche eine quergestreifte Rinde von verschiedener Dicke besitzen, die meistens hyaline Substanz einschliesst. Die scheinbar zwischen den Körnern verlaufenden quergestreiften Züge sind optische Täuschung und nichts Anderes als die an den Zellrändern im Profil der quergestreiften Rinde deutlicher hervortretenden Körnerfibrillen. Eine fibrilläre Zwischensubstanz ist nicht vorhanden.“ Im Uebrigen bleibt unerörtert, wie der eigenthümliche Bau dieser „Muskelbündel“ zu erklären sei und ob denselben eine Bedeutung zukomme.

Eine ganz gegentheilige Ansicht hat Dr. Max Lehnert⁵⁾ in einer sehr gründlichen Arbeit zu beweisen gesucht.

Er bestreitet die Zusammensetzung der Purkinje'schen Fäden aus Zellen bezw. kurzen Muskelbündeln überhaupt und unterscheidet an ihnen zwei Klassen von Fibrillen: Die peripheren Fibrillenbündel ver-

1) Müller's Archiv, 1855.

2) Müller's Archiv, 1862.

3) Henle und Pfeuffer's Zeitschrift, 1863.

4) Archiv für Anatomie und Physiologie von Reichert und Du-Bois-Reymond, 1867.

5) Archiv für mikroskopische Anatomie von Max Schultze, 1867.

laufen zwischen den Körnern in eigenthümlicher Weise anastomosirend, so dass sie Maschen bilden, in welchen eben jene Körner liegen, die nichts als Reste hyalinen Bildungsmaterials sind. Von den peripheren Fibrillensträngen zweigen sich in feinen Bündeln die centralen Fibrillen ab, welche an jene Körner treten und sich nicht allein auf ihrer Oberfläche ohne jede bestimmte Richtung verzweigen, sondern auch in die Tiefe dringen und sie durchsetzen, so dass oft von dem Protoplasma wenig oder nichts übrig ist und die Körner dann ein wirres Fibrillenknäul bilden.

Demnach sollen die Purkinje'schen Fäden nur eine bei wenigen Thieren vorkommende Eigenthümlichkeit im Verlauf gewisser Fibrillenbündel des Myocardium sein, welche zelligen Bau vortäuschen, indem sie ein Netz bilden, dessen Maschen mit embryonalen Protoplasma-kugeln ausgefüllt sind; sie sollen, indem sie jene Eigenthümlichkeit verlieren, wieder in das Myocardium übergehen, aus dem sie auch entspringen. Es wird in ihnen eine Analogie der überhaupt netzartig angeordneten Herzmusculatur gesehen.

Nach Ranvier gehört die quergestreifte Substanz den Zellen an und es giebt keine zwischen diesen verlaufenden Fibrillenbündel. Die fibrilläre Zellrinde zeige sich auf dem Längsdurchschnitt der Zelle als quergestreifter Saum, welcher das protoplasmatische Centrum umschliesse. Im Verlauf der Züge lasse sich vielfach ein allmähliches Vorrücken des Saumes nach innen, also ein Dickenwachsthum der Zellrinde bis zur vollständigen Beseitigung des centralen Protoplasmas erkennen. Damit erfolge der Uebergang in die Musculatur.

Man sehe also in den Purkinje'schen Zellen eine Analogie der Entwicklung der Skelettmusculatur überhaupt, dieselben seien deshalb als embryonale, in der Entwicklung aufgehaltene Herzmuskelzellen aufzufassen.

Diese Ansicht Ranvier's ist neuerdings ziemlich allgemein acceptirt und in allen histologischen Lehrbüchern wiedergegeben.

In der vorstehend, wie ich glaube, vollständig zusammengestellten Literatur über die Purkinje'schen Fäden findet sich zunächst Uebereinstimmung der weit auseinandergelassenen Anschauungen in einem grundlegenden Punkte: es wird von allen Autoren als erwiesen betrachtet, dass die Purkinje'schen Fäden lediglich aus musculösen Gewebeelementen sich aufbauen und der Musculatur beizuzählen seien. Nur ihr Entdecker selbst lässt die Möglichkeit offen, dass zwischen

den „musculösen Wänden“ der Fäden etwas Anderes als Muskelsubstanz eingeschlossen sein könne.

Ebenso ausnahmslos wird die Betheiligung zweier Grundelemente an der Fadenbildung constatirt, nämlich einer hyalinen protoplasmatischen (Zell-) Substanz und eines fibrillären quergestreiften Bestandtheils.

Von wesentlicher Bedeutung ist drittens die ebenfalls allgemein anerkannte Thatsache, dass die Purkinje'schen Fäden lediglich im Anschluss an das Endocardium und zwar nur in den Ventrikeln, nicht aber in den Atrien des Herzens vorkommen, und dass sie, wie besonders Obermeyer ausdrücklich hervorhebt, in ihrem ganzen Verlauf durch eine endocardiale Bindegewebshülle gegen das Myocardium abgeschlossen sind. Sie liegen dabei in der untersten Schicht des Endocardium, überbrücken kleine Gruben zwischen den Fleischbälkchen, ziehen sich auch in den Grund der Chordae tendineae hinein (Obermeyer) und finden sich tiefer im Myocardium nur innerhalb der Bindegewebszüge, welche vom Endocardium in jenes sich hineinziehen. Die Behauptung v. Hessling's, dass sich Purkinje'sche Fäden auch unter dem Pericardium fänden, wird allseitig zurückgewiesen.

Dagegen sind sämtliche Ansichten widersprechend sowohl bezüglich der Bedeutung der Purkinje'schen Fäden, als besonders, soweit das Verhältniss in Frage kommt, in welchem die hyaline protoplasmatische und die quergestreifte fibrilläre Substanz innerhalb der Fäden zu einander stehen.

Reichert und Remak halten die Fäden für einen besonderen Muskel des Endocardium, Kölliker, Aeby und Ranvier erklären sie als Züge embryonaler Herzmuskelzellen. Aeby sieht darin die Urform der gesammten Herzmusculatur, Ranvier führt ihre Eigenart auf einen Aufenthalt in der Entwicklung gewöhnlicher embryonaler Muskelzellen zurück. Lehnert endlich spricht ihnen jede besondere Bedeutung ab.

Allgemein wird die protoplasmatische Substanz als Rest embryonalen Bildungsmaterials angesehen; aber während Kölliker, Aeby und Ranvier die Zellen deswegen als Ueberbleibsel aus der Fötalzeit betrachten, nehmen Obermeyer, Remak und Reichert dieselben als ausgewachsene Primitivcylinder an, welche im Innern noch einen Protoplasmaüberschuss enthalten.

Im Wesentlichen stehen sich bezüglich der rein histologischen Frage zwei Meinungen gegenüber. Nach der einen, welche die herr-

schende genannt werden kann, bestehen die Fäden aus Zellen oder aus diesen gleichwerthigen kurzen Muskelbündeln, mit Protoplasma-kern und fibrillärem Mantel, ohne dass intercelluläre Fibrillenbündel vorhanden wären.

Dementgegen behauptet Lehnert, dem v. Hessling und Remak sich nähern, nicht allein das Vorhandensein intercellulärer Fibrillenbündel, sondern er bestreitet die Existenz wirklicher Zellen und stellt die zellähnlichen Protoplasma-kugeln als Einlagerungen zwischen die den Hauptbestandtheil bildenden Fibrillenbündel dar.

Ein weiteres Eingehen auf die von beiden Seiten als Beweismittel beigebrachten, theilweise widersprechenden Beobachtungen würde an dieser Stelle unnöthige Weitläufigkeiten veranlassen; es wird sich besser bei den einzelnen Punkten der folgenden Untersuchung durch kurze Bemerkungen feststellen lassen, inwiefern die genannten Autoren in ihren thatsächlichen Wahrnehmungen von den hier zu machenden Angaben abweichen.

Ebenso wird sich die Beurtheilung der verschiedenen Ansichten am passendsten verbinden mit der Zusammenstellung der hier gewonnenen Untersuchungsergebnisse und der darauf begründeten Schlussfolgerungen.

Indessen muss, soweit es sich um Specialarbeiten handelt, auf zwei Lücken derselben hingewiesen werden.

Einmal wird in allen zwar das Vorkommen Purkinje'scher Fäden bei verschiedenen Thieren constatirt, dann aber von dem Purkinje'schen Faden im Allgemeinen gesprochen. Die Herren Verfasser haben also entweder eingehende vergleichende Untersuchungen überhaupt nicht angestellt, oder haben dabei nichts Erwähnenswerthes gefunden. Da aber das letztere mit den Thatsachen nicht übereinstimmen würde, bleibt nur das erstere anzunehmen, und in der That geben auch einige Autoren an, dass sie ihre Untersuchung im Wesentlichen aufs Schafherz beschränkt hätten.

Auffallender noch ist die geringe Beachtung, welche der Entwicklungsgeschichte der Purkinje'schen Fäden geworden ist. Da die hervorragendsten Forscher für die embryonale Natur der Purkinje'schen Zellen eintreten, erscheint es unabweisbar geboten, dieselben gerade da aufzusuchen, wo sie eigentlich zu Hause sein sollen — im Herzen des Fötus; die Erforschung der embryonalen Entwicklungsvorgänge ist die unentbehrliche Basis für die Beurtheilung der gesammten schwebenden Fragen.

Es hat aber nur Lehnert einige, ziemlich dürftige Angaben über embryonale Purkinje'sche Fäden seiner Untersuchung eingefügt, deren Richtigkeit ich nicht bestätigt gefunden habe.

Auf die Ergänzung dieser beiden Punkte wird also besonderes Gewicht gelegt werden müssen.

Für die Beurtheilung der Purkinje'schen Fäden ist es ohne Zweifel sehr bedeutungsvoll, ob sie allgemeine Verbreitung innerhalb einer grossen Gruppe des Thierreiches haben, oder nur bei wenigen Thier-species gewissermassen als Abnormität (Aeby, Lehnert) sich vorfinden.

Es ist aber aus leicht ersichtlichen Gründen zunächst unmöglich, die Herzen sämtlicher Wirbelthiere oder auch nur aller Warmblüter einer Durchsichtung zu diesem Zweck zu unterwerfen; dies würde sich nur allmählig nach Massgabe des vorhandenen Materials ausführen lassen.

Die Zahl der Thiere, bei denen sich Purkinje'sche Fäden finden, möglichst zu bereichern, wäre also vorläufig ein ziemlich nutzloses Bemühen und wird hier nicht versucht.

Nur bei einigen Thierarten scheint der Nachweis der Fäden von besonderer Wichtigkeit. Allgemein bekannt sind sie bei Pferd, Rind, Schaf, Ziege und Schwein; ich habe sie ausserdem beim Hunde und ebenso beim Kaninchen constatirt.

Die Purkinje'schen Fäden finden sich also bei allen Haus-säugethieren. Diese Thatsache ist sehr bezeichnend, und deswegen ist das Auffinden der Fäden bei Hund und Kaninchen wichtiger, als das Suchen danach bei einer möglichst grossen Menge anderer Thiere.

Die Purkinje'schen Fäden im Herzen des Pferdes bieten das beste Untersuchungsobject, während die des Schafes diesen ihnen bisher zugeschriebenen Vorzug nicht verdienen. Sie sind hier in grosser Menge vorhanden und deutlich mit blossem Auge als graue, durchscheinende, netzartig angeordnete Fäden erkennbar, vielfach durch Fettumlagerung noch besonders scharf hervorgehoben.

Man kann zum Studium frisches oder solches Material verwenden, welches nach Angabe Ranvier's 24 Stunden lang in Drittelalkohol gelegen hat. Die unstreitig schönsten Präparate erhält man indessen, wenn flache, fädenhaltige Stückchen aus der Herzwand ausgeschnitten

und einige Zeit in 5proc. Lösung von Ammonium monochromat. eingelegt werden.

Das Endocardium lässt sich dann leicht von der Musculatur abziehen, und etwa anhaftende Muskelreste sind mit der Pincette abzuheben. Es kommt übrigens vor, dass nur die obere dickste Schicht des Endocardium sich abziehen lässt, und diejenige, in welcher die Fäden liegen, auf der Musculatur sitzen bleibt; meist lässt sich das mit blossem Auge erkennen und die Fäden sind dann leicht zu erhalten, jedenfalls ist es rätlich, das Endocardium, welches mit seiner Endothelfläche auf den Objectträger ausgebreitet wird, vor dem Zupfen mit schwacher Vergrösserung auf das Vorhandensein der Fäden zu untersuchen.

Die Fäden lassen sich meist in grossen Stücken förmlich herunterziehen, das geleerte Endocardium wird natürlich entfernt und die isolirten Fadenstücke zupft man am besten in Picrocarmin, wobei indess zu beachten ist, dass die Färbung der Purkinje'schen Zellen, besonders durch starkes Nachdunkeln, leicht zu intensiv wird; die Aufbewahrung geschieht nur in Glycerin; an Spirituspräparaten lassen sich die Fäden nicht so gut vom Endocardium befreien, dasselbe muss mit zerpupft werden und erweist sich sehr hinderlich.

Die vom Endocardium abgelösten Fäden sind stets noch von der bereits bekannten, lamellosen Bindegewebsscheide umgeben. Selbst wo der Zusammenhang des Fadens zerstört ist, hat sich diese Scheide oft intact erhalten, wird in den Lücken zwischen den Zellhaufen besonders deutlich sichtbar und hält dieselben zusammen. Diese Scheide ist um so bemerkenswerther, als den Primitivbündeln des Myocardium das Sarcolemma fehlt; es verlaufen darin neben zahlreichen Capillaren auch Nerven; ihre Verbindung mit dem Faden ist übrigens nur locker.

Die Fäden bestehen aus dicht zusammenliegenden „Körnern“ sehr verschiedener Form und Grösse, welche einfach fernerhin als Purkinje'sche Zellen bezeichnet werden sollen. Die Fäden sind meist nicht sehr breit, indem nur 2—4 Zellen quer nebeneinander liegen, sie bilden aber, wo mehrere zusammenstossen, auch viel breitere Platten; stets bestehen sie aus mehreren übereinander gelagerten Zellschichten. Die Fäden bilden zahlreiche Anastomosen, indem Randzellen ausbiegen und mit ebensolchen von anderen Fäden zusammentreten. Spalten und Lücken finden sich sehr häufig innerhalb der Zellzüge, nicht allein zwischen den Längs-, sondern auch zwischen den Querseiten der Zellen; das letztere hielt Obermeyer für eine

besondere Seltenheit. Durch fortgesetztes Zupfen ist es besonders an dem Material, welches mit Ammonium-monochromat.-Lösung behandelt wurde, leicht, die Fäden in kleinste Zellhaufen zu zerreißen und ganz isolirte Zellen zu gewinnen; dann erst lassen sich die histologischen Verhältnisse der Purkinje'schen Zellen wirklich übersehen.

An zusammenhängenden Zellhaufen sieht man schon mit 60- bis 70maliger Vergrößerung, wie die Zellen in der Regel durch breite, dunkler gefärbte Streifen umschlossen sind, welche die Zellgrenzen entweder bilden oder dieselben bedecken. Indessen sind diese Randstreifen keineswegs an allen Zellen oder an allen Seiten einer Zelle zu sehen; sie fehlen sogar immer an den nach aussen gewandten freiliegenden Seiten der an den Grenzen des Zellhaufens gelegenen Zellen, aber auch theilweise innerhalb der Zellzüge. An sehr auseinander gerissenen und kleinen Zellhaufen sind sie grösstentheils nicht vorhanden und nur hier und da an denjenigen Zellrändern, mit denen die Zellen noch untereinander zusammenhängen, zu sehen. Besonders oft liegen an einem solchen dunklen Streifen beiderseits eine Reihe Zellen, und schwächere Queräste gehen von jenem zwischen die Querränder der Zellen, während die Aussenränder derselben eine derartige Umgrenzung entbehren, aber auch jene Queräste fehlen oft. Ein solcher Zellstock besitzt Aehnlichkeit mit einer Beerentraube (Taf. III, 2). Wo nur zwei Zellen zusammenliegen, findet der dunkle Streifen sich an der Verbindungsseite häufig, ab und zu sogar an einer Seite einer ganz isolirten Zelle, aber sehr selten. Wo die Streifen an den Zellrändern fehlen, werden die Contouren durch feine dunkle Linien gebildet.

Bei Anwendung starker Vergrößerung stellt sich heraus, dass jene dunklen Streifen eine Längs- und eine sehr deutliche Querstreifung besitzen, also aus quergestreiften Fibrillenbündeln bestehen. Diese Bündel sollen künftig, obwohl die Bezeichnung dem Gang der Untersuchung vorgreift, als intercelluläre Fibrillenbündel, und die daraus sich bildenden Stränge, welche die Zellen umgrenzen, kurz „Grenzstränge“ benannt werden.

Daneben wird auf der Oberfläche der Zellen selbst ebenfalls Längs- und Querstreifung sichtbar, indessen ist hier die Längsstreifung meist stärker ausgeprägt als die Querstreifung. Diese Zellstreifung, welche natürlich ebenfalls nur von Muskelfibrillen herrühren kann, ist aber von denkbar verschiedener Beschaffenheit und zeigt ausserordentlich complicirte Verhältnisse. Dieselben können nur auf-

geklärt werden mit Hülfe mindestens 700—800facher Vergrößerung und unter Combination der mannigfachen Bilder, welche sich in einer Reihe von Präparaten beobachten lassen. Es mag gleich vorweg bemerkt sein, dass das alte schematische, von Ranvier angegebene Zellbild — Querstreifung der Zelloberfläche, eventuell nur sichtbar als quergestreifter Zellsaum — beim Pferde höchst selten gesehen wurde.

Bisweilen haben die innerhalb der Fäden liegenden Zellen eine auffallend starke Längs- und Querstreifung, herrührend von einem sehr dichten Fibrillenbündelbelag, welcher in der Richtung der Fäden- und der Zellaxe verläuft. Diese Fibrillenbündel gehen über ein Anzahl hinter einander liegender Zellen hinweg; die Querseiten, mit denen die letzteren aneinander stossen, sind nämlich durch die ununterbrochen fortlaufenden Fibrillenbündel verdeckt und treten erst bei verändertem Gesichtsfeld als schwarze Querlinien unter jenen zu Tage. Mithin sind auch jene die Zelloberflächen eindeckenden Fibrillenbündel als intercelluläre zu bezeichnen; es wird sich noch weiterhin zeigen, dass sie in dieselbe Kategorie gehören, wie die Grenzstränge.

Die Wahrnehmung, dass intercelluläre Fibrillenbündel über die Zelloberflächen laufen und einen Belag derselben bilden, ist beim Pferde im Ganzen selten zu machen. Meist treten die intercellulären Bündel nur als geschlossene Grenzstränge an den Zellrändern auf und die von ihnen umschlossenen Zellen besitzen dann eine viel schwächere Streifung. Andererseits sieht man öfters den Grenzsträngen ähnliche, compacte Züge von Fibrillen mitten über die Zellfläche hinwegziehen (Taf. III, 1).

Indem die Grenzstränge, wo vollständig vorhanden, die Zellen allseitig umschliessen, bilden sie eine Art Netz. Die Längs- und Querstreifung der Stränge ist dabei lediglich von ihrer eigenen Längsaxe abhängig, die ihrerseits wiederum den Zellrändern parallel ist, welche der Strang umsäumt. So lange der Grenzstrang also an der Längsseite einer Zelle verläuft, steht seine Querstreifung gleichzeitig quer zur Längsaxe der Zelle und könnte danach für Querstreifung der Zelle selbst gelten. Wenn aber der Grenzstrang, an der Querseite der Zelle angelangt, sich an dieser, oft im fast rechten Winkel, umbiegt, so ändert seine Querstreifung ganz ebenso ihre Richtung und steht jetzt annähernd parallel zur Längsaxe der Zelle; eine Thatsache, welche besondere Beachtung verdient. Es soll dabei ausdrücklich constatirt werden, dass die Grenzstränge gleichzeitig mit der fibrillären Streifung der Zelloberfläche sichtbar sind und zu jener in ganz be-

stimmten Beziehungen stehen. Vielfach wird unter dem zwischen zwei Zellen liegenden Grenzstrang die von ihm bedeckte gemeinsame Zellgrenze als dunkle Linie sichtbar; diese Bemerkung macht auch Obermeyer, Lehnert dagegen bestreitet ihre Richtigkeit. Uebrigens unterscheiden sich die Grenzstränge in ihrem Aussehen von gewöhnlichen Muskelprimitivbündeln durch einen oft welligen Verlauf, ein lockerer erscheinendes Gefüge und deshalb wohl auch nicht so scharf hervortretende Querstreifung. Dass geschlossene intercelluläre Fibrillenstränge vollkommen frei zwischen den Zellen verlaufen, um dann wieder an Zellen heranzutreten, wird unten genauer beschrieben werden (Taf. III, 1).

Die Zelle selbst besitzt auf ihrer Oberfläche im Allgemeinen ebenfalls Längs- und Querstreifung, oder, um falschen Auffassungen zu begegnen, besser gesagt einen fibrillären Belag, ganz abgesehen natürlich von den intercellulären, bereits beschriebenen Fibrillenbündeln, welche sie bisweilen bedecken.

Die an dem Fibrillenbelag der Zelle sichtbare Querstreifung ist viel schwächer als die der Grenzstränge, was auf dünnere Fibrillenschichten deutet. Die Anordnung der Fibrillenbündel bietet ebenso verschiedenartige als überraschende Bilder.

An vielen Zellen laufen die sehr feinen Fibrillenbündel unter sich und zur Längsaxe der Zelle parallel in dichter Lage, wodurch die ganze Zellfläche wirklich quergestreift erscheint; nichtsdestoweniger sind diese Bündel weder vollkommen parallel, noch bilden sie in der Regel eine solide Zellrinde, sie liegen vielmehr meist locker und jedes gesondert erkennbar. Ihren Ursprung nehmen sie in diesem Falle von den Grenzsträngen an den Querseiten der Zelle, scheinen aber auch an den Längsseiten mit denselben Verbindungen einzugehen.

Ein solcher immerhin rindenähnlicher Zellbelag von parallelen Fibrillenbündeln, deren Querstreifung in der That Querlinien über die ganze Zelloberfläche bildet, findet sich aber fast nur innerhalb intacter Fadenstücke, seltener an losgerissenen Zellhäufchen und ganz ausnahmsweise an isolirten Zellen; an letzteren sind dann die Querländer leicht gezähnt, wie zernagt, was wohl durch die Bruchenden der abgerissenen Fibrillenbündel entsteht.

Obwohl diese von den Grenzsträngen entspringenden und die Zellen überziehenden Bündel ebenfalls manchmal noch über die Zellgrenzen hinausgehen, sind sie doch im Wesentlichen Eigenthum der

einzelnen Zelle und sollen als primäre oder äussere Zellfibrillen (-Bündel) bezeichnet werden.

An kleineren Zellhaufen, besonders aber an allen theilweise oder ganz freiliegenden Zellen ist die Lage dieser Fibrillen meist viel weniger dicht, oft sind sie sehr spärlich oder garnicht vorhanden. Je geringer ihre Anzahl ist, um so besser und klarer lassen sich aber überraschende Eigenthümlichkeiten ihrer Anordnung und ihres Verlaufes erkennen.

Es zeigt sich nämlich, dass sie keineswegs in der Regel unter sich parallel sind oder irgend einer bestimmten Richtung zur Zellaxe folgen. Dies wird schon durch v. Hessling anerkannt und von Löhnert eingehend beschrieben, dessen Angaben, soweit sie sich nur auf den Verlauf der Zellfibrillen beziehen, hier im Wesentlichen bestätigt werden. Alle anderen Autoren nehmen an, dass die Fibrillen lediglich unter sich und zur Zellaxe parallel laufen; diese Annahme steht in scharfem Gegensatz zu dem, was sich bei allen Thieren, am klarsten beim Pferde, constatiren lässt.

Man sieht die einzelnen feinen Fibrillenbündel nach verschiedenen Seiten schräg und quer über die Zellen laufen; sehr häufig tritt eine grosse Anzahl an einem Punkte auf die Zellfläche, um von hier aus fächerförmig über dieselbe auszustrahlen und ungeordnet durcheinander zu gehen; sie schnüren sich oft knotenartig von dem an einer Längsseite der Zelle liegenden Grenzstrang ab und ziehen, beiderseits weit ausbiegend, quer nach der gegenüberliegenden Seite. Starke Grenzstränge lösen sich, an einer Zelle auslaufend, völlig in feine Bündel auf und senden dieselben divergirend über die ganze Zellfläche. Ganz besonders an den bekannten traubenartigen Zellhaufen verlieren sich die vom Mittelstrang zwischen die Zellen hineingehenden Queräste in dieser Weise auf den Zellen, und auch jener verzweigt sich schliesslich ebenso auf einer Zelle, welche die Spitze der Traube bildet (Taf. III, 2). Ein Präparat, welches nicht allein diese Verzweigung, sondern das Wesen der Grenzstränge und ihr Verhältniss zu den Zellen in klarster Weise veranschaulichte, verdient vielleicht eine specielle Beschreibung: In einer breiten Lücke zwischen auseinander gerissenen Zellen verläuft ein starker Fibrillenstrang, der sich in zwei Aeste theilt. Der linke Ast begrenzt eine an seiner Aussenseite liegende, lange Zelle, an welche zunächst spärliche Fibrillen abgegeben werden. Am oberen Ende der Zelle biegt sich derselbe auf die Zellfläche hinauf, löst sich in feine Bündel auf, welche über den Zellrand auf die nächste Zelle

treten, erst hier sich völlig ausbreiten und zum Theil noch auf die dritte Zelle sich fortsetzen. Der rechte Ast geht eine Strecke weit zwischen den Zellen, ohne sie zu berühren, vorwärts, ist an einer Stelle (augenscheinlich gewaltsam) um sich selbst gedreht, tritt dann an eine vor ihm liegende Zelle und löst sich in der bekannten Weise auf. (Taf. III, 1.)

Je geringer die Zahl der äusseren Fibrillenbündel ist, um so besser lässt sich natürlich der Verlauf jedes einzelnen, durch seine Querstreifung scharf hervorgehobenen Bündels verfolgen und zugleich feststellen, dass eine Querstreifung eben nur den einzelnen Fibrillenbündeln, nicht aber der Zellfläche an sich eigenthümlich ist. Da aber diese Bündel in ihrer Richtung unter sich und zur Zellaxe keinerlei Regel gehorchen, so kann von einer Querstreifung der Zelloberfläche garnicht gesprochen werden.

Zwischen den primären Zellfibrillenbündeln, die zwei Seitenlinien und eine Querstreifung in Form glänzender Querstriche erkennen lassen, tritt nicht das nackte Zellprotoplasma zu Tage, vielmehr wird unter ihnen noch ein dichtes, wirres Netz feinsten Fibrillen sichtbar, welche als einfache Linien erscheinen, sich kreuz und quer, auch wohl durch mehrere Lagen hindurch verflechten.

Da die primären Bündel, welche sich auf der Zelle verzweigen, in jenes Netz übergehen und sich darin auflösen, da sogar Einzelfibrillen von den Grenzsträngen aus sich direct in dasselbe einsenken, so stellt dieses Fibrillennetz sich als die Fortsetzung der primären Fibrillenbündel dar und bildet demnach die innerste Schicht des fibrillären Zellbelags.

Die Fibrillen, aus denen dieses Netz besteht, werden als innere Zellfibrillen oder Endfibrillen bezeichnet werden.

Das innere Fibrillennetz kann natürlich nur in den Lücken zwischen den äusseren Fibrillenbündeln sichtbar werden, also am besten da überblickt werden, wo jene überhaupt fehlen, und dies ist an den isolirten Zellen meistens der Fall.

Die Herauslösung der einzelnen Zellen aus ihrer Umgebung scheint bisher nicht gelungen zu sein, es wird wenigstens an keiner Stelle darauf hingewiesen. Obermeyer sagt ausdrücklich, dass nie Körner ohne Längs- und Querstreifung gesehen wurden, danach hat er auch keine isolirten Zellen gesehen. Ranvier giebt nur an, dass durch starke Kalilauge die Fäden in einzelnen Schollen mit der daran haftenden fibrillären Rinde zerlegt wurden.

Wenn v. Hessling sagt, dass die Körner aus der Zwischen-substanz ausfallen können, und Lehnert angiebt, dass die „Protoplastmakugeln“ sich herausquetschen lassen, setzt dies ganz andere Verhältnisse voraus. Da aber Lehnert bemerkt, dass diesen „herausgequetschten“ Protoplastmakörpern Reste fibrillärer Substanz zuweilen anhaften, und sie für selten erklärt, so hat er wohl einzelne isolirte Zellen gesehen, ohne indess dieselben besonders zu beachten und Consequenzen daran zu knüpfen. Die Isolirung der Zellen gelingt aber leicht bei allen Thieren, weniger an frischen und Spirituspräparaten, als an solchen, welche in Ammonium-monochromat.-Lösung gelegen haben, und man kann durch Schaben mit der flach gehaltenen Präparirnadel einen Faden fast ganz in einzelne Zellen zerlegen, zwischen welchen dann kleinere und grössere Stücken von Fibrillenbündeln liegen, welche jedenfalls von den zerrissenen intercellulären Fibrillenbündeln oder dem abgestreiften fibrillären Zellbelag stammen.

Wie bereits angedeutet wurde, haben ganz oder theilweise freigelegte Zellen sehr selten eine einigermassen dichte Hülle primärer Zellfibrillen. Meist ist dieselbe bis auf wenige spärliche Reste verschwunden; einzelne schwache Bündel, durch ihre deutliche Querstreifung immerhin scharf von dem inneren Fibrillennetz unterschieden, laufen an einem Rande der Zelle entlang oder ziehen vom Rande aus über die Zelle hinweg, um entweder die gegenüberliegende Seite zu erreichen oder sich mitten auf der Oberfläche der Zelle zu verlieren, also in das Fibrillennetz einzusenken (Taf. III, 3). An zahlreichen Zellen endlich ist keine Spur jener primären Fibrillenbündel mehr zu finden, sie sind nur noch von dem inneren Fibrillennetz umspannen.

An solchen Zellen ist, beim Pferde wenigstens, gar keine Querstreifung mehr zu sehen, nur ein mehr oder weniger dichtes Gewirr feinsten verästelter Linien über körniger Substanz — dem Zellprotoplasma. Wenn aber einzelne jener feinen Linien verfolgt und kleinere Zellpartien unter Heben und Senken des Tubus länger betrachtet werden, erscheinen die Fibrillen des Netzes nicht mehr als einfache Linien, sie machen den Eindruck von Reihen feinsten Körnchen, indem in ihrem Verlauf helle und dunkle Pünktchen abwechseln. Es sind also ebenfalls quergestreifte Fibrillen, und wenn diese Eigenschaft niemals an allen Fibrillen des Netzes zugleich erkennbar ist, scheint es doch zweifellos, dass alle dieselbe besitzen müssen.

Auch das innere Fibrillennetz ist aber nicht überall von gleicher Qualität. An vielen isolirten Zellen ist es auffallend spärlich, es ist

dabei oft nicht die geringste Andeutung einer Querstreifung an den Fibrillen zu erkennen, diese selbst sind vielmehr ebenfalls undeutlich und erscheinen nur noch als ein Gewirr verschwommener Striche und Häkchen. Sicher ist also jedenfalls, dass auch das innere Fibrillennetz grösstentheils fehlen kann. Möglich ist ja, dass, auch wo eine Querstreifung an den Fibrillen nicht mehr zu sehen ist, dieselbe dennoch existirt; es ist indess sehr zweifelhaft, ob jene undeutlichen dunklen Linien überhaupt noch Fibrillen sind, es ist vielmehr anzunehmen, dass es sich hier um Zellen handelt, welche von ihrer fibrillären Hülle vollkommen befreit sind und auf denen nur die Fibrillen eine Anzahl von Eindrücken hinterlassen haben, welche bei dem Härten des Materials in dem Zelleib sich ausgeprägt haben.

Die Formen und die Grösse der isolirten Zellen sind sehr verschieden, aber ihre Gestalt ist stets scharf bestimmt und charakteristisch. Die Randzonen sind meist durchsichtiger als das Innere und die Zellen von beträchtlicher Dicke, andere dagegen mehr abgeplattet. Ovale oder gar rundliche Zellen sind viel seltener als breite Schollen mannigfacher Gestalt, theils eckig, theils abgerundet (Taf. III, 3) mit scharfen glatten Contouren. Hier und da macht ein Zellrand, an welchem dann immer noch einige Fibrillenbündel eintreten, den Eindruck, als ob hier eine Verbindung gewaltsam gelöst sei. Manche Zellen haben einen stielförmigen Ansatz und dann gewöhnlich ellipsoide Form. In dem Stiel treten Fibrillenbündel ein, an einer Zelle am entgegengesetzten Ende in einem schmaleren Zipfel theilweise wieder aus (Taf. III, 3); in einem einzigen Präparat fanden sich 6 solcher Zellen.

An freiliegenden Zellrändern kommen doppelte Contouren vor, welche indess niemals rings um die ganze Zelle gesehen wurden; die äussere Linie scheint manchmal zerrissen. Es kann sich hierbei um eine Endothelscheide der einzelnen Zellen handeln, deren Vorhandensein auch Obermeyer annahm. Da dieselbe nur an solchen Zellen bemerkt wurde, denen die äusseren Zellfibrillen fehlten, so müsste diese Scheide, wie das auch natürlich erscheint, unter jenem Fibrillenbelag liegen, aber ihrerseits das Endfibrillennetz mit einschliessen, so dass die Uebergänge der äusseren in die inneren Fibrillen die Scheide durchsetzen würden. So sehr eine derartige Endothelscheide der Zelle mit den anderen Untersuchungsergebnissen übereinstimmte, ist ihre Existenz doch zunächst noch nicht erwiesen; es kann sich auch um Reste der allgemeinen Bindegewebsscheide des Fadens handeln, welche an einzelnen Zellen sitzen geblieben ist; freilich ist dies unwahr-

scheinlich, wenn man bedenkt, dass an den Zellen sogar der ganze äussere fibrilläre Belag fehlt, von der Fadenscheide also schwerlich noch etwas an der Zelle befestigt sein kann.

Das Protoplasma der Zellen, welches zwischen dem Endfibrillennetz sichtbar wird, ist körnig. Während allgemein die Zellränder durchsichtiger und schwächer gekörnt sind, zeichnen sich einzelne Gruppen von Zellen durch einen Saum aus, welcher stark gekörnt ist und viele kurze Strichelchen enthält. Da dies ziemlich selten ist, glaube ich, dass es sich um besonders dicke Zellen mit starkem Endfibrillennetz handelt und dass die Körnchen und Strichelchen des Saumes die Quer- und Schrägschnitte der Endfibrillen sind, indem das die Zelle allseitig umflechtende Fibrillennetz bei einer gewissen Einstellung nicht von der Fläche, sondern im Durchschnitt erscheint.

Die Zellen sind kernhaltig; die Kerne, deren sehr häufig zwei in einer Zelle liegen, sind gross, mit scharfem Contour, im Innern stark gekörnt und mehrere Kernkörperchen enthaltend. Sie sind oft garnicht, immer nur schattenhaft sichtbar inmitten einer Anhäufung grobkörniger Substanz.

Stumpf endigende, mit abgerundeten Zellen geschlossene schmale Fadenstücke kommen häufig vor; der Widerspruch Lehnert's gegen diese auch von Obermeyer gemachte Angabe ist irrthümlich.

Uebergangs- oder besser Verbindungsstellen zwischen den Purkinje'sche Fäden und den Primitivbündeln des Myocardium habe ich, wenn auch nicht zahlreich, gefunden. Ihre Construction war einigermaßen verschieden: Ein Primitivbündel verliert seine geradlinige Cylinderform, es macht kurze Wellen, lockert sich auf und verbreitert sich dementsprechend. Dann treten Einschnürungen auf, zwischen denen bauchige Erweiterungen liegen, und bald darauf löst es sich theilweise auf; zu beiden Seiten des fortlaufenden Hauptstranges treten Purkinje'sche Zellen zu Tage und die von jenem sich abzweigenden Fibrillenbündel ziehen als Grenzstränge zwischen die Zellen oder in breiten Lagen über die Zellflächen. Der Uebergang des Muskelbündels zu den Purkinje'schen Zellen macht sich also hier insofern allmählich, als das erstere zunächst noch ein geschlossener Strang bleibt und als solcher einige (3—4) hintereinander liegende Zellen völlig umhüllt, die in den bauchigen Erweiterungen deutlich erkennbar sind, ehe es sich zwischen den Zellen verbreitet. Dementgegen wird ebenso oft beobachtet, dass ein Muskelbündel, welches zwar stets

wellig, sonst aber ganz unverändert ist, unvermittelt an einen breiten Zellhaufen herantritt und sich sofort auf demselben verzweigt.

Nach allen den beim Pferde gemachten Wahrnehmungen ist die Angabe Obermeyer's — die einzige vergleichende Bemerkung —, dass das Protoplasma der Purkinje'schen Zellen des Pferdes meist nicht zu sehen sei, unverständlich.

Die Purkinje'schen Fäden der Ziege kommen denen des Pferdes in ihrer Structur am nächsten. Sie sind sehr zahlreich, von Fett umgeben und mit blossem Auge zu sehen.

Die Bindegewebsscheide der Fäden ist noch stärker, schwerer zu entfernen und wird der Untersuchung vielfach hinderlich; die Fäden selbst aber sind leichter zerreisslich und oft liegen ganze Haufen getrennter Zellen beieinander, durch die Bindegewebsscheide allein zusammengehalten.

Die Fäden sind bis 10 Zellen breit, ebenso liegen zahlreichere Zellschichten übereinander; die Scheiden enthalten sehr viele Capillaren.

Die besten Präparate lieferte auch wieder das mit Ammonium-monochromat.-Lösung behandelte Material. An diesem gelang durch Zufall die Sonderfärbung der Zellkerne. Stückchen des abgezogenen, Fäden enthaltenden Endocardium werden mit Picrocarmin intensiv gefärbt und wieder in die Ammonium-monochromat.-Lösung einige Zeit eingelegt. Die rothe Färbung des Gewebes wird dadurch ausgezogen und wieder in eine blassgelbliche verwandelt, in welcher die dunkelrothen Kerne sehr schön hervortreten, während sie sonst an den Purkinje'schen Zellen garnicht oder schwach sichtbar sind. Da übrigens nicht allein die Kerne der Purkinje'schen Zellen, sondern auch die der Musculatur und des Bindegewebes ebenso gefärbt sind und die Färbung überall leicht gelingt, wenn zu starkes Entfärben vermieden wird, so wäre die Methode vielleicht überhaupt zur Kerntinction verwendbar.

Die Anordnung der intercellulären Fibrillenbündel in den Fäden tritt bei der Ziege etwas anders auf. Bei schwacher Vergrößerung sieht man die dunklen Streifen an den Zellgrenzen seltener und dann viel schmaler als beim Pferde, wogegen die Längs- und Querstreifung auf den Zelloberflächen viel stärker ist. Es besteht hier gerade das umgekehrte Verhältniss wie beim Pferde; die Regel ist hier, dass dichte Lagen intercellulärer Fibrillenbündel die Zellen überziehen und

die Querseiten derselben, da sie selbst ausschliesslich der Fadenrichtung folgen, in der bekannten Weise verdecken. An den Längsrändern der Zellen häufen sich die Fibrillenbündel zwar zu dichteren Lagen und bilden so auch etwas dunklere Streifen, aber sie weichen nicht von der Richtung ab und ziehen nicht um die Querseiten der Zellen, sind also keine Grenzstränge in dem bekannten Sinne.

Es kommen indess auch diese die Zellen allseitig umgebenden Grenzstränge vor; dieselben kreuzen sich da, wo sie von der Fadenaxe abweichen, also an den Querseiten der Zellen, mit den die letzteren überziehenden intercellulären Fibrillenbündeln, und es zeigt sich dabei, dass sie unter jenen liegen.

Häufiger als beim Pferde sieht man compacte Fibrillenstränge über die Oberfläche der Zellen ziehen.

Die die Zellen bedeckenden intercellulären Fibrillenbündel sind auch bei der Ziege meist nur innerhalb intacter Fadenstücke vorhanden und fehlen an kleineren Zellhaufen. Dann ist die Längs- und Querstreifung der Zellen eine viel schwächere und ihre Umrisse treten als einfache dunkle Linien scharf hervor.

Auch dieser fibrilläre Belag, welcher über die Zellgrenzen nicht hinausgeht und demnach den äusseren Zellfibrillenbündeln entspricht, ist indessen stärker und regelmässiger als beim Pferde. Die Fibrillen verlaufen der Zellaxe parallel und ihre Querstreifung geht in der That quer über die ganze Zelloberfläche.

Wahrscheinlich werden die primären Zellfibrillen von den intercellulären Bündeln, der Anordnung derselben entsprechend, in der Weise abgegeben, dass sie einfach deren unterste Schicht bilden und sich von jenen nur durch feinere Bündel und dadurch unterscheiden, dass sie eben die Zellgrenzen nicht überschreiten.

An solchen Zellhaufen mit ausschliesslich den Zellaxen parallelem Fibrillenbelag und ohne Grenzstränge zwischen den Zellen tritt allerdings eine Aehnlichkeit mit kurzen Muskelbündeln hervor.

Aber häufig genug ist auch bei der Ziege diese regelmässige Anordnung des fibrillären Belags nicht vorhanden. Die äusseren Zellfibrillenbündel ziehen in geringerer Zahl vereinzelt und unter sich divergirend schräg über die Zelle. An einer Einzelzelle lief nur ein einziges solches Bündel über dieselbe, und an vielen isolirten Zellen ist Aehnliches zu sehen, wenn auch selbst an diesen häufiger der vollständige Belag erhalten bleibt.

Das innere Fibrillennetz verhält sich ebenso wie beim Pferde.

Doch sind manchmal an Zellen, welche nur Endfibrillen haben, kleine Felder der Zelloberfläche mit ganz feinen, schwer sichtbaren Querlinien überzogen, es müssen also in den oberen Schichten des Netzes die Fibrillen partienweise einander parallel laufen, ohne indess zugleich der Zellaxe parallel zu sein; unter diesen parallelen Lagen laufen die Fibrillen wirr durcheinander.

Unter den sehr zahlreichen isolirten Zellen giebt es auch solche, welche nur wenige Endfibrillen ohne erkennbare Querstreifung haben, und andere, wo zwischen dem schwach körnigen Protoplasma nur undeutliche Drucklinien verlaufen und Fibrillen mit Sicherheit nicht mehr nachzuweisen sind.

Die Kerne liegen in stark körniger Substanz, der Regel nach zwei in einer Zelle und dann stets dicht beieinander. Sie haben einen scharfen Contour, sind länglichrund, meist sehr viel länger als breit und oft geradezu stäbchenförmig, das eine Ende etwas dicker als das andere; ihre Form ist dabei oft in ähnlicher Weise homolog, wie die zweier Mandeln, die in einer Schale zusammenliegen. Manche erscheinen zerfallen; alle sind im Innern gekörnt und enthalten 2—3 Kernkörperchen. Sie liegen im Centrum der Zelle; denn wenn auf sie eingestellt wird, verschwindet die Querstreifung der Zelloberfläche gänzlich. Mehr als zwei Kerne in einer Zelle sind weder bei der Ziege noch bei anderen Thieren gesehen worden.

Endothelscheiden kamen an keiner Zelle vor, stiel förmige Ansätze ganz ausnahmsweise.

An einer breiten Zelle mit dichtem Fibrillenbelag hängt ein langes, schmales, gewundenes Fibrillenbündel. Augenscheinlich ist dies eine Verbindungsstelle mit der Musculatur. Solche Fibrillenbündel laufen auch öfter eine Strecke weit neben den Zellen her, um dann plötzlich auf ihnen zu verschwinden, wahrscheinlich indem sie sich in intercelluläre Fibrillenbündel auflösen.

Bei dem Rinde bilden die Purkinje'schen Fäden ein sehr dichtes und starkes Netz, das von dicken Bindegewebs- und Fettscheiden umschlossen ist. Die Fäden sind breiter und dicker als irgendwo. Zerlegung der Fäden und Isolirung der Zellen gelingt leicht.

Die intercellulären Fibrillenbündel finden sich hier regelmässig als starke Grenzstränge, welche die Zellen allseitig umziehen und ein vollständiges Netz zwischen ihnen bilden. Ausserdem aber ziehen sie auch in mächtigen Schichten, welche der Richtung des Fadens folgen,

über die Zellflächen. Die Grenzstränge liegen unter jenen Schichten und kreuzen sich mit denselben, wie schon bei der Ziege erläutert wurde.

Auch hier kann die intercelluläre Fibrillendecke fehlen und der feinere eigentliche Zellbelag hervortreten, welcher ebenfalls oft der Axe des Fadens und der Zelle parallel ist. In einer Häufigkeit aber, welche dies zu einer charakteristischen Eigenthümlichkeit stempelt, kommt eine gleichsam entgegengesetzte Anordnung der primären Zellfibrillenbündel vor. Die Mehrzahl derselben geht nämlich unter sich parallel quer über die Zellen, d. h. sie kreuzen die der Fadenaxe folgenden intercellulären Fibrillen, unter welchen sie deswegen überall deutlich sichtbar werden. Sie umgeben die Zellen wie Reifen, und indem sie von dem Grenzstrang einer Längsseite zur anderen gehen, könnte man sie für die Querstreifungslinien der Zelloberfläche halten, wenn sie nicht selber deutlich quergestreift wären. Es verlaufen also hier über die Zellen zwei Fibrillenlagen, davon eine (intercelluläre) der Längsaxe, die andere der Queraxe parallel ist; da beide quergestreift sind, so schneiden sich die Querstreifungen rechtwinklig.

Nur hierauf kann sich die Bemerkung Obermeyer's beziehen, dass die Zellfibrillen der Längsaxe der Züge deshalb nicht immer parallel seien, weil vielfach die Polenden der Zellen dieser Axe zugekehrt seien. Abgesehen davon, dass diese Bemerkung ja überhaupt auf falscher Voraussetzung beruht, werden damit nicht die sich kreuzenden Fibrillenschichten erklärt, die ja nach Obermeyer's Ansicht beide nur der Zelle angehören könnten.

Im Uebrigen finden sich auch beim Rinde genug Zellen, welche die bereits bekannten Eigenthümlichkeiten der äusseren Zellfibrillenbündel und des inneren Fibrillennetzes aufweisen. Auch hier kommen Zellen vor, welche jedes fibrillären Belags gänzlich entbehren.

Die auffälligste und interessanteste Eigenthümlichkeit der Purkinje'schen Fäden des Rindes beruht aber in der That auf der Stellung gewisser Zellen innerhalb der Fäden.

An den Rändern der Fadenstücke liegt, dicht gedrängt, eine Reihe von Zellen, an denen man zwei Theile unterscheiden kann. Der eine Theil jeder Zelle steckt im Innern des Fadens, von anderen Zellen oder dichten intercellulären Fibrillenbündeln vollständig verdeckt, der andere, über den nur vereinzelt intercelluläre Fibrillen laufen, tritt dagegen frei hervor und charakterisirt sich zunächst durch seinen bogenförmigen Aussenrand. Manchmal ist der Bogen flach und

die Zellen berühren sich seitlich, manchmal schneidet er tief nach innen ein und umgrenzt die ganze Aussenzone der Zelle, welche dann mit ihren Nachbarzellen in keine Verbindung tritt; zuweilen biegen sich die Enden des Bogens gegen einander ein und schnüren so die äussere Zellhälfte gegen die innere ab, so dass die Zelle einer Knolle ähnlich wird, die mit breiter Wurzel im Innern des Fadens steckt.

In manchen Präparaten besonders zahlreich, finden sich überall schmale zapfenartige oder breite halbkreisförmige, aus den Fäden herausgerissene Zellhaufen, welche nur aus derartigen Zellen bestehen, die hier vollständig zu übersehen sind.

Es sind auffallend lange, keulenförmige Zellen, welche mit dem schmäleren aber längeren Innentheil untereinander fest verbunden sind und die breiteren abgerundeten Enden nach aussen kehren, den Steinen eines Gewölbes gleich aneinander gefügt. Wo mehrere Zellschichten übereinander liegen, sind dieselben stets concentrisch und so angeordnet, dass die äusseren Zellzonen der unteren Schicht jedesmal frei hervorragen. Die oberen, also zugleich inneren Zelllagen sind von intercellulären Fibrillenbündeln gressentheils bedeckt, welche stets das Centrum der Zellhaufen anfüllen. Man würde diese stumpfen und halbrunden Zellhaufen ohne weiteres für Fadenendstücke erklären, es kommen aber zahlreiche ganz runde Zellhaufen, förmliche Zellrosetten, vor, stets mehrere concentrische Schichten enthaltend, von denen jedesmal die untere einen grösseren Radius hat, als die darüber liegende; im Centrum Fibrillenbündel. Es ist nicht ganz klar, wie diese runden Zellhaufen, die in jedem Präparat vorkommen, sich dem Faden einfügen. Da aber, wo die keulenförmigen Zellen an den Rändern langer Fadenstücke sich finden, nehmen sie demgemäss eine ausgesprochene Querstellung zur Längsaxe derselben ein.

Die Structur des zapfenartigen Innentheils der Zellen lässt sich natürlich nur an freigelegten Zellen untersuchen. Wo mehrere solche zusammenhängen, sind die Innenzapfen fest mit einander verbunden und ihre Grenzen oft nicht überall deutlich erkennbar. Es ziehen nämlich dichte Lagen intercellulärer Fibrillen, der ursprünglichen Stellung der Zellen zur Fadenaxe entsprechend, quer über die Zapfen hinweg. Zwischen der Beschaffenheit des Zellzapfens und des Zellkopfes besteht ein bemerkenswerther Contrast. An den isolirten Zellen sind die Umrisse des ersteren nicht glatt, sondern zerfasert und zernagt, indem die Bruchenden der ihn bedeckenden intercellulären Fibrillenbündel darüber hinwegragen, ja es scheint hier sogar

ein intercellulärer Kitt vorhanden gewesen zu sein, welcher den Zapfenrändern anklebt.

Unter jenen quer verlaufenden intercellulären Fibrillenbündeln, welche meist noch vorhanden sind, verbreitet sich auf dem Zapfen ein dichtes Gewirr stärkerer und feinerer, zum Theil sehr deutlich quergestreifter Fibrillen, welche, obwohl sie durcheinander laufen, im Allgemeinen von der Basis nach dem Zellkopf ziehen und auf diesen ausstrahlen, ohne den Rand zu erreichen. Das Protoplasma des Zapfens ist körnig und enthält stets den Kern, wo ein solcher überhaupt sichtbar ist.

Die unregelmässigen Umrisse des Zapfens gehen plötzlich in die scharf geschwungene, glatte Bogenlinie des Zellkopfes über. Dieser ist auffallend durchsichtig, hat fast gar keine Körnung und wenig Fibrillen, worunter selten stärkere, erkennbar quergestreifte.

An manchen Zellen scheinen sowohl am Kopf wie am Zapfen keine Fibrillen, sondern nur Eindrücke vorhanden zu sein.

Die keulenförmigen Zellen, die zapfenartigen und runden geschichteten Zellhaufen passen in das gewohnte Bild der Purkinje'schen Fäden nicht hinein, die Construction der Fäden muss demnach beim Rinde eine eigenartige sein. Diese Zellen präsentiren sich allerdings nur an den Rändern der Fäden, dass sie indess nicht einfache Reihen bilden, lehren die schon erwähnten Zellhaufen; sie sind jedenfalls auch im Innern und auf der dem Auge zugewandten Fläche des Fadens vorhanden, wo sie natürlich eine andere Ansicht gewähren.

Danach scheint es, als ob die Fäden beim Rinde einen Grundstock hätten, der aus intercellulären Fibrillenbündeln besteht und an welchem langgestreckte Zellen festsitzen, indem sie ihr zapfenartiges Ende nach innen kehren und die Zellfibrillen in dieses eintreten lassen. Zwischen den Zellzapfen, welche sich mit den Nachbarzellen berühren, verlaufen starke intercelluläre Fibrillenzüge. Die nach aussen gekehrten breiten Zellköpfe würden demnach wie Dachziegeln zu einander liegen, während zwischen und über ihnen ebenfalls intercelluläre Fibrillenzüge sich befänden.

Diese Bauart ist aber keinesfalls die herrschende, da sich genug Einzelzellen und Zellhaufen finden, welche nur die gewohnten Zellformen aufweisen, und da die Flächenansichten der Fadenstücke meist die schon am Anfang geschilderten Verhältnisse zeigen. Ob überhaupt sich Fäden vorfinden, welche nur aus keulenförmigen Zellen bestehen, oder ob diese reihen- und haufenweise zwischen den ge-

wöhnlichen Zellen vorkommen, endlich ob ihnen eine principielle Bedeutung zusteht oder ob sie nur gewissen Eigenthümlichkeiten in der Anordnung der intercellulären Fibrillen und der Zellen zu einander ihre allerdings ganz abnorme und höchst eigenthümliche Gestalt und Structur verdanken — über diese Fragen kann noch keine sichere Entscheidung getroffen werden.

Jedenfalls stellen die keulenförmigen Zellen, da sie in so grosser Menge auftreten, einen wichtigen, eigenartigen Bestandtheil der Purkinje'schen Fäden des Rindes dar und liefern sehr interessante Aufschlüsse über die Histologie der Fäden und der Zellen.

Abgesehen von den keulenförmigen Zellen ist der Bau der Purkinje'schen Fäden beim Schafe dem beim Rinde sehr verwandt. Sie sind ebenso zahlreich, stark und breit, mit festen Scheiden umschlossen.

Die Anordnung der intercellulären Fibrillenbündel ist ebenfalls ganz dieselbe, in gleicher Stärke finden sie sich als Grenzstränge und überziehen in breiten Schichten die Zellen.

Dass die Mehrzahl der äusseren Zellfibrillen reifenförmig um die Zelle laufen, ist beim Schafe noch häufiger und ausgeprägter als beim Rinde (Taf. III, 6).

Durch Schaben mit der Präparirnadel wird der ganze Faden in einzelne Zellen zerlegt, zwischen denen in Menge zerrissene Fibrillenbündelstücke liegen.

Sehr viele dieser Zellen — und das ist beim Schafe auffällig — haben nur noch ein sehr schwaches Fibrillennetz, an welchem Querstreifung nur schwer erkennbar ist, und jene Zellen, welche nur undeutliche Drucklinien haben, sind häufig.

Beim Schafe, wie auch beim Rinde, finden sich vereinzelte grosse, stumpf-ovale oder fast rundliche, dicke, gelbe Körper inmitten der Fäden. Dieselben bestehen aus einer von einem dichten Netz feiner Strichelchen durchzogenen, schwach körnigen Masse, die einen scharfen Umriss hat. Sie sind rings von einem schmalen Streifen umgeben, dessen fibrillärer Bau keinen Zweifel darüber lässt, dass er einer Purkinje'schen Zelle angehört; von demselben gehen manchmal Fibrillen über jenen Körper. Die Körper liegen also innerhalb einzelner Purkinje'scher Zellen, die colossal vergrössert sind. v. Hessling hat sie ebenfalls beim Schafe gesehen und sie vermuthungsweise für Psorospermien-schläuche gehalten. So nahe der Gedanke liegt, erweckt ihre Beschaffenheit doch begründete Zweifel dagegen, indess

vermag ich eine andere, zweifelfreie Erklärung nicht hinzuzufügen; dass es sich um eine pathologisch veränderte Zelle ohne fremden Körper darin handelt, ist wohl nicht anzunehmen.

Während alle bisher beschriebenen Purkinje'schen Fäden bei blossem Ueberblick fast gleichförmig aussehen und ihre charakteristischen Unterschiede erst bei eingehender Untersuchung offenbaren, machen diejenigen des Schweins sogleich einen fremdartigen Eindruck. Auch sie sind mit blossem Auge zu erkennen und ihre Existenz ist ja auch von allen Autoren anerkannt. Wenn aber das Endocardium, in dem sie tief eingebettet liegen, abgezogen wird, so bleiben sie kaum sichtbar; niemals treten sie auf der Innenfläche des Endocardium, wie bei den anderen Thieren, als starke, dunkle Fäden hervor und hinterlassen auch keine Abdrücke in der Musculatur, wie sie dies sonst am gehärteten Material thun, wenn sie mit dem Endocardium abgehoben werden.

Unter dem Mikroskop zeigen sie sich als breite aber dünne Züge, welche nur schwach gegen das Endocardium abstechen — im Gegensatz zu allen vorher genannten Fäden. Sie vom Endocardium abzuheben, gelingt nicht (allerdings sind vom Schwein nur frische und Spirituspräparate untersucht), dasselbe muss zerzupft werden.

Die Purkinje'schen Fäden sind von einer ganz besonders starken, vielschichtigen Bindegewebsscheide umschlossen; die innere Schicht derselben scheint structurlos, umschliesst die Fäden sehr fest und legt sich dicht den am Rande liegenden Zellen als feiner Saum an.

Die Fäden sind sämtlich einschichtig und deshalb so schwach sichtbar. Die Zellen sind fast alle länglich abgerundet, im Allgemeinen etwas schmaler als sonst. Sie sind an den schmalen Seiten mit einander verbunden und zwischen den Längsseiten finden sich innerhalb intacter Züge unregelmässige Löcher und Spalten, so dass auch das Gefüge des Fadens lockerer erscheint als sonst.

Dichte Züge intercellulärer Fibrillenbündel mit starker Querstreifung laufen, im Allgemeinen der Längsaxe der Zellen folgend, über dieselben und treten an den schmalen Verbindungsseiten auf die nächsten Zellen über. Diese Bündel, welche trotz übereinstimmender Richtung völlig durcheinander laufen, hüllen die Zellen ein; von Grenzsträngen ist nirgends etwas zu sehen, obwohl die Fibrillenbündel an den Längsseiten der Zellen sich etwas häufen. Nur an wenigen

Stellen hat der fibrilläre Zellbelag eine regelmässige Form und deckt die Zellen mit geradlinigen feinen Fibrillenbündeln.

Wo die intercelluläre Fibrillenhülle fehlt, ist die Querstreifung meist ganz ausserordentlich schwach und schwer sichtbar, dennoch sind die Zellen von einem sehr starken und dichten Fibrillennetz überzogen. Der Unterschied zwischen den äusseren und inneren Zellfibrillen kommt hier fast garnicht zur Geltung, beide bilden zusammen das deshalb aussergewöhnlich starke Fibrillennetz, dessen Querstreifung wegen des wirren Verlaufes der Fibrillen nur schwach hervortritt, aber stets erkennbar ist. An einzelnen Zellen ist meist nur dieses Netz vorhanden; nackte Zellen wurden nicht gefunden. Das Protoplasma ist gröber gekörnt und Kerne meist nicht sichtbar. Die Zellgrenzen sind nicht so glatt, wie bei den anderen Thieren, sehen vielfach faserig aus und es scheint demnach, als ob auch die oberen Lagen des Fibrillennetzes theilweise über die Zelle hinausgingen, was ja nichts Besonderes wäre, da dieses Netz beim Schwein, wie erwähnt, auch den äusseren Zellfibrillen entspricht.

Die Purkinje'schen Fäden des Schweins bilden in vielen Beziehungen einen vermittelnden Uebergang zu den von mir im Hundherzen aufgefundenen, indessen stehen diese in einem noch viel grösseren Contrast zu den bei den übrigen Thieren vorkommenden Fäden, und darin liegt auch wohl der Grund, dass ihre Existenz bisher bestritten worden ist.

Aeby und Obermeyer wollen sie zwar gesehen haben, und der letztere macht dies durch eine kurze zutreffende Bemerkung noch glaubhafter, übrigens aber beschränken sich beide darauf, ihr Vorhandensein zu constatiren.

Die Unterschiede zwischen den Purkinje'schen Fäden des Hundes und denen anderer Thiere sind zu gross, als dass sie in der allgemeinen Beschreibung der Purkinje'schen Fäden, welche jene beiden Autoren geben, ohne weiteres mit einbegriffen werden könnten. Dieselbe ist in der That für sie nicht zutreffend, und es ist daher nicht zu verwundern, wenn Lehnert bestreitet, dass die ihm von Obermeyer übersandten Präparate wirklich Purkinje'sche Fäden enthielten. Zweifel an der Identität der bei Hunden vorkommenden Fäden mit den bei anderen Thieren gefundenen sind in der That zunächst berechtigt und können nicht durch eine blosser Behauptung zurückgewiesen, sondern müssen durch den Thatbestand Punkt für Punkt

widerlegt werden. Eine eingehende Beschreibung scheint daher nothwendig zu sein.

Im Herzen eines grossen Hundes waren die Purkinje'schen Fäden als die unverkennbaren, grauen, gelatinösen Streifen in spärlicher Anzahl wahrzunehmen. Sie erwiesen sich bei der mikroskopischen Untersuchung als viel zahlreicher vorhanden, und es ist daher möglich, dass sie überhaupt nur unter günstigen Verhältnissen und manchmal garnicht mit blossem Auge gesehen werden können, sonst würden sie so gründlichen Forschern, wie Lehnert, nicht entgangen sein.

Sie sind also jedenfalls weniger deutlich und am abgezogenen Endocardium, so wie die des Schweins, nicht mehr zu unterscheiden.

Unter dem Mikroskop sieht man nach vollständiger Entfernung der anhaftenden Muskelfasern am ungefärbten Präparat blasse, aber von deutlicher Scheide eingeschlossene Züge im Endocardium, welche grossentheils aus locker nebeneinander liegenden Zellen oder zellähnlichen Stücken bestehen.

Schon jetzt tritt trotz des fremdartigen Bildes eine schwer verkennbare Aehnlichkeit mit Purkinje'schen Fäden hervor, und Obermeyer, der die Purkinje'schen Zellen ja für kurze Muskelbündel ansieht, mag vielleicht überhaupt keine Schwierigkeit darin gefunden haben, jene Stücken, die in der That kurzen Muskelbündeln gleichen, ohne weiteres als Purkinje'sche Zellen zu definiren.

Nachdem durch gründliches Zupfen das umgebende Bindegewebe, soweit möglich, entfernt ist, sind die Züge grösstentheils in regellos neben- und übereinander liegende, eckige, kurze Stückchen zerfallen, welche eine starke Querstreifung besitzen und dadurch Bruchstücken der Musculatur jedenfalls ähnlicher sind als den bekannten Formen Purkinje'scher Zellen.

Vergleicht man sie aber mit den Primitivbündeln des Myocardium, so sind sie auch von diesen ganz verschieden.

Sie sind mindestens doppelt, in der Regel aber drei- bis fünfmal so breit als jene, selten viel länger als breit, oft breiter als lang; ihre Querstreifung erscheint matt und unregelmässig gegenüber den glänzenden feinen Querlinien der Primitivbündel.

Das merkwürdigste ist, dass die weitaus meisten dieser Stücken — eine andere Bezeichnung lässt sich zunächst nicht anwenden — einen oder mehrere kurze, im Verhältniss zur Breite des Stückes sehr schmale, stielartige Ansätze haben, deren Querstreifung etwas schärfer

ist. Die Ansatzstelle dieser Stümpfe ist verschieden, wie ihre Zahl, und bestimmend für die Form der Stücke.

Bald bildet ein solcher Stiel die Fortsetzung eines Seitenrandes und giebt dem Stücke das Aussehen eines Beiles; oder er setzt in der Mitte eines Querrandes an und ruft die Form einer Schaufel hervor; manchmal treten mehrere an verschiedenen Stellen heraus und verursachen eine ganz unregelmässige Gestalt; bisweilen sieht man auf der dem Auge zugewandten Oberfläche des Stückes einen solchen Stiel, welcher sich dann recht deutlich als Anhängsel kennzeichnet. Sehr häufig sind zwei einander gegenüber liegende Stiele vorhanden und dann tritt meist eine Verschmälerung des Stückes nach beiden Stielen hin und eine länglich-rundliche Form zu Tage, aus welcher die Stümpfe scharf heraustreten; hier ist die Aehnlichkeit mit dem Bruchstück eines Muskelbündels ganz verloren.

Endlich aber findet man beim Durchsuchen der Haufen und besonders freiliegend mehr und mehr Formen, welche eben nur als Zellen bezeichnet werden können und auch weiter nichts sind. Dieselben besitzen abgerundete Enden, sind länglich oval oder weniger regelmässig gebildet. Manche haben ganz die Umrisse des Längsdurchschnittes einer Pflaume: an der breiteren und flacheren Basis sitzt ein Stiel, das gegenüberliegende Ende ist abgerundet und etwas schmaler.

Daneben finden sich in den Haufen auch längere, quergestreifte Stücke; manche bestehen aus mehreren, durch stark verschmälerte Zwischenstücke verbundenen, hintereinander liegenden, breiten Bäuchen (Taf. IV, 1).

Die Mehrzahl hat geradlinige Längsränder, welche indess nicht parallel, vielmehr buchtig und zackig sind. Die Stücke haben demnach unregelmässige Gestalt und meist zahlreiche, stielförmige Ansätze, welche sich entweder wie Aststümpfe um einen Stamm vertheilen oder wie die Finger der Hand aus dem keulenförmig verbreiterten Ende des Stückes hervortreten.

Es muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass beim Zupfen von Muskelbündeln aus der Tiefe des Myocardium niemals auch nur entfernt ähnliche Formen gefunden wurden.

Mit starker Vergrösserung sieht man die Querstreifung der kurzen und der längeren Stücken sehr stark hervortreten, während die fibrilläre Längsstreifung viel weniger oder fast garnicht sichtbar ist. Die Querstreifung geht an den langen Stücken stets, meist auch an den

kurzen ununterbrochen über die ganze Oberfläche; an anderen aber differenzieren sich breite, in sich geschlossene, durch schmale Spalten getrennte Fibrillenstränge, die nicht ganz parallel über die Zellen laufen. In den Spalten, welche die Querstreifung unterbrechen, kommen feinere Fibrillenbündel divergirender Richtung zum Vorschein. Die Querränder der Stücke sind oft leicht gezähnt und lassen die Bruchenden der Fibrillenbündel erkennen, wo aber Stiele vorhanden sind, kommen nur in ihnen solche Bruchenden vor, während die Umrisse des Stückes sonst scharf und glatt sind. Die starke Fibrillenbündeldecke fehlt aber häufig, besonders da, wo die mehr eckige Gestalt einer abgerundeten Platz macht, d. h. wo eben in Folge ihres Fehlens die Zellform deutlicher zu Tage tritt. Da gehen wenige Fibrillenbündel vom Stiel aus auf die Zelle, verlieren sich auf ihr oder treten in einem der Eintrittsstelle gegenüber liegenden Stiel theilweise wieder aus (Taf. IV, 1). Dazwischen treten ganz feine Fibrillenbündel und Einzelfibrillen hervor, welche sich in der bekannten Weise kreuz und quer über die Zelle verzweigen und ebenfalls quergestreift sind.

Es giebt Zellen, welche nur dies feine Netzwerk besitzen, und endlich solche, an welchen weder Querstreifung noch Fibrillen mehr zu erkennen sind, sondern nur die bekannten spärlichen Drucklinien.

Das Protoplasma der Zelle ist grobkörnig wie beim Schwein; Kerne vielfach zu sehen, oval und starkkörnig, hier aber von einem hellen Hof mit scharfem Contour umgeben.

An eine Zelle tritt ein langer dünner geschlängelter Fibrillenstrang, und während ein schmaler Ast desselben an einer Längsseite der Zelle emporsteigt, geht der Hauptstamm an der anderen Seite entlang und biegt sich um den oberen Querrand der Zelle herum, hier abgerissen; aus dem Theilungswinkel strahlen spärliche Fibrillenbündel auf die sonst nur mit feinsten Endfibrillen bedeckte Zelle aus.

Damit darf der Nachweis der Purkinje'schen Fäden beim Hunde als erbracht gelten; es wäre geradezu unmöglich, die beschriebenen Gebilde für etwas Anderes als Purkinje'sche Zellen zu erklären, da sie eben alle charakteristischen Eigenschaften derselben in sich vereinigen.

Sonderbare Formen gewöhnlicher Primitivbündel können es nicht sein, denn abgesehen davon, dass sie sich nur unter dem Endocardium vorfinden, giebt es eben keine rundlichen Muskelbündel mit stumpfen Enden, noch weniger Muskelbündel ohne Querstreifung. Sie besitzen

fibrillären, quergestreiften Belag und protoplasmatischen Kern; der Belag kann grossentheils fehlen und die Fibrillen laufen nicht immer parallel; die innersten Fibrillenschichten bilden ein wirres Netz; es fehlt also keines der wichtigen Kriterien der Purkinje'schen Zellen.

Es erübrigt demnach nur, die immerhin erheblichen Unterschiede zu erklären:

In den Purkinje'schen Fäden des Hundeherzens ist Menge und Anordnung der intercellulären Fibrillen, aber auch die Lage der Zellen zu einander eine andere als sonst.

Die intercellulären Fibrillenbündel liegen sehr dicht beisammen und sind weniger aufgelockert als bei anderen Thieren. Nirgends ordnen sie sich zu Grenzsträngen an, sie bilden lediglich jene fibrillären Schichten, welche bereits bei allen Thieren gesehen wurden. Während sie bei jenen aber nur über und zwischen den Zelllagen mehr oder minder dicht verlaufen, schliessen sie hier die einzelnen Zellen vollkommen ein.

Diese Zellen weichen dadurch wesentlich ab, dass sie nicht unmittelbar zusammen, sondern durch Zwischenräume getrennt liegen. Die Fibrillenbündel, nachdem sie, sich entfaltend, eine Zelle umschlossen haben, sammeln sich am Scheitel derselben wieder zu einem Strang, der aber nur den kurzen Raum bis zur nächsten Zelle durchmisst, um sich an dieser wieder zur Zellhülle aufzulösen. Auf diese Weise erfolgt der Uebergang von einer Zelle auf die andere und gleichzeitig die Verbindung der Zellen untereinander; da die Fibrillen oft in mehreren Bündeln von einer Zelle an verschiedene Nachbarzellen gehen, so wird dadurch die Verbindung der verschiedenen Zellreihen und eine allgemeine Verästelung der intercellulären Fibrillenzüge bewerkstelligt, wie dies bei anderen Thieren auf andere Weise ebenfalls geschieht.

Die stielartigen Uebergänge der Fibrillenbündel zu den einzelnen Zellen brechen erklärlicherweise am leichtesten beim Zupfen durch, und so versteht es sich, 1) dass an der Mehrzahl der Zellen ein oder mehrere stielartige Ansätze sich finden, in denen stets die Fibrillenbündel eintreten und abgerissen sind, 2) dass die Zellen beim Zupfen fast alle isolirt werden und 3) dass sie trotzdem meist sogar den intercellulären Fibrillenbelag (dessen Fibrillen eben in den Stielen abgerissen sind) unversehrt behalten. Die längeren quergestreiften Stücke, in denen Einschnürungen mit bauchigen Erweiterungen abwechseln, bestehen eben aus Zellen, welche in der beschriebenen

Weise von Fibrillenbündeln umschlossen werden und im Zusammenhang geblieben sind.

Daneben kommen aber auch häufig genug Zellen vor, deren Ränder sich unmittelbar berühren und bei denen die intercellulären Fibrillenbündel in breiter Schicht von einer Zelle zur anderen ziehen, wie dies bereits mehrfach geschildert ist, nur dass hier die Fibrillen so dicht gelagert sind, dass sie die Zellen vollkommen verdecken. Die Verbindung zwischen derartig zusammenliegenden Zellen ist natürlich besonders fest, und deshalb finden sie sich häufiger zusammenhängend und bilden jene längeren quergestreiften Stücke, welche, da die Zellgrenzen unsichtbar und auch nicht durch Einschnürungen markirt sind, von Muskelbündeln nur durch ihre oben beschriebene Form sich unterscheiden. Natürlich werden auch diese Zellen beim Zupfen oft auseinander gerissen, und man findet deshalb auch isolirte Zellen ohne Stiel, bei denen die Fibrillenbündel am ganzen Querrande abgerissen erscheinen oder fehlen.

Dass die Zellen in ihrer intercellulären Hülle meist eckigen Stückchen gleichen, kann nicht befremden. Einmal sind, besonders auch beim Pferde, die Zellen selbst oft eckig, mehr noch verursacht dies Aussehen der dichte intercelluläre Fibrillenbelag, der die Zelle umschliesst und durch seinen Uebergang in die Stiele derselben ein mehr winkliges Aussehen giebt. Endlich finden sich ja auch abgerundete, ovale, stumpfendige Zellen in Menge; an diesen sieht man die charakteristischen Zellformen, den Eintritt der Fibrillenbündel in den Stielen, die bekannte Verzweigung der Zellfibrillen, welche sich hier ebenso wenig wie beim Schwein in äussere und innere Fibrillen trennen lassen, weil alle netzartig durcheinander laufen — kurz, Verhältnisse, die keiner Erklärung mehr bedürfen.

Endlich ist jene Zelle mit langem Fibrillenstrang (Taf. IV, 1) augenscheinlich eine Uebergangsstelle zur Musculatur; ein Primitivbündel tritt an die Zelle und theilt sich an derselben, gleichzeitig an sie einen Fibrillenbelag abgebend, der übrigens auffällig schwach und wohl künstlich zum Theil entfernt ist.

Da die Zellen locker und, wie es scheint, nur einschichtig liegen, sind die Fäden dünn und durchsichtig bei durchfallendem Licht; da aber der fibrilläre Belag der Zelle zu stark ist, um das Protoplasma durchscheinen zu lassen, haben die Fäden weniger gelatinösen Habitus. Aus beiden Gründen erklärt es sich, dass sie mit blossem Auge weniger deutlich und oft vielleicht garnicht gesehen werden.

Den Werth vergleichender Untersuchungen beweist am besten nicht allein die Wahrnehmung, dass man bei den verschiedenen Thieren immer denselben Dingen, aber in anderer Form und Einkleidung begegnet und gerade aus dieser Verschiedenartigkeit heraus am besten ein Bild des wesentlichen und allgemein gültigen gewinnt, für diesen Werth spricht noch mehr die Erkenntniss, dass in dem Studium gewisser Eigenthümlichkeiten bei einer Thierspecies zugleich der Schlüssel gewonnen wird zu dem Verständniss verwandter Eigenschaften bei einem anderen Thiere, die aber in einem viel grelleren Gegensatz zur allgemeinen Regel stehen und ohne die Kenntniss gewisser Uebergangsformen räthselhaft bleiben würden. So wären auch die Purkinje'schen Zellen beim Kaninchen garnicht aufzufinden und zu verstehen ohne Zuhülfenahme der beim Hunde gemachten Beobachtungen.

Mit blossem Auge entdeckt man im Kaninchenherzen keine Purkinje'schen Fäden. Zieht man Stückchen des Endocardium ab, entfernt möglichst die anhaftende Musculatur und zupft dann, so trifft man quergestreifte Züge, die von dichter Bindegewebsseide umschlossen sind, aber nicht die geringste Aehnlichkeit mit den gewöhnlichen Purkinje'schen Fäden haben, andererseits trotz ihrer Querstreifung aber auch von den Primitivbündeln ganz verschieden sind. Dagegen fällt, abgesehen von der Bindegewebshülle, sofort eine gewisse Formenverwandtschaft mit jenen längeren, unregelmässigen Stücken in den Fäden des Hundeherzens auf.

Es sind eigentlich keine Fäden, vielmehr eigenthümlich sprossige Gebilde, im Aussehen ähnlich gewissen Cactusarten oder baumförmigen Korallen. Die einzelnen Sprossen sind viel breiter als Primitivbündel und von ganz unregelmässiger Gestalt. Bald sind sie eine Strecke weit ziemlich schmal, bald verbreitern sie sich keulen- oder sogar plattenartig, bald laufen die verbreiterten Enden spitz zu, bald sind sie stumpf und abgerundet. Die Ränder sind nicht parallel, mit Zacken und Vorsprüngen, Ausbuchtungen und stielartigen Fortsätzen versehen. Die Querstreifung ist überall deutlich, fibrilläre Längsstreifung weniger.

Eine Zusammensetzung aus einzelnen Zellen lässt sich nicht erkennen; durch fortgesetztes Zupfen werden aber kleinste Theilchen freigelegt, welche nichts Anderes sind als Purkinje'sche; von dichtem Fibrillenmantel umhüllte Zellen. Aus einem einzigen Zuge wurden

9 solcher Gebilde isolirt (Taf. IV, 2). Den meisten dieser Zellen, welche alle Querstreifung haben, haften augenscheinlich noch intercelluläre Fibrillenbündel in grösserer Menge an, von denen ihre Formen zum Theil verdeckt sind. Die meisten zeigen trotzdem aber eine charakteristische Form; sie sind länglich, mit etwas schwächerer Basis und dickerem runden Kopf. An den ganz isolirten Zellen ist die Basis abgerissen, und man sieht, dass die Zellen damit befestigt gewesen sind. In der That finden sich bei anderen Zellen an der Basis stielförmige Reste quergestreifter Fibrillen. Andere Zellen sitzen mit der Basis einem Fibrillenstrang, von dem nur noch ein Bruchstück vorhanden ist, sprossenartig seitwärts auf. Wahrscheinlich ist die Stellung aller Zellen eine ähnliche. Eine so genaue Feststellung der Zusammensetzung der Züge, wie sie beim Hunde gegeben werden konnte, scheiterte hier an der Schwierigkeit, dieselben vollständig zu zerlegen. Indessen ist aus der Form der Züge und der Zellen zu folgern, dass ähnliche Verhältnisse vorliegen wie beim Hunde. Die intercellulären Fibrillenbündel schliessen die Zellen vollständig ein, welche nicht dicht beieinander liegen, sondern getrennt zwischen den Fibrillenbündeln, hier wahrscheinlich sogar in grösseren Zwischenräumen, eingestreut sind. Das Wesentlichste, worauf es ankam, war der Nachweis ihrer Existenz. Die Form der Zellen dürfte jeden Zweifel daran zerstreuen. Die Zellen sind den beim Hunde gefundenen Zellformen ausserordentlich ähnlich, und wenn es auch nicht gelingt, über die feineren Details ihres fibrillären Belags Aufschluss zu erhalten, weil sie alle ziemlich vollständige Querstreifung behalten haben, so können es doch eben ihrer Form wegen keine Muskelbündel, es müssen daher Purkinje'sche Zellen sein. Die übrigen abnormen Verhältnisse, besonders der Umstand, dass die Zusammensetzung der Züge aus Zellen nur aus dem Vorhandensein herausgerissener Zellen geschlossen werden kann, bieten zu keinen Bedenken Anlass, da wir eben beim Hunde eine vollkommene Analogie dafür gesehen haben, deren Kenntniss eine Erklärung für die Beschaffenheit der Purkinje'schen Zellen beim Kaninchen nicht schwer werden lässt.

Wegen Mangel an Material war es mir nicht möglich, auch das Herz des Menschen in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen; trotzdem hierin bisher keine Purkinje'schen Fäden gefunden wurden, ist ihre Existenz doch nicht unwahrscheinlich und wohl nur unter ähnlichen verwickelten Verhältnissen verborgen, wie sie z. B. beim

Kaninchen sich zeigen. Die Lösung dieser Frage muss einer ferneren Untersuchung vorbehalten werden.

Die Entwicklungsgeschichte der Purkinje'schen Fäden hat nur den allgemeinen Entwicklungsmodus aufzuklären, dessen Grundzüge, unabhängig von der späteren individuellen Gestaltung der Fäden, bei allen Thierspecies dieselben sein werden. Da es demnach gleichzeitig vergleichender Untersuchungen nicht bedarf, denen schon die Beschaffung des Materials hinderlich wäre, habe ich mich darauf beschränkt, Embryonen vom Schafe¹⁾ in jeder Woche der Fötalzeit, vom Anfang bis über die Hälfte derselben hinaus, und desgleichen Kalbsembryonen in den letzten zwei Dritteln des intrauterinen Lebens zu untersuchen, so dass alle Entwicklungsperioden und gleichzeitig zwei Thierklassen vertreten sind.

Der Auffindung Purkinje'scher Zellen in dem frühesten Lebensabschnitt begegnen grosse Schwierigkeiten, wenigstens bei den mir zu Gebote stehenden Hilfsmitteln. Dieselben beruhen auf der Winzigkeit der Herzhohlräume, der Unmöglichkeit, Stücken des Endocardium genügend von der Musculatur zu trennen, endlich der Beschaffenheit der Zellen selbst.

So ist es mir nicht gelungen, im Herzen des 2 $\frac{1}{2}$ Cm. langen¹⁾, etwa 5 Wochen alten Schaffötus die Zellen zu finden.

Die Beobachtungen darüber beginnen bei einem 4 $\frac{1}{2}$ Cm. langen Embryo, der etwa das Alter von 7 Wochen hat.

Die Musculatur des Herzens besteht in diesem Stadium aus Zellen, welche sich zu langgestreckten Bündeln zusammenlegen. Die Zellen sind sehr lang und schmal, sonst von der Mannigfaltigkeit in der Form, welche den in der Entwicklung stehenden Zellen eigen zu sein pflegt. Eine zweite allgemeine Eigenschaft ist der sehr grosse, eirunde, granulirte Kern, welcher 2—3 mal so breit ist als der Zelloib, so dass der letztere da, wo der Kern liegt, eine bedeutende Auftreibung besitzt und der Kern an den Seiten nur von einer ganz schmalen Protoplasmazone eingefasst wird. Nach den Enden hin verschmälern sich die Zellen meist, haben also Spindelform; andere sind an dem einen Ende beträchtlich breiter und haben hier oft einen oder zwei Ausläufer. Das Zellprotoplasma ist ganz schwach körnig; an den

¹⁾ Die Messungen verstehen sich von der Schwanzwurzel bis zum Ohr und von da bis zur Schnauze.

Seitenrändern der Zelle taucht eine Reihe glänzender Pünktchen oder ganz kurzer Strichelchen, mit regelmässigen Abständen von einander, auf; es ist dies die in der peripheren Zellzone eben beginnende Querstreifung, welche indess nur mit den stärksten Vergrösserungen sichtbar gemacht wird.

Die Zellen legen sich zu schlanken Bündeln zusammen, in welchen die Zellcontouren als feine Längslinien erscheinen.

Neben den Spindelzellenbündeln finden sich andere Bündel, welche breiter und gedrungener sind, stumpfe Enden und an den Seiten bogige Ausbuchtungen haben, in denen Kerne liegen, welche überhaupt sehr zahlreich in kurzen Abständen nebeneinander lagern. Jene Ausbuchtungen an den Bündeln sind die Umrisse rundlicher Zellen, aus denen das ganze Bündel besteht. Sie sind fast so breit als lang und unterscheiden sich dadurch auffällig von den Spindelzellen, was besonders an einigen frei neben einem Haufen liegenden Zellen sich zeigte (Taf. IV, 3).

Die Zellen sind stark granulirt, haben grosse Kerne, die aber viel kleiner sind als der Querdurchmesser der Zelle, und keine Querstreifung an ihren Rändern. Im Innern des Zellhaufens sind die Zellcontouren weniger gut zu übersehen, da hier viele Schichten übereinander zu liegen scheinen. Ausserdem verlaufen in der Mittellinie des Haufens, ziemlich dicht beisammen, der Länge nach feine Linien, von denen einzelne auch über die an den Rändern gelegenen Zellen hinwegziehen. An diesen vereinzelt und am besten zu übersehenden Linien zeigen sich deutlich die Merkmale einer Querstreifung, es sind also Muskelfibrillen.

Diese Zellhäufchen, welche aus breiten, von den Spindelzellen ganz verschiedenen Zellen bestehen und über welche Muskelfibrillen hinziehen, müssen demnach als die Anfänge der Purkinje'schen Fäden angesehen werden.

Lehnert hat behauptet, die Purkinje'schen Fäden beim 6 Cm. langen Schaffötus als solide cylindrische Fäden mit vielen Kernen gefunden zu haben, an denen keine Spur einer Zelltheilung vorhanden wäre; die Zellen differenzirten sich erst später. Diese Angabe ist also irrthümlich. Uebrigens ist auch, die entwicklungsgeschichtliche Möglichkeit ausser Acht gelassen, nicht erfindlich, warum solche Fäden gerade Purkinje'sche Fäden sein sollten, denen sie durch nichts ähnlich sind; eher könnte es sich um in die Länge gewachsene Spindelzellen mit mehreren Kernen handeln, welche in jener Periode sich

finden. Es darf demnach bezweifelt werden, dass Lehnert die Purkinje'schen Fäden in diesem Stadium gefunden hat.

Die sichere Unterscheidung der Purkinje'schen Zellhäufchen ist übrigens nur unter Hülfe stärkster Vergrößerungen möglich; sie haben hier noch nicht jenes charakteristische Gefüge, welches sie bald darauf schon bei schwacher Vergrößerung zwischen den Muskelbündeln erkenntlich macht; eine Bindegewebsscheide ist noch nicht vorhanden.

Abstechender ist ihre Gestalt schon bei dem etwa 9 Wochen alten, 9 Cm. langen Fötus.

Die Muskelzellen haben die Spindelform grösstentheils verloren und sind zu schmalen Fasern ausgewachsen, in welchen mehrere nicht mehr so breite Kerne hintereinander liegen. Die sehr deutliche Querstreifung reicht über die ganze Oberfläche der Fasern.

Die Purkinje'schen Zellen sind breite Schollen, die je einen runden Kern enthalten. Sie liegen in breiten, stumpf endigenden Zügen zusammen und über sie zieht sich ein Gewirr deutlich quergestreifter Fibrillen oder wohl feiner Fibrillenbündel, welche ebenso an den Zellrändern als über die Zellflächen ohne bestimmte Richtung verlaufen. Dass die Zellen selbst keine Querstreifung besitzen, sieht man besonders an freiliegenden, an welchen vielfach gar keine Fibrillen vorhanden und deren Randzonen lediglich schwach granulirt sind. Die Zellen sind granulirt und an den Rändern durchsichtiger als in der Mitte. Die vereinzelte Lage der Fibrillen ermöglicht es, ihren Verlauf über mehrere Zellen zu verfolgen; an einer freiliegenden Zelle ragte ein feines, am Zellrande hinlaufendes Bündel über denselben, augenscheinlich abgerissen, weit hinaus und war am Ende umgebogen. Jene Fibrillen sind also intercellulär (Taf. IV, 4).

Bei dem etwas über 10 Wochen alten, 12 Cm. langen Embryo hat bereits die Zusammensetzung des Myocardium lediglich aus Muskelfasern, anstatt aus Zellen, Platz gegriffen. Auch der Purkinje'sche Faden hat bereits alle die wesentlichen Eigenschaften, welche er nach abgeschlossener Entwicklung zeigt. Schon mit 250 maliger Vergrößerung sieht man die breitscholligen Zellen, welche von intensiver gefärbten Streifen grösstentheils umrandet sind. Bei starker Vergrößerung erklären sich diese Streifen als stark quergestreifte Grenzstränge, welche dasselbe Verhalten, wie beim ausgewachsenen Thiere, zeigen. Ausserdem haben die Zellen einen schwachen, nicht parallelen Fibrillenbelag, an dem theilweise auch Querstreifung zu sehen ist. Neben den zu Grenzsträngen gewordenen intercellulären Fibrillenbündeln

treten also jetzt auch Zellfibrillen auf, die aber besonders an den aussen gelegenen Zellen oft fast ganz fehlen. An einer isolirten Zelle lag an einer Seite ein abgerissenes Fibrillenbündel, die übrigen Ränder waren ganz ohne Streifung (Taf. IV, 5).

Bei dem 14 Cm. langen Embryo, der die 11. Woche überschritten hat, finden sich die Fäden, in Bindegewebscheiden eingeschlossen, bereits als starkes Netz unter dem Endocardium. Hier, wie auch beim 13 Wochen alten Embryo, sind, ausser der stärkeren Entwicklung der intercellulären und der Zellfibrillen, Veränderungen von Bedeutung gegenüber der früheren Periode nicht mehr wahrzunehmen.

Die folgenden Untersuchungen sind am Kalbsfötus vorgenommen und beginnen mit einem 16 Cm. langen, in der 14. Lebenswoche stehenden Fötus. Hier bilden die Purkinje'schen Fäden ein dichtes Netz unter dem Endocardium. Die Verzweigungen der Fäden sind niemals spitzwinklig, sondern bogenartig ausgerundet, wodurch bei dem Zusammentritt vieler Fäden breite Platten entstehen. In den Fäden liegen 10 Zellen und mehr quer nebeneinander; Fadenbruchstücke verhalten sich im Aussehen zu den zusammenliegenden Primärbündeln wie ein abgehauener Stamm zu einem Reisigbündel; sie sind von bindegewebiger Scheide umschlossen, an den abgerissenen Enden kolbig verbreitert und aufgeblättert.

So charakteristisch schon ihre Form entwickelt ist, befindet sich die Ausbildung des fibrillären Bestandtheils doch bedeutend im Rückstande gegenüber derjenigen beim gleichalterigen Schafe. Im Verhältniss zur Gesamtdauer des intrauterinen Lebens entspricht allerdings die 14. Woche beim Kalbe etwa derjenigen Zeit, in welcher beim Schafe die gleiche Entwicklungsstufe der Fibrillen vorhanden war.

An der Musculatur, deren schmale kurze Fasern noch an die Zellform erinnern, beginnt die Querstreifung in der peripheren Zone. An den Purkinje'schen Fäden verläuft der Länge nach ein ziemlich dichter Fibrillenbelag mit sehr schwacher Querstreifung. Innerhalb der einzelnen Zellen sieht man ein schwaches Fibrillengewirr, dessen Querstreifung nur an einzelnen Fibrillen nachzuweisen ist (Taf. IV, 6).

Die Querstreifung der Musculatur ist am 16 wöchentlichen, 20 Cm. langen Fötus fein, aber über der ganzen Oberfläche erkennbar. Das Fibrillennetz auf den Purkinjeschen Zellen ist dichter, die Querstreifung der Fibrillen deutlicher. An den Zellrändern an und für sich existirt auch hier keine Querstreifung, die Umriss der Zellen sind feine dunkle Linien (Taf. IV, 7).

Erst in der 19. Woche, am 27 Cm. langen Fötus, haben die Fäden diejenige Entwicklung erreicht, welche sie beim 10wöchentlichen Schaffötus haben. An den Zellgrenzen werden dunkle Streifen sichtbar, d. h. Grenzstränge umschliessen die Zellen, und der fibrilläre Zellbelag wird stärker.

Von jetzt ab macht lediglich die Ausbildung des Fibrillensystems Fortschritte in der bekannten Weise, und schon vor Ablauf des fötalen Lebens ist auch der fibrilläre Zellbelag von dem der ausgewachsenen Zellen nicht mehr verschieden.

Das Studium der Purkinje'schen Zellen in den verschiedenen Perioden ihrer Entwicklung liefert also ein Resultat, welches sich den bei den ausgewachsenen Zellen ermittelten Untersuchungsergebnissen in allen Punkten entsprechend gestaltet.

Dass sie in den ersten Lebenswochen nicht nachgewiesen werden konnten, ist kein Beweis gegen ihre Existenz, beruht wohl viel mehr auf den geschilderten Schwierigkeiten.

Sie finden sich zu einer Zeit, wo das Myocardium noch ganz aus Spindelzellen besteht, an welchen eben die Umbildung des Protoplasma in fibrilläre Substanz an der peripheren Zellzone sich zeigt. Die Purkinje'schen Zellen haben eine ganz andere, im Laufe der Entwicklung sich wenig mehr verändernde Form und keine Querstreifung. Das Wichtigste ist, dass schon jetzt an dem Purkinje'schen Faden, der freilich nur die Bezeichnung als Zellhaufen verdient, quergestreifte Muskelfibrillen auftreten, welche zwischen und über den Zellen verlaufen.

Was das numerische Verhältniss angeht, so sind die Purkinje'schen Zellen jetzt und in allen späteren Fötalstadien keinesfalls zahlreicher vorhanden, als am ausgewachsenen Thier.

In der folgenden Entwicklungszeit prägen sich die Zellformen aus, wachsen zu breiten Schollen, an welchen übrigens die Kerne stets deutlich sichtbar bleiben. Ein wirres, intercelluläres, quergestreiftes Fibrillennetz verläuft über die schwach körnigen Zellen, dann treten Grenzstränge zwischen und fibrillärer Belag auf den Zellen auf. Die Grenzstränge werden stärker, die Zellfibrillen vermehren sich und differenzieren sich in die verschiedenen Schichten.

Niemals tritt an den Zellen eine Randquerstreifung ein, wie an den Muskelzellen; dies lässt sich in allen Perioden an freiliegenden Zellen nachweisen, denen auch hier der fibrilläre Belag ganz oder

grösstentheils fehlen kann und deren Ränder stets schwächer granulirt scheinen als das Zellinnere.

Es hat sich im Gange der Untersuchung, welche mit der Beleuchtung der Entwicklungsgeschichte der Purkinje'schen Fäden ihren Abschluss findet, nicht überall umgehen lassen, an einzelne Wahrnehmungen Erläuterungen zu knüpfen und den einfachen Thatsachen Ansichten hinzuzufügen. Wenn man aber von einigen Bezeichnungen absieht, die aus Zweckmässigkeitsgründen von vornherein so gewählt werden mussten, wie sie der Natur der Sache zu entsprechen schienen, so beziehen sich alle bisher gegebenen Erklärungen auf Einzelheiten und specielle Verhältnisse, die an jener Stelle erledigt werden mussten.

Es ist bisher möglichst vermieden worden, zu den Fragen, deren Beantwortung die eigentliche Aufgabe der vorliegenden Arbeit bildet, Stellung zu nehmen. Es bleibt also noch übrig, gestützt auf die nun vollständig vorliegenden Untersuchungsergebnisse, an diese Fragen heranzutreten, ihre Entscheidung unter gleichzeitiger Kritik der bestehenden Ansichten zu versuchen und dabei ein allgemeines Bild der Purkinje'schen Fäden zu entwerfen.

Es mögen zuerst zwei Auffassungen ihre Erörterung finden, welche sich nicht auf die histologischen Verhältnisse allein erstrecken, sondern auf die Entwicklungsgeschichte Bezug nehmen und auf Grund derselben kritisirt werden müssen.

Aeby erklärt die Purkinje'schen Zellen für die embryonale Urform aller Zellen des Myocardium. Danach müssten sie bei dem Embryo in grosser Menge vorhanden sein und zu einer gewissen Zeit die Hauptmasse des Myocardium ausmachen. Sie sind aber im Herzen des 7 Wochen alten Schaffötus keineswegs zahlreicher wie beim ausgewachsenen Thiere. Der Einwurf, dass dann ihr Uebergang in Spindelzellen schon erfolgt sein könnte, ist nicht stichhaltig, denn in den vorhergehenden Stadien konnten sie garnicht aufgefunden werden und alle während dieser Zeit vorhandenen Zellen gleichen viel mehr den Spindelzellen als den Purkinje'schen; es liegt also kein Grund vor, sie für letztere zu halten.

Die Ansicht, dass in den Purkinje'schen Zellen die Urform der Muskelzellen zu sehen sei, steht also mit der Entwicklung derselben im Widerspruch.

Ranvier definirt die Purkinje'schen Zellen als embryonale, in der Entwicklung aufgehaltene Muskelzellen. Diese Annahme, welche

sich auf ein oben bereits skizzirtes optisches Bild stützt, hat von vornherein manche Unwahrscheinlichkeit gegen sich. Es ist nicht recht einzusehen, warum eine einfache Verzögerung in der Entwicklung so eigenartige Bildungen zur Folge haben soll. Es ist dabei nicht erklärlich, warum gewöhnliche, in der Entwicklung zurückgebliebene Muskelzellen sich so exclusiv verhalten sollten, dass sie nur unter dem Endocardium vorkommen, getrennt von der übrigen Musculatur, und dass sie sich gar durch eigene Bindegewebscheiden abschliessen, während gerade der Herzmusculatur bindegewebige Scheiden fehlen. Beweisend ist die Entwicklungsgeschichte. Schon in sehr früher Zeit findet sich die bereits charakteristisch gestaltete Purkinje'sche Zelle neben den gewöhnlichen Spindelzellen. Während diese bereits eine Querstreifung erhalten, welche vom Rande aus sich entwickelt, haben die Purkinje'schen Zellen keine Querstreifung, ihre Ränder sind, wie an freien Zellen überall zu sehen, schwach granulirt und durchsichtiger als der Zelleib.

Dagegen verlaufen über und zwischen den Zellen einzelne quergestreifte Fibrillen und feine Fibrillenbündel, die indessen, wie ebenfalls überall constatirt werden kann, nicht den einzelnen Zellen angehören, sondern intercelluläre Fibrillen sind, die also auch nicht aus den Zellen entstanden sind.

Aber der intercelluläre Verlauf jener Fibrillen kann ja bestritten werden, und, diesen selbst zugegeben, kann man doch behaupten, dass die Fibrillen sich aus den Purkinje'schen Zellen entwickelt hätten. Dann würde also die Umwandlung von Protoplasma in fibrilläre Substanz an den Spindelzellen in concentrischen Schichten von der Peripherie aus stattfinden, an den Purkinje'schen Zellen würde sich das Protoplasma zu spärlichen und regellos verlaufenden bzw. sogar auf andere Zellen übergehenden Fibrillen verdichten. Dies wäre eine so principielle Verschiedenheit in dem Entwicklungsgang beider Zellarten, dass beide nicht mehr als gleichartige Zellen angesehen werden könnten, denn ein Aufenthalt in der Entwicklung kann dieselbe wohl verzögern, verkümmern und in andere Bahnen leiten, er kann aber nicht bewirken, dass dieselbe, soweit sie überhaupt stattfindet, sich nach ganz anderen inneren Gesetzen vollzieht.

Da die Purkinje'schen Zellen nicht von Anfang an neben den Spindelzellen nachgewiesen sind, da man ferner vielleicht behaupten kann, dass die auf ihnen verlaufenden quergestreiften Fibrillen ihnen auch entstammten, so bleibt, was die Entwicklungsgeschichte angeht,

allerdings die Möglichkeit offen, dass die Purkinje'schen Zellen musculöse Zellen sind, dass sie sogar von derselben Zelle abstammen wie die Spindelzellen. Aber die Purkinje'schen Zellen wären dann dennoch keine zurückgebliebenen Reste embryonaler Zellen, sie wären vielmehr Zellen, welche in einem sehr frühen Zeitpunkt eine nach ganz abweichenden Gesetzen erfolgende Entwicklung einschlagen, mit deren Vollendung sie nicht allein eine andere Gestalt, sondern auch einen anderen Charakter erlangten. Die Purkinje'schen Zellen würden trotz ihrer Stammverwandtschaft doch eine völlige Sonderstellung einnehmen und als ein selbstständiges musculöses Organ aufgefasst werden müssen. Dies würde ihnen eine ganz andere Bedeutung verleihen, als Ranvier ihnen beimisst.

Mit gleichem Recht kann aber die gegentheilige Behauptung aufrecht erhalten werden, dass die an den Purkinje'schen Zellen des 7 wöchentlichen Fötus wahrnehmbaren quergestreiften Fibrillen, weil sie intercellulär verlaufen, nicht aus jenen Zellen entstanden sind. Sie können dann nur herrühren von Spindelzellen, und darin liegt eine ganz ungezwungene Erklärung ihrer Abkunft. An den Spindelzellen, welche ja dasselbe bedeuten wie die späteren Primitivbündel, ist bereits eine fibrilläre Schicht vorhanden. Diese Schicht löst sich, indem Spindelzellen mit den Purkinje'schen Zellhaufen in Verbindung treten, in die einzelnen Fibrillen auf, wobei das im Innern der Spindelzelle befindliche Protoplasma — wenigstens optisch — verschwindet. Die Spindelzelle thut damit genau dasselbe, was die Muskelbündel thun, welche beim erwachsenen Thiere mit den Purkinje'schen Fäden sich vereinen.

Da sich in jeder Fötalperiode Purkinje'sche Zellen nachweisen lassen, an welchen die Fibrillen gänzlich fehlen, so weist auch dies darauf hin, dass die Fibrillen nicht zur Zelle selbst gehören und von aussen her stammen.

Nach den Ergebnissen, welche das Studium der Purkinje'schen Zellen in den embryonalen Entwicklungsstadien liefert, bilden dieselben entweder ein eigenartiges musculöses Organ, oder es sind überhaupt keine Muskelzellen und sie treten nur mit Muskelfibrillen in Verbindung, welche von aussen her, von den Spindelzellen, stammen.

Wenden wir uns der Histologie der Purkinje'schen Fäden ausgewachsener Herzen zu, so lassen sich aus den widerstreitenden An-

sichten zwei allgemeine Fragen formuliren, die am besten getrennt behandelt werden:

1. Existirt zwischen den Zellen fibrilläre Zwischensubstanz?
2. Was sind die Zellen selbst?

Die erste Frage lässt nur zwei Antworten zu: v. Hessling, Remak und vor Allem Lehnert bejahen sie, während alle Anderen dem entgegengetreten.

Von den Purkinje'schen Fäden beim Hunde (in Rücksicht auf ihre bisher nicht anerkannte Existenz) abgesehen, sind bei allen Thieren, am wenigsten beim Pferde, dichte Lagen intercellulärer Fibrillenbündel vorhanden, welche ausschliesslich der Axe des Fadens folgen und über die Querseiten der Zellen deutlich hinwegsetzen. Sie bilden besonders bei der Ziege und dem Schwein die Hauptmasse der intercellulären Fibrillen. Gut zu sehen sind sie auch bei Rind und Schaf, wo sie sich mit dem reifenförmig quer über die Zellen laufenden Zellfibrillenbelag kreuzen. Hier stehen die Gegner vor einem Widerspruch; sie müssen entweder diese Fibrillenbündel als intercelluläre anerkennen, oder zugeben, dass die der Zelle angehörigen Fibrillenbündel aus zwei sich kreuzenden Schichten bestehen; beides läuft ihren Ansichten zuwider.

Ebenfalls unwiderleglich zeigen sich die intercellulären Fibrillennagen, welche über die Zapfen der keulenförmigen Zellen des Rindes quer hinweglaufen und die Umrisse derselben theilweise verdecken.

Während dieser intercellulären, sehr bedeutenden Fibrillenschichten keine Erwähnung gethan wird, konnten die intercellulären Grenzstränge zwischen den Zellen nicht unbeachtet bleiben.

Die Grenzstränge sind auf optische Täuschung zurückgeführt worden; Obermeyer meint, es seien nur die an den Rändern deutlicher vortretenden Körnerfibrillen. Ranvier und Andere sagen Folgendes: Wird auf das Zellcentrum eingestellt, so ist die Querstreifung der Oberfläche der Zelle nicht sichtbar, sondern nur ein breiter, quergestreifter Saum, der Durchschnitt der fibrillären Zellrinde. Die Grenzstränge, welche die Zelle umgeben, sollen mit diesen Durchschnitten identisch sein. Die grössere oder geringe Breite des Saumes soll die Dicke der Zellrinde angeben und allmählich sollen die Säume bis zur Mitte der Zelle vorrücken, womit dann das Zellprotoplasma völlig verschwunden wäre und die Zelle nur aus Fibrillen bestände.

Die Grenzstränge haben in der That mit derartigen optischen Verhältnissen nichts zu thun. Sie sind kein Attribut der Zellränder.

Sie umschliessen (beim Pferde) zwar die meisten innerhalb der Fäden liegenden Zellen allseitig, fehlen aber auch an einzelnen Seiten derselben. Dagegen gehen derartige Stränge auch mitten über die Oberfläche von Zellen. Regelmässig fehlen die Grenzstränge an den freien Aussenrändern der Zellen, während sie an den gegenüber liegenden Seiten, wo die Zellen noch mit anderen in Verbindung stehen, vorhanden sind. Demnach werden viele Zellen nur an einer Seite von einem Grenzstrange berührt.

An den beim Pferde beschriebenen traubenartigen Zellständen sitzen die Zellen beiderseits oft in Abständen an dem ununterbrochen zwischen ihnen durchgehenden Fibrillenstrang, der sie oft nur tangentialartig streift. Dabei liegen Zellen an solchen Grenzsträngen, welche fast nur das Endfibrillennetz haben, und auch an freien Zellen findet sich oft an einer Seite ein Stück Grenzstrang, während auf der Zelle selbst nur das innere, kaum quergestreift erscheinende Fibrillennetz sichtbar ist. Andererseits fehlen die Grenzstränge an Zellen mit ganz vollständigem fibrillärem Belag, sie fehlen bei der Ziege überhaupt meistens und die Zellumrisse treten dann als feine Linien hervor.

Aus allen diesen Thatsachen leuchtet die Unmöglichkeit hervor, dass die Grenzstränge Durchschnitte der Zellrinde oder die an den Rändern stärker sichtbaren Körnerfibrillen sein können.

Eine zweite Gruppe von Beweisen liegt in dem Verhältniss zwischen Grenzsträngen und Zellfibrillen. Die äusseren Zellfibrillen entspringen von den Grenzsträngen, man sieht dies am besten bei nicht parallelem Verlauf der ersteren. Bei Rind und Schaf gehen dichte Lagen senkrecht aus einem längsseitig liegenden Grenzstrange hervor quer über die Zelle; man sieht sogar die Grenzstränge selber am schmalen Rande einer Zelle sich ganz in Zellfibrillen auflösen; besonders an den traubenförmigen Zellständen beim Pferde verzweigt sich der Mittelstrang derart auf einer die Spitze bildenden Zelle (Taf. III, 2), nachdem er zwischen den anderen Zellen durchgelaufen ist und an sie Fibrillenbündel abgegeben hat.

Endlich ist oben (beim Pferde, S. 171) eingehend beschrieben worden, wie ein Fibrillenstrang ganz frei zwischen zwei Zellreihen verläuft, um dann auf die Zellen zu treten und sich hier zu verzweigen; damit ist also direct bewiesen, dass die Grenzstränge ausserhalb der Zellen liegen.

Nach Art des Verlaufes der Grenzstränge ist es überdies nicht

möglich, in ihnen den Durchschnitt der Zellrinde zu sehen, ohne in einen Widerspruch zu gerathen.

Ist die Purkinje'sche Zelle eine Muskelzelle oder ein Muskelbündel, so bildet ihre fibrilläre Rinde einen Cylindermantel, für dessen Querstreifung die Längsaxe der Zelle die Richtung bestimmt. Wenn bei Veränderung des Gesichtsfeldes die Querstreifung mitten auf der Oberfläche unsichtbar wird, so bleibt ihre Richtung an den Zellrändern, an denen sie noch zu sehen ist, doch natürlich unverändert. Die Grenzstränge aber verlaufen mit ihren Fibrillen immer parallel den Zellseiten, die Querstreifung der Fibrillen steht also stets auf dem Zellrande senkrecht und wechselt mit diesem stets die Richtung. Sie ist daher nicht senkrecht zur Längsaxe der Zelle, sondern — schematisch ausgedrückt — radiär zum Zellcentrum gestellt.

Der Grenzstrang, welcher die Zelle umgiebt, könnte deswegen nur dann der Durchschnitt der Zellrinde sein, wenn diese anstatt eines Cylindermantels eine Kugelschale bildete. Dies steht ebenso sehr im Widerspruch zur Natur des Muskelbündels, als zur Ansicht Ranvier's vom Dickenwachsthum der fibrillären Zellrinde. Wenn die Kugelschale immer breiter würde bis zum Verschwinden des Protoplasmas, dann müsste die Querstreifung schliesslich radiär vom Zellcentrum ausstrahlen, was weder gesehen noch behauptet worden ist. Die Grenzstränge können also garnicht identisch sein mit Durchschnitten der Zellrinde.

Selbst die von den Grenzsträngen ausgehenden äusseren Zellfibrillenbündel überschreiten (Pferd) vielfach noch die Zellgrenzen und setzen sich auf die Nachbarzellen fort; auch sie sind also zum Theil intercellulär.

Endlich ist der Verlauf der Fibrillenbündel in den ersten Entwicklungsperioden ebenfalls ein intercellulärer.

Es existiren also Fibrillenstränge zwischen den Zellen; dieselben bilden sogar einen wesentlichen Bestandtheil der Fäden und der den Zellen selbst eigenthümliche Fibrillenbelag nimmt von ihnen seinen Ursprung.

In der zweiten Frage, welche die Natur der Zellen selbst betrifft, sind ebenfalls zwei Meinungen vertreten, welche indess nicht alle Möglichkeiten erschöpfen.

1. Nach Ranvier, Obermeyer etc. sind die Purkinje'schen Zellen Muskelzellen oder gleichwerthige Muskelbündel mit

Protoplasmakern und quergestreifter Zellrinde, deren Fibrillen der Axe des Fadens und der Zelle parallel laufen.

2. Nach Lehnert existiren überhaupt keine Zellen, sondern nur Einlagerungen von Protoplasmakugeln (embryonalem Bildungsmaterial) zwischen den Fibrillenbündeln.

Was die erste Behauptung anbetrifft, so sind in dieser Hinsicht die Ergebnisse der vorausgegangenen Untersuchung so klar, dass sie an sich selbst beweisend sind und keiner Erläuterungen mehr bedürfen. Es muss also auf sie verwiesen werden, da eine Wiederholung aller an sich gleich wichtigen Details nicht thunlich ist. Es werden einige kurze Hinweise genügen, die Unhaltbarkeit jener Behauptung nochmals klarzustellen:

Die Entwicklung der Purkinje'schen Zellen zeigt schon, dass, wenn die Fibrillen sich überhaupt aus den Zellen entwickeln, Entstehung und Anordnung derselben von der gewöhnlichen Musculatur ganz verschieden ist.

Die Verhältnisse der fibrillären Umhüllung der ausgewachsenen Zellen bringt diesen Unterschied noch viel überzeugender zu Tage. Es ist bereits constatirt, dass die Zellfibrillen von intercellulären Fibrillenzügen entspringen. Rindenähnlicher Fibrillenbelag, dessen Fibrillen der Zellaxe parallel sind, findet sich fast nur innerhalb intacter Fadenstücke, bildet die Regel eigentlich nur bei Ziegen. Ueberall sonst sind die Fibrillen weder der Zellaxe noch sich selber parallel und bilden ein mehr oder weniger lückenreiches Geflecht. Sie ziehen vereinzelt nach allen Richtungen über die Zellen, kreuzen sich, sind in Ursprung und Verlauf genau zu verfolgen, kommen von den Grenzsträngen und gehen über die Zellränder hinaus oder lösen sich auf der Zelle auf. Nur in diesen Fibrillenbündeln ist Querstreifung vorhanden und, da sie ganz verschiedene Richtung haben, ist von einer Querstreifung der Zelloberfläche überhaupt nicht zu reden. Unter den äusseren Fibrillenbündeln liegt das ganz wirre Endfibrillennetz, mit feinsten Fibrillen und schwächster Querstreifung in mehreren Schichten durcheinander verflochten und unmittelbar das Zellprotoplasma umgebend. An den keulenförmigen Zellen beim Rinde geht dieses Fibrillennetz von der Zellbasis nach dem Zellkopf, dessen Scheitel aber frei bleibt und nur die Fibrillen gegen sich ausstrahlen lässt.

Wenn also der die Zellen umgebende Fibrillenbelag wirklich der Zelle selbst angehörte, ihre äussere Zone bildete, so wäre die Zelle deswegen doch nicht gleichbedeutend mit einer gewöhnlichen Muskel-

zelle oder einem Primitivbündel, sie wäre vielmehr ein eigenartiges musculöses Gebilde.

Die Untersuchungsergebnisse führen aber noch einen bedeutsamen Schritt weiter. Der gesammte fibrilläre Zellbelag ist von der Zelle trennbar und es kommen nackte und fast nackte Zellen vor. Wenn Obermeyer gallertartig-durchsichtige, deutlicher gestreifte und ganz muskelähnliche Zellen unterscheidet, so schildert er damit die Verhältnisse nur oberflächlich und unzutreffend. Es wäre nur dann gerechtfertigt, verschiedene Zellarten anzunehmen, wenn dieselben in den Fäden nebeneinander vorkämen. Dort haben indess die Zellen alle ihren vollständigen Fibrillenbelag, und nur wo gewaltsame Störungen des Zusammenhanges der Zellen stattgefunden haben, ermangeln sie desselben mehr oder minder, so dass also eine künstliche Abtrennung vorliegt. Wo die Fäden durch Schaben mit der Präparirnadel ganz in einzelne Zellen zerlegt wurden, sind in grosser Menge zerrissene Fibrillenstücken zwischen denselben zu sehen. Es ist gezeigt worden, dass sehr viele Zellen nur noch das Endfibrillennetz besitzen, dessen Verbindung mit der Zelle natürlich eine besonders feste ist. Auch dies Fibrillennetz fehlt aber oft, und solche Zellen, die für völlig nackt gelten können und nur einige Drucklinien auf ihrer Fläche zeigen, sind, ausser beim Kaninchen, bei allen Thieren gefunden worden. Es ist übrigens unwesentlich, ob man diese wenigen Drucklinien doch für Fibrillen erklären will; es steht jedenfalls fest, dass der ganze fibrilläre Zellbelag, mindestens bis auf kümmerlichste Reste, sich von der Zelle trennen lässt. Dies wäre, wenn derselbe der Zelle selbst angehörte, wenn er gar innerhalb einer Zellmembran läge (Obermeyer), nicht möglich, wenigstens nicht ohne eine gleichzeitige Zerstörung und Zerfaserung des Zelleibes. Diese tritt aber nicht ein; die von ihrem Belag befreiten Zellen haben ihre glatten Umrisse und diejenigen charakteristischen Formen behalten, welche man bereits in den frühesten Entwicklungsperioden an ihnen beobachtet. Die verschiedenen Schichten von Fibrillenbündeln, welche die Purkinje'schen Zellen umgeben, bilden also nicht einen Theil der Zelle und die periphere Zone derselben, sie sind vielmehr nur ein dieselben mehr oder weniger dicht umschliessendes und von ihnen trennbares Geflecht, demgegenüber die Zellen eine selbstständige Existenz bewahren. Damit stimmt die Erklärung, welche bereits bei den embryonalen Zellen für das Wesen und die Abstammung der darüber verlaufenden Fibrillen gegeben worden ist, vollkommen überein.

Die intercellulären und die von ihnen entspringenden Zellfibrillenbündel entstammen den Muskelbündeln des Myocardium, welche an die Purkinje'schen Zellen herantreten. Der Uebergang der Purkinje'schen Fäden zu den Muskelbündeln geschieht nicht durch eine allmähliche Veränderung der Zellnatur, indem die fibrilläre Substanz das Protoplasma allmählich verdrängt, wie Ranvier und Obermeyer annehmen; alle Verbindungsstellen, welche bei verschiedenen Thieren zur Beobachtung gelangten, zeigen vielmehr, dass Primitivbündel ihr Aussehen nur insofern verändern, als sie locker und wellig werden, um dann sogleich zwischen breiten Zellhaufen sich aufzulösen, in denen die Zellen ganz und gar ihre typische Beschaffenheit haben. An einzelnen Stellen vollzog sich der Uebergang auf die Zellhaufen derartig, dass das aufgelockerte Primitivbündel erst einige breite Zellen vollständig einschloss. Bei Ziege und Hund fanden sich grosse protoplasmatische Zellen, an welche ein schmales Fibrillenbündel herantrat, um dieselben als Grenzstrang zu umschliessen und sich dann weiter zu verzweigen. Nur beim Schwein, dessen Zellen überhaupt stark fibrillär gestreift und schmaler sind, vermittelten längere schmalere und dicht mit Fibrillen bedeckte Zellen den Uebergang der Purkinje'schen Fäden zu den gewöhnlichen Muskelbündeln, wie dies Obermeyer für die Regel hält. Die besonderen Verhältnisse der intercellulären Fibrillenzüge bei Hund und Kaniuchen haben bereits ihre Erklärung gefunden.

In den gegebenen Ausführungen ist gleichzeitig eine indirecte Ablehnung der anderen von Lehnert vertretenen Ansicht, dass überhaupt keine Purkinje'schen Zellen existirten, eingeflochten, indessen ist es nöthig, dieser gegenüber noch auf einige Punkte besonders aufmerksam zu machen.

Die Zusammensetzung aus Zellen ist das Characteristicum der Purkinje'schen Fäden von der frühesten Entwicklungszeit an. Will man nun das oben Gesagte ausser Acht lassen und nochmals von der Möglichkeit ausgehen, dass jene Zellen eine besondere Art von Muskelzellen seien, aus denen sich die daran sichtbaren Fibrillen entwickeln, so könnte diese Entwicklung in der That derart erfolgen, dass die Fibrillen auf Kosten des Protoplasmas sich vermehren, zunächst dichte Zellrinden bilden, dann Fibrillen an die Nachbarschaft abgeben, die zu intercellulären Strängen verschmelzen, so dass schliesslich ein dichtes Muskelgeflecht entsteht, in welchem nur noch die unverbrauchten Reste der Zelleiber als Protoplasmakugeln liegen. Nur so

könnte man bei Berücksichtigung der embryonalen Entwicklungsvorgänge sich die Lehnert'sche Ansicht zurechtlegen.

Selbst dann aber treten noch viele Beweisgründe dagegen auf. Zunächst will Lehnert selbst, dass alle Fibrillen aus dem Myocardium entstammen und wieder in dasselbe zurückkehren. Damit behauptet er also, entweder dass sich die Fibrillen nicht aus den Purkinje'schen Zellen entwickelt haben, und dann müssen diese ihre frühere Zellform doch behalten haben; oder er leugnet, dass die Purkinje'schen Zellen von den Muskelzellen verschiedene und ganz eigenartige entwickelte Zellen sind, und dann setzt er sich in Widerspruch zur Entwicklungsgeschichte.

Ueberdies sieht man an den ausgewachsenen Fäden ja ebenso gut, wie beim Fötus, dass die Fäden sich durchaus aus Zellen zusammensetzen und diese mit ihren Rändern überall direct zusammenhängen. An den Fäden der Ziege und des Schweins, wo wenig oder keine Grenzstränge an den Seiten der Zellen hinlaufen, sieht man ja die Zellgrenzen als feine Linien hervortreten. Dieselben werden sogar, z. B. beim Pferde, unter den Grenzsträngen, welche sie bedecken, sichtbar. Eine Veränderung in der Zellform und in der Zusammensetzung der Fäden hat also während der Entwicklung nicht stattgefunden. Endlich würden sich Protoplasmakugeln, die noch dazu von den Fibrillen auch durchsetzt sein sollen, ganz gewiss nicht aus der fibrillären, mit ihnen in innigster Zusammengehörigkeit stehenden Hülle herausreißen lassen, mindestens nur unter theilweiser Zerstörung der Form. Gerade die Form der isolirten Purkinje'schen Zellen ist aber eine charakteristische. Ihre Umrisse sind scharf gezeichnet, ihre Gestalt stimmt mit den Zellen der ersten Perioden, die doch fraglos selbstständige Zellen sind, vollkommen überein, trotz grosser Mannigfaltigkeit. Besonders schöne, breite, eckige Platten finden sich beim Pferde, noch eigenartiger sind die keulenförmigen Zellen beim Rinde. Sie haben ausnahmslos Kerne, und zwar in der Regel zwei, die ebenfalls ganz bestimmte Eigenschaften zeigen. Auch die gestielten Zellen sind erwähnenswerth.

Die Purkinje'schen Fäden, wie sie sich im Herzen der Hausäugethiere finden, bestehen demnach aus Zellen, welche bei Pferd, Ziege, Rind und Schaf unmittelbar aneinander in mehreren Schichten, beim Schwein einschichtig und vielfach nur mit den schmalen Seiten zusammenstossend, beim Hunde und wohl auch beim Kininchen

grösstentheils von einander getrennt liegen. Die an sich nicht muskulösen Zellen treten in Verbindung mit Primitivbündeln des Myocardium, welche sich auf und zwischen ihnen verzweigen und so mit ihnen den Faden bilden. Die an die Zellen herantretenden Primitivbündel lösen sich zu feinen Fibrillenbündeln auf, welche zunächst in breiten Lagen, lediglich der Fadenrichtung folgend, über die Zellschichten hinweg ziehen und die Zellen bedecken. Die mit ihren Rändern aneinander liegenden Zellen sind nicht platt, sondern von mehr oder minder beträchtlicher Dicke, die Flächen wölben sich also von den Rändern nach der Mitte etwas empor und zwischen den Nachbarzellen bilden sich dadurch Vertiefungen, welche furchenartig rings um die Zelle verlaufen. Diese Furchen werden von den tiefsten Lagen der intercellulären Fibrillenbündel ausgefüllt, die als Grenzstränge die Zellen umgeben. Deshalb liegen die Grenzstränge unter jenen Fibrillenschichten, folgen den Zellrändern und bedecken ihrerseits die gemeinschaftlichen Berührungslinien der Nachbarzellen, zwischen denen sie hindurchziehen. In speciellen Raceeigenschaften liegt es, dass die intercellulären Fibrillenbündel bald hauptsächlich schichtenartig über die Zellen ziehen (Ziege), was bei Schwein und Hund, auch beim Kaninchen sogar ausschliesslich der Fall ist, bald hauptsächlich als Grenzstränge zwischen den Zellen verlaufen (Pferd), bald gleichmässig in beiden Formen nebeneinander auftreten (Rind und Schaf).

Von den intercellulären Fibrillenbündeln entspringen die äusseren Zellfibrillen(-Bündel), welche meist in mehreren sich kreuzenden Schichten die Zellen ziemlich dicht umhüllen. Oft überzieht die oberflächliche Schicht derselben die Zelle mit parallel unter sich und zur Zellaxe laufenden Fibrillen, durch deren Querstreifung die ganze Zellfläche Querlinien erhält, so dass die Zelle in der That einem Muskelbündel ähnlich wird. Bei Rind und Schaf gehen häufig dichte Lagen äusserer Zellfibrillen reifenförmig quer um die Zellen. Meistens ist aber der Verlauf der Fibrillen ein regelloser, und hierbei ist, besonders wenn sie nur noch in geringer Menge vorhanden sind, der Ursprung aus den Grenzsträngen besonders deutlich zu sehen.

Die äusseren Fibrillenbündel geben nach innen Fibrillen ab, aus welchen sich das Endfibrillennetz bildet, welches unmittelbar das Zellprotoplasma umgiebt.

Dieser aus verschiedenen Schichten bestehende Zellbelag ist künstlich von der Zelle trennbar. Selbst das Endfibrillennetz fehlt, und

es giebt ganz nackte Zellen, welche nur einige schwache Drucklinien haben. Es ist indess nicht unmöglich und übrigens bedeutungslos, dass jene „Drucklinien“ vielleicht doch die letzten Reste der Endfibrillen sind, obwohl ihr ganzes Aussehen und die mangelnde Querstreifung dagegen spricht.

Die von dem fibrillären Belag befreiten Zellen haben charakteristische Form, scharfe Umrisse, schwach oder stärker körniges Protoplasma und einen, bei Pferd und Ziege fast immer zwei Kerne. Ihre Form ist schon in sehr frühen Entwicklungsperioden die constante.

Diese Zellen sind selbstständige, nicht musculöse Gebilde.

Die Purkinje'schen Fäden finden sich nur in den Ventrikeln, bilden ein Netz unter dem Endocardium und sind von Bindegewebscheiden eingeschlossen. Da sie sich bei allen Haussäugethieren nachweisen lassen, welche bisher fast ausschliesslich das Untersuchungsobject gebildet haben, so ist der Wahrscheinlichkeitsschluss nicht unberechtigt, dass sie bei allen Säugethieren, oder sogar, da Aeb y und Obermeyer sie auch bei Gans und Huhn gesehen haben wollen, bei allen Warmblütern sich finden.

Die Purkinje'schen Fäden bilden nach alledem ein besonderes Organ mit musculösen Wänden, in welchen nichtmusculöse Zellen eingeschlossen sind. Die Natur und Bedeutung dieser Zellen ist noch nicht aufgeklärt und bildet eine Frage für sich, welche kaum durch das Mikroskop allein gelöst werden dürfte und einer besonderen Untersuchung vorbehalten bleiben muss. Ich möchte die Vermuthung aussprechen, dass es sich hierbei um musculomotorische Endapparate handelt und dass die Purkinje'schen Fäden in wichtiger Beziehung zu der Thätigkeit des Herzens stehen.

Erklärung der Abbildungen.

Taf. III.

Fig. 1. Das S. 171 beschriebene Präparat aus dem Herzen des Pferdes.

Fig. 2. Traubenförmiger Zellstand aus dem Herzen des Pferdes. Zelle mit Endothelscheide (?).

Fig. 3. Isolirte Zellen aus dem Herzen des Pferdes mit Resten primärer Zellfibrillenbündel und Endfibrillennetz. Zellen mit stielartigem Ansatz und nackte Zellen.

Fig. 4. Die von Grenzsträngen umschlossenen Zellen aus dem Herzen des Pferdes bei 60 facher Vergrößerung.

Fig. 5 a. Aus dem Herzen des Rindes: keulenförmige Zellen im Zusammenhang und Zellrosette (60 mal vergrößert).

Fig. 5 b. Isolierte keulenförmige Zellen aus dem Rindsherzen.

Fig. 6. Fadenstück mit intercellulären Fibrillenbündeln und reifenförmigem Verlauf der äusseren Zellfibrillen aus dem Schafherzen.

Taf. IV.

Fig. 1 a. Nebeneinander liegende, durch intercelluläre Fibrillenbündel umhüllte und verbundene Zellen aus dem Herzen des Hundes.

Fig. 1 b. Isolierte Zellen, ebendaher.

Fig. 1 c. Uebergang eines Muskelbündels auf eine Purkinje'sche Zelle, ebendaher.

Fig. 2. Isolierte Purkinje'sche Zellen aus dem Kaninchenherzen.

Fig. 3. Zellhäufchen mit intercellulären Fibrillen, zwei isolierte Purkinje'sche und zwei Muskelspindelzellen vom $4\frac{1}{2}$ Cm. langen, 7 Wochen alten Schafembryo.

Fig. 4. Zellhäufchen vom 9 wöchentlichen (9 Cm. langen) Schafembryo.

Fig. 5. Zellhäufchen vom über 10 Wochen alten (12 Cm. langen) Schafembryo.

Fig. 6 a. Fadenstück aus dem Herzen des 14 Wochen alten (16 Cm. langen) Kalbsfötus.

Fig. 6 b. Muskelzellen aus demselben.

Fig. 7. Zellen aus dem Herzen des 16 Wochen alten (20 Cm. langen) Kalbsfötus.

VIII.

Ueber die Schweineseuche.

Von

Dr. **Schütz,**

Professor an der Königl. Thierärzneyschule zu Berlin.

(Hiersu Taf. V.)

In meiner Arbeit: „Ueber den Rothlauf der Schweine und die Impfung desselben“¹⁾ habe ich mich in einer Anmerkung, wie folgt, ausgesprochen: „Herr Stabsarzt Dr. Loeffler hat die Namen: Rothlauf und Schweineseuche in dem Sinne gebraucht, dass er die Krankheit, welche durch die feinen Bacillen verursacht wird, als Rothlauf, und die, bei welcher der andere Bacillus nachzuweisen ist, als Schweineseuche bezeichnete. In demselben Sinne werde ich diese Bezeichnungen in den folgenden Abhandlungen beibehalten.“ Hierdurch ist meine Stellung zu beiden Namen ausreichend gekennzeichnet. Inzwischen ist durch die ätiologischen Forschungen von Loeffler²⁾, Schottelius³⁾ und mir die Sache soweit gefördert worden, dass sich der Rothlauf der Schweine mit Sicherheit erkennen lässt, und ich glaube, dass gerade die von mir mitgetheilten Obductionsberichte für die praktische Thätigkeit der Thierärzte von entscheidender Bedeutung sein werden. In jedem Falle dürfte es nunmehr keine Schwierigkeiten haben, dass für die veterinärpolizeiliche Behandlung dieser Seuche

¹⁾ Dieses Archiv, Bd. XI, Heft 4, 1885; Arbeiten a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte, Bd. I, Heft 1 u. 2, 1885.

²⁾ Loeffler, Experimentelle Untersuchungen über Schweine-Rothlauf. Arbeiten a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte, 1885, S. 46.

³⁾ Lydtin u. Schottelius, Der Rothlauf der Schweine, seine Entstehung und Verhütung. 1885.

erforderliche Erfahrungsmaterial bezüglich der Verbreitung und Uebertragbarkeit derselben zu sammeln.

Dagegen liegen über die als „Schweineseuche“ bezeichnete Krankheit keine ausführlichen Mittheilungen vor, und ich hielt mich deshalb für verpflichtet, diesem Leiden meine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Zu welchem Ergebniss diese Bemühungen geführt haben, soll in den nachstehenden Abhandlungen besprochen werden.

Loeffler sagt an der oben erwähnten Stelle, dass ihm am 26. October 1882 auf dem Viehhofe in Rummelsburg bei Berlin von dem Herrn Kreisthierarzt Eggeling ein Schwein zur Verfügung gestellt wurde, welches, wie letzterer glaubte, soeben am „Rothlauf“ eingegangen war. Bei der Obduction dieses Schweins fand Loeffler Folgendes: „Die Haut am Bauche, an den Geschlechtstheilen und am Halse röthlich livide. Enormes Oedem der Haut am Halse, bis zwischen die Vorderbeine nach abwärts sich erstreckend. Pharynx geröthet und geschwollen. Kehlkopfschleimhaut und Trachealschleimhaut intensiv dunkelroth. Lungen wenig verändert, rechts einige Partien dunkelroth, wenig lufthaltig. Am Herzen nichts Besonderes. Leber und Nieren parenchymatös getrübt. Magenschleimhaut intensiv roth, ebenso die Schleimhaut des Anfangstheils des Zwölffingerdarmes. Darm im Uebrigen unverändert. Mesenterialdrüsen nicht vergrössert. Milz ziemlich gross, dunkel blauroth, ziemlich derb.“ Loeffler besäte aus der ödematösen Halshaut, Leber und Niere je drei Gläschen mit Kaninchenbouillon, erstarrtem Hammel-, Kälber- und Pferdeblutserum, und fand am folgenden Tage die Kaninchenbouillon getrübt und auf den Serumflächen einen schwachen, leicht irisirenden Belag. Bei der mikroskopischen Untersuchung ergab sich, dass in sämtlichen Gläschen nur eine Bacterienart gewachsen war: „ausserordentlich kleine, ovoide Bacterien, bisweilen in der Form an die Organismen der Kaninchensepticämie erinnernd, besonders bei den in der Theilung begriffenen Exemplaren, von denselben jedoch durch ihre fast um die Hälfte geringere Grösse unterschieden. Sie wuchsen auch in Fleischwasser-Pepton-Gelatine, an dem Einstichpunkte etwas stärker wie im Impfstiche, und bildeten einen grauweisslichen Wall von trockenem Aussehen um den Einstichpunkt herum.“

Die mit Haut-, Leber- und Nierenstückchen geimpften Kaninchen, Mäuse und Meerschweinchen verhielten sich wie folgt: Die Kaninchen waren am Morgen des 27. October bereits todt. Sectionsbefund identisch dem bei der Kaninchensepticämie. Die Mäuse starben im Laufe

des 27. October. Sectionsbefund: Oedem der Unterhaut, Milztumor, rothfleckige Lungen. In allen Organen dieselben Bacterien. Die Meerschweinchen erlagen am 2. und 3. Tage nach der Impfung. Der Sectionsbefund war bei allen identisch: Blutig seröse Infiltration des Unterhautgewebes des ganzen Bauches, nach aufwärts bis in die Achselhöhle, nach abwärts bis in die Inguinalgegend reichend. Musculatur von demselben röthlichen Oedem durchtränkt. Lungen grauroth. Milz kaum vergrößert. Sonst nichts Besonderes. In dem Hautödem, in der Pericardial- und Peritonealflüssigkeit, sowie im Milzausstrich die gleichen Bacterien.

„Die weitere Untersuchung dieses Organismus bestätigte und ergänzte die Ergebnisse dieses ersten Versuches.“

Loeffler hat ferner mit der 3. Generation der auf Kälberblutserum fortgezüchteten Bacterien eine Maus, einen kleinen Vogel, zwei Tauben, zwei Hühner und zwei Ratten, mit der 4. Generation vier Meerschweinchen und ein Schwein, mit der 11. Generation ein Meerschweinchen und mit der 12. Generation zwei Meerschweinchen geimpft. Die Maus und der kleine Vogel starben am Tage nach der Impfung, die Meerschweinchen im Verlaufe des 1.—3. Tages; die Tauben, Hühner, Ratten und das Schwein dagegen blieben gesund. Endlich hat Loeffler ein halbes Jahr später mit der Cultur der Bacterien ein Meerschweinchen und zwei junge Schweine geimpft. Von diesen starben das Meerschweinchen am 3. und das eine Schwein am 2. Tage nach der Impfung. Die Obduction des Schweins ergab folgenden Befund: „Bauchdecken bläulichroth. Enormes Oedem der Haut. Lungen hypostatisch. Magenschleimhaut stark geröthet, Milz nicht verändert. Nieren parenchymatös. Mesenterialdrüsen nicht geschwollen.“ In Schnitten der Haut des Schweins fanden sich die beschriebenen Bacterien, und ein Kaninchen, eine Maus und zwei Meerschweinchen, welche mit excidirten Hautstücken des Schweins geimpft wurden, gingen im Verlaufe von 1—2 Tagen zu Grunde.

Loeffler schliesst diesen Versuchen eine allgemeine Bemerkung an, welche sein Urtheil über die Stellung der „Schweineseuche“ im nosologischen System mit Sicherheit erkennen lässt. „Bei dem hervorragenden Interesse, welches aus nationalökonomischen Gründen den Krankheiten der Schweine von den verschiedensten Seiten entgegengebracht wird, dürften ausgedehntere bacteriologische Untersuchungen sehr bald die Entscheidung darüber bringen, ob das von mir in einem Falle gefundene Bacterium zu rothlaufähnlichen Epidemien unter den

Schweinen Anlass giebt, bezw. ob man berechtigt ist, auf Grund dieses ätiologischen Momentes eine bestimmte Gruppe von Erkrankungen als Schweineseuche oder Schweinesepticämie von dem eigentlichen Rothlauf abzutrennen.“

Ich werde am Schlusse meiner Arbeit noch einmal auf diese Erklärung zurückkommen, betone aber schon jetzt, dass sie meinen Untersuchungen anfänglich eine fehlerhafte Richtung gegeben hat, und dass ich erst durch genaue Beachtung aller für die vorliegende Entscheidung wichtigen Gesichtspunkte und namentlich durch Prüfung eines reichen Beobachtungsmaterials zu einer anderen Auffassung über den Sitz der Krankheit gekommen bin.

Eggeling¹⁾ äussert sich über die Schweineseuche in einem im Club der Landwirthe am 9. Januar 1883 gehaltenen Vortrage wie folgt:

„Die Schweineseuche ist die häufigste und gefährlichste der bislang mit „Rothlauf“ bezeichneten Leiden, sie kommt in manchen Gegenden fast alljährlich vor und fordert in den Schweinezuchten die grössten Opfer. Sie entwickelt sich sehr schnell, die Thiere zeigen sich fast plötzlich krank und erscheinen schon nach wenigen Stunden verfallen. Sie liegen fast fortwährend, stehen ungern auf, sind sehr schwach und haben einen schwankenden Gang. Der Appetit ist gänzlich verschwunden, zuweilen trinken die Thiere ein wenig Wasser. In seltenen Fällen zeigt sich Brechneigung oder wirkliches Erbrechen; in den meisten Fällen haben die Thiere Verstopfung. Die innere Körpertemperatur ist bis auf 42° C. und darüber gesteigert, der Herzschlag ist frequent, mitunter kaum fühlbar. Nach etwa 16stündigem Kranksein zeigt sich eine Röthung der Haut unter dem Leibe, und zwar zunächst im Bereiche des Nabels oder der Vorhaut, sodann zwischen den Hinterbeinen, später auch unter der Brust und unter dem Halse. Diese Röthung ist dunkler wie bei der Rothlaufseuche, meist sogar blutroth, sie breitet sich auch allmählich nach allen Seiten hin aus, überzieht oft in kurzer Zeit den Hals, die Ohren, den Kopf und schliesslich fast den ganzen Körper. Anschwellungen der Haut und Athembeschwerden fehlen. Die Krankheit endet fast immer in 24—48 Stunden tödtlich.

Bei der Obduction der Cadaver findet man als auffälligste Abnormität regelmässig eine schwere Entzündung des Magens. Die

¹⁾ Eggeling, Ueber den Rothlauf der Schweine. Nachrichten a. d. Club d. Landwirthe zu Berlin, 1883, No. 148.

Magenschleimhaut ist, besonders an der grossen Krümmung intensiv dunkelroth gefärbt, geschwollen, mit Schleim bedeckt, stellenweise auch von dem Oberhäutchen entblösst. Oft kleben die Futtermassen der Schleimhaut so fest an, dass beim Abspülen das Epithel losgerissen wird. Die Entzündung der Schleimhaut erstreckt sich meist auch auf den Zwölffingerdarm und mitunter auch auf den Dickdarm. Die Gekrösdrüsen sind immer geschwollen, oft bis zur Dicke eines Taubeneies vergrössert. Die Leber ist blutreich, zuweilen auch trocken und brüchig; die Milz oft geschwollen; die Nieren sind blutreich, zuweilen entzündet; die Athmungsorgane in der Regel gesund; das Herz ist trüb, trocken und brüchig; die Musculatur des Körpers blassroth und ebenso wie das Herz verändert. — Bei sehr stürmischem Verlauf der Krankheit sind die Organveränderungen mit Ausnahme derer des Magens und Darmes gering, bei längerer Dauer der Krankheit sind sie erheblicher. Das Blut hat bei der Schweineseuche gewöhnlich eine dunkelrothe Farbe, an der Luft färbt es sich heller, es gerinnt nur locker.

Die Krankheit der Schweineseuche ist nach allen diesen Merkmalen eine vom Magen und Darmcanal aus eingeleitete Blutvergiftung, eine Septicämie. Hierfür spricht die immer vorhandene schwere Entzündung des Magens und Darmcanals und die Schwellung der Gekrösdrüsen, sowie die Entzündung der grossen drüsigen Organe.“

Wenn man die vorstehenden klinischen und anatomischen Erscheinungen mit denen vergleicht, welche ich in meiner ersten Arbeit veröffentlicht habe, so wird es mindestens sehr wahrscheinlich, dass das von Eggeling beschriebene und der Schweineseuche zugesprochene Bild dem Rothlauf angehört. Hierfür sprechen die Schwellung der Milz, die schwere Magen-Darmentzündung, die auffallende Erkrankung der mesenterialen Lymphdrüsen, „die Entzündung der grossen drüsigen Organe“ und die diffuse Blaufärbung der äusseren Haut.

Ich will ferner bemerken, dass auch der von Loeffler über die Schweineseuche mitgetheilte Befund, den er im Jahre 1882 festgestellt hat, mit dem von Eggeling beschriebenen nicht übereinstimmt. Mithin hat Loeffler den Namen „Schweineseuche“ auf eine andere Krankheit bezogen als Eggeling. Nun könnte man vermuthen, dass die Loeffler'sche Schweineseuche vielleicht mit der von Eggeling beschriebenen „Rothlaufseuche“ identisch ist. Diese Frage will ich erst später beantworten, wenn ich die Resultate meiner eigenen Beobachtungen und Versuche mitgetheilt habe. Vorläufig wollte ich nur fest-

stellen, dass über die Schweineseuche unvollständige und sich widersprechende Angaben in der Literatur vorlagen, als ich meine Arbeiten begann.

Um meine experimentellen Untersuchungen über den Rothlauf der Schweine vorläufig abschliessen zu können, hatte ich eine grössere Anzahl von Collegen und Gutsbesitzern gebeten, mir die Organe von Schweinen, welche unter den Erscheinungen dieser Krankheit gestorben waren, zu übersenden. Diese Bitte ist überall freundlichst aufgenommen worden, und in kurzer Zeit wurde ich mit so grossen Mengen eines für die Fortführung meiner Versuche geeigneten Materials versehen, dass ich nicht nur meine Studien über die Aetiologie und pathologische Anatomie dieser Krankheit bis zu dem von mir veröffentlichten Umfange vollenden, sondern auch eingehende experimentelle Untersuchungen über Ursachen und Wesen der Schweineseuche vornehmen konnte.

Am 15. Juni 1885 wurden mir die Mägen, Milzen und Lebern von drei Schweinen, die angeblich unter den Symptomen des Rothlaufes erkrankt und nach kurzer Krankheitsdauer zu Grunde gegangen waren, überschickt. Eine Beschreibung der in diesen Organen beobachteten Abweichungen will ich unterlassen, weil sie bereits faulig geworden waren und eine sichere Trennung zwischen den pathologischen und cadaverösen Veränderungen nicht mehr gestatteten. In den auf Deckgläschen hergestellten und mit Gentianaviolett¹⁾ gefärbten Milz- und Leberausstrichen liessen sich die feinen Bacillen des Rothlaufes nicht nachweisen, folglich war die Behauptung, dass die Schweine am Rothlauf gelitten hatten, mindestens mit Wahrscheinlichkeit widerlegt. Dagegen fanden sich in den Deckglaspräparaten zahlreiche andere Mikroorganismen, und unter diesen in überwiegender Menge eine Art, die oval gestaltet war. Dieser Befund erinnerte mich sofort an die von Loeffler beobachteten Bacterien der Schweineseuche, und um diesen Organismus von den anderen zu trennen, benutzte ich das bereits mitgetheilte Impfverfahren²⁾. Die Ansicht, welche diesem Verfahren zu Grunde liegt, ist folgende: Wir wissen, dass die Mikroorganismen ganz verschiedene Eigenschaften besitzen, dass viele pathogen wirken, andere nicht. Es ist ferner bekannt, dass die krankmachenden Organismen nicht bei allen, sondern nur bei gewissen

¹⁾ Dieses Archiv, Bd. XI, S. 286.

²⁾ Ibidem, Bd. XI, S. 362.

Thieren schädlich wirken, dass z. B. die Rothlaufbacillen Mäuse tödten, Meerschweinchen aber nicht. Wenn daher verunreinigtes Material, also Gemische von Bacterien vorliegen, so kann man eine Trennung der pathogenen von den nicht pathogenen oder eine solche der pathogenen Organismen von einander durch Verimpfung des Materials auf verschiedene Thiere versuchen. Dieses Verfahren wird selbstredend erfolglos sein, wenn mehrere auf das Impfthier pathogen wirkende Mikroorganismen in dem verunreinigten Material enthalten sind; in anderen Fällen dagegen führt es in bequemer Weise zu einem sicheren Resultat. Es ist namentlich bei Substanzen zu empfehlen, die faul geworden sind, da sich die gewöhnlichen Fäulnissbacterien nach der Verimpfung nicht vermehren¹⁾. Auf diese Weise gelingt es, aus Organen und Blut, die z. B. von milzbrandkranken Thieren genommen und faul geworden sind, Reinculturen der Milzbrandbacillen herzustellen. Man hat dabei nur die Vorsicht in Anwendung zu bringen, dass die Impfungen mit möglichst geringen Mengen der putriden Organe ausgeführt werden, um die schädliche Wirkung der Fäulnissgifte auszuschliessen.

In dem in Rede stehenden Falle verfuhr ich, wie folgt: Ich stellte mit einem ausgeglühten Messer einen frischen Schnitt durch eine Milz her, hob mit der Spitze einer ebenfalls ausgeglühten Nadel eine kleine Menge Milzpulpa heraus und impfte hiermit:

- 2 Mäuse,
- 1 Kaninchen,
- 1 Taube und
- 2 Meerschweinchen.

Die Mäuse wurden auf dem Rücken, das Kaninchen am rechten Ohre, die Taube am linken Brustmuskel und die beiden Meerschweinchen am Bauche geimpft. Bei jedem Thiere wurde eine kleine Hautwunde gemacht, dann die Haut von den unterliegenden Weichtheilen getrennt und in die hierdurch entstandene Hauttasche die oben erwähnte Menge des Impfmateri als geschoben.

Beide Mäuse waren bereits am folgenden Tage auffallend krank. Sie sassan am Boden des Glases, krümmten den Rücken, schlossen die Augenlider und athmeten sehr beschleunigt. Wurden sie durch ein

¹⁾ Koch, Gaffky u. Loeffler, Experimentelle Studien über die künstliche Abschwächung der Milzbrandbacillen und Milzbrandinfection durch Fütterung. Mittheilungen a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. II, 1884, S. 161.

Geräusch aufgeregt, so öffneten sie zwar die Augenlider, verhielten sich aber im Uebrigen auffallend still. Dagegen wurde eine Absonderung der Conjunctiva und ein Verkleben der Augenlider, wie wir es nach der Verimpfung mit Rothlaufbacillen kennen gelernt haben, weder bei diesen, noch bei den später geimpften Mäusen beobachtet. Dann wurden die Mäuse soporös, liessen sich auf die Seite und den Rücken legen und führten in dieser Lage zappelnde Bewegungen mit den Gliedmassen aus. Endlich wurden die Athembewegungen unregelmässig und stossweise ausgeführt, und bald darauf trat der Tod ein. Die eine Maus starb am 2., die andere am 3. Tage nach der Impfung. Die Obduction ergab Folgendes: Die Unterhaut durchfeuchtet und rosaroth. Diese Färbung war durch starke Anfüllung der subcutanen Gefässe bedingt. Bei der Maus, welche am 2. Tage nach der Impfung gestorben war, fanden sich in der Unterhaut auch einige punktförmige blutige Herde. Die Lymphdrüsen in den Knicfalteln geschwollen, feucht und dunkelroth. Der Dickdarm mit Fäcalsmassen stark gefüllt (ein Befund, der bei den mit Rothlaufbacillen geimpften Mäusen niemals wahrzunehmen war). Milz gross und graubraun. Leber und Nieren parenchymatös getrübt. Lungen geröthet, feucht, lufthaltig und mit dunkelrothen (hyperämischen) Flecken durchsetzt.

Im Blute und in allen Organen der beiden Mäuse wurden grosse Mengen von Bacterien gefunden, die eine ovale Gestalt hatten und mit den in der Schweinemilz nachgewiesenen in Form und sonstigem Aussehen vollkommen übereinstimmten. Auch will ich ausdrücklich betonen, dass nur die ovalen Bacterien im Blute, in den Milzen, Lebern, Lungen etc. beider Mäuse ermittelt wurden, und dass also der Versuch, sie von den übrigen in der Schweinemilz beobachteten Mikroorganismen abzutrennen, auf dem bezeichneten Wege gelungen war. Ich benutzte deshalb das Blut der beiden Mäuse zur Aussaat auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine.

Die Bacterien haben die Form eines Ovals und lassen sich nach der Weigert'schen Kernfärbungsmethode sehr leicht tingiren. Ich habe zum Färben derselben wässrige Lösungen von Methylenblau, Gentianviolett, Fuchsin etc. gebraucht und gefunden, dass jeder der genannten Farbstoffe seinen Zweck erfüllt. Sind die Bacterien mit der bereits früher angegebenen Gentianviolettlösung gefärbt, so zeigen sie in ihren centralen Theilen eine ungefärbte Stelle, die von einer blaugefärbten Schicht umgeben ist. Die Menge dieser Schicht ist an

den Polen der Bacterien eine grössere, so dass die Enden der letzteren stärker gefärbt erscheinen als die mittleren Theile. Sind die Bacterien sehr stark gefärbt, so sehen sie gleichmässig blau aus. Da diese Organismen auf der Mitte zwischen Mikrococcen und Bacillen stehen, so mögen sie Bacterien genannt werden. Sie sind 0,0012 Mm. lang und 0,0004—0,0005 Mm. breit; ihre Länge beträgt mithin etwa $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ vom Durchmesser des rothen Blutkörperchens der Maus. Ihre Vermehrung geht in folgender Weise vor sich: Zunächst werden sie länger, etwa doppelt so lang wie breit, zeigen deutlich abgerundete Enden und färben sich wie die Organismen der Kaninchensepticämie und der Hühnercholera, so dass zwischen den intensiv gefärbten Enden etwa ein Drittel oder die Hälfte der ganzen Länge ungefärbt bleibt. Bei genauerer Prüfung kann man sich jedoch überzeugen, dass die gefärbten Endstücke mit einander verbunden sind, indem auf jeder Seite des Organismus eine feine Linie von dem einen gefärbten Ende bis zum anderen verläuft. Dann trennen sich die Endstücke, indem das ungefärbte Mittelstück verschwindet. Die abgelösten Endstücke erscheinen zuerst kugelig, zeigen aber sehr bald wieder die Form eines Ovals. Mithin entstehen aus jedem Organismus durch Theilung zwei neue Individuen, in denen sich bei vorsichtigen Färbungen der ungefärbte centrale Theil von dem gefärbten peripherischen leicht unterscheiden lässt. Geht die Theilung der Bacterien rasch vor sich, was namentlich, wie wir später kennen lernen werden, bei Schweinen der Fall ist, aber auch bei Kaninchen beobachtet wird, so erreichen die Organismen überhaupt nicht die beschriebene Grösse, sondern theilen sich bereits, ohne dass das ungefärbte Mittelstück deutlich erkennbar wird. Unter diesen Umständen sind auch die Organismen der nachfolgenden Generationen kleiner, meist nur halb so gross und noch kleiner als die, welche aus der langsam fortschreitenden Theilung der Bacterien hervorgegangen sind. Oft sind die jüngsten Generationen ausserordentlich klein, dabei aber deutlich oval und durch Gentianaviolettlösung gleichmässig intensiv färbbar.

Die Bacterien lassen sich im Blute auch ohne vorhergegangene Färbung leicht nachweisen. Hierzu sind die auf hohlgeschliffenen Objectträgern hergestellten Präparate am meisten geeignet. Bei der mikroskopischen Untersuchung eines solchen Präparats kann man die Bacterien zwischen den Blutkörperchen ohne Schwierigkeiten erkennen, auch feststellen, dass die Bacterien keine selbstständige Bewegung ausführen.

Die Vertheilung der Bacterien im Blute war eine gleichmässige, nur wechselte die Menge derselben. Bei der Maus, welche 24 Stunden länger gelebt hatte, war die Anzahl der Bacterien im Blute und in der Milz grösser als bei der früher gestorbenen.

Das Kaninchen starb am 18. Juni, also am 3. Tage nach der Impfung. Die an demselben beobachteten Krankheitserscheinungen waren kurz folgende: Am 16. Juni war das geimpfte rechte Ohr angeschwollen, schmerzhaft, heiss und geröthet, auch hing es seitlich am Kopfe. Am 2. Tage hatte sich die Anschwellung über den ganzen Kopf und Hals ausgebreitet und waren die um den oberen Theil des Halses gelegenen Lymphdrüsen als harte, bohngrosse Knoten zu fühlen. Das Thier sass traurig mit hängendem Kopfe in einer Ecke des Käfigs, athmete röchelnd und liess sich leicht ergreifen. Die bald nach dem Tode ausgeführte Obduction ergab: Starke Durchtränkung der Unterhaut am rechten Ohre, am Kopfe und Halse mit einer trüben Flüssigkeit. Die auricularen, pharyngealen, cervicalen und submaxillaren Lymphdrüsen vergrössert, derb und geröthet; Durchschnittsfläche grauroth und feucht. Die Tonsillen erbsengross. Die Luftwege mit einem röthlichen, feinblasigen Schaume erfüllt. Die Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre stark geröthet und mit Blutpunkten besetzt. Die Brustfellsäcke leer. Die Lungen stark geröthet und sehr feucht; Durchschnittsfläche spiegelnd. Milz leicht geschwollen, weich, braunroth. Nieren, Leber und Herz schwach getrübt. Schleimhaut des Magens, Zwölfinger- und Leerdarmes gleichmässig geröthet, die des Hüft- und Dickdarmes fleckig geröthet. Im Blute und allen Organen viele Bacterien. In ganz enormer Zahl und in allen Stadien der Theilung fanden sie sich in der Flüssigkeit der Unterhaut; am reichlichsten waren die jüngsten Generationen vertreten, die, wie bereits erwähnt ist, auffallend klein und deutlich oval gestaltet sind.

Das Blut des Kaninchens säte ich wieder auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine aus.

Die übrigen am 15. Juni geimpften Thiere (zwei Meerschweinchen und eine Taube) blieben gesund.

Bis zum 22. Juni waren die Bacterien in der Fleischwasser-Pepton-Gelatine üppig gewachsen. In dem rothen Impfstich hatten sich zahlreiche weisse Punkte gebildet, die entweder isolirt oder in Gruppen beisammen lagen. Die Gruppen erwiesen sich bei Loupenvergrösserung aus kleinen trüben grauen, auch weissen Punkten oder

Flecken zusammengesetzt. Diese Punkte nahmen beim weiteren Wachsen allmählich an Umfang zu und confluirten später mit den in der Nachbarschaft gelegenen, so dass der Impfstich nunmehr eine zusammenhängende grauweiße Schicht bildete, die aussen mit punktförmigen grauweißen Herden besetzt war. Jeder Punkt entsprach einem kugeligen Rasen (einer Colonie), der durch Theilung eines einzelnen oder weniger Organismen hervorgegangen war. Um die Einstichstelle hatte sich ein grauweißer Wall gebildet, der an der Oberfläche ein mattes Aussehen zeigte. Eine Verflüssigung der Gelatine wurde selbst bei alten Culturen nicht wahrgenommen.

Von dem grauweißen Walle, der um die Einstichstelle lag, wurde eine kleine Menge mit einer ausgeglühten Platinnadel abgenommen, auf Deckgläschen ausgestrichen, mit wässriger Gentianaviolettlösung gefärbt und dann mikroskopisch untersucht. Hierbei ergab sich, dass in allen Culturen nur die ovalen Bacterien gewachsen waren.

Mit einer aus dem Blute der am 17. Juni gestorbenen Maus hergestellten Reincultur wurden am 22. Juni geimpft:

- 2 Mäuse,
- 1 Kaninchen und
- 3 Tauben.

Die Impfung wurde in der bekannten Weise ausgeführt und auf jedes Thier soviel von der Reincultur übertragen, wie auf einer Nadelspitze Platz hatte.

Beide Mäuse erkrankten unter den Erscheinungen wie die früheren; die eine starb am folgenden und die andere am 2. Tage nach der Impfung. Die Obduction ergab bei beiden: Durchfeuchtung und Hyperämie der Unterhaut, Schwellung der lumbalen, inguinalen und mesenterialen Lymphdrüsen, Anfüllung des Dickdarmes mit Fäcalsmassen, starken Milztumor und parenchymatöse Entzündung der Leber, Nieren, des Herzens und der Muskeln. Ein Theil des Blutes war geronnen und ein anderer gerann erst nach seiner Berührung mit der Luft. Im Blute und in allen Organen fanden sich überraschend viele Bacterien.

Das Kaninchen starb am 2. Tage nach der Impfung; die an ihm beobachteten Krankheitserscheinungen stimmten mit den oben beschriebenen überein. Die anatomischen Abweichungen, welche bei der Obduction ermittelt wurden, waren folgende: Durchtränkung der Unterhaut am rechten Ohre und an der rechten Kopfseite mit einer trüben, leicht gerötheten Flüssigkeit; die an der rechten Seite des Kopfes

und Halses gelegenen Lymphdrüsen vergrößert, auf dem Durchschnitt geröthet und sehr feucht. Der Kehlkopf, die Luftröhre und die Bronchien mit einer feinblasigen, schaumigen, röthlichen Flüssigkeit gefüllt. In der Schleimhaut des Kehlkopfes und Schlundkopfes machten sich einige injicirte Venen bemerkbar. Die Schleimhaut der Luftröhre und der Bronchien sehr stark geröthet (Tracheitis und Bronchitis haemorrhagica). Lungen geröthet und sehr feucht. Brustfellsäcke leer. Die Schleimhaut des Magens um den Pylorus geröthet, die des Dickdarmes überall roth und mit einer zähen, schleimartigen Masse bedeckt.

In der Flüssigkeit der Unterhaut, im Blute und in allen Organen waren sehr viele Bacterien nachzuweisen.

Die Aussaat von Blut der beiden Mäuse und des Kaninchens auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine ergab wiederum die beschriebenen Reinculturen.

Die Tauben zeigten nach der Impfung keine Störungen des Allgemeinbefindens.

Aus den vorstehenden Versuchen ergibt sich, dass Mäuse und Kaninchen, welche mit kleinen Stückchen der Schweinemilz geimpft wurden, septicämisch erkrankten und starben, dass im Blute und in den Gewebssäften dieser Thiere Bacterien nachzuweisen waren, die in ihrer Form mit den in den Milzausstrichen beobachteten übereinstimmten, und dass die aus dem Blute der geimpften Thiere hergestellten Reinculturen der Bacterien Mäuse und Kaninchen tödteten, deren Blut und Organe wiederum die ovalen Bacterien enthielten. Folglich war erwiesen, dass die Schweinemilz pathogen wirkte, und dass die Bacterien Träger dieser Wirkung waren, denn die abgetrennten und in Reinculturen fortgezüchteten Bacterien hatten nach ihrer Verimpfung auf Mäuse und Kaninchen dieselbe Krankheit hervorgerufen, wie die verimpften Milzstücke. Nunmehr musste festgestellt werden: ob die in der Schweinemilz entdeckten Bacterien auch bei Schweinen schädlich wirken oder nicht.

Mit dem Blute der am 24. Juni gestorbenen Maus wurden zwei Erlenmeyer'sche Kölbchen, die je 20 Grm. Pepton-Rindfleischinfus enthielten, besät. Die Kölbchen wurden darauf in den Brütapparat gestellt und bei 35° C. gehalten. Schon am nächsten Tage zeigte das Fleischinfus eine starke Trübung und einen grauweißen Bodensatz, der am 2. Tage an Dicke noch bedeutend zugenommen hatte. Dieser Bodensatz bestand aus einer schleimigen Substanz, die ausschliesslich aus den in Rede stehenden Bacterien zusammengesetzt

war. Die meisten von ihnen lagen einzeln, andere zu zweien und noch andere zu mehreren mit ihren Enden aneinander gereiht. Im letzteren Falle bildeten sie geschwungene Fäden oder Flechtwerke.

Mit diesem Infus impfte Herr Geheimrath Roloff am 26. Juni, Nachmittags 5 Uhr, zwei gesunde, ca. 4—5 Monate alte Schweine der gemischten kleinen Rasse. Jedem Schwein wurden zwei Pravaz'sche Spritzen voll des Infuses an der inneren Fläche des linken Hinterschenkels subcutan injicirt. Hiernach zeigten beide Thiere folgende Krankheitserscheinungen:

Schon am nächsten Tage war eine starke Anschwellung an der inneren Fläche beider Hinterschenkel entstanden, die sich bei dem einen Schwein auf die hintere Bauchpartie beschränkte, bei dem anderen dagegen etwas weiter nach vorn reichte. Auf den geschwellenen Partien war die Haut dunkelroth gefärbt. Beide Thiere waren kraftlos und konnten kaum noch gehen, sie frassen nicht, athmeten beschleunigt und liessen den Schwanz schlaff herabhängen. Die Temperatur des einen Schweins, welches nach den äusseren Erscheinungen das kränkere war, betrug $41,7^{\circ}$ und die des anderen $41,1^{\circ}$ C.

Am Nachmittag legte sich das kränkere Thier nieder, fiel bald auf die Seite und starb zwischen 6 und 7 Uhr Abends, also ca. 24 Stunden nach der Impfung. Bei der am 28. Juni, Morgens 9 Uhr, ausgeführten Obduction wurden folgende Veränderungen ermittelt: Die inneren Flächen beider Hinterschenkel und die hintere untere Abtheilung des Bauches etwas geschwollen. Mitten auf den geschwellenen Hauttheilen ein umschriebener dunkelrother Fleck, dessen Nachbarschaft diffus bläulich gefärbt war. Haut, Unterhaut und Muskeln sind an dieser Stelle mit einer rothen, trüben Flüssigkeit getränkt; die Haut derb und verdickt. In der Bauchhöhle 55 Grm. trüber, gelblicher Flüssigkeit. Der Darmcanal und der Magen an der Aussenfläche grauroth aussehend. Im Magen eine weissliche breiige Flüssigkeit; die mit Fundusdrüsen besetzte Abtheilung der Magenschleimhaut etwas geschwollen, trübe und stellenweise diffus geröthet. Im Dünndarm galliger, flüssiger Inhalt. Die Schleimhaut sehr schwach geschwollen, an einigen Stellen wenig gefüllte venöse Gefässe. Im Dickdarm eine geringe Menge dickbreiiger Massen; Schleimhaut nicht geschwollen. Die Solitärfoellikel, die Peyer'schen Haufen und die mesenterialen Lymphdrüsen ohne Veränderung. An der Milz keine auffälligen Abweichungen. Die Leber nicht vergrössert, braunroth,

wenig getrübt. Die Nieren graubraun, auf der Schnittfläche nur leicht getrübt. Die Harnblase ziemlich stark gefüllt mit hellgelbem Harn, der sauer reagirte und reich an Eiweiss war. Im Uebrigen war die Harnblase nicht verändert. In den Pleurasäcken und im Herzbeutel kein abnormer Inhalt. Das Herz und die grossen Gefässstämme enthielten dunkelrothes, flüssiges Blut, welches an der Luft sehr bald zu einem rothen Kuchen gerann. Die unteren Abschnitte der hinteren Lappen beider Lungen bläulichroth; diese Theile fühlten sich derb an und knisterten auf Druck wenig. Die übrigen Abschnitte der Lungen rosaroth. Auf dem Durchschnitt erschienen sämmtliche Theile der Lungen roth und mit schaumiger Flüssigkeit reichlich gefüllt, im Uebrigen ohne Veränderung. Die Wände der Bronchien in den blau-rothen Partien verdickt; in den Bronchien grauweisser Schleim und eine mässige Menge von *Strongylus paradoxus*. Aus den Bronchien der übrigen Lungentheile ergiesst sich auf seitlichen Druck dichter, blutiger Schaum. In der Luftröhre und im Kehlkopfe keine Abweichungen.

Während der Obduction wurden zahlreiche Ausstrichpräparate des in der Bauchhöhle ermittelten Transsudats, des Blutes, der Lungen, Milz, Leber, Nieren und der blutigen Flüssigkeit in den angeschwollenen Hautpartien angefertigt, gefärbt und mikroskopisch untersucht. Ueberall konnten die bekannten Bacterien nachgewiesen werden. Eine überraschend grosse Anzahl fand sich in der Flüssigkeit der Haut und Unterhaut; sie enthielt neben vielen grösseren und in der Theilung begriffenen erstaunlich grosse Mengen kleinerer, ovaler Organismen. Die Vertheilung der Bacterien im Blute war keine gleichmässige, denn in vielen Ausstrichpräparaten desselben konnten nur wenige, in anderen dagegen kleine, aus drei und mehr Bacterien bestehende Häufchen beobachtet werden. Auf eine Veränderung möchte ich noch besonders aufmerksam machen, nämlich auf die starke Anschwellung der inguinalen Lymphdrüsen, speciell der am linken Hinterschenkel gelegenen. Die Lymphdrüsen waren von blutig getränkten Gewebsmassen umgeben und zeigten auf den Durchschnitten ein rothgeflecktes Aussehen. Jeder Fleck entsprach einer punktförmigen Hämorrhagie. Dabei war das Drüsengewebe von Bacterien gleichmässig dicht durchsetzt.

Das andere Schwein starb am 28. Juni, Nachmittags 5 Uhr, und die gleich nach dem Tode ausgeführte Obduction führte zu folgendem Ergebniss: Vor und in den Nasenlöchern röthlich gefärbter dichter

Schaum. Die hinteren Gliedmassen bis zur Schwanzwurzel und der hintere untere Theil des Bauches bis zum zweiten Zitzenpaare ziemlich stark geschwollen. Auf der geschwollenen Hautpartie fiel eine blaurothe Stelle auf, die scharf begrenzt war und tiefer als die Umgebung lag, sie erstreckte sich vom dritten Zitzenpaare in einem Bogen nach hinten, nahm die ganze innere Fläche der Oberschenkel, die Leistengegenden und den Damm ein, umgab das untere Ende der Unterschenkel und die Mittelfüsse ganz und schnitt in Höhe der Fesselgelenke scharf ab. An den geschwollenen Partien waren die Haut, Unterhaut und die sich anschliessenden Muskeln mit einer röthlich gefärbten Flüssigkeit durchtränkt, die an den blaurothen Stellen ausgesprochen hämorrhagisch war. Die Muskeln bläulichgrau, durchfeuchtet und etwas trübe. In der Bauchhöhle 25 Grm. einer tüben, gelblichen Flüssigkeit. Die inguinalen und lumbalen Lymphdrüsen geschwollen und weich, ihre Kapseln geröthet, die Schnittfläche grau-roth, etwas vorquellend und trübe, die ersteren gleichzeitig mit dunkelrothen Flecken durchsetzt. Magen- und Darmschleimhaut trübe, leicht geschwollen und stellenweise diffus geröthet; auffallend gering war die Röthung der Magenschleimhaut. Die Peyer'schen Haufen und die Solitärfollikel grau und leicht geschwollen. Milz vergrössert, mässig fest, braunroth; Schnittfläche hügelig, Pulpa weich, Trabekel nicht erkennbar. Leber vergrössert, ziemlich fest, dunkel graubraun; Schnittfläche glatt, sehr blutreich, Parenchym trübe. Beide Nieren vergrössert, graubraun, fest; Schnittfläche glatt, Rinde deutlich trübe. Harnblase fast leer; Harn sauer und eiweisshaltig. In den Brustfellsäcken 20 Grm. einer wässerigen, trüben Flüssigkeit. Der Herzmuskel grau gefleckt. Die Lungen im Zustande der Expiration und wenig lufthaltig; in den hinteren Theilen beider Hinterlappen einige kleine blutige Herde, welche über die Durchschnittsfläche hervortraten. Das Lungengewebe im Uebrigen gleichmässig roth und mit Flüssigkeit getränkt. Die Bronchien, Luftröhre und Kehlkopf mit dichtem Schaume erfüllt. Das aus dem Herzen und den Gefässen entnommene Blut war flüssig, gerann aber bald an der Luft.

Nach der Obduction wurden die Transsudate der Brust- und Bauchhöhle, die hämorrhagische Flüssigkeit der Unterhaut in der Nähe der Impfstelle, das Blut und die grossen Organe, wie Milz, Lungen etc., auf die Gegenwart der Bacterien geprüft. Sie fanden sich in allen Theilen vor, namentlich reichlich im hämorrhagischen Oedem

der Unterhaut und in den Lymphdrüsen; an beiden Stellen traten sie in Form der kleinen ovalen Gebilde auf.

Aus dem Blute, den Transsudaten der genannten Körperhöhlen und der Flüssigkeit der Unterhaut beider Schweine wurden je drei Gläschen mit Fleischwasser-Pepton-Gelatine und Pepton-Rindfleischinfus besät; in allen wuchsen die bekannten Bacterienculturen. Ferner wurden zwei Mäuse mit dem Blute des am 28. Juni gestorbenen Schweins am Rücken subcutan geimpft, die schon wenige Stunden nach der Impfung erkrankten und am folgenden Tage (ca. 24 Stunden nach der Impfung) starben. Die Obductionsresultate stimmten mit den früheren überein, und in der mit dem Blute der Mäuse besäten Fleischwasser-Pepton-Gelatine wuchsen wieder die ovalen Bacterien.

Durch die vorstehenden Impfversuche bei Schweinen ist dargethan, dass die aus der Schweinemilz abgeschiedenen Bacterien auch Schweine krank machen und tödten können. Das anatomische Krankheitsbild, welches bei beiden Schweinen ermittelt wurde, liess mit Sicherheit erkennen, dass die Bacterien an der Impfstelle zuerst gewirkt und sich vermehrt hatten, dann in die Lymph- und Blutbahn eingetreten und hierdurch in alle Organe des Körpers gelangt waren, um die in den Obductionsprotocollen mitgetheilten Abweichungen hervorzurufen. Die Impfkrankheit verlief also bei Schweinen unter denselben Erscheinungen wie bei Kaninchen. Ich will noch hinzufügen, dass die Veränderungen, welche nach der Impfung in der Haut, Unterhaut etc. bei Schweinen entstehen, mit den Karbunkeln der Rinder etc. in ihrem Aussehen vollkommen übereinstimmen, und dass die Natur einer solchen Anschwellung durch eine gewöhnliche, wenn auch noch so genaue Untersuchung nicht erkannt werden kann. Ich glaube annehmen zu können, dass alle diese Fälle früher dem Milzbrande der Schweine zugezählt worden sind.

Beachtet man nun, dass Loeffler im Blute und in den Geweben eines Schweins einen Organismus gefunden hat, der in seiner Form mit dem oben beschriebenen übereinstimmt, dass dieser Organismus, soweit die Loeffler'schen Beschreibungen ein Urtheil gestatten, in derselben Weise wächst, wie die von mir aus der Schweinemilz gezüchteten Bacterien, dass bei der Obduction des von Loeffler am 26. October 1882 obducirten Schweins fast dieselben Veränderungen nachgewiesen wurden, wie bei den von Herrn Roloff geimpften und hiernach gestorbenen Schweinen, dass der Loeffler'sche Mikroorganismus, sowie die von mir gefundenen Bacterien auch auf Mäuse und

Kaninchen pathogen wirken; und dass beide den Tod dieser Thiere in fast gleicher Zeit herbeiführten, so dürfte die Schlussfolgerung gerechtfertigt sein, dass die Loeffler'sche Schweineseuche mit der Krankheit identisch ist, welche durch die in Rede stehenden Bacterien hervorgerufen wird. Dagegen ist es vorläufig ganz unmöglich, den Namen Schweineseuche auch auf die von Eggeling unter diesem Ausdruck beschriebene Krankheit zu beziehen; für jetzt mag es genügen, darauf hinzuweisen, dass eine grössere Uebereinstimmung in den Krankheitserscheinungen zwischen dem von Loeffler als Schweineseuche und dem von Eggeling als „Rothlaufseuche“ bezeichneten Leiden der Schweine besteht. Die nachstehenden, von Eggeling veröffentlichten Angaben über die Kennzeichen der „Rothlaufseuche“ werden die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung bestätigen:

„Die Rothlaufseuche entwickelt sich unter allmählich zunehmender Gesundheitsstörung, verringerter Fresslust, Mattigkeit und gesteigertem Durstgefühl innerhalb 24 Stunden. In dieser Zeit ist die innere Körpertemperatur erheblich, meist bis auf 41—42° C. gesteigert, die Thiere liegen viel und zeigen eine grosse Schwäche im Hintertheil. Sodann entwickelt sich in der unteren Halsgegend, unter dem Bauche und an den inneren Schenkelflächen frühzeitig eine Röthung der Haut; dieselbe zeigt eine eigenthümliche, bräunliche Nüancirung, so dass man die Färbung zutreffend als „kupferfarben“ bezeichnen kann. Die Röthe breitet sich ziemlich schnell aus, indem sie nicht gleichmässig, sondern sprungweise und strahlenförmig fortschreitet. Nicht selten ist die Haut unter dem Halse, namentlich im Bereiche des Kehlkopfes, geschwollen und schmerzhaft; in manchen Fällen wird die Athmung frequent und angestrengt, auch stellen sich zuweilen Schluckbeschwerden ein.“

„Bei der Obduction findet man die Haut in den obersten Schichten geröthet und, wo Schwellungen eingetreten sind, in ganzer Dicke stark serös durchtränkt; an solchen Stellen sind auch die Unterhaut, das benachbarte Bindegewebe und selbst die Muskeln von einer trüben, wässerigen Flüssigkeit infiltrirt. Von den inneren Organen sind die Schleimhaut der Respirationswege und die Nieren am schwersten verändert. Die erstere zeigt sich immer geröthet, nicht selten auch geschwollen und mit Schleim bedeckt; oft sind die Bronchien mit schaumiger Flüssigkeit gefüllt und die Lungen ödematös. An den Nieren ist die Rindensubstanz grau gefärbt, trübe und trocken und die Marksubstanz blutreich und feucht. Die Leber zeigt ausser Blutfülle

nichts Krankhaftes; die Milz ist meist normal; die Schleimhäute des Magens und Darmcanals zum Unterschiede von der Schweineseuche entweder garnicht oder doch nur in geringem Masse (durch leichte Röthung) verändert.“

Eggeling fügt noch hinzu: „Die Krankheit wird durch das eigenartige Leiden der Haut, die entzündliche Affection der Respirationswege und die schwere Erkrankung der Nieren als acute Ausschlagskrankheit, die dem Scharlach des Menschen ähnlich ist, gekennzeichnet.“

Eggeling und Loeffler scheiden mithin zwischen dem Rothlauf und der Schweineseuche, aber ihre Beschreibungen der beiden Krankheiten decken sich nicht. Loeffler, der den ätiologischen Momenten besonders Rechnung trägt, bezeichnet mit Schweineseuche etwas Anderes als Eggeling, und umgekehrt. Trotzdem bin ich unter thierärztlichen Sachverständigen vielfach der Auffassung begegnet, als ob zwischen beiden Autoren völlige Concordanz bestände. Beide sind nur darin einig, dass die Schweineseuche (wie der Rothlauf) eine Art von Septicämie ist, und da ich noch keine Anhaltspunkte hatte, diese Ansicht widerlegen zu können, so benutzte ich die mir jetzt gebotene Gelegenheit, zwei andere Versuche anzustellen, deren Resultate ich kurz mittheilen will.

Ich hatte festgestellt, dass Schweine durch Impfung von Culturen abgeschwächter Rothlaufbacillen immun gemacht werden können gegen die Wirkung virulenter Culturen¹⁾, und es blieb folglich noch die Frage²⁾ zu entscheiden: ob die auf diese Weise hergestellte Immunität gegen den Rothlauf auch einen Schutz verleihe gegen die von mir erzeugte Bacterienkrankheit der Schweine (Loeffler'sche Schweineseuche). Diese Frage liess sich an der Hand des vorliegenden Materials auf experimentellem Wege sofort beantworten. Mir standen nämlich zwei Schweine zur Verfügung, welche durch die am 3. und 12. Mai stattgehabten Impfungen³⁾ mit Reinculturen abgeschwächter Rothlaufbacillen immun gemacht worden waren, und welche sich auch noch bei der späteren, am 11. Juni ausgeführten Impfung⁴⁾ mit einer sehr virulenten Rothlaufbacillencultur als immun erwiesen hatten. Ich

¹⁾ Ueber den Rothlauf etc. Dieses Archiv, Bd. XI, Heft 5. u. 6, S. 376.

²⁾ l. c. S. 275.

³⁾ l. c. S. 373 und 374.

⁴⁾ l. c. S. 377.

beschloss deshalb, eins von diesen Thieren mit einer Pepton-Rindfleischinfuscultur der ovalen Bacterien zu impfen, welche ich durch Aussaat von Blut des am 28. Juni gestorbenen Schweins (S. 225) gewonnen hatte.

Die Impfung führte Herr Geheimrath Roloff auf meinen Wunsch am 14. Juli, Mittags 12 Uhr, aus, indem er eine Spritze voll der Cultur einem Schwein an der inneren Fläche des linken Hinterschenkels subcutan injicirte. Hiernach entwickelte sich bis zum folgenden Tage eine harte blaurothe Anschwellung an der inneren Fläche beider Hinterschenkel und an der unteren Seite des Bauches. Am zweiten Tage reichte die Anschwellung am Baucha bis zum Schaufelknorpel und an den Hinterschenkeln bis zu den Sprunggelenken. Das Thier lag meist, liess sich schwer aufreiben, frass nicht, athmete beschleunigt und oberflächlich und wurde zeitweise etwas unruhig. Die innere Körpertemperatur betrug $41,9^{\circ}$ C. Am Abend zeigten sich bläuliche Flecke am Kopfe, Halse, an den Ohren und der inneren Fläche der Vorderschenkel. Dann legte sich das Thier und starb in der Nacht vom 16. zum 17. Juli. Die am 17. Juli, Vormittags 10 Uhr, vorgenommene Obduction lieferte nachstehendes Ergebniss:

An der unteren Seite des Bauches fand sich eine ziemlich feste Geschwulst, welche vom Schaufelknorpel bis zum Mittelfleisch reichte und intensiv blauroth gefärbt war. Beide Hinterfüsse waren etwas geschwollen und wiesen gleichfalls grössere umschriebene blaurothe Flecke auf. Diffuse, weniger intensiv gefärbte Flecke fanden sich noch am Kopfe, Halse und an den Ohren. Die inneren Flächen beider Vorderfüsse waren an ihrem oberen Ende bläulich gesprenkelt. Die blauen Flecke liessen sich nicht abwaschen. Beim Einschneiden sah man aus der Haut und Unterhaut grössere Tropfen trüber, röthlicher Flüssigkeit austreten. Die Unterhaut war bläulichroth gefärbt und mit röthlicher, wässriger Flüssigkeit prall gefüllt. Die sich anschliessenden Muskeln hatten eine trübe Beschaffenheit und waren von streifigen, blutigen Flecken durchsetzt. Die Nasenlöcher und das Maul mit feinblasigem Schaum in sehr reichlicher Menge erfüllt, der auch die benachbarten Theile der Haut bedeckte. Die Schleimhaut in der Fundus- und Pylorusdrüsenregion leicht geröthet und trübe. Der Dünndarm fast durchweg zusammengezogen, seine Schleimhaut schwach getrübt; am hinteren Ende ganz schwache Röthung der Zotten, die am Hüftdarm aufhörte. Dagegen zeigte sich hier eine schwache Injection der Peyer'schen Haufen, die dicht vor der Hüft-Blinddarm-

öffnung zugleich eine Vergrösserung der Drüsen erkennen liessen. An dieser Stelle waren auch die Solitärfoollikel geschwollen. Die Schleimhaut des Dickdarms nur stellenweise leicht geröthet. Leber etwas vergrössert, äusserlich graubraun, Durchschnittsfläche glatt, Acini vergrössert, graubraun und trübe. Milz geschwollen, prall, äusserlich blauröth, zahlreiche linsen- bis bohnergrosse, zum Theil erhabene Knoten fanden sich zerstreut in ihr vor; Pulpa vermehrt, braunroth, Trabekel schwer erkennbar. Die Knoten hatten auf dem Durchschnitt eine dunkelrothe Farbe, waren unregelmässig gestaltet und fühlten sich etwas hart an. Die Nieren wenig vergrössert, fest, Kapseln leicht trennbar, Oberfläche glatt, graurothbraun, venöse Gefässe stark mit Blut gefüllt. Auf dem Durchschnitt glatt, Marksubstanz stark geröthet, Rinde grauroth und von trüben grauen radiären Streifen durchzogen. Die mesenterialen Lymphdrüsen waren wenig geschwollen und weich; ihre Kapseln leicht geröthet. Auf der Schnittfläche waren die Drüsenknoten grau, trübe und das zwischen ihnen gelegene Gewebe geröthet. Die Brustfellsäcke leer. Die Lungen im Expirationszustande, etwas knisternd, äusserlich schmutzig rosaröth; Schnittfläche glatt, stark spiegelnd. In den Bronchien, in der Luftröhre und im Kehlkopf feinblasiger röthlicher Schaum. Die Schleimhaut der Luftröhre etc. stellenweise von gefüllten Venennetzen durchzogen, ohne sonstige Abweichung. In den Herzhöhlen neben dunkelrothen, weichen Gerinnseln flüssiges Blut. Das Blut in den grösseren Gefässen floss nach deren Eröffnung aus, gerann aber sofort an der Luft zu einem rothen Kuchen.

Im Blute, in der Milz und in allen übrigen Organen konnten zahlreiche Bacterien nachgewiesen werden. Ganz besonders gross war die Anzahl derselben in den beschriebenen Knoten der Milz, die nach ihrer Form und sonstigen Beschaffenheit als splenitische aufzufassen sind.

Dieser Befund in der Milz dürfte auch von allgemeinerer Bedeutung sein, da sich das Zustandekommen der hämorrhagischen Splenitis in dem mitgetheilten Falle mit Sicherheit erklären lässt und selbstredend nur als die Wirkung der für Schweine ausserordentlich bösartigen Bacterien anzusehen ist. Ich habe diese Knoten später in gehärteten und mit Methylenblau gefärbten Schnittpräparaten untersucht und eine so enorme Menge von Bacterien in ihnen gefunden, dass das Milzgewebe fast garnicht mehr zu erkennen war. Da sich ferner das Gewebe in den Knoten schlecht färbte und die Kerne in

den meisten Milzzellen fehlten, so dürfte auch die weitere Schlussfolgerung begründet sein, dass das Gewebe in den splenitischen Knoten abgestorben war.

Dieser Versuch lässt nur eine Deutung zu, nämlich dass Schweine, deren Empfänglichkeit gegen das Rothlaufcontagium getilgt ist, noch keine Immunität gegen das Contagium der Schweineseuche erlangt haben.

Ich habe mich ferner bemüht, ein Schwein auf natürlichem Wege, und zwar vom Darne aus zu inficiren. Da sich annehmen liess, dass die Bacterien, an denen ich keine Sporenbildung beobachten konnte, beim Passiren des Magens, wie andere Bacillen, z. B. die Milzbrandbacillen, abgetödtet würden, so versuchte ich die saure Reaction des Mageninhalts durch Verabreichung von alkalischen Flüssigkeiten zu beseitigen.

Einem Schwein wurden Futter und Getränk 24 Stunden lang entzogen. Dann wurden dem Thiere stark alkalische Bouillon (in neutraler Bouillon wurden 5 pCt. kohlen-saures Natron gelöst) und eine halbe Stunde später etwa 1 Liter Blut mit Fleischstückchen des Schweins verabreicht, welches am 26. Juni mit Bacterien geimpft und am 27. Juni gestorben war. Das Thier frass das vorgesetzte Futter aus und zeigte sich in den nächsten Tagen etwas kränklich; es frass nicht gut und gähnte häufig. Nach Verlauf von 5 Tagen war es wieder munter und bei guter Fresslust.

Demnach war es nicht gelungen, das Schwein auf dem bezeichneten Wege zu inficiren.

Am 27. August 1885, während ich mich auf einer Ferienreise befand, wurden dem pathologischen Institut der Thierarzneischule die Mägen und Milzen mehrerer Schweine, die an einer ansteckenden, dem Rothlauf ähnlichen Krankheit zu Grunde gegangen waren, übersandt. Herr Repetitor Lüpke, der allen Untersuchungen über die Actiologie des Rothlaufs und der Schweineseuche mit Eifer gefolgt, auch in den bacteriologischen Untersuchungsmethoden durch mich unterrichtet war, prüfte die Organe genauer, ermittelte in Ausstrichpräparaten der Milzen die beschriebenen ovalen Bacterien und benutzte Theilchen einer Milz zu Impfungen bei Mäusen.

Die nachstehende Tabelle giebt eine Uebersicht über die durch Herrn Lüpke am 29. August mit der Milz vorgenommenen Impfungen:

1. Generation: 2 Mäuse
 †† 30. 8.
2. Generation: 2 Mäuse
 †† 31. 8.
3. Generation: 2 Mäuse
 †† 1. 9. Fleischwasser-Pepton-Gelatine.

Bei meiner am 1. September 1885 erfolgten Rückkehr fand ich die von Herrn Repetitor Lüpke besäte Fleischwasser-Pepton-Gelatine vor, und ich konnte mich an Ausstrichpräparaten der Reinculturen und an der Wachsthumart derselben überzeugen, dass sein Urtheil begründet war. Es waren in den Culturen ausschliesslich die mir bekannten ovalen Bacterien gewachsen.

Der Einsender der Präparate, Herr College Hirschel zu Putlitz, äusserte sich über das Auftreten und die Erscheinungen der bei den Schweinen beobachteten Krankheit wie folgt:

„Herr Molkereibesitzer Th. hat Anfangs dieses Jahres eine Dampf-Centrifugen-Molkerei erbaut und dieselbe am 1. April in Thätigkeit gesetzt. Er verarbeitet pro Tag 1000—1500 Liter Vollmilch. Zur Verwerthung der Magermilch und der Molken hält derselbe ca. 150 Stück Schweine. Die Schweinekoben befinden sich in einem ebenfalls ganz neu errichteten Backsteingebäude. Der Fussboden ist cementirt, die Tröge sind aus Schieferplatten hergestellt. Ebenso ist das Sammelbassin, in dem die Magermilch aufbewahrt wird, und welches sich ebenfalls im Stalle befindet, innen mit Schieferplatten bekleidet.

Zu dem Sammelbassin gelangt die Milch aus dem Centrifugenraume durch eine eiserne Rohrleitung, die auf dem Hofe etwa $\frac{1}{4}$ Fuss unter der Erde liegt. Das Eingussbecken für die Magermilch befindet sich im Centrifugenraum. Es ist von Eisenblech hergestellt und innen und aussen mit Mennige angestrichen. Vom inneren Anstrich ist schon viel entfernt und wahrscheinlich mit der Milch in das Sammelbassin gespült worden. Die eiserne Rohrleitung ist aus mehreren Stücken zusammengesetzt. Die Verbindungsstellen sind erst mit Mennige überstrichen, dann mit Werg bewickelt, nochmals mit Mennige bestrichen und dann zusammengeschraubt nach Art der Gasrohrverbindungen.

Die Molken werden in einem kleineren Bassin neben dem grossen Sammelbassin aufgefangen und passiren dieselbe Rohrleitung. Dieses kleinere Bassin ist innen mit Cement bekleidet.

Das Futter für die Schweine besteht nur aus Molken und Magermilch und ist stets stark sauer. Das grosse Bassin wird nur sehr selten geleert, so dass alte Futterreste drei Wochen lang im Bassin sich befinden. Ebenso stehen stets alte Reste in der Rohrleitung.

Die ersten Schweine, mit denen der Besitzer seine Ställe besetzte, waren von ihm aus seiner alten Molkerei mit hergeführt. Dieselben wurden früher mit demselben Futter gefüttert. Als der Besitzer neue Schweine ankauft und dieselben einstellt, erkranken zuerst einige am „Rothlauf“ und gingen ein. Die Ställe wurden darauf gehörig gereinigt und desinficirt und mit neuem Kalkanstrich versehen. Trotzdem erkrankten die Schweine von dieser Zeit an massenweise und gingen ein. Nur ganz vereinzelt traten hierbei rothlaufähnliche Erscheinungen ein. Im Allgemeinen waren die Krankheitserscheinungen folgende:

Nachdem die neuangekauften Thiere etwa 3—4 Tage lang im Stalle sich befunden hatten und mit dem Futter aus den Sammelbassins gefüttert worden waren, stellte sich zuerst Durchfall ein. Die Excremente waren grünlichgelb bis grünlichgrau gefärbt. In sehr seltenen Fällen waren die Excremente blutig. Zu gleicher Zeit wurden die Thiere steif in den Beinen und lagen deshalb viel. Futter wurde nur sehr wenig aufgenommen. Am 6. oder 7. Tage trat noch Kreuzschwäche ein, so dass die Thiere beim Gehen hin und her taumelten. Meist blieben sie schon jetzt den ganzen Tag liegen und taumelten höchstens einmal nach dem Futtertroge, waren aber dann meist schon so schwach, dass sie am Troge umfielen. Bei einigen Thieren wurden um diese Zeit die Ohren roth, ähnlich wie beim Rothlauf, bei allen aber stellte sich schnelles, angestregtes Athmen ein. Bei den liegenden und schon schwer erkrankten Thieren traten häufig Zuckungen und Krämpfe auf. Am 8.—10. Tage gingen die erkrankten Thiere dann ein.

Zuerst ist angenommen worden, dass die Mennige im Ausgussbecken und in der Rohrleitung die Krankheit verursachen könnte. Blei ist jedoch bei der Analyse des Futters durch einen Chemiker nicht gefunden worden. Mithin konnte es als Krankheitsursache nicht angesehen werden. Dagegen ergab die chemische Untersuchung des Futters einen sehr hohen Gehalt an Essigsäure. Herr Th. hat daraufhin die Magermilch sowohl wie die Molken süß verfüttert. Da aber die Aenderung des Futters auf die schon erkrankten Thiere schädlich

einwirkte und deren Tod beschleunigte, so liess der Besitzer sofort wieder das Futter stark sauer verabreichen.“

Am Schlusse des Briefes wurde ich gebeten, die Art der herrschenden Seuche festzustellen, und dieser Bitte die Bereitwilligkeit des Besitzers hinzugefügt, die gewünschten Untersuchungen event. durch Uebersendung von kranken Thieren und von Cadavern der gestorbenen unterstützen zu wollen.

Mir fiel bei dieser sorgfältigen und genauen Beschreibung des Krankheitsbildes auf, dass es weder mit dem von Eggeling für die „Rothlaufseuche“, noch mit dem von ihm für die „Schweineseuche“ angegebenen übereinstimmt, und ich muss bekennen, dass ich auch jetzt noch nicht im Stande bin, diesen Widerspruch bestimmt aufzuklären. Ich will indess meine subjective Meinung in den Complex der Thatsachen nicht eintragen, sondern die Resultate meiner weiteren experimentellen Untersuchungen sprechen lassen.

Nach Ueberwindung vieler Hindernisse, welche die Eisenbahnverwaltung gegen den Transport kranker und gestorbener Schweine des Herrn Th. erhoben hatte, kam ich am 18. November in den Besitz von zwei Cadavern, deren Haut, Kopf und Extremitäten abgeschnitten waren. Die Cadaver gehörten wenige Monate alten Schweinen an, die an der in Rede stehenden Seuche gelitten hatten und kurz vor der Absendung gestorben waren. Die anatomische Untersuchung der Organe der Bauch- und Brusthöhle hat das Nachstehende ergeben:

1. Schwein aus Putlitz. Obduction am 19. November 1885.

Magen an der Aussenseite grauroth, Darm bläulichroth, die kleinen in der Serosa und Subserosa gelegenen Venen mit Blut strotzend gefüllt. Inhalt des Dünndarms flüssig, der des Dickdarms breiig. Im Magen eine geringe Menge gröberer Stücke (gekochte Rüben?) und stark gallig gefärbte Flüssigkeit. Die Schleimhaut der Regio oesophagea geschwollen und faltig, der grösste Theil mit Galle stark getränkt. An dem der kleinen Curvatur zu gelegenen Rande derselben zwei bräunlichgelbe Flecke vom Umfange einer Linse bzw. Bohne, die tiefer als die Umgebung lagen. Die Flecke waren scharf begrenzt, trübe und trocken; an ihren Rändern liess sich die obere Schleimhautschicht in Form einer dünnen Haut ziemlich leicht abheben. Die Drüenschleimhaut des Magens in zahlreiche mehr oder weniger hohe Falten gelegt, trübe; der grösste Theil, besonders die Kämme der Falten stark mit Galle imbibirt; die Vertiefungen zwischen diesen grauroth, am Fundusdrüsentheil graugelb und hügelig. An Stelle der

Lymphfollikel seichte Gruben mit flachen Rändern und bläulichem Grunde. Die Schleimhaut des Zwölffingerdarms und des Anfangstheils des Leerdarms etwas geschwollen, an den meisten Stellen nur einige gefüllte kleinere Blutgefässe, an einigen gallig getränkt; weiter abwärts wurde die Schleimhaut zart und blass. An den Peyer'schen Haufen und Solitärfollikeln keine Abweichungen. Die Dickdarmschleimhaut trübe, bläulichgrau mit einem Stich ins Grüne. Die mesenterialen Lymphdrüsen sind nicht merklich vergrössert, bläulichgrau, fest. Die Milz unbedeutend vergrössert, äusserlich bläulichrothbraun, mässig fest, ihre Ränder scharf. An der Pulpa keine Abweichungen, das Balkengewebe ziemlich deutlich zu erkennen. Die Leber etwas vergrössert, bläulichbraun, fest, mit leicht abgerundeten Rändern. Die Acini vergrössert, die centralen Theile derselben dunkelbraun, die peripherischen trübe und graubraun. Die Gallenblase mit klumpiger, bräunlichgelber, trüber Galle mässig gefüllt; ihre Schleimhaut gallig gefärbt. Die Nieren kaum vergrössert, graubraun, fest; Oberfläche und Schnittfläche glatt und glänzend; die Markschiebt graublauroth, die Rindensubstanz graubraun, leicht getrübt und mit stark gefüllten, verästelten Gefässen radiär durchzogen. Im Herzbeutel 36 Grm. trüber röthlicher Flüssigkeit. Peri- und Epicardium waren mit einander verklebt; die Verbindung war vermittelt durch geringe Mengen einer warzigen, zottigen oder strangartigen, graurothen, elastischen Masse. Die getrennten Flächen waren glanzlos und sahen warzig und zottig aus. Myocardium graubraun, etwas trübe und fest, Schnittfläche mattglänzend. Ränder der Mitralis und Tricuspidalis etwas verdickt und retrahirt, ebenso verhielt es sich mit den Sehnenfäden. Sonst keine Abweichungen am Herzen. Die Lungen erschienen gross, die beiden Lappen der linken Lunge mit Ausschluss der oberen Ränder und die vier Lappen der rechten Lunge derb und luftleer (hepatisirt). In beiden Brustfellsäcken 64 Grm. trüber, röthlichgelber Flüssigkeit, gemischt mit Fibrinflocken. Das Lungenfell an den hepatisirten Abschnitten rau, glanzlos, trübe; die letzteren im Ganzen dunkel grauroth, mit eingelagerten graugelben bzw. röthlichgelben, umschriebenen Flecken von verschiedener Grösse und Form. Die oberen Ränder der beiden linken Lungenlappen fühlten sich weich, obwohl wenig knisternd an. Auf der Durchschnittsfläche der hepatisirten Abschnitte waren graurothe und röthlichgelbe Stellen zu unterscheiden, welche scharf von einander abgegrenzt waren. Die letzteren entsprachen den umschriebenen Flecken an der Pleura, waren sehr

mürbe und theils mattglänzend, theils granulirt, nahmen grössere Lungentheile ein oder waren herdweise in die graurothen Partien eingesprengt. Die Grenze schnitt meist mit dem Verlauf der grösseren Bronchien und Gefässe ab. Die Oberfläche der graurothen Partien war ebenfalls granulirt, mattglänzend und trübe. In den letzteren erschienen zahlreiche, derbere, grieskorn-grosse röthlichgelbe Flecke, die den inneren Theilen der Läppchen entsprachen und entweder einzelt oder bisweilen zu kleinen Gruppen zusammenlagen. Das interlobuläre Gewebe war mit trüber, röthlicher Flüssigkeit getränkt. An den weichen Lungentheilen war die Pleura glatt und durchsichtig; der Durchschnitt glatt, glänzend und hier und da mit kleinen diffusen dunkelrothen Flecken versehen, die sich derb anfühlten. Auf seitlichen Druck ergoss sich feinblasiger Schaum über die Schnittfläche. Die bronchialen Lymphdrüsen vergrössert, fest, ihre Kapseln geröthet. Das Drüsengewebe auf der Schnittfläche röthlichgrau und vorquellend.

2. Schwein aus Putlitz. Obduction am 19. November 1885.

Am Magen dieselben Veränderungen, wie bei No. 1, nur fanden sich an der Regio oesophagea mehrere der in dem vorstehenden Obductionsprotocolle beschriebenen Flecke. Der Darm, die mesenterialen Lymphdrüsen, auch Milz und Nieren verhielten sich genau, wie im ersten Falle. An den Lungen der Art nach dieselben Abweichungen; die Hepatisation erstreckte sich auf alle Lappen, frei davon waren nur die oberen Partien derselben, welche stark durchfeuchtet und dunkelroth gefärbt waren. An den bronchialen Lymphdrüsen die im Protocolle des ersten Falles aufgeführten Veränderungen. Am Herzbeutel keine Abweichungen. Der Herzmuskel bläulichgrau, mattglänzend und trübe. Im Uebrigen keine Abnormitäten am Herzen.

Diese Fälle bieten viel Bemerkenswerthes dar. Zunächst haben beide Schweine an einer acuten Lungen-Brustfellentzündung gelitten, und bei dem Schwein No. 1 war auch ein Uebergreifen des Entzündungsprocesses auf den Herzbeutel nachzuweisen. Die Lungenentzündung ist eine maligne und einer bei Pferden häufig vorkommenden Form vergleichbar, welche ich früher zum Gegenstande einer ausführlichen Besprechung gemacht habe¹⁾. Die gelben Stellen, welche schon durch die Pleura erkennbar waren, entsprechen necrotischen Lungentheilen, die stellenweise bis an die Oberfläche reichen und als Aus-

¹⁾ Schütz, Die genuine Lungenentzündung der Pferde. Dieses Archiv, Bd. VIII, 1882, Heft 1 u. 2.

gangspunkte der Pleuritis anzusehen sind. An vielen Stellen fielen die Grenzen der Lungenläppchen mit den Grenzen der necrotischen Abschnitte zusammen, an anderen nicht. Ich mache speciell auf die im Innern der Lämpchen gelegenen gelben Herde aufmerksam, die in Form kleiner Knoten auftraten und um die Eintrittsstellen der Bronchioli ihren Sitz hatten. Wenn man ferner beachtet, dass die in den weichen Lungentheilen gelegenen derben „Flecke“ eine dunkelrothe Farbe hatten, so ist auch die Annahme berechtigt, dass an den necrotischen Partien der Lunge ein hämorrhagischer Entzündungsprocess vorgelegen hat, und dass die gelbe Farbe derselben durch Zerfall und theilweise Resorption des Blutfarbstoffes zu Stande gekommen ist. Der Process nähert sich der Gangrän, hat aber auch eine gewisse Aehnlichkeit mit der käsigen Pneumonie und unterscheidet sich von letzterer nur dadurch, dass die todten (opaken, trüben) Abschnitte gelb und feucht waren. Die zwischen den gelben gelegenen graurothen Theile der Lunge, welche die Hauptmasse derselben ausmachten, waren Sitz einer frischen Entzündung, welche chronologisch der acuten Pleuritis parallel steht. Ich bin also der Meinung, dass die gelben Abschnitte die ältesten sind, dass sie in ihrer Umgebung eine frische Pneumonie und aussen die Pleuritis bedingt haben, die, wie sich aus den Obductionsprotocollen ergibt, ein serös-fibrinöses Exsudat mit blutiger Beimischung geliefert hatte. Die gelben Stellen bestehen aus todter Lungensubstanz und entfärbtem hämorrhagisch-entzündlichen Material und sind umschlossen von frisch entzündetem Gewebe. Da die Summe der gelben Herde eine sehr grosse ist, so sind die Zonen, in denen sich die acute Entzündung entwickelt hat, zusammengeflossen und bilden die zusammenhängende graurothe Unterlage, in welche die gelben Herde scheinbar eingesetzt sind. Die Pneumonie der beiden Schweine ist hiernach als ein Multiplum von Krankheitsherden anzusehen, die nur dadurch, dass sie sich aneinanderfügen, den Eindruck der Einheit machen. Jeder gelbe Herd ist das Ergebniss einer localen Pneumonie und hat seine selbstständige Entstehung, folglich ist die ganze Lunge Sitz einer multiplen mortificirenden Pneumonie.

An diese Pneumonie schliessen sich die Erscheinungen einer allgemeinen Infection an, die theils durch die Lymphbahnen, theils durch die Blutgefässe erfolgt ist. Für ersteres sprechen die schweren Veränderungen der nachbarlichen Lymphdrüsen, und für die Infection des Blutes die parenchymatösen Veränderungen der Leber, Nieren, der Milz, des Herzens und die Reizung des Magens und Darms. Schon

in der angeführten Abhandlung hatte ich erwähnt, dass die unregelmässige Pneumonie der Pferde, die erfahrungsgemäss auch mit allgemeiner Infection des Körpers verbunden ist, wahrscheinlich durch specifische Ursachen bedingt werde. Zu demselben Urtheil kam ich bei der Pneumonie der Schweine, und hierdurch wurde ich veranlasst, alle Organe derselben zum Gegenstande einer genauen bacteriologischen Forschung zu machen.

Ich fertigte Ausstrichpräparate aus den verschiedenen Lungen-theilen an, färbte sie theils mit wässriger Gentianaviolett-, theils mit Fuchsinlösung, und prüfte sie dann auf die Anwesenheit von Mikroorganismen. Hierbei ergab sich zu meiner grössten Ueberraschung, dass in den hepatisirten Theilen der Lunge grosse Mengen ovaler Bacterien von verschiedener Grösse nachzuweisen waren; viele waren ausserordentlich klein, andere etwas grösser und noch andere in der Theilung begriffen; die letzteren zeigten alle Uebergänge zwischen ovalen Formen, die im Centrum eine ungefärbte Stelle erkennen liessen, und etwas längeren Gebilden, die sich wie die Organismen der Hühnercholera nur an den Enden intensiv färbten, während etwa ein Drittel ihrer Länge ungefärbt blieb. Ganz ungewöhnlich gross war die Menge der in schneller Theilung (cf. S. 218) begriffenen Organismen, bei denen sich das ungefärbte Mittelstück nur undeutlich erkennen liess, und die, wo zwei aneinander gelagert waren, eine Form zeigten, welche Pasteur bekanntlich als „la forme d'un huit de chiffre“ beschrieben hat. In der Vertheilung der Bacterien bot sich noch die bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit dar, dass die Anzahl derselben in den abgestorbenen Theilen der Lunge viel grösser war, als in den frisch entzündeten graurothen Abschnitten der letzteren.

In den Lungen beider Schweine wurde genau dasselbe Resultat ermittelt. Mithin hatten sich die Bacterien, welche nach der vorstehenden Beschreibung von den in den Schweinemilzen beobachteten nicht verschieden waren, in solcher Menge und Ausbreitung in den Lungen vorgefunden, dass die krankhaften Veränderungen derselben sehr wohl auf die Bacterien bezogen werden konnten. Ich kam deshalb aus den in den Lungen vorliegenden Abweichungen sofort auf die Vermuthung, dass die Bacterien durch die Respirationswege aufgenommen, bis in die feinsten Bronchien und Alveolen aspirirt worden waren und die Pneumonie hervorgerufen hatten. Die röthlichgelben Stellen der Lunge mussten ihre ersten Angriffspunkte gewesen sein, in diesen mussten sie sich vermehrt und die Mortification verursacht

haben. Hierdurch liess es sich erklären, dass sich der mortificirende Entzündungsprocess an vielen Stellen in Form bronchopneumonischer, an anderen in der lobulären und an noch anderen in Form grösserer Herde darstellte. Man konnte annehmen, dass die Krankheitserreger in die verschiedensten Theile der Lunge gleichzeitig oder kurz hintereinander eingedrungen waren, und hierdurch nicht nur die Multiplicität, sondern auch die relative Gleichaltrigkeit der zahlreichen Entzündungs-herde verstehen. Man konnte weiter folgern, dass die im Umkreise der abgestorbenen Herde beobachteten frischen Veränderungen durch erstere bedingt waren, indem sich die Bacterien in die Nachbarschaft ausgebreitet und in ihnen eine frische Entzündung hervorgerufen hatten. Endlich liess sich das Fehlen der Mortification in den frisch entzündeten Theilen der Lunge durch den inzwischen erfolgten Tod der Thiere erklären.

Ferner fand ich die Bacterien, wenn auch in geringerer Anzahl, in den Exsudatmassen der Pleurasäcke und beim Schwein No. 1 in den Verklebungsschichten der Herzbeutelblätter. Hierdurch war erwiesen, dass die Pleuritis und Pericarditis durch die Fortführung der Bacterien aus den Lungen in die Brustfellsäcke zu Stande gekommen waren. Sie zeigten sich ferner in grossen Mengen in den bronchialen Lymphdrüsen, in welche sie offenbar durch den Lymphstrom eingedrungen waren. Dagegen wurde eine geringe Menge im Blute, in der Milz, der Leber und den Nieren nachgewiesen.

Das Resultat dieser zeitraubenden Untersuchung war also, dass die Lungen die grösste Anzahl, die bronchialen Lymphdrüsen eine annähernd gleiche Menge und alle übrigen Organe nur verhältnissmässig wenige Bacterien enthielten. Diese Vertheilung sprach gleichfalls für die aufgestellte Vermuthung, dass die Bacterien ihren Eingang in den Körper durch die Lungen gefunden, und dass von diesen aus eine Weiterverbreitung in die verschiedenen Organe stattgefunden hatte.

Eine besondere Berücksichtigung verdient noch das Verhalten der in den Bronchien und in den unteren Theilen der Luftröhre vorgefundenen Inhaltmassen. (Ich will dabei bemerken, dass die oberen Theile der Luftröhre bei beiden Cadavern fehlten, weil die Köpfe derselben schon in Putlitz abgeschnitten worden waren.) Der Inhalt bestand aus einem dichten, feinblasigen, röthlichen Schaum und necrotischen Lungentheilchen. Letztere waren mit ganz enormen Mengen der Bacterien durchsetzt, auch fanden sie sich in bedeutender Anzahl in der schaumigen Flüssigkeit. Ich betone das Vorkommen der

Bakterien an der in Rede stehenden Stelle nicht nur, um die diagnostische Bedeutung desselben hervorzuheben, sondern ganz besonders, um noch auf einen anderen Weg der Ansteckung als den durch die Lungen aufmerksam zu machen. Hierauf werde ich nach der Besprechung meiner Versuche zurückkommen. Im Uebrigen ist das Auftreten der Bakterien im Inhalt der grossen Respirationswege leicht zu erklären, denn nicht alle Bakterien werden bei der Aspiration bis in die Lungen gelangen, sondern ein Theil wird schon in der Nase, im Kehlkopfe, in der Luftröhre und den Bronchien liegen bleiben und sich hier ansiedeln und vermehren; ein anderer und wahrscheinlich der grössere Theil stammt aber aus der Lunge selbst. Die necrotischen Herde in den Lungen bleiben nicht geschlossen, sondern bahnen sich bei ihrem Zerfall einen Weg in die Bronchien, entleeren in letzteren einen Theil ihres Inhalts und mit demselben die in den necrotischen Theilen enthaltenen Bakterien.

Wenn nun auch die in beiden Schweinen, besonders in den Lungen derselben, entdeckten Bakterien in ihrer Form mit den aus den Schweinemilzen gezüchteten übereinstimmten, so ging daraus noch nicht hervor, dass sie mit ihnen identisch waren. Ja wir wissen, dass selbst die Uebereinstimmung im Wachstumsmodus noch nicht ausreicht, um sich für die Identität zweier Organismen aussprechen zu können. Ich will beispielsweise daran erinnern, dass wir einen Bacillus kennen, der sich im Aussehen vom Milzbrandbacillus nicht unterscheidet, der ferner in Fleischwasser-Pepton-Gelatine etc. genau so wächst wie der Milzbrandbacillus, und der nur durch seine physiologischen Eigenschaften von ihm geschieden werden kann, denn der dem Milzbrandbacillus ähnliche Mikroorganismus zeigt selbst bei Thieren, z. B. weissen Mäusen, die erfahrungsgemäss ausserordentlich empfänglich für die Milzbrandinfection sind, keine schädliche Wirkung. Um auf die Identität der in den oben erwähnten Schweinemilzen und der in den Lungen der Putlitzer Schweine ermittelten Bakterien schliessen zu können, musste daher nicht nur die Wachstumsart, sondern auch die Wirkung der letzteren bei verschiedenen Thieren, namentlich bei Schweinen erforscht werden.

Ich säte deshalb Lungenstückchen beider Schweine in Fleischwasser-Pepton-Gelatine aus. Zu diesem Zwecke wurde der innere Lappen der rechten Lunge gewählt, der schon bei der Obduction vorsichtig gegen jede Verunreinigung geschützt worden war. Derselbe wurde mit einem ausgeglühten Messer abgeschnitten, in eine 5 proc.

Carbolsäurelösung gelegt und in dieser 15 Minuten lang gelassen. Dabei wurde der Lappen in dieser Lösung mit einem Glasstabe fortwährend hin und her bewegt. Dann wurde er 10 Minuten lang in einer 1proc. Sublimatlösung gelassen. Auf diese Weise gelang es, alle an der Oberfläche etwa haftenden fremden Organismen, die während der Obduction trotz aller Vorsicht auf sie gelangt sein konnten, zu tödten. Darauf wurde ein Schnitt mit einem ausgeglühten Messer durch den Lappen gelegt, senkrecht auf diesen mit einem anderen ausgeglühten Messer ein zweiter, und dann mit einer ausgeglühten Pincette ein Lungenläppchen gepackt und durch langsames Ziehen von seiner Nachbarschaft abgerissen. Von der Rissstelle wurden mit einer ausgeglühten Scheere kleine Stückchen abgeschnitten und diese mit der ausgeglühten Platinnadel in die Fleischwasser-Pepton-Gelatine eingimpft. Andere ebenso entnommene Stückchen wurden auf erstarrtem Rinder- und Hammelblutserum mit der Platinnadel ausgestrichen. Ferner wurden Blut- und Exsudatproben beider Schweine ausgesät in Fleischwasser-Pepton-Gelatine und Pepton-Rindfleischinfus.

Gleichzeitig wurden am 19. November 1885 mit Lungestückchen geimpft:

- 6 Mäuse am Rücken,
- 5 Meerschweinchen (2 junge und 3 alte) am Bauche,
- 2 Kaninchen am Ohre,
- 2 Ratten am Bauche,
- 2 Tauben und
- 1 Huhu an der Brust.

Die Mäuse zeigten nach der Impfung die auf S. 217 beschriebenen Krankheitserscheinungen und starben sämtlich im Laufe des nächsten Tages, also ca. 24 Stunden nach der Einimpfung der Lungestückchen. Bei der Obduction wurden die gleichfalls auf S. 217 mitgetheilten Abweichungen beobachtet. Hervorzuheben ist dabei, dass die Lungen ausser einer starken Röthung und wässerigen Tränkung keine Abweichungen erkennen liessen, und dass der Dickdarm, wie bei den früher geimpften Mäusen, mit breiigen Inhaltmassen stark gefüllt war. Im Blute der 6 Mäuse wurden Bacterien in sehr grosser Menge ermittelt, die gleichmässig in demselben vertheilt, von gleicher Grösse, oval gestaltet und in der Mitte ungefärbt waren. Andere Mikroorganismen fanden sich im Blute nicht.

Aus dem Blute einer jeden Maus wurden Reinculturen der Bacterien in Fleischwasser-Pepton-Gelatine angefertigt, auch eine

Oese voll Blut auf erstarrtes Rinder- und Hammelbutserum ausgestrichen.

Bei beiden Kaninchen wurde am Tage nach der Impfung eine starke, schmerzhaft und heisse Anschwellung an den geimpften Ohren festgestellt; die letzteren hingen schlaff herunter. Am Abend desselben Tages hatte sich die Anschwellung über einen grossen Theil des Kopfes und den oberen Abschnitt des Halses ausgebreitet. Gleichzeitig waren die Thiere traurig, athmeten beschleunigt und röchelnd und frassen nicht.

Das eine Kaninchen starb am 2. Tage nach der Impfung. Obductionsbefund: Die Haut und Unterhaut am rechten Ohre, an der rechten Kopfhälfte und am Halse mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt, die beim Einschneiden in die Theile in grösseren Tropfen austrat. Die benachbarten Muskeln grau und trübe. Sämmtliche am Kopfe und Halse gelegenen Lymphdrüsen vergrössert, mässig fest, äusserlich geröthet, auf dem Durchschnitt grauroth und feucht. In beiden Brustfellsäcken eine nicht messbare Menge trüber, grauer Flüssigkeit. Brustfell geröthet; es zeigte an einzelnen Stellen kleine, kaum millimetergrosse, hochrothe Flecke. Die bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen vergrössert und grauroth. Die Lungen dunkelroth und wässerig durchtränkt. Die Bronchien und Luftröhre mit feinblasigem, röthlichen Schaum gefüllt; nach dem Abspülen erschien die Schleimhaut mit einem sehr dichten rothen Gefässnetz durchsetzt. Das Blut in den Herzhöhlen geronnen. Herzmuskel etwas trübe. Im linken Theil des Magens bräunlichgraue, im rechten grünlichgelbe dicke Flüssigkeit. Die Schleimhaut des Magens ohne wesentliche Abweichung. Im Dünndarm grünlichgelber, mit Schleim vermischter Inhalt, der theils flüssig, theils gallertig ist. Die Peyer'schen Haufen leicht geschwollen und bläulichgrau. Inhalt des Dickdarms breiig; die Schleimhaut desselben liess eine leichte Anfüllung der Gefässe erkennen. Die Milz etwas vergrössert, dunkelbraun und mässig fest. Die Leber schlaff, auf dem Durchschnitt von gleichmässig graurothem Aussehen. Die Läppchen undeutlich erkennbar. An der vorderen Fläche ein weisslicher Belag, der dem Ueberzuge der Leber fest anhaftete. Nieren schlaff, graubraun, trübe. Auf dem Durchschnitt zeigte die Nierensubstanz die gleiche Farbe; die breite Grenzschicht rothbraun; die Marksubstanz schmutzig rosaroth, nur in den äusseren Abschnitten stärker geröthet.

Während der Obduction wurden aus dem Blute und allen Organen

Ausstrichpräparate auf Deckgläschen gemacht und mikroskopisch untersucht. Hierbei wurde nachgewiesen, dass das Blut sehr viele ovale Bacterien, die Milz, Leber, Nieren und Lunge dagegen nur eine geringere Menge enthielten. Ganz enorme Massen der Bacterien wurden in der Flüssigkeit, mit der die Unterhaut an den Ohren, dem Kopfe und Halse infiltrirt war, und in den Lymphdrüsen dieser Körperteile festgestellt. Die in der Flüssigkeit befindlichen Bacterien zeigten meist die Form kleiner ovaler Gebilde. Die in der Milz gefundenen Bacterien waren am grössten und in der Regel nur an den Enden gefärbt.

Das Blut des Kaninchens wurde auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine ausgesät.

Das andere Kaninchen ging am 3. Tage nach der Impfung zu Grunde. Bei der gleich nach dem Tode ausgeführten Obduction wurde derselbe Befund wie bei dem am vorhergehenden Tage gestorbenen Thiere wahrgenommen. Im Blute, in der Milz, Lunge, Leber, den Nieren nur wenige, im wässerigen Infiltrat der Haut und Unterhaut am Ohre, Kopfe und Halse dagegen eine grosse Anzahl ovaler Bacterien.

Das Blut des Kaninchens wurde zur Aussaat auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine verwendet.

Eine Maus, die mit einer Oese voll Blut des zweiten Kaninchens am 24. November subcutan am Rücken geimpft wurde, starb am folgenden Tage. Krankheits- und Obductionerscheinungen stimmten mit den auf S. 217 geschilderten überein. Blut und alle Organe dieses Thieres waren mit den ovalen Bacterien reichlich durchsetzt. Aus dem Blute der Maus wurden Reinculturen der Bacterien in Fleischwasser-Pepton-Gelatine hergestellt.

Von den fünf geimpften Meerschweinchen starben drei: das eine junge am 4. Tage, das andere am 5. Tage und ein altes Meerschweinchen am 8. Tage nach der Impfung. Die übrigen beiden Meerschweinchen blieben gesund. Die beiden jüngeren Meerschweinchen zeigten an der unteren Seite des Bauches, im Umfang der Impfstellen, eine Füllung der Unterhaut mit blutiger, trüber Flüssigkeit und eine gleiche Beschaffenheit der in der Nachbarschaft gelegenen Muskeln. Bei dem älteren Thiere hatte sich an derselben Stelle eine hämorrhagisch-eiterige Infiltration der Unterhaut und Muskeln entwickelt, die nach vorn bis an das Brustbein und nach hinten bis zur Schamgegend

reichte. Im Uebrigen fanden sich bei den drei gestorbenen Meerschweinchen folgende Abweichungen:

Lungen geröthet und wässerig durchtränkt. Herzmuskel trübe. Die kleineren venösen Gefässe des Dünndarms stark gefüllt. Am Blind-, Grimm- und Mastdarm trat die Injection der kleineren Venen nur stellenweise auf. Leber bräunlichgrau, trübe, mässig fest. Beim Durchschneiden floss wenig Blut aus den grösseren Gefässen. Acini leicht erkennbar; bei genauerer Betrachtung ergab sich ein kleiner brauner Fleck im Centrum derselben. Nieren vergrössert, bläulich grauroth. Oberfläche glatt. Auf dem Durchschnitt das Gewebe ganz grauroth und etwas trübe; venöse Gefässe bequem erkennbar. Milz kaum vergrössert, schlaff. Die Malpighi'schen Körperchen gross. Pulpa braunroth. Kehlkopf und Luftröhre mit feinblasigem Schaum gefüllt.

Die Untersuchung der um die Impfstellen angesammelten blutigen bezw. eiterigen Flüssigkeit, des Blutes und der verschiedenen Organe in Ausstrichpräparaten ergab, dass die erwähnte Flüssigkeit überraschend grosse Mengen von kleinen ovalen Bacterien enthielt, und dass sich im Blute, in der Milz und den übrigen Organen eine geringere Anzahl derselben fand. Die im Blute etc. beobachteten Bacterien erschienen etwas grösser.

Mit dem Blute eines jeden Meerschweinchens wurde je eine Maus am 24., 25. bezw. 27. November 1885 geimpft. Alle Mäuse starben am Tage nach der Impfung. Im Blute und in den Organen der Mäuse wurden sehr viele länglich ovale Bacterien ermittelt, deren Enden in den mit wässriger Gentianavioletlösung gefärbten Präparaten dunkelblau erschienen. Aus dem Blute der Mäuse wurden wieder Reinculturen der Bacterien in Fleischwasser-Pepton-Gelatine hergestellt.

Ich glaube aus diesen Versuchen schliessen zu dürfen, dass Meerschweinchen eine geringere Empfänglichkeit für die Infection durch die in Rede stehenden Bacterien besitzen, als Mäuse und Kaninchen, und dass die Prädisposition bei jungen Meerschweinchen eine grössere ist als bei alten.

Von den beiden geimpften Tauben ging nur eine am 22. November, also am 3. Tage nach der Impfung, ein. Sie war von beiden die schwächere und mit einem in der Heilung begriffenen Knochenbruch am linken Flügel behaftet. Der Tod trat plötzlich ein, ohne dass Krankheitserscheinungen vorher an ihr wahrzunehmen waren.

Die Unterhaut um die an der Brust gelegene Impfstelle war mit einer gelben, fibrinös-eiterigen Masse infiltrirt, die eine geringe Anzahl von ovalen Bacterien enthielt. Im Blute und in den Organen liessen sich nur äusserst wenige Bacterien nachweisen.

Mit dem Blute der Taube impfte ich am 24. November eine Maus, die erst am 4. Tage nach der Impfung starb. Im Blute und in der Milz dieser Maus fanden sich gleichfalls nur wenige Bacterien. Mit dem Blute dieser Maus impfte ich eine zweite am 29. November, die am 3. Tage nach der Impfung starb. Im Blute und in den Organen dieser Maus wurden grosse Mengen der Bacterien beobachtet. Am 3. December wurde mit dem Blute der zweiten eine dritte Maus geimpft, die im Laufe des nächsten Tages zu Grunde ging. Das Blut der dritten Maus enthielt ebenfalls grosse Mengen der Bacterien.

Mithin dürfte die Schlussfolgerung gerechtfertigt sein, dass auch Tauben der Infection durch die Bacterien schwer zugänglich sind. Denn es ist zu beachten: dass nur eine Taube starb, trotzdem beide mit einem Material geimpft wurden, welches sich bei allen übrigen Thieren als sehr virulent erwiesen hatte; dass sich die Bacterien an der Impfstelle der gestorbenen Taube nur in geringem Grade vermehrt hatten; und dass sich im Blute und in der Milz derselben nur einzelne Bacterien nachweisen liessen. Die mit dem Blute der gestorbenen Taube verimpfte geringe Anzahl der Bacterien auf die erste Maus dürfte auch den erst am 4. Tage eingetretenen Tod der letzteren und die bei der Uebertragung der Bacterien von Maus auf Maus begünstigte schnelle Vermehrung derselben die Beschleunigung des tödtlichen Verlaufs der Impfkrankheit erklären.

Das Blut der Taube und der drei Mäuse gelangte zur Aussaat auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine.

Endlich starb am 26. November, also 7 Tage nach der Impfung, eine Ratte. Die Obduction derselben ergab im Allgemeinen denselben Befund, wie bei dem am 8. Tage nach der Impfung gestorbenen Meerschweinchen (S. 243). Von der Impfstelle am Bauche ausgehend, hatte sich eine blutig-eiterige Infiltration der Unterhaut und der anstossenden Muskeln ausgebildet. Auch waren in der eiterigen Flüssigkeit viele, im Blute und in den Körperorganen dagegen nur wenige Bacterien nachzuweisen. Hiermit stimmt auch die Thatsache überein, dass eine Maus, welche mit einer Oese voll Blut der Ratte geimpft war, erst am 3. Tage nach der Impfung starb. Ihr Blut enthielt grosse Mengen der Bacterien.

Das Blut der Ratte und der Maus wurde auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine übertragen.

Das am 19. November geimpfte Huhn erkrankte nicht.

Die Beobachtungen, welche an den aus Lungenstückchen etc. der beiden Schweine und aus dem Blute der geimpften Thiere in Fleischwasser-Pepton-Gelatine, auf erstarrtem Rinder- und Hammelblutserum und in Pepton-Rindfleischinfus gezüchteten Culturen gemacht wurden, ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

1. Schweine.

- | | | |
|---|---|--|
| 19. 11. Aussaat von Lungenstückchen der beiden Schweine | { | in Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 30. 11. üppig gewachsen.
auf erstarrtes Rinder- und Hammelblutserum. Bis 21. 11. kräftig gewachsen. |
| Aussaat von Blut- und Exsudatproben der beiden Schweine | { | in Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 30. 11. in isolirten Colonien gewachsen.
in Pepton-Rindfleischinfus. Schon am nächsten Tage trübe. |

2. Mäuse.

- | | | |
|---|---|--|
| 20. 11. Aussaat von Blut der 6 Mäuse (geimpft mit Lungenstückchen eines Schweins) | { | in Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 30. 11. üppig gewachsen.
auf erstarrtes Rinder- und Hammelblutserum. Bis 22. 11. kräftig gewachsen. |
|---|---|--|

3. Kaninchen.

- | | | |
|--|---|--|
| 20. 11. Aussaat von Blut des ersten Kaninchens (geimpft mit Lungenstückchen eines Schweins) | { | auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 30. 11. sehr üppig gewachsen. |
| 22. 11. Aussaat von Blut des zweiten Kaninchens (geimpft mit Lungenstückchen eines Schweins) | { | auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 30. 11. sehr üppig gewachsen. |
| 25. 11. Aussaat von Blut einer Maus (geimpft mit Blut des zweiten Kaninchens) | { | auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 30. 11. üppig gewachsen. |

4. Meerschweinchen.

- | | | |
|---|---|---|
| 25. 11. Aussaat von Blut einer Maus (geimpft mit Blut des ersten Meerschweinchens) | { | auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 2. 12. sehr üppig gewachsen. |
| 26. 11. Aussaat von Blut einer Maus (geimpft mit Blut des zweiten Meerschweinchens) | { | auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis 2. 12. sehr üppig gewachsen. |

28. 11. Aussaat von Blut einer Maus } auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis
(geimpft mit Blut des dritten } 2. 12. üppig gewachsen.
Meerschweinchens)

5. Taube.

22. 11. Aussaat von Blut einer Taube } auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis
(geimpft mit Lungenstück- } 2. 12. in wenigen isolirten Colonien
chen eines Schweins) } gewachsen.

28. 11. Aussaat von Blut einer Maus } auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis
(geimpft mit Blut der Taube) } 2. 12. isolirte Colonien gewachsen.

2. 12. Aussaat von Blut einer Maus } auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis
(geimpft mit Blut der vor- } 10. 12. üppig gewachsen.
hergehenden)

4. 12. Aussaat von Blut einer Maus } auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis
(geimpft mit Blut der vor- } 10. 12. sehr üppig gewachsen.
hergehenden)

6. Ratte.

26. 11. Aussaat von Blut der Ratte } auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis
(geimpft mit Lungenstück- } 2. 12. in Colonien gewachsen.
chen eines Schweins)

29. 11. Aussaat von Blut einer Maus } auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine. Bis
(geimpft mit Blut der Ratte) } 10. 12. sehr üppig gewachsen.

Zu der vorstehenden Tabelle will ich noch bemerken, dass die Gelatineculturen bei Zimmertemperatur und die Serum- und Rindfleischinfusculturen im Brütschranke bei 35° C. gehalten wurden.

Im Impfstich der Gelatineculturen entwickelten sich kleine graue oder weisse, trübe Punkte, welche den einzelnen Colonien der Bacterien zugehörten. Bei den sehr üppig gewachsenen Culturen flossen die Colonien bald zusammen, bei anderen blieben sie isolirt. Um die Einstichstellen entstand ein grauweisser Rasen, dessen Oberfläche glänzte. Die Gelatine wurde nicht verflüssigt.

In den Pepton-Rindfleischinfusculturen zeigte sich schon am nächsten Tage eine starke Trübung und in den folgenden Tagen eine zusammenhängende grauweisse Masse am Boden der Kölbchen. Der Bodensatz bestand nur aus Bacterien, die theils einzeln, theils zu zwei oder mehreren aneinander lagen und im letzteren Falle geradlinig oder geschlängelt verlaufende Fäden bildeten.

Auf den Serumculturen wuchsen die Bacillen in Form eines feinen Belages, welcher trocken war und leicht irisirte. Ungemein üppig erfolgte das Wachsen in der Flüssigkeit am Grunde des Rea-

genzglases, in der sich trübe graue wolkige Schichten von schleimiger Beschaffenheit bildeten.

Mithin stimmen die aus den Lungen der Putlitzer Schweine gezüchteten Bacterien nicht nur in ihrer Form, sondern auch in ihrer Wachsthumart mit den in den Schweinemilzen (cf. S. 219) und mit den von Loeffler¹⁾ gefundenen Bacterien überein. Ich will dabei erwähnen, dass schon Loeffler auf die irisirende Beschaffenheit der auf erstarrtem Blutserum gewachsenen Culturen aufmerksam gemacht hat.

Hierzu kommt, dass die Bacterien der Schweinelungen, die der Schweinemilzen und die von Loeffler beobachteten Bacterien Mäuse und Kaninchen sicher und schnell tödten, und dass die bei den gestorbenen Thieren nachweisbaren Obductionsbefunde nicht von einander abweichen. Nur bei den übrigen Impftieren (Meerschweinchen, Tauben und Ratten) liegen gewisse Unterschiede vor. Denn während die von Loeffler gefundenen Bacterien den Tod bei den mit ihnen geimpften Meerschweinchen im Laufe des 1.—3. Tages nach der Impfung hervorriefen, starb von drei Meerschweinchen, welche ich mit Milzbacillen geimpft hatte, keins, und gingen von fünf Meerschweinchen, welche mit Lungenstückchen eines Putlitzer Schweins geimpft waren, nur drei zu Grunde. Aehnliche Differenzen zeigten sich bei den geimpften Tauben und Ratten. Diese Verschiedenheit des Impfergebnisses dürfte sich vielleicht durch die individuelle Disposition der Thiere oder durch die Menge des verimpften Materials erklären lassen. Auch glaube ich aus den bereits mitgetheilten und später folgenden Versuchen schliessen zu müssen, dass Meerschweinchen, Ratten und Tauben für die Infection mit den in Rede stehenden Bacterien nicht sehr empfänglich sind. Im Uebrigen wurden aber bei den nach der Impfung gestorbenen Meerschweinchen die von Loeffler beschriebenen Veränderungen an der Impfstelle und an den Körperorganen beobachtet.

Hiernach liessen die in den Schweinemilzen, ferner die von Loeffler bei einem Schwein und endlich die in den Lungen der Putlitzer Schweine gefundenen Bacterien nicht nur dieselbe Form und Wachsthumart, sondern auch dieselbe Wirkung erkennen. Mithin müssen diese drei Organismen identisch sein.

Wie steht es nun aber mit der Behauptung, dass die „Schweine-

¹⁾ Experimentelle Untersuchungen etc. Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte, Bd. I, S. 52.

seuche“ eine Septicämie sei? Ich werde auf diese Frage später zurückkommen.

Am 13. December 1885 erhielt ich durch die Freundlichkeit des Herrn Thierarztes Hirschel zwei vollständige Cadaver aus Putlitz, von denen das eine einem jungen und das andere einem älteren Schwein angehörte, welches die Krankheit überstanden hatte und an den Folgezuständen derselben zu Grunde gegangen war.

Bei der Obduction des jüngeren Thieres wurden die nachstehenden Befunde constatirt:

Die Haut an den Ohrensippen, um die Nasenöffnungen und das Maul, an der unteren Seite des Bauches und in der Nachbarschaft der Geschlechtstheile schwach bläulichroth gefärbt. Die Farbe liess sich durch Fingerdruck nur schwer, aber fast vollständig beseitigen. Beim Einschneiden sah man nur gefüllte Gefässe in der Haut und Unterhaut, aus denen flüssiges Blut austrat. An einigen Stellen, die sich durch eine stärkere Röthung auszeichneten, waren die Haut und Unterhaut mit röthlicher Flüssigkeit durchtränkt; solche Stellen fanden sich am Halse und zwischen den Vorderbeinen. Aus den Nasenlöchern floss eine röthliche Flüssigkeit. Um den After angetrocknete Kothmassen. Geringes Fettpolster; graurothe Färbung der Muskeln. Die Venen des Netzes mit Blut stark gefüllt. Magen und Darm durch Gas ausgedehnt, im Ganzen blass und nur an wenigen Stellen von rothen Gefässnetzen durchzogen. In der Bauchhöhle 1 Esslöffel voll gelblicher, trüber Flüssigkeit. Magen ziemlich weit und mit gallig gefärbter Flüssigkeit gefüllt. Schleimhaut grauroth, in der Fundusdrüsenregion etwas trübe, gegen den Pförtner hin einige Falten. Im Dünndarm eine geringe Menge Flüssigkeit, die vorn gallig, weiter nach hinten grau gefärbt war. Die Schleimhaut liess nur an einigen Stellen eine schwache Röthung der Zotten erkennen. Die Peyer'schen Haufen und Solitärfollikel ganz schwach geschwollen, in der Nähe der Ileocöcalöffnung etwas stärker. Im Dickdarm weiche Kothmassen, an einigen Stellen wenige gefüllte venöse Gefässe. Leber etwas vergrössert, Ränder abgerundet. Das Gewebe gleichmässig blauroth, brüchig, etwas trübe. Acini gross. Gallenblase schwach gefüllt. Galle gelb und trübe. Auf dem Durchschnitt der Leber konnte auch eine starke Füllung der grösseren Gefässe mit Blut nachgewiesen werden. Milz etwas vergrössert, mässig weich, bläulichbraun, Ränder abgerundet. Auf dem Durchschnitt glatt, Pulpa dunkel rothbraun. Follikel klein. Die schwach vergrösserten Nieren an der Oberfläche

glatt, bläulich grauroth, mit starker Füllung der oberflächlichen Venen. Auf dem Durchschnitt schwache graue Trübung der Rindensubstanz. Marksubstanz blauroth. Harnblase zusammengezogen, enthielt 20 Grm. bräunlichen Harns. Die Venen der Mesenterien mit Blut stark gefüllt. Die mesenterialen Lymphdrüsen gering vergrössert, weich; Kapseln geröthet; Schnittfläche bläulichgrau. In den Brustfellsäcken 150 Grm. trüber grauer Flüssigkeit mit gelben Flocken und fadenartigen Gerinnseln. Die unteren Abschnitte der Lungen mit einer dünnen Fibrinschicht bedeckt, durch welche feste Verklebungen mit dem Zwerchfell und den Brustwänden bedingt waren. Im Herzbeutel 65 Grm. einer röthlichen, mit gelblichen Flocken gemischten Flüssigkeit. Der Herzmuskel derb und grauroth. Das Blut im Herzen und in den grossen Gefässen geronnen. An den Klappen und Sehnenfäden lagen keine Abweichungen vor. Die Lungen erschienen gross. Die unteren Theile der beiden linken und der vier rechten Lappen fest und luftleer. Der Ueberzug dieser Theile rauh, trübe und glanzlos. Die oberen Abschnitte der Lungenlappen weich und lufthaltig; der Ueberzug derselben glatt und glänzend. Die hepatisirten Lungentheile äusserlich grauroth, mit eingelagerten gelblichen Flecken. Diese Flecke waren von ziemlich scharfen Rändern umgrenzt. Auf dem Durchschnitt grauroth, mit röthlichgelben Stellen, die letzteren traten etwas über die Oberfläche, waren mürbe und von verschiedener Form und Grösse; die meisten linsengross und rundlich, andere nahmen die Grenzen einzelner oder mehrerer Lungenläppchen ein. Aus den Bronchien ergoss sich eine trübe, röthliche, schaumige Flüssigkeit, die mit einer feinbröckeligen Masse gemischt war. Der Durchschnitt der oberen lufthaltigen Theile gleichmässig blauroth; in den Bronchien dichter Schaum. Kehlkopf und Luftröhre mit schaumiger Flüssigkeit und einigen gelbbräunlichen Flocken erfüllt. Die Schleimhaut von rothen venösen Netzen durchzogen. Nasengänge enthielten Schaum, Schleimhaut blassroth. Halsvenen mit dunklem, weich geronnenen Blute gefüllt. Die bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen stark vergrössert, Kapseln röthlich, Durchschnitt glatt, grauroth, wenig glänzend; an einzelnen Stellen grauweisse, trübe Flecke. Die weiche Hirnhaut zart und nur die venösen Gefässe gefüllt. In den Seitenventrikeln des Grosshirns eine geringe Menge klarer Flüssigkeit. Durchschnitt der Hirnsubstanz feucht glänzend, die weisse Substanz mit zahlreichen gefüllten Venen durchzogen.

Mithin hat das dritte Schwein fast denselben Befund ergeben,

wie die beiden, welche ich am 19. November obducirt hatte. Als Todesursache ist die multiple mortificirende Pneumonie anzusehen, welche ihrerseits die Pleuritis und Pericarditis und die allgemeine Infection des Körpers verursacht hat. Auch die bacteriologischen Untersuchungen haben dasselbe Resultat geliefert: die Lungen und Bronchialdrüsen waren am reichlichsten mit Bacterien durchsetzt, die Exsudatmassen in den Brustfellsäcken und in der Herzbeutelhöhle enthielten eine geringere Menge, und Blut, Milz, Leber und Nieren eine verhältnissmässig kleine Anzahl der in Rede stehenden Mikroorganismen. Um Wiederholungen zu vermeiden, beziehe ich mich auf den oben mitgetheilten Bericht.

Mit Lungenstückchen und Blut des dritten Schweins wurden wieder Culturen auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine und erstarrtem Rinder- und Hammelblutserum hergestellt. Die Culturen wuchsen genau so, wie auf S. 246 beschrieben ist, und die Untersuchungen auf Deckgläschen zeigten, dass in ihnen nur die ovalen Bacterien gewachsen waren.

Ausserdem wurden am 13. December zwei Mäuse mit Lungenstückchen subcutan am Rücken geimpft, die im Laufe des folgenden Tages starben. Sectionsbefund: Anfüllung der Unterhautgefässe mit Blut, das Gewebe mit Flüssigkeit schwach getränkt. Die Kniefalten-, Leisten- und Bugdrüsen vergrössert und geröthet. Milztumor. Hyperämie und Oedem der Lunge. Leichte parenchymatöse Trübung der Leber und Nieren. Im Blute und in allen Organen dieselben Bacterien.

Am 16. December wurden aus der Lunge des dritten Schweins geimpft:

- 2 Kaninchen am Ohre,
- 2 Meerschweinchen am Bauche,
- 1 Ratte am Bauche,
- 2 Tauben und
- 2 Hühner an der Brust.

Schon am folgenden Tage, am 17. December, waren beide Kaninchen erlegen. Sectionsbefund: Entzündliches Oedem am geimpften rechten Ohre, an der rechten Kopfhälfte und am oberen Theil des Halses. Die am Grunde der Ohrmuschel und um den Schlundkopf gelegenen Lymphdrüsen vergrössert, derb, grauroth. Lungen dunkelroth und mit Flüssigkeit durchtränkt. Luftwege mit Schaum gefüllt. Die Venennetze ihrer Schleimhäute stark injicirt. Leber, Nieren, Herz

und Muskeln parenchymatös getrübt. Die grossen Körpervenen mit Blut gefüllt. Blut im Herzen und in den Venen flüssig, an der Luft gerinnend. Im Blute und in allen Organen die gleichen Bacterien.

Das eine Meerschweinchen starb am 2. Tage nach der Impfung. Sectionsbefund: Ausgebreitetes hämorrhagisches Oedem um die Impfstelle. Milz wenig vergrössert. Leichte Trübung der Nieren und Leber. Lungen rothgefleckt, auf dem Durchschnitt feucht glänzend. In der Flüssigkeit um die Impfstellen und in allen Organen die ovalen Bacterien.

Das zweite Meerschweinchen ging am 5. Tage nach der Impfung ein. Obductionsbefund: Blutig-eiterige Infiltration der Unterhaut an der unteren Seite des Bauches, Durchtränkung der nachbarlichen Muskeln mit blutig-wässriger Flüssigkeit. Milz etwas geschwollen. Leber, Nieren und Muskeln stark getrübt. Lungen stark geröthet und sehr feucht. Die eiterige Flüssigkeit an der unteren Bauchseite enthielt grosse Mengen der Bacterien; letztere fanden sich auch in grösserer Anzahl im Blute und in allen Organen.

Von den beiden Tauben, die mit Rücksicht auf die bisherigen Erfahrungen (S. 244) mit grossen Mengen Lungensubstanz geimpft waren, starb die eine am 17. December, also am folgenden Tage, und die andere am 19. December, am 3. Tage nach der Impfung. Sectionsbefund: In der Unterhaut um die Impfstelle eine gelbliche trockene Exsudatmasse, welche aus Fibrin und Eiter bestand. Muskeln blau-roth. Körpervenen mit Blut gefüllt. Darm durchweg geröthet. Lungen dunkelroth und mit Flüssigkeit durchtränkt. Mässige Vergrösserung der Milz und parenchymatöse Veränderung der Leber. Bei beiden Thieren fanden sich im Exsudat der Unterhaut, im Blute und in den Organen die Bacterien wieder.

Die beiden Hühner und die Ratte blieben gesund.

Aus dem Blute der nach der Impfung gestorbenen Mäuse, Kaninchen, Meerschweinchen und Tauben wurden Culturen angelegt, und zwar in Fleischwasser-Pepton-Gelatine und erstarrtem Rinder- und Hammelblutserum. Drei Tage später liess sich in allen Culturen eine kräftige Entwicklung der Bacterien nachweisen.

Durch die vorstehenden Untersuchungen ist mit Bestimmtheit festgestellt, dass eine Lungenentzündung bei Schweinen auftritt, welche infectiöser Natur ist und durch ein Contagium verursacht wird, welches mit den ovalen Bacterien identisch ist. Diese Krankheit hat nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine hohe wirthschaft-

liche Bedeutung; denn ich will anzuführen nicht unterlassen, dass dem Herrn Th. im Laufe des vorigen Jahres ca. 200 Schweine im Werthe von etwa 6000 Mark an dieser Krankheit gestorben sind, und dass sie nach den brieflichen Angaben des Herrn Thierarztes Hirschel in allgemeinerer Verbreitung unter den Schweinen der dortigen Gegend vorgekommen ist. Von dieser Krankheit werden besonders die jüngeren Thiere befallen, die bis auf wenige Ausnahmen zu Grunde gehen. Herr Thierarzt Hirschel, welchen ich von den Ergebnissen meiner Untersuchungen in Kenntniss gesetzt hatte, theilte mir mit, dass er bei seinen zahlreichen Obductionen ein mit dem meinigen übereinstimmendes Ergebniss fast in jedem Falle beobachtet habe. Hierdurch erlangen meine Schlussfolgerungen selbstredend eine wesentliche Unterstützung. In jedem Falle ist die von Loeffler aufgestellte Frage:

„Bei dem hervorragenden Interesse, welches aus nationalökonomischen Gründen den Krankheiten der Schweine von den verschiedensten Seiten entgegengebracht wird, dürften ausgedehntere bacteriologische Untersuchungen sehr bald die Entscheidung darüber bringen, ob das von mir in einem Falle gefundene Bacterium zu rothlaufähnlichen Epidemien unter den Schweinen Anlass giebt, bezw. ob man berechtigt ist, auf Grund dieses ätiologischen Moments eine bestimmte Gruppe von Erkrankungen als Schweineseuche oder Schweinesepticämie von dem eigentlichen Rothlauf abzutrennen“ —

schnell geklärt. Denn es steht nunmehr fest, dass die durch die ovalen Bacterien bedingte und als Schweineseuche bezeichnete Krankheit mit dem Rothlauf nichts zu thun hat, auch keine Septicämie im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern eine infectiöse Pneumonie ist. Damit fällt eigentlich die Voraussetzung, welche bei der Wahl des Namens „Schweineseuche oder Schweinesepticämie“ massgebend gewesen sein dürfte. Trotzdem möchte ich den Namen „Schweineseuche“ für die in Rede stehende Krankheit vorläufig beibehalten, da, wie weiter unten gezeigt werden soll, noch nicht mit Sicherheit dargethan ist, dass nur die Lunge als Atrium für die krankheitserregenden Bacterien anzusehen ist.

War nun die oben ausgesprochene Vermuthung zutreffend, dass die Bacterien durch den Respirationsapparat eingedrungen waren, sich hier vermehrt und die mortificirende Pneumonie der Schweine hervorgerufen hatten, so musste auch durch künstliche Ueberführung von

Reinculturen der Bacterien in die Lungen gesunder Schweine dieselbe Krankheit verursacht werden können. Ich beschloss deshalb, zunächst eine directe Einimpfung der Bacterien in die Lungen eines Schweins zu machen, um überhaupt erst festzustellen: ob die Bacterien an dieser Stelle sich vermehren, und ob sie eine Pneumonie erzeugen.

Zu diesem Zwecke impfte ich zunächst mit einer Gelatinecultur der Bacterien, welche ich durch Aussaat von hepatisirten Lungenstückchen des am 13. December erhaltenen Schweinecadavers gezüchtet hatte, drei Kaninchen und zwei Mäuse. Von dem um die Einstichsstelle gelegenen Walle der Gelatinecultur wurde eine ganz geringe Menge mit der ausgeglühten Platinnadel abgehoben und die Nadel in der am Ohre der Kaninchen hergestellten subcutanen Tasche ausgestrichen. Dies geschah am 12. Januar d. J., Mittags 12 Uhr. Jede Maus wurde mit derselben Menge der Cultur, auch etwa um dieselbe Zeit, am Rücken subcutan geimpft. Am nächsten Morgen waren die vier geimpften Thiere todt. Bei der Obduction wurden Vergrößerung der Milz und der Lymphdrüsen, und bei der mikroskopischen Untersuchung des Blutes, der Milz, Leber etc. die beschriebenen Bacterien ermittelt. Von den in Alkohol gehärteten Organen dieser Thiere habe ich eine Reihe von Schnitten angefertigt, welche in Gentianaviolettlösung gefärbt wurden. Bei der Untersuchung der Schnitte zeigte sich, dass die Bacterien in den Capillargefäßen aller Organe enthalten waren.

Nachdem auf diese Weise die Virulenz der in Rede stehenden Reincultur festgestellt worden war, säte ich geringe Mengen derselben auf Pepton-Rindfleischinfus in Erlenmeyer'schen Kölbchen aus, und, da ich die Wahrnehmung gemacht hatte, dass sich die Culturen etwas abschwächen, wenn sie längere Zeit bei 35° C. gehalten werden (cf. weiter unten), so liess ich die Kölbchen zwei Tage lang bei Zimmertemperatur stehen. Schon am nächsten Tage war das Infus trübe, und am zweiten Tage hatte sich ein grauer Bodensatz gebildet, der sich beim Schütteln der Kölbchen in Form grauer trüber Züge vom Boden ablöste.

Am 16. Januar, Nachmittags 1 Uhr, spritzte ich von diesem Infus eine Pravaz'sche Spritze voll in jede Lunge eines älteren Schweins, welches am 3. Mai 1885 nach dem bekannten Verfahren gegen den Rothlauf immun gemacht worden war¹⁾ und sich auch noch bei den

¹⁾ l. c. S. 373.

am 11. Juni¹⁾ und am 21. November ausgeführten Impfungen mit virulenten Rothlaufbacillenculturen als immun erwiesen hatte. Hierzu wurden die Canülen und Spritzen vorher sterilisirt, dann die Canüle durch die Brustwand bis in die Lunge vorsichtig eingestochen, darauf die Spritze auf die Canüle gesetzt und der Inhalt in die Lunge eingespritzt. Dabei will ich versuchen, dass ich zu diesem Versuche 8 Cm. lange Canülen anfertigen lassen musste, um durch die dicke Haut des Schweins und das etwa 3 Cm. dicke subcutane Fettpolster bis in die Lunge gelangen zu können. Nach der Entleerung der Spritzen quollen einige Tropfen mit Luft gemischten Blutes aus der Ansatzstelle der Canüle heraus.

Am Abend athmete das Schwein beschleunigt und angestrengt und hatte sich in der Streu verkrochen. Temperatur 40,2° C.

Am 17. Januar lag das Thier auf der Brust, athmete 40 mal in der Minute, stöhnte bei jeder Expiration und zeigte keine Spur von Appetit. Beim Berühren schrie und ächzte es. Nachdem es aufgetrieben war, lief es schwankend nach dem Futtertroge und fiel nieder. Temperatur 41,3°.

Am 18. Januar suchte das Thier unter Schreien und Stöhnen den Futtertrog auf, frass aber nur sehr wenig und konnte sich nicht an den Beinen erhalten. Hierauf legte es sich nieder, schrie oft laut ohne erkennbare Veranlassung und war zum Aufstehen schwer zu bewegen. Expiration stöhnend, Inspiration kurz. Zahl der Athemzüge 48—56 pro Minute. Temperatur 41,4°.

Das Schwein starb in der Nacht vom 18.—19. Januar 1886, und bei der Obduction wurde der nachstehende Befund ermittelt:

Circa 10 Monate altes, graues, mageres Sauschwein des gemischten kleinen Schlages. An den Extremitäten, den Hals- und Bauchmuskeln Todtenstarre. An den abhängigsten Stellen des Rumpfes, sowie an den Extremitäten war die Haut roth gesprenkelt, am Maule, an der Nase, zwischen den Hinterschenkeln und am Mittelfleisch diffus bläulichroth gefärbt. An Stelle des Fettpolsters eine gelbe schleimige Gewebsmasse. Körpermuskeln grauroth und trübe. In der Bauchhöhle kein abnormer Inhalt. Der Magen mit dickbreiigen Massen mässig gefüllt. Der Dünndarm zusammengezogen und äusserlich grauroth. Im Blind- und Grimmdarm dickbreiige Kothmassen; im Mastdarm eine Anzahl ziemlich trockener, länglicher, fester Kothballen. Der

¹⁾ l. c. S. 377.

Dickdarm an der Aussenfläche dunkel bläulich. Die Gekrösvenen mit dickflüssigem Blute stark gefüllt. Die mesenterialen Lymphdrüsen etwas vergrössert, ziemlich fest, von aussen bläulich grauroth. Auf dem Durchschnitt grauroth, trübe. Im grossen Netze, im Milz-Magenbande und unter der Leberkapsel zahlreiche Finnen.

Die Magenschleimhaut besonders in der Nähe des Pylorus in grössere Falten gelegt, deren Kämme geröthet waren. Mit Ausschluss der unveränderten Portio oesophagea war die Schleimhaut mit zähem weissen, trüben Schleime bedeckt, an dem Futtertheile hafteten. Der Schleim liess sich schwer abspülen. Die Farbe der Schleimhaut im Ganzen röthlichgrau, trübe, etwas geschwollen, an den mit Fundusdrüsen besetzten Theilen hügelig. An Stelle der Follikel seichte Gruben, deren Umgebung leicht geröthet war.

Im Anfang des Zwölffingerdarms war die Schleimhaut ziemlich dick. Aus der Mündungsstelle des Gallenganges liess sich ein bohnen-grosser gelblicher Schleimpfropf leicht herausdrücken. In dem Gange etwas trübe, gelbe, schleimige Galle. Hinter der Mündung des Ganges in den Darm verlor sich die Schwellung der Schleimhaut allmählich; im Uebrigen war letztere gleichmässig grauroth. In der Schleimhaut des hinteren Leerdarmabschnittes und des Hüftdarms nur wenige gefüllte venöse Gefässe. Die Peyer'schen Haufen klein, bläulichgrau; um die einzelnen Follikel lag ein zierliches feines Gefässnetz. In der Schleimhaut des Dickdarms gefüllte Gefässnetze, sonst keine Abweichungen.

Leber bläulich dunkelbraun, fest. Schnittfläche glatt, etwas grau und leicht getrübt.

Milz aussen bläulich dunkelbraun, fest. Auf dem Durchschnitt braunroth, glatt. Das Trabeculargewebe schwer erkennbar, Malpighi'sche Körperschen wenig vergrössert.

Nieren kaum vergrössert, Kapseln leicht trennbar, Aussenfläche glatt, dunkel grauroth. Auf dem Durchschnitt glatt; Markschiebt stark geröthet, Grenzschiebt dunkel grauroth, Rinde grauroth und etwas trübe.

Im rechten Pleurasack 200 Grm. dunkelrother trüber, im linken 105 Grm. gelber trüber Flüssigkeit, in der zahlreiche grosse Flocken von sehr loser Beschaffenheit und rother bezw. gelbweisser Farbe enthalten waren. Vor der 6. Rippe und ca. 15 Cm. über dem Brustbein war die rechte Lunge mit der Rippenwand auf einer fast dreimarkstückgrossen Fläche ziemlich fest, an allen übrigen Stellen dagegen

leicht verklebt. Die Verklebungsmasse weich und dunkelroth. Beim Herausnehmen der Lunge blieb ein kleiner Theil derselben an der zuerst erwähnten Stelle haften. Die vier Lappen der rechten Lunge durch gallertartige dunkelrothe Massen verklebt. Eine ähnliche leicht trennbare Verbindung zeigte sich auch zwischen dem Herzbeutel und der rechten Lunge. Das Brustfell überall geröthet, trübe und glanzlos. Im linken Pleurasack waren nur in der Nähe des unteren Lungenrandes häutige gelbe Massen vorhanden, auch war dass Brustfell nur in dieser Gegend leicht verändert. Im 6. Zwischenrippenraume, ungefähr 20 Cm. über dem Brustbein, hatte die Lunge einen dünnen fibrinösen Belag auf einer thalergrossen Stelle.

Im Herzbeutel 52 Grm. trüber Flüssigkeit von gelblicher Farbe, wenig flockig. Eine starke gelbe Fibrinschicht überzog das ganze Herz und eine schwächere die innere Fläche des äusseren Herzbeutelblattes. Das Herz vorn und hinten mit Warzen und an den Seiten mit flachen Leisten von gelben brüchigen Fibrinmassen bedeckt. Herzmuskel etwas grau und trübe. Die Mitralis an den Rändern verdickt, undurchsichtig und etwas retrahirt; die Papillarmuskeln spitz; die oberen Enden der Sehnenfäden verdickt. Die rechte Lunge im Inspirationszustande, luftleer, fest, im mittleren Lappen röthlichgrau, in den drei übrigen dunkelroth auf dem Durchschnitt. Die graue Partie lag um die dreimarkstückgrosse Stelle des mittleren Lappens, welche ziemlich fest mit der Rippenwand verklebt war; sie schnitt mit den Grenzen des mittleren Lappens scharf ab. Das Gewebe in dieser Partie derb, auf dem Durchschnitt matt glänzend. Die zwischen den Läppchen gelegenen Bindegewebszüge breit, gelblichgrau, trübe und fest. In den dunkelrothen Lungenpartien war die Schnittfläche glatt, spiegelnd, und bildete das mit gelblicher klarer Flüssigkeit getränkte Zwischengewebe breite Streifen. Die grösseren Bronchien mit trübem glasigen Schleime und dichtem Schaume gefüllt. Die linke Lunge im Expirationszustande, einige grössere Abschnitte blauroth, andere grauroth, alle durchfeuchtet und beim Einschnneiden nicht knisternd. Auf dem Durchschnitt glatt, spiegelnd; aus den durchschnittenen Bronchien tritt bei seitlichem Druck feinblasiger Schaum hervor. Die Lufttröhre mit Schaum gefüllt; die Schleimhaut mit trüber, grauer, schleimiger Masse bedeckt. Die feinen Venennetze der Bronchial- und Trachealschleimhaut stark gefüllt. In Höhe der mit Fibrin bedeckten Stelle der Pleura lag central ein wallnussgrosser, derber, scharf umgrenzter Herd von derselben Beschaffenheit, wie die graue Partie der

rechten Lunge; um ihn befand sich eine schmale rothe Zone von frisch hepatitisirtem Lungengewebe. Die bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen vergrössert, derb und grauroth.

Aus dem Obductionsbefunde geht hervor, dass die durch die rechte Brustwand eingestochene Canüle in den mittleren Lappen der entsprechenden Lunge eingedrungen war. Der Wirkung der injicirten Pepton-Rindfleischinfus-Cultur entspricht der grosse necrotische, graurothe Lungenherd und die ausgebreitete Brustfellentzündung, welche an der Einstichstelle zu einer festen Verklebung durch Fibrin geführt, im Uebrigen aber ein reichliches hämorrhagisches Exsudat geliefert hatte. Im Exsudat und in den necrotischen Lungenpartien wurden ganz enorme Mengen von Bacterien gefunden. Die Fibrinmassen um die Einstichstelle enthielten fast nur die kleinen ovalen Bacterien, in der Flüssigkeit und in den necrotischen Lungentheilen wurden gleichzeitig viele grössere und in der Theilung begriffene Organismen derselben Art nachgewiesen. In den Alveolen lagen Fibrin, rothe und weisse Blutkörperchen und Bacterien, letztere in dichten Haufen beisammen. In den rothen, frisch hepatitisirten Lungentheilen war die Anzahl der in der Füllungsmasse der Alveolen befindlichen Bacterien eine geringere. Ein ähnlicher Befund wurde an dem Inhalt des linken Pleurasackes, sowie an den necrotischen und frisch erkrankten Theilen der linken Lunge ermittelt. Rechnet man hinzu, dass andere Mikroorganismen an den genannten Stellen nicht wahrzunehmen waren, so ist als erwiesen zu erachten, dass die Lungen- und Brustfellentzündung des erwähnten Schweins durch die injicirten Bacterien verursacht war. Dabei ist nicht unbeachtet zu lassen, dass die Lungenerkrankung ihrer Art nach genau mit der übereinstimmte, welche wir bei den drei obducirten Putlitzer Schweinen kennen gelernt haben.

Reichliche Mengen von Bacterien fanden sich auch in den Inhaltsmassen der Bronchien und der Luftröhre. Dagegen liessen sich in den Nieren, der Milz und der Leber nur geringe Mengen derselben ermitteln. Auffallend klein war die Anzahl derselben im Blute. Folglich war auch festgestellt, dass die Lunge Mittelpunkt der Störung, und dass die krankhaften Zustände der übrigen Organe auf eine von der Lunge ausgehende Infection des Blutes zu beziehen waren.

Lungentheile, Exsudat- und Blutproben des Schweins wurden auf

Fleischwasser-Pepton-Gelatine ausgesät. In allen Gläschen wuchsen die bekannten Bacterienculturen.

Die mit Lungentheilen des Schweins geimpften Mäuse und Kaninchen starben innerhalb 24 Stunden nach der Impfung. Im Blute dieser Thiere wurden wieder die avalen Bacterien gefunden.

Nachdem experimentell festgestellt war, dass durch Injection von Reinculturen der Bacterien in die Lungen eine mortificirende Lungenentzündung infectiöser Art bei Schweinen hervorgerufen wird, machte ich noch zwei andere Versuche, um eine Infection auf natürlichem Wege und zwar durch Inhalation von Bacterien herbeizuführen.

Ich liess eine Lunge des in der Nacht vom 18. zum 19. Januar gesorbenen Schweins in kleine Stücke schneiden, trocknen und pulverisiren. Das Trocknen und Pulverisiren geschah bei Zimmertemperatur und war erst am 7. Februar d. J. beendet. Darauf siebte ich die pulverige Masse durch ein Drahtnetz, um die gröberen Partikeln, die sich trotz aller Mühe nicht verreiben liessen, von den feineren zu trennen. Dann impfte ich mit je 3 Oesen voll Pulver zwei Mäuse am Rücken. Beide Mäuse starben am 2. Tage (am 9. Februar) nach der Impfung. Im Blute und in den Organen dieser Thiere viele ovale Bacterien.

Am 10. Februar impfte ich nochmals zwei Mäuse mit derselben Menge des Pulvers. Diese Thiere starben erst am 3. Tage der Impfung. Im Blute und in den Organen eine grosse Anzahl der Bacterien.

Demnach hatte das durch Pulverisiren der Lunge erhaltene Impfmaterial bei den geimpften Mäusen zwar tödtlich gewirkt, auch war dargethan, dass diese Wirkung auf der Gegenwart der ovalen Bacterien in dem Pulver beruhte; allein es war auch durch die, namentlich im zweiten Versuche beobachtete, längere Dauer der Impfskrankheit erwiesen, dass die Wirkungsfähigkeit des Pulvers mehr und mehr abnahm. Ich führte deshalb den beabsichtigten Inhalationsversuch bei einem Schwein schon am nächsten Tage aus.

Zu diesem Zwecke wurde ein ca. 3 Monate altes Schwein des kleinen gemischten Schlages in einen Holzkasten gestellt, welcher an einer Wand zwei markstückgrosse Oeffnungen hatte. In die obere wurde das Pulver mittelst eines Kautschukballons in den Kasten einblasen und durch die untere von Zeit zu Zeit ein kräftiger Luftstrom mit einem Blasebalg in den Kasten geführt, um die niederfallenden zerstäubten Pulvermassen von Neuem aufzuwirbeln. Der

Versuch dauerte 6 Stunden. Darauf wurde das Schwein in seinen Stall zurückgebracht.

Hiernach erkrankte das Thier nicht. Auch blieben zwei Mäuse, welche an demselben Tage (am 11. Februar) mit 3 Oesen voll Pulver geimpft wurden, gesund. Folglich war das Pulver inzwischen unwirksam geworden.

Einen anderen Inhalationsversuch führte ich in folgender Weise aus: Mit einer kleinen Menge einer Reincultur, welche ich durch Aussaat von Exsudatproben des in der Nacht vom 18. zum 19. Januar gestorbenen Schweins in Fleischwasser-Pepton-Gelatine erhalten hatte, impfte ich am 27. Januar, Mittags 12 Uhr, zwei Kaninchen am rechten Ohre. Beide Kaninchen waren am 28. Januar bereits todt. Die makroskopischen und mikroskopischen Befunde stimmten mit den bisherigen überein. Mit dem Blute eines Kaninchens besäte ich mehrere Kölbchen mit Pepton-Rindfleischinfus, und zwar jedes Kölbchen mit je einer Oese voll Blut. Das Infus wurde bei Zimmertemperatur gehalten. Am 2. Februar war es bereits trübe, und am 3. Februar hatte sich in allen Kölbchen ein grauweißer Bodensatz gebildet, der nur aus den Bacterien der Schweineseuche bestand.

Mit den Infusculturen wurde ein Zerstäubungsapparat gefüllt. Ferner wurde ein ca. 3 Monate altes Schwein der gemischten kleinen Rasse in den oben beschriebenen Holzkasten gesetzt, dessen untere Oeffnung verschlossen wurde. In die obere Oeffnung des Kastens wurde die Mündung des Zerstäubungsapparats eingeführt, letzterer mit dem Gummigebläse verbunden und in Betrieb gesetzt. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen (am 4. und 5. Februar) wurden jedesmal im Verlauf von mehreren Stunden 500 Ccm. der Infuscultur zerstäubt und von dem im Kasten befindlichen Schwein inhalirt. Nach der Inhalation wurde das Schwein in den Stall zurückgebracht.

Am 7. Februar erkrankte das Schwein, es athmete beschleunigt und angestrengt, hustete zeitweise, frass nicht und lag meist auf der Brust. Beim Berühren schrie es nicht.

Am 8. Februar athmete das Thier 40mal in der Minute, stöhnte bei jeder Expiration und zeigte geringe Fresslust. Es stand, wenn es zum Aufstehen veranlasst wurde, mit gekrümmtem Rücken ruhig im Stalle.

Vom 9.—11. Februar dieselben Erscheinungen. Das Thier war auffallend mager geworden und zum Aufstehen schwer zu bewegen.

In den nächsten Tagen nahm die Schwäche noch mehr zu, und

am 14. Februar wurde das Schwein, weil äussere Gründe eine weitere Haltung desselben nicht mehr gestatteten, getödtet.

Die Obduction ergab eine multiple mortificirende Pneumonie. In den erkrankten Lungentheilen wurden grosse Mengen der ovalen Bacterien gefunden. Nach der Aussaat von kleinen Lungentheilen in Fleischwasser-Pepton-Gelatine wuchsen üppige Culturen der Bacterien.

Hiernach hat die Einspritzung und die Inhalation von Reinculturen der Bacterien in die Lungen dieselbe Wirkung gehabt, auch stimmen die Producte der Infection mit denen, welche bei den natürlich erkrankten Schweinen ermittelt waren, vollkommen überein. Mithin sind alle Beweise erbracht, dass die Schweineseuche eine durch die in Rede stehenden Bacterien bedingte Infectionskrankheit ist¹⁾.

Ich habe die Absicht, die Inhalationsversuche bei Schweinen in nächster Zeit zu wiederholen.

Einige Thiere unterliegen der acuten Lungenentzündung nicht, sondern bei ihnen entwickeln sich käsige Zustände in den Lungen, Lymphdrüsen und anderen Organen, die sich nach der Art der Tuberculose progressiv ausbreiten und schliesslich durch allgemeine Abmagerung und Verfall der Kräfte zum Tode führen können. In dieser Beziehung lieferte die Obduction des zweiten, am 13. December 1885 eingesandten Cadavers einen überaus lehrreichen Befund. Ich lasse das während der Section dictirte Protocoll folgen:

Stark abgemagertes Cadaver. Todtenstarre nicht mehr vorhanden. Die sichtbaren Schleimhäute blassbläulich. Der rechte Hinterschenkel erheblich geschwollen; die Anschwellung begann eine Handbreite unter dem Kniegelenk und nahm von da abwärts zu, um ihre grösste Ausbildung am Sprunggelenk und am Mittelfuss zu finden. Die beiden vorderen Zehen standen weit auseinander und die hinteren hoben sich in fast wagerechter Richtung vom Mittelfuss ab. Schon von der Mitte des Unterschenkels an verschwand der Panniculus adiposus in einer weissen, knorpelhartem Schwiele, welche von der Haut bis zu den Knochen reichte. Die Hautoberfläche war glatt und nur an der vorderen Fläche des Mittelfusses erhoben sich aus der diffusen Geschwulst einzelne flachrundliche Knoten. Am oberen Theil des Unterschenkels

¹⁾ In neuerer Zeit habe ich mehrere Schweine aus der Umgegend von Berlin obducirt, die an einer acuten mortificirenden Lungen-Brustfellentzündung gestorben waren und in den Lungen etc. dieser Thiere die ovalen Bacterien gefunden. Es lässt sich daher annehmen, dass diese Krankheit in allgemeiner Verbreitung unter den Schweinen auftritt.

hatte die Haut ein glattes, narbenartiges Aussehen. Inmitten des harten Gewebes fanden sich viele Höhlen, welche mit einer käsigen, gelben Masse erfüllt waren und glatte Wände hatten. Die grössere Zahl derselben lag an der hinteren, eine kleinere an der vorderen Fläche des Mittelfusses und einige um das Sprunggelenk. Die Höhlen standen theils unter sich, theils mit mehreren Sehnenscheiden und Gelenken in Verbindung. In den Gelenken und Sehnenscheiden ein dickbreiiger Inhalt. Mehrere Knochen des Sprunggelenkes liessen sich als todte, mit Käsemassen durchsetzte Körper aus den Gelenkhöhlen leicht herausheben. Die Gelenkflächen des Roll- und Sprungbeins und des unteren Endes des Unterschenkel- und Wadenbeins erschienen wie angenagt und die oberen Enden der Schienbeine bestanden aus körnig-zerfallenen, todtten, gelben Massen, die Gelenkbänder waren zerstört und von den Sehnen des oberflächlichen und tiefen Zehenbeugers grössere Abschnitte abgetrennt, die als morsche Fetzen in den Käsemassen lagen. Auf den nicht abgestorbenen Knochen des Sprunggelenks und des Mittelfusses ausgebreitete periostitische Auflagerungen. An keiner Stelle war es zum Aufbruch durch die Haut gekommen.

An der inneren Fläche des Unter- und Oberschenkels im Verlauf der Lymphgefässe kirsch kern- bis wallnussgrosse, theils derbe, theils fluctuirende Knoten, welche aus einer derben, gefässreichen Kapsel bestanden, die mit einer gelblichgrauen, schmierigen, mitunter trockenen, krümeligen Masse angefüllt waren. Beim Ausspülen des Inhalts ergab sich, dass derselbe von einem schmutziggelben, mürben Balkenwerke durchzogen wurde, welches mit der Kapsel fest verbunden war. Die rechte Leistendrüse hühnereigross, mit derber, innen glattwandiger Kapsel, Inhalt breiig und aus der eröffneten Kapsel durch seitlichen Druck herauszuschieben. Das rechte Packet der lumbalen Lymphdrüsen taubeneigross, derb und hart, mit starker fibröser Kapsel versehen. Inhalt schmierig, gelb, käsig. Die Wand der Kapsel durch ein gelbes, trübes, mürbes Balkenwerk verbunden. Um diesen grossen Knoten kleinere, bis haselnussgrosse; Kapsel fest, leicht geröthet; Durchschnitt weiss, matt, trübe (markig). Die Lymphdrüsen der beiden vorderen Gliedmassen, namentlich die Achseldrüsen, ferner die Drüsen der rechten unteren Brustwand, die Bugdrüsen, die Lymphdrüsen der rechten Ohrdrüsengegend und Theile der Unterkieferdrüsen vergrössert, im Allgemeinen wallnussgross; sie stellten dickwandige Säcke dar, die mit einer gelblichgrauen, dickbreiigen Masse angefüllt waren. Auch die pharyngealen Lymphdrüsen waren vergrössert; ein

Knoten hatte die Grösse und Form einer Kartoffel. Die von neugebildeten Gefässen durchzogene derbe Kapsel liess sich als zusammenhängende Haut von dem gelbrothen harten Drüsengewebe leicht abziehen. Die Schnittfläche des letzteren war trocken, glanzlos, röthlichweiss, undurchsichtig und zeigte viele ganz weisse Stränge, in denen hanfkorn-grosse, gelbweisse, umschriebene mürbe Herde lagen. Der grosse Knoten war von mehreren kleineren umgeben, welche dieselbe Beschaffenheit hatten und untereinander zusammenhingen. An der linken Seite des Halses zeigte sich eine tief eingezogene, strahlige Narbe.

Die rechte Tonsille stark vergrössert, bläulichgrau. Die Tonsillartaschen mit einer zähen, grauweissen, trüben Flüssigkeit gefüllt. Mitten auf der Oberfläche der Tonsille ein fast pfenniggrosser, umschriebener, gelblicher Herd, welcher aus gelben, käsigen Massen bestand, die sich leicht herausheben liessen. Der Herd reichte durch die ganze Tonsille hindurch. Nach der Entleerung des Inhalts blieb eine glattwandige, ausgebuchtete Höhle zurück. Am Stimmfortsatz des linken Giesskannenknorpels und am oberen Ende des linken Stimmbandes lagen drei käsige Geschwüre von Erbsengrösse; das am Stimmfortsatz ermittelte Geschwür reichte bis auf den Knorpel. Die Geschwüre waren durch eine 2—3 Mm. breite Schleimhautbrücke getrennt.

In den Brustfellsäcken 150 Grm. klarer, wässriger Flüssigkeit. Die Lungen erschienen gross. Die Spitzen des rechten und linken vorderen Lappens und die unteren Ränder der übrigen Lappen grau-roth, luftleer, derb, trocken; die Aussonfläche dieser Lungentheile durch mehrere Einziehungen gefurcht und mit der Rippenwand stellenweise fest verwachsen. Das übrige Gewebe war roth und fühlte sich weich und knisternd an. In allen Lungenlappen fanden sich zerstreut hirsekorn- bis wallnuss-grosse derbe Knoten, von denen die unmittelbar unter dem Lungenfell gelegenen schmutziggelb und trübe hindurchschienen und über die Umgebung etwas hervorragten; einzelne mit Höhlen im Innern, andere fest, käsig. Von den Zweigen der Luftröhre gelangte man unmittelbar in mehrere Höhlen hinein. Die Wände dieser Höhlen glatt; in denselben eine weiche, breiige oder homogene, gelbweisse, nicht ganz so feuchte Masse, die sich von den Wänden abgelöst hatte. Andere Höhlen waren vollständig abgeschlossen und von starren, festen Kapseln umgeben; Inhalt fast trocken, käsig. An keiner Stelle eine frische Erkrankung. Die bronchialen und

mediastinalen Lymphdrüsen taubeneigross, fest. Kapseln verdickt. Inhalt käsig.

Das Herz klein, blassbraun. Im Herzbeutel 2 Esslöffel voll klarer Flüssigkeit. Die Herzhöhlen mit flüssigem Blute gefüllt.

In der Bauchhöhle 250 Grm. durchsichtiger Flüssigkeit. Bauchfell blassgrau und nur am Netze einige gefüllte Venen sichtbar. Im Magen eine reichliche graue Flüssigkeit. Schleimhaut desselben grau-gelb, nur die grösseren venösen Gefässe gefüllt. Im Dünndarm gallig gefärbte Flüssigkeit. Der Darm war so weich, dass er beim Abtrennen vom Gekröse häufig zerriss. Schleimhaut nicht verändert. Im Dickdarm dickbreitiger Inhalt; die Schleimhaut hatte ein bläulichweisses Aussehen. Milz klein, von aussen stahlblau; Durchschnitt braunroth. Nieren und Leber klein, doch sonst nicht verändert. Harnblase zusammengezogen; Inhalt bestand aus einigen Tropfen trüben Harns. Schleimhaut unverändert. An den Geschlechtstheilen keine Abweichungen. An der Gekröswurzel lagen zwei haselnussgrosse Lymphdrüsenknoten, der eine in der Nähe der lumbalen Lymphdrüsen, der andere mehr nach vorn. Beide Knoten besaßen dicke Kapseln und käsigen Inhalt. Im retroperitonealen Gewebe, in den Mesenterien und im Netze keine Spur von Fett.

In den grossen Gefässen flüssiges Blut.

Die harte Hirnhaut nicht verändert. Das Gehirn weich. Die weiche Hirnhaut zart und überall von reichlichen venösen Netzen durchzogen. In den Seitenhöhlen eine geringe Quantität von Flüssigkeit. Der Durchschnitt der Hirnsubstanz auffallend blass.

Das beschriebene anatomische Bild war offenbar dem der Scrofulose oder Tuberculose ähnlich. Die krankhaften Veränderungen der Knochen erregten den Verdacht, dass sie aus einer tuberculösen Osteomyelitis hervorgegangen waren, und die tiefliegende strahlige Narbe am Halse liess auf ein verheiltes scrofulöses oder tuberculöses Geschwür schliessen, welches durch Perforation eines Lymphdrüsenknotens entstanden war. Hierzu kam, dass die Grenzen vieler Herde in den Lungen mit denen der Lobuli zusammenfielen, also käsig-pneumonischen Ursprungs waren, und dass das Gewebe ausserdem mit kleinen miliaren Knoten, welche die Eigenschaften älterer Tuberkel zeigten, durchsetzt war. Trotzdem hielt mich ein Umstand von einer bestimmten Erklärung zurück. Ich hatte nämlich vor einigen Jahren ähnlich veränderte Lungen, Lymphdrüsen etc. von mehreren Schweinen erhalten und alle erkrankten Organe im Gesundheitsamte genau unter-

sucht. Ich erinnerte mich, dass es mir dabei nicht gelungen war, die tuberculöse Natur des Leidens durch den Nachweis der Tuberkelbacillen darthun zu können, und dass meine damaligen Cultur- und Impfversuche zu unklaren Ergebnissen geführt hatten. Der einzige Unterschied, welcher zwischen den Abweichungen des Putlitzer Schweins und den von mir früher untersuchten vorlag, bestand in der Dauer der Zustände. Die käsigen Massen waren in den früheren Fällen trockener und auf dem Durchschnitt der Lymphdrüsenknoten concentrisch geschichtet, woraus ich schloss, dass die Eintrocknung der käsigen Substanz allmählich, schichtweise vor sich gegangen war. Auch waren die Thiere besser genährt. (Die krankhaften Veränderungen wurden erst nach dem Schlachten auf dem hiesigen Schlachtviehhofe ermittelt.)

Um nun festzustellen: ob das Schwein an der Tuberculose gelitten hatte oder nicht? färbte ich eine grosse Anzahl von Ausstrichpräparaten der aus verschiedenen Organen genommenen käsigen Massen nach dem Ehrlich'schen Verfahren. Trotz aller Mühe und Sorgfalt konnte ich keine Tuberkelbacillen in ihnen nachweisen. An Stelle derselben fand ich die bekannten ovalen Bacterien. Sie lagen in grossen Mengen in allen käsigen Knoten, und ein Unterschied in der Anzahl der Bacterien mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der käsigen Massen: ob sie feucht oder trocken waren, liess sich nicht feststellen. In der Grösse stimmten sie mit den durch schnelle Theilung hervorgegangenen jüngeren Generationen überein, wie sie sich auf der Oberfläche des erstarrten Rinder- oder Hammelblutserums bilden. Sie waren also in den abgestorbenen (käsigen) Gewebsmassen in den Formen gewachsen, die wir in den ausserhalb des Körpers hergestellten Culturen kennen gelernt hatten. Etwas Aehnliches ist von den Milzbrand- und Tuberkelbacillen¹⁾ bekannt.

Von Wichtigkeit ist noch, dass sie sich in grossen Mengen auch in den Knoten fanden, die keine Verbindung mit anderen Theilen hatten, die von dicken fibrösen Kapseln fest umschlossen waren, und deren Inhalt sich von den Wänden vollständig abgelöst hatte. Diese Thatsache verdient bei anderen Krankheiten, z. B. bei der Lungen- seuche beachtet zu werden.

Mit dem käsigen Inhalt eines vollkommen abgeschlossenen Lymphdrüsenknotens wurden die nachstehenden Versuche gemacht:

¹⁾ Koch, l. c. S. 25.

Ich schnitt den Knoten mit einem ausgeglühten Messer heraus, legte ihn 15 Minuten lang in 5proc. Carbolsäurelösung und dann 10 Minuten lang in 1proc. Sublimatlösung. Darauf trocknete ich den Knoten mit reinem Fliesspapier ab, durchschnitt ihn mit einem anderen ausgeglühten Messer und tauchte die vorher ausgeglühte Platinnadel in die käsig-breiige Masse ein. Mit je einer Oese voll besäte ich 6 Gläschen mit Fleischwasser-Pepton-Gelatine, 6 Gläschen mit erstarrtem Rinder- und 6 Gläschen mit erstarrtem Hammelblutserum.

Gleichzeitig impfte ich am 14. December mit der käsigen Substanz:

- 2 Mäuse am Rücken,
- 2 Kaninchen am Ohre,
- 2 Meerschweinchen am Bauche,
- 2 Ratten am Bauche,
- 2 Tauben und
- 2 Hühner an der Brust.

Auf die Meerschweinchen, Ratten, Tauben und Hühner wurden grössere Mengen des käsigen Materials verimpft.

Die Mäuse und die Kaninchen starben am folgenden Tage. Die Section ergab:

Bei den Mäusen: Unterhaut geröthet und schwach durchfeuchtet. Lymphdrüsen vergrössert. Milz geschwollen, bläulichroth, weich. Dickdarm mit breiigem Inhalt gefüllt. Nieren und Leber leicht getrübt. Lungen geröthet und feucht. Im Blute und in allen Organen sehr viele ovale Bacterien.

Bei den Kaninchen: Starke Schwellung der Haut und Unterhaut am Ohre und an den nachbarlichen Theilen des Kopfes und Halses. In der Flüssigkeit der Unterhaut eine sehr grosse Anzahl von Bacterien, meist kleine ovale, auch grössere in der Theilung begriffene. Milz wenig vergrössert. Leber und Nieren parenchymatös verändert. Lungen durchfeuchtet, dunkelroth, weich. Im Blute viele Bacterien, ebenso in allen Körperorganen.

Am 3. Tage nach der Impfung (am 17. December) verendeten ein Meerschweinchen und eine Taube.

Bei dem Meerschweinchen fand sich ein umfangreiches hämorrhagisches Oedem an der unteren Seite des Bauches. Milz kaum vergrössert, ziemlich fest. Leber und Nieren stark getrübt. Lungen feucht, weich und stark geröthet. Bronchien und Luftröhre mit Schaum gefüllt. Im Blute viele Bacterien.

Bei der Taube lag in der Unterhaut um die Impfstelle ein gelbes

Exsudat; letzteres mit Bacterien reichlich durchsetzt. Im Blute und in den Organen wenige Bacterien.

Alle übrigen Thiere erkrankten nicht.

Das Blut der gestorbenen vier Thiere wurde auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine ausgesät.

Am 17. December wurden nochmals zwei Mäuse mit dem käsigen Inhalt eines Lungenknotens am Rücken geimpft. Beide Mäuse starben in der Nacht vom 18.—19. December. Sie lieferten bei der Section die wiederholt beschriebenen Befunde. Auch das Blut dieser Mäuse wurde zur Aussaat auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine benutzt.

Die Culturen in der Fleischwasser-Pepton-Gelatine waren nach Ablauf von 6 Tagen und die auf erstarrtem Hammel- und Rinderblutserum in 2 Tagen kräftig und dicht gewachsen. Die Serumculturen wurden während dieser Zeit bei 35° C. im Brütschranke gehalten. Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass ausschliesslich die ovalen Bacterien in den Culturen zur Entwicklung gekommen waren. Ich will noch hinzufügen, dass ich die Culturen später wochenlang beobachtet und durch viele Generationen auf Fleischwasser-Pepton-Gelatine und Serum fortgezüchtet habe, dass ich aber niemals einen anderen Organismus in ihnen nachweisen konnte. Auch erwiesen sich die späteren Generationen der bei Zimmertemperatur in Fleischwasser-Pepton-Gelatine gezüchteten Bacterien nach ihrer Uebertragung auf Mäuse ebenso wirksam, wie die aus den Käseherden frisch entnommenen. Dagegen liess sich in den auf erstarrtem Serum gewachsenen Culturen, die in Thermostaten bei 35° gehalten wurden, nach Ablauf von 2—3 Wochen eine Abnahme in der Virulenz feststellen. Denn die mit ihnen geimpften Mäuse zeigten erst am 3. Tage auffällige Krankheitserscheinungen und gingen in der Regel am 4. oder 5. Tage zu Grunde. Diese Wahrnehmung machte ich auch bei den aus dem Blute, der acut entzündeten Lungen etc. der übrigen Thiere auf Serum angestellten und einige Zeit fortgezüchteten Culturen.

Erwägt man nun, dass in den käsigen Krankheitsproducten dieselben Bacterien gefunden wurden, wie in den acut erkrankten Lungen etc. der übrigen Schweine, dass die in den Käsemassen ermittelten Bacterien in Fleischwasser-Pepton-Gelatine und auf erstarrtem Rinder- und Hammelblutserum in derselben Zeit und in derselben Art wuchsen, wie die aus den frisch entzündeten Schweinelungen, und dass durch Uebertragung der Culturen aus den Käsemassen auf

Mäuse, Kaninchen etc. dieselbe Krankheit hervorgerufen wurde, wie nach der Verimpfung der aus den frisch entzündeten Lungen gezüchteten Bacterien, so ist erwiesen, dass alle Schweine an derselben Infectionskrankheit gelitten haben, und dass die käsigen Zustände den Ausgang derselben darstellen.

Was den Verlauf der Seuche unter den Schweinen des Molkereibesitzers Th. betrifft, so will ich erwähnen, dass mit dem Eintritt der kälteren Witterung keine neuen Erkrankungsfälle aufgetreten sind. Auch hat mir Herr Thierarzt Hirschel mitgetheilt, dass die Seuche im Winter regelmässig ihr Ende erreicht und erst mit Beginn der wärmeren Witterung sich von Neuem entwickelt.

Hiernach kennen wir jetzt die Ursachen von zwei allgemein verbreiteten Infectionskrankheiten der Schweine: dem Rothlauf und der Schweineseuche. Wenn wir die Form, die Wachstumsart und die physiologischen Eigenschaften als Merkmale benutzen, um die verschiedenen Arten der Mikroorganismen zu erkennen, so ergibt sich aus den vorstehenden Mittheilungen mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die feinen Bacillen des Rothlaufs der Schweine mit denen der Koch'schen Stäbchensepticämie der Mäuse und die Bacterien der Schweineseuche mit denen der Gaffky'schen Kaninchensepticämie übereinstimmen. Koch und Gaffky haben nachgewiesen, dass die Organismen, welche die von ihnen entdeckten Septicämien verursachen, weit verbreitet vorkommen, „dass sie sich im Blute geschlachteter Thiere, im Fleischwasser oder in mit organischen Substanzen verunreinigten Gewässern gerade so ansiedeln können, wie die Fäulnisbacterien.“ Die Erklärung, dass man die Organismen der Mäuse- und Kaninchensepticämie besonders häufig in aus Schlächtereien bezogenem Blute gefunden hat, dürfte nach meiner Meinung in dem Umstande liegen, dass an diesen Stellen oft an Rothlauf resp. Schweineseuche leidende Thiere geschlachtet wurden. Im Uebrigen würde sich bei der Annahme der in Rede stehenden Identität (zwischen Rothlauf der Schweine und Mäusesepicämie, sowie zwischen Schweineseuche und Kaninchensepticämie) auch erklären lassen, dass Rothlauf und Schweineseuche unter ganz verschiedenen Verhältnissen bei Schweinen auftreten können und allgemein verbreitete Krankheiten sein müssen.

Der Rothlauf der Schweine zeigt die Eigenschaften einer Septicämie, die Schweineseuche dagegen ist in ihren Producten der Tuberculose ungemein ähnlich. Augenblicklich sind die Stadien der Schweine-

seuche noch nicht so genau verfolgt, dass wir alle Eigenschaften derselben besprechen könnten; aber die Hauptfrage ist erledigt, und es bedarf nur noch einer fortgesetzten Prüfung der Einzelfälle, um das Fehlende zu ergänzen. Vorläufig glaube ich, dass die Lungen der Schweine, wie bei der Tuberculose, den gewöhnlichen Angriffspunkt des Contagiums abgeben, und dass von hier ausgehend die Bacterien sich im Körper verbreiten, von Neuem ansiedeln und neue Krankheitsherde hervorrufen können. Dies schliesst selbstredend nicht aus, dass die Bacterien gelegentlich einmal auch auf einem anderen Wege in den Körper eindringen können, wofür schon die Ergebnisse der bei Schweinen ausgeführten subcutanen Impfungen sprechen. Unterstützt wird diese Annahme durch das Resultat der vorstehenden Untersuchungen, dass sich der Infectionsstoff nicht nur in den entzündeten Lungen, sondern auch in grossen Mengen in den Inhaltmassen der Respirationewege findet, und dass er folglich nach aussen entleert werden und auch mit anderen Theilen des Schweins in Berührung kommen kann. So möchte ich annehmen, dass Wunden, welche Schweinen durch Peitschenhiebe, durch Bisse von anderen Thieren etc. beigebracht werden, Eingangspforten für den Infectionsstoff bilden können. Auf eine Infection von solchen Wunden möchte ich den von Loeffler beobachteten Fall zurückführen, in welchem „ein enormes Oedem, vom Halse bis zwischen die Vorderbeine nach abwärts sich erstreckend“, also eine Veränderung in der Haut und den anliegenden Weichtheilen bestand, wie sie nach subcutanen Impfungen von Reinculturen der ovalen Bacterien bei ganz gesunden Schweinen entstehen. Dagegen bin ich nicht im Stande, die Eggeling'schen Angaben mit den Resultaten meiner Beobachtungen und Untersuchungen in Einklang zu bringen.

Ich habe schon erwähnt, dass das Krankheitsbild, welches Eggeling von der „Rothlaufseuche“ der Schweine beschreibt, eine gewisse Aehnlichkeit mit dem hat, welches Loeffler bei einem am 26. October 1882 obducirten Schwein beobachten konnte. Denn Eggeling giebt an, dass „nicht selten die Haut unter dem Halse, namentlich im Bereich des Kehlkopfes, geschwollen und schmerzhaft“, dass die geschwollene Haut „stark serös durchtränkt ist, und dass an solchen Stellen auch die Unterhaut, das benachbarte Bindegewebe und selbst die Muskeln von einer trüben, wässerigen Flüssigkeit infiltrirt sind.“ Es ist dies gewiss eine merkwürdige Uebereinstimmung mit dem von Loeffler beobachteten Falle von Schweineseuche. Auffallend ist aber,

dass Eggeling diese Erscheinungen als charakteristische Zeichen einer unter Schweinen in seuchenhafter Verbreitung auftretenden Krankheit beschreibt und dabei von den Lungen nur anführt, dass sie sich im Zustande des Oedems befanden. Mithin kann nur gefolgert werden, dass in den von Eggeling mitgetheilten Fällen nicht die Krankheit vorgelegen hat, welche nunmehr als Schweineseuche angesehen werden muss. Dagegen halte ich die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen, dass diese Fälle dem Stäbchenrothlauf der Schweine vielleicht zuzurechnen sind. Zur Entscheidung dieses Punktes müssen weitere, namentlich Untersuchungen des Blutes und der Organe der gestorbenen Schweine auf das Vorhandensein der dieser Krankheit eigenthümlichen Bacillen angestellt werden.

Auch ist die Möglichkeit einer Infection durch den Darm nicht abzuweisen. Das oben mitgetheilte Resultat der Verfütterung von Blut und Fleisch eines an der Schweineseuche gestorbenen Schweins an ein gesundes spricht nicht gegen diese Möglichkeit. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Wiederholung des Versuches oder eine Aenderung in der Anordnung desselben zu positiven Ergebnissen führt. Auch beabsichtige ich, mit der Fütterung von Reinculturen der Bacterien bei passender Gelegenheit von Neuem zu beginnen. Vorläufig will ich nur die Aufmerksamkeit auf ein von Roloff¹⁾ beschriebenes Leiden der Schweine lenken, welches er mit dem Namen der „käsigen Darmentzündung“ belegt und zur Tuberculose gerechnet hat, welches aber höchst wahrscheinlich in den Kreis der durch die ovalen Bacterien bedingten Krankheitsprocesse zu rechnen ist. Dabei ist allerdings nicht ausser Acht zu lassen, dass die Darmwand auch vom Blutstrom her inficirt werden kann, und dass folglich die käsigen Zustände des Darmes noch nicht ohne Weiteres auf eine bacterielle Verunreinigung des Darminhalts zu beziehen sind.

Ueberhaupt ist nunmehr die ganze Summe krankhafter Veränderungen bei Schweinen, welche als zur „Scrofulose und Tuberculose“ gehörig bezeichnet worden sind, einer erneuten Prüfung mit Rücksicht auf die in der vorliegenden Arbeit mitgetheilten Gesichtspunkte zu unterwerfen. Ich verspreche mir hiervon grossen Gewinn für die Thierheilkunde, nachdem wir wissen, dass es mindestens zwei Reihen ausgebreiteter käsiger Processe bei Schweinen giebt, von denen die

¹⁾ Roloff, Virchow's Archiv, 36. Bd., 1866.

eine durch die Tuberkelbacillen und die andere durch die eiförmigen Bacterien verursacht wird.

Am Schlusse möchte ich noch bemerken, dass der verstorbene Director der hiesigen Thierarzneischule, Herr Geheimrath Roloff, die klinischen und anatomischen Zeichen der „Scrofulose und Tuberculose“ der Schweine Jahre lang studirt und die Ergebnisse seiner Studien in einer sehr sorgfältigen Arbeit zusammengestellt hat¹⁾. Er folgte deshalb dem fortschreitenden Gange der vorstehenden Untersuchungen mit hohem Interesse und vermuthete schon, dass ihre Erfolge die wissenschaftliche Grundlage für eine Trennung der von ihm als „Schwindsucht“ bezeichneten Krankheiten der Schweine abgeben würden. Denn er wusste genau, welche Bedeutung den „käsigen“ Lungenentzündungen der Schweine in wirthschaftlicher Beziehung zuzusprechen ist. Und wenn auch seine Krankheit ihn bald zwang, seine eigene Thätigkeit an diesen Untersuchungen einzustellen, so kann ich doch sagen, dass es zum grossen Theil seiner Anregung zu verdanken ist, wenn die Thierheilkunde jetzt über die in der vorliegenden Arbeit mitgetheilten Fortschritte verfügt.

Erklärung der Abbildungen (Taf. V).

Fig. 1. a, b, c Culturen der Bacterien der Schweineseuche in Fleischwasser-Pepton-Gelatine.

Fig. 2. Bacterien der Schweineseuche im Blutausstriche.

¹⁾ Roloff, Die Schwindsucht, fettige Degeneration, Scrophulose und Tuberculose bei Schweinen. 1875.

IX.

Ueber die Aufenthaltszeiten der aufgenommenen Nahrung im Darmcanal der Schweine und die Reactionsverhältnisse des Darminhalts dieser Thiere.

Von

Ellenberger und V. Hofmeister.

Ueber die in der Ueberschrift bezeichneten Fragen liegen zwar ältere Untersuchungen vor; trotzdem erscheint es uns aber nicht überflüssig, die Resultate unserer eigenen hierüber gemachten Beobachtungen mitzutheilen. Sie dürften einiges Neue enthalten und in mancher Beziehung nähere Aufklärung geben.

1. In Bezug auf die Durchgangszeit der Nahrungsmittel durch den Darmcanal der Schweine haben wir folgende Beobachtungen gemacht:

a) Bei einem Schwein, welches Sägespähne mit anderem Futter erhalten hatte, traten dieselben nach 24 Stunden im Koth auf, waren aber auch nach 36 Stunden noch in demselben enthalten.

b) Ein Gleiches constatirte man bei Hafer- und Kartoffelfütterung.

c) Bei einem dritten Schwein beobachtete man ganz dasselbe.

d) Kartoffelschalen fand man 20 Stunden nach der Nahrungsaufnahme im Koth, sie traten allmählich massenhafter auf, nahmen dann ab, waren aber nach 48 Stunden und darüber noch im Koth zu finden. Dieselben finden sich dann aber nicht in jedem Kothballen, es tritt vielmehr ca. 36 Stunden nach der Futteraufnahme in Bezug auf die Beschaffenheit der Kothballen Unregelmässigkeit ein, so dass z. B. bei einer Entleerung Koth abgesetzt wird, welcher frei von Schalen ist, während bei dem nächsten Kothabsatz wieder Schalen in den Ballen zugegen sind. Es scheint also, dass die Kartoffelschalen zuweilen an einzelnen Stellen des Dickdarms längere Zeit liegen bleiben.

e) Heidelbeeren, welche in einer Mahlzeit mit Kleie verabreicht wurden, traten nach 18 Stunden schon im Koth auf und waren auch nach 40 Stunden noch in demselben zu finden. Nach ca. 48 Stunden war der Koth frei von denselben.

f) Einige weitere Beobachtungen in Bezug auf Hafer und Kartoffeln hatten ähnliche Resultate. Der Hafer erschien nach ca. 18 Stunden im Koth und wurde in ca. 12—16 Stunden (= 36 Stunden) entleert. In Spuren war er aber auch noch nach 48 Stunden im Koth zu finden.

2. Die Aufenthaltszeiten der Nahrung in den einzelnen Darmabschnitten ergeben sich aus Folgendem:

a) Eine Mahlzeit, bestehend aus 500—1000 Grm. Hafer, fand sich eine Stunde nach Beendigung der Mahlzeit noch vollständig im Magen.

b) Bei einer Hafermahlzeit von 750 Grm. war 3 Stunden nach derselben bereits Hafer, aber wenig, in den Dünndarm übergetreten.

c) Bedeutender war dies der Fall 4 Stunden nach der Mahlzeit.

d) 6 Stunden nach der Mahlzeit war der Hafer bereits bis zum Ende des Dünndarms und Anfang des Dickdarms vorgerückt. Der bedeutendste Theil befand sich aber noch im Magen. Im Dünndarm fanden sich 14 9 Grm. Faser, also die Reste von ca. 155 Grm. Hafer. Ein kleiner Theil war bereits in den vordersten Theil des Dickdarms eingetreten. Die Haferhülsen fanden sich besonders in der Nähe der Einmündung des Ileum in das Colon und nur sehr sparsam im Coecum.

e) 8 Stunden nach einer Mahlzeit von 750 Grm. Hafer ohne Nachfütterung fand sich der Hafer im Magen, Dünndarm, Coecum und Anfangstheil des Colon, und zwar im Magen ca. $\frac{4}{5}$ der aufgenommenen Menge.

f) 10 Stunden nach einer Mahlzeit von 1000 Grm. Hafer bei fehlender Nachfütterung waren Theile des Hafers schon weit in das Colon vorgerückt. Hier fanden sich aber noch bedeutende Reste der vorhergegangenen Mahlzeiten, welche mit den Haferhülsen gemischt waren. Eine scharfe Scheidung differenter Futterarten kommt im Dickdarm des Schweins niemals vor. Merkwürdigerweise treten zuweilen Ballen von langfaserigen Nahrungsmitteln abgetrennt in den verschiedenen Abschnitten des Darmcanals auf. Sie bleiben von vorn bis hinten gesondert und sind schon im Magen aufzufinden. Im Uebrigen aber besteht stets Durchmischung der Reste verschiedenartiger Nahrungsmittel.

g) Bei einem Schwein, welches 12 Stunden vor seinem Tode 1000 Grm. Hafer genossen hatte, waren Theile dieser Mahlzeit bis gegen die hintere Hälfte des Colon vorgedrungen. Im Magen fand man noch 57,7 pCt. Faser, welches 554 Grm., also ungefähr der Hälfte des aufgenommenen Hafers entspricht. Der Blinddarm und der Dünndarm enthielten nur Haferreste. Im Colon waren schon vorn, noch mehr aber im zweiten Drittel Reste einer ca. 48 Stunden vor dem Tode verabreichten Mahlzeit. Im hinteren Drittel und im Rectum fand man Reste einer Mahlzeit, welche 4 Tage ante mortem genossen worden war. Es ist dabei allerdings zu beachten, dass das Thier ca. 40 Stunden vor dem Tode gehungert, dass also der Nachschub neuer Massen gefehlt hatte.

h u. i) Bei zwei Schweinen, welche 36 Stunden vor dem Tode Heidelbeeren mit Kleie und 2 resp. 4 Stunden ante mortem Hafer erhalten hatten, waren die Heidelbeeren im Coecum und Colon und der Hafer im letzteren Falle im Magen und in geringeren Mengen im Dünndarm nachzuweisen.

k) Bei einem anderen Thiere, welches ebenfalls 36 Stunden ante mortem Heidelbeeren mit Kleie und 6 Stunden vor dem Tode Hafer gefressen hatte, war

der grösste Theil des Dickdarms mit Heidelbeeren und Kleie angefüllt. Im Coecum und Anfangstheil des Colon fand man bereits Hafertheile. Beachtenswerth ist, dass im hinteren Theil des Colon und im Rectum noch Theile einer Haferfütterung angetroffen wurden, welche 4 Tage vor dem Tode stattgehabt hatte und welcher ausser den beiden genannten noch drei Mahlzeiten, aus Kleie und Milch bestehend, gefolgt waren. Man ersieht hieraus, wie auch aus einer weiteren Beobachtung, welche ergab, dass 5 Tage nach einer Fütterung mit Kartoffeln noch Kartoffelschalen im Dickdarm anzutreffen waren, dass beim Schwein einzelne Theile aufgenommener Stoffe viele Tage im Dickdarm liegen bleiben können.

l) Bei einem anderen Thiere, welches beinahe 48 Stunden vor dem Tode eine Mahlzeit aus Kleie und Heidelbeeren erhalten, dann 40 Stunden gehungert, dann Hafer gefressen hatte und 8 Stunden nach der letzten Mahlzeit getödtet worden war, fand man noch im Coecum Heidelbeeren und Kleie. Das Colon enthielt dieselbe Masse. Der Hafer war im Coecum und auf ca. 1 Meter Entfernung im Colon nachzuweisen. Im Rectum fand man Heidelbeeren, aber auch Reste von Hafer, welcher 5 Tage vor dem Tode gefressen worden war.

m) Bei einem Schwein, welches 7 Tage vor dem Tode Hafer, dann 2 Tage lang Fleisch, dann Kalbsknochen, dann 2 Tage nur Fleischbrühe und dann 10 Stunden vor dem Tode wieder Hafer erhalten hatte, fand man im Dickdarm Knochensalze und noch bedeutende Reste des vor 7 Tagen verabfolgten Hafers. Das Coecum war mit frischem Hafer angefüllt.

n) Ein Schwein hatte 9 Tage vor dem Tode Kartoffeln mit, dann 2 Tage solche ohne Schalen, dann 3 Tage Fleisch, dann Knochen, dann 2 Tage Fleischbrühe, dann 12 Stunden ante mortem 1000 Grm. Hafer erhalten. Der frische Hafer war bis gegen das hintere Drittel des Colon vorgedrungen, aber mit Resten der vor ca. 48 Stunden verabreichten Knochen gemischt. Im hinteren Drittel des Colon und im Rectum fanden sich Fleischkoth, aber auch noch einzelne Klümpchen von Kartoffelschalen. d. h. Reste einer Nahrung, die vor 9 Tagen aufgenommen worden war. Hierzu wollen wir noch bemerken, dass Heiden-Pommritz (Beiträge zur Ernährung der Schweine) bei verschiedenen Schweinen constatirte, dass bei Strohfütterung 5—6 Tage verflossen, bis der Koth strohfrei war.

3. Die Reaction des Darminhalts wurde bei 7 Schweinen aufgenommen. Sie verhielt sich, wie umstehende Tabelle zeigt.

Die Beschaffenheit des Magen- und Darminhalts zeigte sich bei diesen 7 Schweinen, wie folgt:

Der Mageninhalt ist bei Körnerfutter stets verhältnissmässig trocken (60—70 pCt. Wasser).

Der Dünndarm enthält in seinen vorderen Partien in der Regel nur eine stark schleimige, gelblich erscheinende, zähe Masse, in welcher nur wenig Futterpartikelchen enthalten sind. Im hinteren Theil des Dünndarms findet man meist grössere Quantitäten von Nahrungsmitteln, die oft durch Galle gelb gefärbt sind, keinen unangenehmen Geruch haben und hochgradig verdaut erscheinen. Man findet fast nur Unverdauliches, welches mit Schleim, Galle und anderen Flüssigkeiten durchtränkt ist. Der Wassergehalt des gesammten Dünndarm-inhalts beträgt ca. 80—85 pCt.

Reactionsverhältnisse des Darminhalts bei sieben Schweinen.

	Schwein No. 1.	Schwein No. 2.	Schwein No. 3.	Schwein No. 4.	Schwein No. 5.	Schwein No. 6.	Schwein No. 7.
Mageninhalt . . .	sauer	sauer	sauer	sauer	sauer	sauer	sauer
Dünndarminhalt .	der Inhalt in den vorderen fünf Sechstein war sauer, dann neutral, hinten alka- lisch	vordere Hälfte sauer, dann neutral, dann alkalisch	vordere drei Fünftel sauer, dann alka- lisch	vordere drei Fünftel sauer, dann alka- lisch	vordere zwei Drittel sauer, hinteres Drit- tel alkalisch	vordere zwei Drittel sauer, hinteres Drit- tel alkalisch	vordere Hälfte sauer, von der Mitte ab al- kalisch
Blinddarminhalt . . .	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch
Grimmdarminhalt . . .	alkalisch	zu sieben Ach- tel alkalisch, nach hinten sauer	alkalisch	alkalisch, nach hinten neutral	alkalisch, nach hinten schwach sauer	alkalisch	alkalisch, hinten sauer
Masidarininhalt . . .	alkalisch	schwach sauer	neutral	neutral	schwach sauer	neutral	sauer

Der Blinddarm enthält schon eine consistentere, aber doch noch wasserreiche Masse, welche verschieden gefärbt ist, je nach der Beschaffenheit der Nahrung, aber die gelbe Farbe des Dünndarminhalts verloren hat. Der Blinddarminhalt nimmt schon einen etwas unangenehmen Geruch an. Sein Wassergehalt beträgt ungefähr 85—90 pCt.

Das Colon enthält eine ähnliche aber stärker stinkende Masse als das Coecum; nach hinten wird der Inhalt trockener, wasserärmer.

Das Rectum enthält eine mehr oder weniger derbe, stark stinkende, nach hinten in Ballen zerlegte, nach der Beschaffenheit der Nahrungsmittel verschieden gefärbte Masse.

Resumé.

Aus den vorstehend angeführten Beobachtungen ergibt sich Folgendes:

1. Bei normaler Folge der aus Vegetabilien oder gemischter Nahrung bestehenden Mahlzeiten und gesunden Schweinen beginnt die Entleerung der Reste einer aufgenommenen Mahlzeit 18—24 Stunden nach derselben (zuweilen auch früher) und ist in 12 weiteren, also 36 Stunden nach der Futteraufnahme, im Wesentlichen beendet.

Reste der verzehrten Nahrungsmittel verweilen aber, namentlich wenn es sich um schwerer verdauliche Stoffe handelt, bedeutend länger; sie scheinen in den Poschen des Dickdarms liegen zu bleiben und können dort unter Umständen 8 Tage und vielleicht noch länger verweilen. Mitten unter Kothballen, welche die Reste der in letzter Zeit aufgenommenen Nahrung enthalten, erscheinen plötzlich solche, in welchen sich noch alte Nahrungsreste (Kartoffelschalen, Haferhülsen, Sehnen etc.) befinden. Diese Thatsache hat eine praktische Bedeutung. Sie zeigt uns, dass schwer lösliche Gifte in dem Dickdarm sehr lange Zeit liegen bleiben können, dass also bei der antidotischen Behandlung gewisser Vergiftungen auch längere Zeit nach der stattgehabten Giftaufnahme noch die entleerende Kurmethode (Purganzen, Laxanzen) am Platze ist. Es ist also unrichtig, wenn gelehrt wird, dass 24 oder 36 Stunden nach einer Vergiftung die betreffende Methode nutzlos sei.

2. Was den Aufenthalt der Nahrungsmittel in den einzelnen Abschnitten des Verdauungscanals anbelangt, so geht darüber aus unseren Beobachtungen hervor:

Im Magen verweilt ein Theil der aufgenommenen Nahrung, wenn sie nicht aus absolut verdaulichen und löslichen Stoffen (zartes Fleisch, Zucker, Pepton etc.) besteht, bis zur nächsten Mahlzeit, vorausgesetzt, dass diese nicht gar zu spät erfolgt. Ist die neue Mahlzeit reich-

haltig genug, dann schiebt sie alle Reste der früher aufgenommenen Nahrung aus dem Magen heraus. Ist aber die neue Mahlzeit nur knapp, dann bleibt anfangs noch ein Rest der früheren Mahlzeit im Pylorustheil des Magens liegen.

In den Dünndarm treten die ersten Portionen einer Mahlzeit ca. 3 Stunden nach derselben. Nach weiteren 3 Stunden ist ein kleiner Theil des Dünndarminhalts schon im Coecum angelangt. Demnach treten die ersten Theile einer mässigen Mahlzeit 5—6 Stunden nach Aufnahme derselben in das Coecum ein. Der bedeutendste Theil ist zu dieser Zeit aber noch im Magen. Im Dünndarm halten sich demnach die Nahrungsmittel nur eine kurze Zeit auf.

Im Dickdarm verweilen die Nahrungsmittelreste verschieden lange. Es richtet sich dies nach der Natur der Nahrung, nach der Füllung des Dickdarms, nach der Menge etc. der nachrückenden Massen und auch nach der Individualität des Thieres. Wir fanden den genossenen Hafer 12 Stunden nach der Aufnahme schon im zweiten Drittel des Colon. Er hatte bis zum Anus demnach nur noch das letzte Drittel des Colon und das Rectum zu durchlaufen.

3. Die Reaction des Darminhalts ist beim Schwein folgende:

Der Mageninhalt reagirt sauer; nur zu Beginn der Verdauung ist er in der Nähe der Cardia alkalisch. Der Dünndarminhalt reagirt mindestens in der vorderen Hälfte, zuweilen in den vorderen zwei Dritteln und fünf Sechsteln sauer und in dem hinteren Abschnitt alkalisch; es ist demnach der Inhalt des Duodenum stets sauer, der des Ileum stets alkalisch, der des Jejunum wechselnd. Der Inhalt des Coecum reagirt stets alkalisch, ebenso der Inhalt der proximalen Strecken des Colon. In den distalen Abschnitten des Colon und im Rectum wechselt die Reaction; sie ist meist schwach sauer oder neutral, zuweilen aber auch alkalisch.

X.

Die Wirkung der Galle auf rohes und gekochtes Stärkemehl.

Von

H. Nasse in Marburg.

Die Herren Ellenberger und Hofmeister haben in ihrem Bericht über die die Wirkung der Galle auf die Verdauungsstoffe (s. dieses Archiv, Bd. XI, Heft 5 u. 6) betreffenden Versuche die von mir gefundenen Ergebnisse über die Wirkung der Galle auf das Stärkemehl angeführt, um den ihrigen die meinigen als widersprechend gegenüberzustellen. Ich muss bedauern, dass die Herren meine Arbeit (im Archiv f. wissenschaftl. Heilkunde, B. IV, Heft 3, S. 445 u. ff.) gar nicht gelesen haben und sich an irgend einem Auszuge, der theils unrichtig, theils unvollständig gewesen sein muss, haben genügen lassen.

Sie geben an, dass ich berichte, Schweinegalle löse reichlich den Stärkekleister, dass ich aber der Rindsgalle ein diastatisches Vermögen abspreche, während sie in der Regel bei der Schweinegalle keinen lösenden Einfluss erkennen konnten, dagegen in der Ochsen-galle ein diastatisches Ferment fanden. Sie würden aber bei der Lesung meiner Abhandlung ersehen haben, dass ich S. 446 und 450 sage, die Ochsen-galle bilde in der Wärme von $37,5^{\circ}\text{C}$. aus der Stärke viel Zucker ohne alle Säure, und in dem Filtrat finde sich kein gelöstes Amylum, und ferner (S. 451) hinzufüge, in einer von Schleim befreiten Galle sei die Umwandlung eine etwas geringere, und dass ich erkläre, die Schweinegalle verändere den Kleister nicht, erzeuge sehr wenig Glycose, die schleimfreie Galle noch viel weniger, und dabei etwas Säure, löse auch nicht die Stärke auf, wie das Filtrat beweise. Somit würden die Herren Berichterstatter eingesehen haben, dass ihre eigenen Ergebnisse nur die meinigen bestätigen.

Anders verhält es sich nun aber in Betreff der Wirkung der Schweinegalle auf rohes Stärkemehl. Hier weichen unsere beiderseitigen Ergebnisse von einander ab, und zwar aus einem nachweisbaren Grunde.

Ich fand, dass das Amylum, wenn es mit dieser Galle oder mit einer Lösung von hyocholinsaurem Natron 21—23 Stunden lang in einer Temperatur von wenigstens 38,8—42,5°C., also in der Wärme, welche das Schwein besitzt, digerirt wird, nicht aber in einer geringeren, sich bis auf einige aufgequollene Stärkemehlkörner löst, eine leicht filtrirbare, durch Jod sich stark bläuende Flüssigkeit bildet, in der nur äusserst wenig Zucker und nur sehr wenig Säure vorhanden ist. Diese lösende Wirkung wird durch Zusatz von kohlen-saurem Natron nicht aufgehoben. Och-sengalle und glycocholsaures Natron lassen das Stärkemehl in dem Parallelversuch ganz unverändert und erzeugen auch keine Säure.

Wenn nun die Herren Ellenberger und Hofmeister nicht zu denselben Resultaten gelangten, keinen amylolytischen Einfluss der Schweinegalle beobachteten, so hing dies davon ab, dass sie weder in einer so hohen Wärme, noch eine so lange Zeit hindurch die Versuche anstellten. Dem von mir gefundenen muss ich einen um so höheren Werth beimessen, als ich mit anderen organischen Säuren ausser mit der Weinsäure eine gleiche Wirkung auf das Stärkemehl nicht erzielen konnte. Gewiss werden die genannten Beobachter, deren Genauigkeit bei ihren Untersuchungen ich alle Achtung zolle, wenn sie ein gleiches Verfahren wie ich einschlagen, sich auch in diesem zweiten Punkte von der Richtigkeit meiner Angaben überzeugen.

Mittheilungen

aus den

amtlichen Veterinär-Sanitätsberichten.

Berichtsjahr 1883/84.

Zusammengestellt von

Dr. J. Esser und Dr. W. Schütz.

(Fortsetzung — s. S. 65.)

II. Organkrankheiten.

A. Krankheiten des Nervensystems.

Hirntuberkel bei einer Kuh. Eine sehr magere, hochtragende Kuh hatte periodische Anfälle, bei denen sie mit den Vorderfüßen in die Krippe stieg und sich sehr wunderlich benahm. Beim Fressen vergass sie oft das Kaugeschäft auf längere Zeit, während das Maul noch mit Futter gefüllt war. Sie drängte stets nach rechts, und da sie mit der rechten Seite an der Wand stand, so hatte sie sich bei diesem Drängen das rechte Horn beträchtlich abgerieben und an der Haut Verletzungen zugezogen. Im Freien machte sie unaufhörlich Manegebewegungen nach rechts. Fiebererscheinungen waren nicht zugegen. Der Referent diagnosticirte *Coenurus cerebralis*. Nach der Geburt eines todten Kalbes verendete die Kuh bald. Bei der Section wurde eine sehr ausgebreitete Perlsucht der serösen Häute der grossen Körperhöhlen ermittelt. Die tuberculösen Massen waren stellenweise mehrere Zoll stark. Im rechten vorderen Lappen des Grosshirns lag eine hühnereigrosse, feste Geschwulst, welche den ganzen vorderen Theil der Schädelhöhle rechterseits ausfüllte und bis in die Siebbein-grube hinein reichte. Die nähere Untersuchung ergab, dass es sich hier um einen Tuberkel handelte. Kr.-Th. Lehmann-Wittlich.

Abscess im Grosshirn. Ein Remontepferd benahm sich wie ein dummkolleriges und drehte ausserdem nach rechts. Später trat

Lähmung des Hintertheils ein, und unter soporösen Erscheinungen erfolgte der Tod nach 3tägiger Krankheitsdauer. Bei der Section wurde in der rechten Hemisphäre des Grosshirns ein wallnussgrosser Abscess gefunden, welcher unmittelbar unter den Hirnhäuten sass und Eiter von milchartiger Beschaffenheit enthielt. Die Gehirnsubstanz war erweicht, und aus den Seitenkammern des Gehirns konnten 3 Esslöffel voll einer trüben Flüssigkeit geschöpft werden. O.-Rossarzt Haase-Wolken.

Paralyse an den Gliedmassen eines Pferdes. Ein Arbeitspferd konnte sich seit Wochen nicht mehr vom Boden erheben, hatte 52 Pulse und 48 Athemzüge in der Minute, war sonst munter und frass. Nach dem Tode sahen die Muskeln wie gekocht aus und hatten eine sulzige Beschaffenheit. Die Lungen waren puffig, alle übrigen Organe serös infiltrirt, die Gekröswurzeln mit Extravasaten (?) versehen, die Rückenmarkshäute stark injicirt und das Rückenmark blutig punktirt. Prof. Dr. A nacker-Düsseldorf.

B. Krankheiten der Respirationsorgane.

Fremder Körper in der Nasenhöhle eines Pferdes. Nachdem ein Pferd seit 8 Tagen beim Athmen ein eigenthümlich schnaufendes Geräusch hatte hören lassen, nahm das Geräusch und die damit verbundene Athemnoth so zu, dass das Pferd zu ersticken drohte. Durch die in Folge dessen angestellte Untersuchung wurde Schwellung der Nasenschleimhaut, Schleimausfluss aus der Nase und Bindehautkatarrh des rechten Auges constatirt. Die Oberlippe und die Nasenränder hingen schlaff herab und wurden beim Fressen und Athmen nicht bewegt. An der Mündung des rechten unteren Nasenganges wurde bei genauerer Untersuchung ein fremder Körper entdeckt, der sich nach seiner Extraction als ein 20 Cm. langer und $\frac{3}{4}$ Cm. starker, reichlich mit Dornen besetzter Schössling einer wilden Rose erwies. Kr.-Th. Kühne.

Erstickung einer Kuh durch Verschlucken der Nachgeburt. Kr.-Th. Schäfer-West-Priegnitz machte die Section einer Kuh, welche Morgens todt im Stalle gefunden wurde, nachdem sie am Abend vorher gekalbt hatte. Er fand im Rachen, im Schlunde und in den Mägen des Thieres einen grossen Theil der Nachgeburt, welcher im ununterbrochenen Zusammenhange stand. Im Rachen hatte

sich ein grösseres Knäuel gebildet, welches den Zugang zum Kehlkopfe verlegte und den Tod durch Erstickung herbeiführte.

Amyloide und colloide Neubildung in der Schleimhaut der Nase und Luftröhre. Dep.-Th. Wolff-Berlin beobachtete auf der Schleimhaut der Luftwege einer 20jährigen Stute, welche mittelmässig genährt war, glattes Deckhaar, einen kräftigen Puls hatte und frei von Fiebererscheinungen war, den nachstehenden interessanten Process. Die um die beiden unteren Nasenöffnungen gelegenen Weichtheile waren etwas ödematös, aus den Nasenlöchern floss eine geringe Menge wässerigen Secrets. In der Nähe der unteren Nasenöffnungen war die Nasenschleimhaut verdickt und von höckeriger Oberfläche. Einzelne Theile der verdickten Schleimhautpartie waren ausgezeichnet warzig eingerichtet, wodurch ihr Aussehen in Bezug auf Form eine gewisse Aehnlichkeit mit Blumenkohl darbot. In der nächsten Nachbarschaft dieser Neubildung war die Schleimhaut verdickt, weiss, derb, von glatter Oberfläche und ging nach oben unter stetiger Abschwächung der Erscheinungen allmählich in unveränderte Theile über. In der Nähe der Choanen hatte die Schleimhaut der Nasenmuscheln und Nasengänge ein glasiges Ansehen, dies war besonders an der rechten oberen Nasenmuschel der Fall. Eine ähnliche Beschaffenheit zeigte die Kehlkopfschleimhaut namentlich an den Rändern der Epiglottis. Diese Schleimhautabschnitte waren gallertig, gelb gefärbt und wiesen vereinzelt erbsengrosse, rundliche, bernsteinfarbige Knoten auf. Die Schleimhaut der Luftröhre war etwas diffus verdickt und mit feinen Körnchen gleichsam besät. Nur stellenweise erhoben sich auf ihr flache, längliche, höckerige Knoten. An einigen Stellen lagen auch weisse, flache Narben, von denen eine den Umfang einer Bohne, andere den eines Hanfkorns hatten. Erosionen und Geschwüre fehlten. Die submaxillaren Lymphdrüsen waren etwas vergrössert und verhärtet.

Die im pathologischen Institut der Thierarzneischule vorgenommene mikroskopische Untersuchung ergab, dass es sich um eine amyloide und colloide Degeneration der Schleimhaut handelte. Die geschwulstartigen Bildungen zeigten in ihren oberen Schichten eine zellige, in den tieferen eine fibröse Einrichtung. Die Schleimdrüsen und ihre Ausführungsgänge waren vielfach zu Grunde gegangen.

Plötzlich entstandenes Kehlkopfpfeifen und Heilung desselben. Bei einem edlen Wagenpferde wurde plötzlich sehr heftiges Kehlkopfpfeifen bis zur Erstickungsgefahr bei der geringsten Arbeit bemerkt. Im Stande der Ruhe zeigte sich das Athmen voll-

ständig normal, ebenso erschien das Thier nach jeder Richtung hin ganz gesund und munter. Uebte man jedoch mit der Hand einen gelinden Druck auf den Kehlkopf oder auf die Partie der Drosselrinne bis unter die Mitte des Halses einige Male aus, so trat sofort sehr heftiges Athmen mit starkem Pfeifen im Kehlkopf ein. Der Zustand ging nach 8—10 derartigen Athemzügen wieder zum normalen über, liess sich aber sofort wieder durch leisen Druck hervorrufen. Der Berichtstatter hielt die Krankheit für einen Reizzustand im Nervus recurrens und machte subcutane Injectionen von Morph. acet. dagegen. Nach 8 Tagen waren die Erscheinungen des Kehlkopfpfeifens verschwunden und sind bei einer 4 monatlichen Beobachtung nicht wiederkehrt. Kr.-Th. Ebinger-Rössel.

Echinococcen in den Lungen. Dem Kr.-Th. Uhse-Cottbus wurde eine 9jährige Kuh mit dem Vorbericht vorgestellt, dass das Thier öfter huste, allmählich kurzathmig geworden und trotz regen Appetits stets abgemagert sei. Das Athmen war sehr beschleunigt, der Husten kurz und trocken. Bei der Auscultation des Thorax wurde normales Bläschengerauschk nicht vernommen, anstatt dessen aber eigenthümliches Reiben und quiekende Töne. Die Kuh starb bald. Die Obduction ergab folgenden Befund: Beide Lungen erschienen gleich häutigen, mit Kartoffeln gefüllten Säcken, deren Oberfläche über und über knotig war. Das Lungenfell war überall durchscheinend. Die Schnittfläche der Lungen gewährte den Anblick eines Pflasters, welches aus unzähligen, unmittelbar aneinander liegenden Wurmbblasen (Echinococcen) bestand, deren Grösse im Mittel die einer guten Kartoffel betrug. Die durchschnittenen Blasen entleerten eine wasserhelle Flüssigkeit. Lungensubstanz fand sich nur in ganz geringem Masse zwischen den Echinococcenblasen, und die noch vorhandene war zum grössten Theil bläulich gefärbt und luftleer. Die Leber enthielt auch eine grosse Anzahl derselben Parasiten, von denen die unmittelbar unter der Kapsel sitzenden ihr gleichfalls eine knollige Oberfläche verliehen. Im Herzen keine Echinococcen. Ausser diesen Erscheinungen und hochgradiger Magerkeit des Cadavers fand Uhse keine wesentlichen Abweichungen; er schliesst daher aus dem Vorstehenden, dass die Echinococcenkrankheit die Ursache der Abzehrung und des Todes der in Rede stehenden Kuh gewesen ist.

C. Krankheiten der Circulationsorgane.

Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Ein Wagenpferd blutete oft aus der Nase. Eines Tages brach es vor dem Lastwagen zusammen und verendete schnell. Das Herz dieses Pferdes war von ungewöhnlicher Grösse und Form: es war breiter als lang und die rechte Herzhälfte ungemein erweitert und ausgedehnt. Die Wandungen der rechten Herzhohlräume hatten nur die Stärke eines Kartenblattes. Die Lungen waren mit Blut überfüllt. Prof. Dr. Anacker-Düsseldorf.

Metastatisches Melanosarcom am Herzen. Kr.-Th. Krekeler-Höxter theilt folgenden interessanten Fall mit: Ein 18 Jahre altes Pferd (Schimmel) stürzte nach wenigen Schritten vor dem beladenen Wagen zusammen und verendete auf der Stelle. Die Obduction ergab Melanosarcome an allen Organen und Theilen von den Ohrspeicheldrüsen bis zum After, deren Gesammtmenge K. auf 25—30 Pfund veranschlagt. Das Herz war der bevorzugte Sitz der Geschwülste und hatte mehr als das Doppelte der natürlichen Grösse, die Wandstärke des linken Ventrikels betrug 5 Zoll. Der bei weitem grösste Theil des Herzens bestand aus Geschwulstmassen, das Herzfleisch war stark geschwunden, an der Herzspitze nur noch spurweise vorhanden. Die Geschwülste waren zum Theil ziemlich fest und derb, zum Theil markartig weich.

Neubildung in der Herzmusculatur. Bei einem mit hochgradigen Athembeschwerden behafteten Pferde ermittelte Kr.-Th. Schirlitz-Torgau 50—60 Athemzüge in der Minute und einen auffallend starken Herzschlag. Durch die Section wies der Obducent in der rechten Herzkammer mitten an der Scheidewand ein hohles „Fleischgewächs“ von der Grösse eines kleinen Apfels nach, dessen Wand eine faserige Structur erkennen liess.

Echinococcen in der Herzmusculatur. Zwei Kühe verendeten plötzlich. Bei der Section fand Kr.-Th. Pirl-Wittenberg in der Seitenwand der linken Herzkammer einen Echinococcus, in dessen Höhe die Wandstärke sehr gering war. Die Blasen waren in beiden Fällen unversehrt. Krankheitserscheinungen waren dem Tode nicht vorausgegangen.

Ruptur der Aorta. Dem Kr.-Th. Bührmann-Halle i. W. wurde ein Pferd mit dem Vorbericht zur Behandlung übergeben, dass

es der Knecht vor 12 Tagen mit dem Misthaken geschlagen habe. B. fand an dem Patienten sehr hochgradige Störungen im Allgemeinbefinden. Durch die örtliche Untersuchung ermittelte er an der linken Seite zwischen der 13. und 14. Rippe ungefähr 12 Cm. von der Wirbelsäule entfernt eine 1,5 Cm. im Durchmesser haltende Wunde, aus welcher gelblicher dicker Eiter entleert wurde. Die Wunde führte in gerader Richtung nach unten in eine grosse Eiterhöhle. Um dem Eiter Abfluss zu verschaffen, spaltete B. Haut und Musculatur vom unteren Wundrande abwärts. Bei der Operation wurde er plötzlich von einer so starken Blutung überrascht, dass an ein Stillen derselben nicht gedacht werden konnte. Das Pferd starb nach Verlauf von 10 Minuten durch Verblutung. Die bald nachher vorgenommene Obduction ergab in Höhe der Anheftung des Zwerchfells an die obere Fläche der Pleuroperitonealhöhle eine fluctuirende Geschwulst von der Grösse eines Menschenkopfes, welche grösstentheils linkerseits lag, in die Bauchhöhle hineinragte und von dem Peritoneum bedeckt war. Der Inhalt der Geschwulst bestand aus dickem Eiter und saftigen, dunkelrothen Blutgerinnseln und umgab an der unteren, freien Seite die Aorta inferior. Die innere Eiterhöhle stand mit der durch den operativen Eingriff freigelegten äusseren in directer Verbindung. Die Aorta war innerhalb der inneren Höhle zerrissen und durch diesen Riss der Tod durch Verblutung erfolgt. Ferner fanden sich bei der Section noch zwei weitere Eiteransammlungen in der Bauchhöhle, von denen die eine von der Grösse eines Kinderkopfes in der Nähe der linken Niere ihre Lage hatte, während die kleinere sich am Schaufelknorpel befand. Beide lagen retroperitoneal und standen durch mit Eiter gefüllte Canäle mit der grossen Eiterhöhle in Verbindung. Das Zwerchfell war besonders in der Nähe des letztgenannten Herdes stark entzündlich geschwollen und die linke Lunge mit demselben verklebt.

Aneurysma Aortae und Endoaortitis chronica. Bei einer 20jährigen Stute fand Dep.-Th. Wolff-Berlin die hintere Aorta von ihrem Ursprunge ab 40 Cm. lang vollständig verknöchert; ihr Lumen war auf das Dreifache erweitert. Die Tricuspidalklappen waren stark verdickt und das Herz hypertrophisch. Bei der Untersuchung des lebenden Thieres waren Circulationsstörungen nicht wahrgenommen worden.

Kr.-Th. Gückel-Münsterberg fand gelegentlich der Section eines Ochsen in der rechten Nierengegend eine schwarzrothe, reichlich kopfgrosse Geschwulst, um welche herum das retroperitoneale Gewebe eine

szulzige Beschaffenheit und gelbe Farbe zeigte. Das Gewicht dieser Geschwulst betrug 12 Pfund. Auf dem Durchschnitt fiel dem Obducenten die grosse Zahl geschlängelt verlaufender Blutgefässe auf, in deren grösste man zwei Finger bequem einführen konnte. Die Gefässe endigten zum Theil blind und das Lumen, besonders der kleineren, war nicht selten durch ein dunkelrothes saftiges Blutgerinnsel vollständig ausgefüllt. In ihrem Verlauf verhielten sie sich zu einander auffällig di- und convergent. Das zwischen ihnen gelegene Gewebe hatte die Beschaffenheit schwarzrother derber Blutgerinnsel. Mehrere dieser Gefässe standen mit der Vena cava posterior in Verbindung.

D. Krankheiten der Digestionsorgane.

Schlunderweiterung bei einem Rinde. Ein 2jähriges Rind zeigte 3 Monate hindurch nach der Futteraufnahme Erbrechen. Dabei wurde der Appetit immer geringer und das Thier magerte vollständig ab. Schliesslich wurden nur kleine Quantitäten Grünfutter aufgenommen, die innerhalb einer halben Stunde wieder erbrochen wurden. Das erbrochene Futter war gut zerkleinert, reichlich vom Speichel durchtränkt und ohne sauren Geruch. Erhielt das Thier jedoch nach der Futteraufnahme Getränk, so erfolgte das Erbrechen sofort. Nach der Tödtung des Rindes fand sich unmittelbar vor dem Zwerchfell eine Erweiterung des Schlundes, welche 3 Liter Flüssigkeit aufnehmen konnte und durch Ausdehnung aller Häute ohne sonstige krankhafte Erscheinungen an denselben bedingt war. Kr.-Th. Langrehr-Verden.

Stenose des Dünndarms. Eine hochtragende Kuh, welche überreichlich mit gekochten Kartoffeln gefüttert war und schon einige Wochen hindurch Erscheinungen der sogenannten Unverdaulichkeit gezeigt hatte, setzte in 11 Tagen keine Fäcalmassen ab. Keine Medication half. Als am 12. Tage starke Auftreibung des Hinterleibes eintrat, wurde das Thier geschlachtet. Bei der Obduction fiel dem Referenten ein ca. 30 Cm. langer Dünndarmtheil auf, dessen Wand stark hypertrophisch und dessen Lumen ungemein eng war. An diesen Theil schloss sich ein anderer, 10 Cm. langer an, dessen nicht verdickte Wände zusammengefallen waren und angefeuchtetem Löschpapier sehr ähnlich sahen. Der Ref. nimmt an, dass die hypertrophische wie die gelähmte Partie ursächlich auf die Fütterung bezogen werden müssen. Dep.-Th. Prümers-Koblenz.

Hodensackbruch. Bei einem Hengste entstand nach einem

scharfen Ritt ein Hodensackbruch. Als Kr.-Th. Kruckow-Rosenberg die Reposition der vorgefallenen Darmschlingen mehrmals vergebens bewirkt hatte, schob er den Testikel den Darmschlingen nach in die Bauchhöhle hinein, worauf der Austritt der letzteren in den Hodensack sich nicht wiederholte. Am Hodensack erzeugte er durch Bestreichen mit verdünnter Schwefelsäure eine Entzündung mit starker Schwellung. Als sich später diese Entzündung allmählich verloren hatte, fand K. eine beträchtliche Verengerung des Bauchringes, so dass ein fernerer Vorfall vom Darm nicht zu befürchten steht.

Carcinom der Mesenterialdrüsen. Dep.-Th. Wolff-Berlin beschreibt folgenden Fall: Ein 20jähriger Wallach war im schlechten Nährzustande, hatte einen sogenannten Hängebauch und zeigte wenig beschleunigtes Athmen; 50 Pulsschläge in der Minute, 38,4° C. innere Körperwärme. Bei der inneren Untersuchung fand sich in der Bauchhöhle zunächst eine mit dem grossen Netze innig verbundene, über 2 Fuss lange und 1 Fuss dicke, rundliche Geschwulstmasse von circa 15 Kgr. Schwere. Dieselbe war äusserlich uneben, grau-roth und hatte eine etwas mürbe Consistenz. Sie dehnte sich auf beiden Seiten des Netzes aus, so dass es den Anschein hatte, als wenn das letztere sich durch sie hindurchwände. Die Mesenterialdrüsen waren zum Theil faustgross, aussen wie die grosse Geschwulstmasse beschaffen und innen grauweiss und von speckigem Ansehen. An der unteren Fläche des Mastdarms befand sich eine grössere Neubildung von den Eigenschaften der mit dem Netze in Verbindung stehenden, und auf der Bauchhaut sowie auf dem Ueberzuge der Leber und der Milz sassen zahlreiche, haselnuss- bis wallnussgrosse, meist platte, grauweisse, derbe Knoten, welche in etwas an die Perlknoten des Rindes erinnerten. Die übrigen Organe waren anscheinend nicht erkrankt. Auf der Schnittfläche zeigten die Geschwülste ein stellenweise dichtes, stellenweise lockeres, faseriges Gewebe von graugelber bzw. grau-rother Farbe. Gewebszerfall war nirgends zu bemerken.

Die Eingeweide sammt den Neubildungen wurden in möglichst unverletztem Zustande dem pathologischen Institut der Königl. Thierarzneischule übersandt. Herr Prof. Dr. Schütz resumirte das Ergebniss seiner Untersuchung folgendermassen: „Die Geschwulstknoten erweisen sich als Krebse. Der Primärkrebs hat in den Mesenterialdrüsen seinen Sitz, und von hier ausgehend sind Metastasen im Netze, den Lungen u. s. w. entstanden. Interessant ist auch, dass die Ge-

schwulstmasse in die rechte Nierenarterie hineingewachsen ist und sie in Form eines federkielartigen Körpers erfüllt.“

Splenitis multiplex. Kr.-Th. Bührmann-Halle i. W. theilt einen Fall mit, in welchem eine Kuh in unregelmässigen Zwischenzeiten auffällige Fiebererscheinungen mit Schüttelfrösten zeigte. Bei einem der Anfälle, welchen B. beobachtete, und der 2 Stunden vor seinem Eintreffen begonnen hatte, nahm er folgende Symptome wahr: Das mit unter den Leib gestellten Beinen dastehende Thier zeigte ein sicht- und fühlbares Zittern am ganzen Körper, welches sich bisweilen zu deutlichem Schütteln steigerte. Die Blutwelle war klein, der Puls kaum fühlbar und seine Frequenz stand auf 110 in der Minute. Das Athmungsgeschäft war so oberflächlich, dass die Zahl der Athemzüge nicht festgestellt werden konnte. Die Haut fühlte sich auffällig kalt an, und die Mastdarmtemperatur stand auf $41,2^{\circ}$ C. Der Anfall dauerte im Ganzen ca. 5 Stunden. Nach dieser Zeit verloren sich die Krankheitserscheinungen allmählich; die Haut wurde wärmer, der Puls kräftiger und ruhig, die Arterie weich und voll. Nach Verlauf von 2 Stunden stand die innere Körperwärme auf $38,7^{\circ}$ C., und das Thier sah wie bethaut aus. Das stark abgemagerte Thier wurde geschlachtet. Die Section lieferte im Wesentlichen den nachstehenden Befund: Skelettmusculatur blass und wässerig. Die Milz 4620 Grm. schwer, bedeutend vergrössert, die Ränder rund; ihre Oberfläche ist uneben, mit zottigen Anhängseln besetzt und enthält stellenweise faustgrosse, halbrunde umschriebene Auftreibungen, welche fluctuiren, während die übrigen Theile die Consistenz eines festen Teiges haben. Die Farbe der Milz ist im Allgemeinen stahlblau, an den Auftreibungen grauroth bis graubraun. Die Milzkapsel ist an der letzteren bis zu 0,4 Cm. verdickt. Die sieben von B. ermittelten Auftreibungen stellten Herde dar, welche durch starke bindegewebige Kapseln von ihrer Umgebung abgeschlossen waren und eine schwarzbraune, dickflüssige, übelriechende Masse enthielten.

Abscess in der Bauchwand mit Perforation in den rechten Brustfellsack. Kr.-Th. Schaefer-West-Priegnitz heilte einen Fall von heftiger Blähsucht bei einem Pferde durch den Gebrauch des Trokars. Die durch die Operation in der rechten Flanke erzeugte Wunde vernarbte unter Anwendung antiseptischer Verbände nach 10 Tagen. 6 Wochen später constatirte Sch. bei dem Thiere eine Brustfellentzündung, welcher es nach 2 Tagen erlag. Die Section ergab eine zweifäustergrosse Geschwulst an der Bauchwand in Höhe

des Trokarstiches, von welcher ein an Umfang stetig abnehmender Strang neben der Aorta sich bis in die Brusthöhle erstreckte. Die Geschwulst barg einen grossen Eiterherd, welcher sich in Fingerstärke in dem genannten Strange bis jenseits des Zwerchfells hinzog und unmittelbar an dem letzteren durch Perforation in den rechten Pleurasack die tödtlich gewordene Brustfellentzündung hervorgerufen hatte.

E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.

Neubildung um die rechte Niere. Ein werthvoller dänischer Wallach erkrankte unter den Erscheinungen hochgradiger Mattigkeit, war dabei appetitlos und entleerte wenig Urin. Das Thier nahm oft eine gestreckte Stellung ein, wie zum Uriniren, und verharrte lange in derselben. Trotzdem der Appetit wieder etwas rege wurde, magerte das Thier allmählich ab, wobei auch die Kräfte stetig verfielen. Nach einer Krankheitsdauer von 9—10 Monaten liess der Besitzer das Pferd tödten. Die durch Kr.-Th. Schirlitz-Torgau vorgenommene Section ergab in der rechten Nierengegend eine kugelförmige feste Geschwulst von 50 Cm. im Durchmesser und einem Gewicht von 35 Kgr. Sie hatte die Consistenz von harter Lebersubstanz, sah auf dem Durchschnitt „gleichmässig speckig“ aus. Die etwas verkleinerte rechte Niere war fest von dieser Geschwulst eingeschlossen.

Krebs der Harnblase. Kr.-Th. Stolz-Euskirchen theilt folgende Beobachtung mit: Eine gut genährte 14jährige Schimmelstute entleerte im Verlaufe des Sommers einige Male Blut mit dem Urin, ohne Störungen im Allgemeinbefinden wahrnehmen zu lassen. Im September trat Erkrankung unter Kolikerscheinungen ein. Das Thier stellte sich häufig zum Uriniren, liess aber jedesmal nur wenig Harn. Vom Mastdarm aus wurde in der Blasengegend eine kindskopfgrosse Geschwulst wahrgenommen, welche nach der Untersuchung durch die Vagina ihren Sitz in der Blase haben musste. Bei der Section ergab sich, dass die Geschwulst an der linken Seite der Blasenwand, zwischen Schleimhaut und Muskelhaut sass und in beide Häute ohne Grenze übergang. Sie füllte die Blase so sehr aus, dass nur noch ein geringer Raum für die Ansammlung von Urin übrig blieb. In der Nähe des Blasenhalsses hatte die Geschwulst an einer kleinen Stelle ulcerösen Zerfall, die Schleimhaut war gewissermassen durchbohrt. Aus der Oeffnung entleerte sich auf Druck eine blutige, mit Gewebstheilchen vermischte Flüssigkeit aus dem Innern der Neubildung in die Blase.

Auf der Schnittfläche war das Gewebe gelblichweiss, derb und zeigte sehr feine silberglänzende Strahlen, die in die periphere, mehr röthlich gefärbte und gleichmässig beschaffene Masse verliefen. Am Dünndarm befanden sich mehrere langgestielte Lipome, an mehreren Stellen des Blinddarms, besonders an der Spitze, eine Menge faden- und bandförmiger Anhängsel, desgleichen am Blindsack des Magens. An der hinteren Zwerchfellfläche sassen in grosser Zahl erbsen-, haselnuss- bis baumnussgrosse warzenförmige Neubildungen, ebensolche auch vereinzelt am Bauchfell, an Milz und Leber. Diese Neubildungen fühlten sich hart an und zeigten auf der Schnittfläche ein ziemlich gleichmässiges weissröthliches Gewebe. Sämmtliche Lymphdrüsen waren unverändert und die serösen Säcke der Brusthöhle frei von solchen Bildungen.

Geschwulst in der Harnblase, Ureterectasie, Hydro-nephrose; Cystitis diphtheritica. Kr.-Th. Emmerich-Homburg beschreibt folgenden Fall: Ein seit 9 Monaten an stetig zunehmenden Harnbeschwerden leidender 4jähriger Wallach erkrankte unter beunruhigenden Allgemeinerscheinungen und wurde aus diesem Grunde seiner Behandlung anvertraut. Untersuchung: Grosse Unruhe, wiederholtes Drängen auf den Urin, tropfenweise Entleerung des letzteren, schwache Darmgeräusche, stark vergrösserte und prall gefüllte Harnblase, welche durch Druck auf den Mastdarm die Defäcation behinderte. Entleerung des Urins ($\frac{1}{2}$ Eimer voll) durch den Katheter. Nach der Operation ruhiges und normales Verhalten des Pferdes. Fortgesetztes Katheterisiren. Am 3. Tage die ersten Spuren einer Cystitis, deren Erscheinungen sich täglich steigerten. Zuerst war der Urin nur röthlich gefärbt und etwas trübe, dann traten noch flockige Gerinnsel darin auf, wozu sich später ein übler Geruch gesellte. Hierneben bestanden Fiebererscheinungen. Zuletzt traten alle Symptome einer acuten Bauchfellentzündung auf, welcher der Patient am 14. Tage der Krankheit erlag. Bei der Obduction ermittelte E. die nachstehenden Veränderungen am Harnapparat: Die Blase war ca. 60 Cm. lang und von entsprechender Breite, der Blasenhalshal ungemäin verlängert. Die Wand der Harnblase war derb und hatte trotz der grossen Ausdehnung die Stärke eines kleinen Fingers; ihr Inhalt bestand in einer jaucheähnlichen, fadenziehenden Flüssigkeit. Auf der unteren Blasenwand, eine Handbreite von dem Sphincter vesicae entfernt, sass eine flache, gelappte Geschwulst, deren periphere Theile von gallertiger Consistenz waren, und neben dieser eine gleichfalls gestielte kleine

Geschwulst von derselben Beschaffenheit. Beide Geschwülste wogen zusammen 1 Pfund und füllten den vorderen Theil der Blase (Hals) vollkommen aus. Auf der Blasenschleimhaut befanden sich trübe graue Stellen, an welchen die oberste Schleimhautschicht zum Theil sich membranartig ablösen liess, und neben diesen umschriebene Defecte von verschiedener Grösse und Gestalt, deren Grund lebhaft roth war. Der diffus geröthete übrige Theil der Blasenschleimhaut war mit einer grossen Zahl kleiner, dunkelrother Herde besät. Die Ureteren hatten bei einer Wandstärke von 4 Mm. einen lichten Durchmesser von 8 Mm. Das Nierenbecken war beträchtlich erweitert. Neben diesen Veränderungen wurde eine Peritonitis fibrinosa festgestellt. Leider ist eine mikroskopische Untersuchung der Geschwulst nicht ausgeführt worden.

Drillingsgeburt einer Stute. Eine 8jährige Stute, die bis dahin ein Füllen geboren hatte, war im Jahre 1881 im hochtragenden Zustande noch zur Arbeit benutzt worden. In den Stall zurückgebracht, stellte sie sich langgestreckt hin und presste mit grosser Vehemenz ein todttes Füllen hervor; wenige Minuten später wurde ein zweites todttes Füllen hervorgepresst, und nach etwas längerer Zeit ein drittes noch lebendes Füllen, welches aber sehr bald verendete. Alle drei Füllen waren Stutfüllen. Die Stute wurde wieder von demselben Hengste gedeckt und gebar im Jahre 1882 ein todttes Zwillingpaar. Von einem anderen Hengste gedeckt, brachte sie alsdann 1883 ein gesundes Füllen zur Welt. Dieser Fall ist beachtenswerth, da bislang in der Literatur nur ein ähnlicher Fall verzeichnet ist. Kr.-Th. Rabe-Königsberg i. d. Nm. beobachtete nämlich, dass eine 5jährige Stute drei lebende Hengstfüllen gebar, die aber nach einigen Stunden starben. Dep.-Th. Kühnert.

Enzootisches Auftreten von brandiger Gebärmutterentzündung bei Mutterschafen. Kr.-Th. Ruthe wurde auf einem Gute, wo von 60 Mutterschafen, die gelammt hatten, 11 an brandiger Gebärmutterentzündung zu Grunde gegangen waren, consultirt und constatirte, dass die Mutterschafe bis zur Geburt ganz gesund waren und es auch blieben, wenn die Nachgeburt regelmässig abging; war dies nicht der Fall, so erkrankten die Thiere unter heftiger Anschwellung der Scham und starben nach 2—3 Tagen. Bei der Section fand sich die Schleimhaut der stark geschwollenen Scham blauroth, und in der Umgebung derselben, besonders nach dem Euter zu, mässiges blutiges Oedem; in der Bauchhöhle fand sich gelbrothes Serum. Die

Gebärmutter war geschwollen, blauschwarz, ihre Wände 5—6 Cm. und darüber dick, sehr mürbe, ihr Inhalt eine äusserst penetrant riechende Flüssigkeit. Ruthe ordnete an, dass die Mutterschafe, welche lammen sollten, isolirt wurden, und dass denselben vor und gleich nach der Geburt die Scheide mit Carbolöl bestrichen wurde. Ferner erhielten die Thiere vor und nach dem Lammen eine Dosis Carbolsäure 0,5 und Chinoidin 2,0 mit Kamillenthee. Nach Befolgung dieses Verfahrens sistirten die Krankheitsfälle.

Mastdarm-Harnröhrenfistel. Kr.-Th. Stöhr-Thorn untersuchte ein 2jähriges Wallachfohlen, welches nach Angabe des Besitzers den Urin zum grössten Theil aus dem Mastdarm entleerte, und fand unmittelbar vor dem Sphincter ani eine trichterförmige Oeffnung in der Mitte der unteren Darmwand, in welche er den kleinen Finger hineinbringen konnte, mit dem er in einen glatten Canal gelangte. Stöhr beobachtete das Fohlen auch, während dasselbe Urin absetzte, und sah, dass zuerst ein starker Strahl Urin im hohen Bogen aus dem Mastdarm spritzte, worauf ein schwacher Strahl aus der Harnröhre nachfolgte.

Prolapsus vaginae chronicus bei einem jungfräulichen Rinde. Eine einjährige, gut genährte Ferse, die wiederholt brünstig, jedoch zum Begattungsacte nicht zugelassen war, zeigte beim Liegen einen faustgrossen Scheidenvorfall. Dieser Fall beweist, dass Prolapsus vaginae auch ausserhalb der Periode der Trächtigkeit, sogar bei jungfräulichen Rindern vorkommen kann, und ist deshalb in forensischer Beziehung beachtenswerth. Kr.-Th. Dr. Kaiser.

Menstruation bei einer Stute. Kr.-Th. Ritz-Frankenberg beobachtete bei einer Stute, die zur Zucht nicht verwendet wurde, in Zwischenzeiten von 3—4 Wochen Blutausfluss aus den Genitalien.

Tuberculose des Eierstocks. Eine wohlgenährte, etwa 3jährige Kuh litt seit Wochen an Durchfall und verrieth eine stetig zunehmende Schwäche im Hintertheil. Als sie sich nicht mehr erheben konnte, wurde sie geschlachtet. In der linken Hungergrube war eine feste, grosse Geschwulst deutlich fühlbar. Durch die Obduction wurde Tuberculose in Lunge, Leber und Lymphdrüsen festgestellt. Der linke Eierstock war kindskopfgross, rundlich, fest und etwas geröthet. Die Geschwulst bestand vorwiegend aus straffem, weissen Bindegewebe und enthielt zahlreiche grosse und kleine Hohlräume, welche mit weichen, gelblichgrauen, krümeligen Massen gefüllt waren. Sie war mit der Musculatur der Lende und des Beckens verwachsen und die

käsigen Herde erstreckten sich bis in die Muskelsubstanz hinein.
Kr.-Th. Heinsen-Lauenburg.

F. Krankheiten der Haut und Unterhaut.

Die Räude des Hundes (*Sarcoptes canis*) wird nicht selten durch den engen Verkehr auf den Menschen übertragen und verursacht bei demselben so oft lästige, intensive und dauernde Erkrankung, dass es gerechtfertigt erscheint, die Bekämpfung der Räude der Hunde und auch der Katzen durch reichsgesetzliche Bestimmungen zu bewirken. Veranlassung zu diesem Antrage giebt dem Kr.-Th. Prof. Dr. Leonhard in Frankfurt a. M. die Beobachtung, dass eine ganze Familie durch ein aus München bezogenes Schosshündchen angesteckt wurde. Das Thierchen stammte von einem Hundehändler aus München, deshalb wurde nach dort berichtet und waren auch daselbst verschiedene Personen durch andere Hunde angesteckt worden.

Schlempemaue. Kr.-Th. Wegener-Ost-Sternberg berichtet, dass die Schlempemaue auf mehreren Gütern aufgetreten und dadurch mit Erfolg behandelt worden sei, dass die kranken Thiere in einen anderen Stall gebracht und trockenes Futter unter gänzlicher Entziehung der Schlempe erhielten.

G. Krankheiten der Bewegungsorgane.

Zerreissung des *Musc. gastrocnemii* an beiden Hintersehenkeln bei einer Kuh. Eine hochtragende Kuh, welche ihrem Führer entlaufen war und sich einen ganzen Tag hindurch umhergetrieben hatte, war anderen Tages unvermögend aufzustehen. Kr.-Th. Leistikow-Jerichow II fand, dass die Kuh, wenn sie zum Aufstehen angetrieben wurde, sich der Vordergliedmassen in der gewöhnlichen Weise bediente, das Hintertheil jedoch nur soweit zu erheben vermochte, dass dasselbe von dem ganzen Unterfuss, vom Sprunggelenk abwärts, getragen wurde. Unterschenkel und Unterfuss standen dabei im Sprunggelenk rechtwinklig zu einander, die Achillessehnen waren erschlafft und in Falten gelegt. Die Section bestätigte die Diagnose auf Zerreissung der Wadenmuskeln.

Lähmungserscheinungen nach dem Verfüttern von rohen Kartoffeln. Kr.-Th. Klein-Teltow sah nach dem Verfüttern von rohen Kartoffeln, welche auf moorigem Boden gewachsen und nicht

vollständig zur Reife gelangt waren, Steifigkeit in den Gliedmassen und Lähmungserscheinungen im Kreuze entstehen. Die Schweine konnten nicht stehen, knieten beim Fressen und brachen mit dem Hintertheil zusammen; aufgerichtet, kreuzten sie die Hinterbeine und fielen ohne Unterstützung immer wieder um. Schliesslich gingen sie an den Folgezuständen der Lähmung zu Grunde. Die mit solchen Kartoffeln gefütterten Kühe bekamen einen heftigen Maukeauschlag.

Lähmung des Nervus radialis. Ein 5jähriges kräftiges Pferd wurde, nachdem es neben einem anderen Pferde vor einem leichten Wagen $\frac{3}{4}$ Stunden im Trabe bewegt war, ohne erkennbare Veranlassung plötzlich auf dem rechten Vorderschenkel so lahm, dass es nur mühsam in den Stall zurückgebracht werden konnte. Bei der drei Tage später vorgenommenen Section fand Kr.-Th. Bormann-Schwetz Folgendes: Allgemeine Krankheitserscheinungen waren nicht vorhanden. Im Stande der Ruhe belastete das Pferd den rechten Vorderschenkel gar nicht, sondern setzte ihn gewöhnlich nach vorn. Schmerz, vermehrte Wärme und Geschwulst waren an demselben nirgends festzustellen. Gefühl und Temperatur desselben schienen normal. Bei der Bewegung wurde der Schenkel ziemlich regelmässig vorgebracht; allein eine Belastung desselben war nicht möglich, indem das Ellenbogengelenk bei jedem Versuch sofort auffallend stark gebeugt wurde, und Vorderfusswurzel und Fesselgelenk meist mehr oder weniger stark sich nach vorn neigten. Während der Bewegung war deutlich zu sehen und mit der aufgelegten Hand zu fühlen, dass die Strecker des Vorarmes, welche auch in der Ruhe erschlafft schienen, gänzlich unthätig blieben. Nachdem Einreibungen und Haarseile erfolglos angewandt worden und bereits Atrophie der Vorarmstrecker eingetreten war, wurden Injectionen von Strychn. nitr. (0,025—0,05) angewandt, worauf nach 14 Tagen soweit Besserung eingetreten war, dass das Pferd im Schritt auf ebenem Wege bewegt werden konnte. Nach weiteren 3 Wochen war die Atrophie der Strecker und ebenso die Lahmheit fast vollständig beseitigt.

In einem anderen Falle war ein 3jähriges Arbeitspferd vor dem Wagen gestürzt und zeigte bald darauf Unthätigkeit der Strecker des Vorarmes, während entzündliche Erscheinungen nicht zu constatiren waren. Behandlung und Verlauf war wie im ersten Falle.

Osteomalacie in Folge ausschliesslicher Ernährung mit Kartoffeln. 2 Kühe, welche als ausschliessliche Nahrung neben dem Spülig aus den Cantinen ebendasselbst bezogene Kartoffelschalen

im gekochten Zustande erhielten, erkrankten unter folgenden Erscheinungen: Rosige Entzündung und Anschwellung der unteren Theile der Gliedmassen, grosse Schmerzhaftigkeit daselbst, Bläschen- und Schorfbildung, Appetitmangel. Fieber unbedeutend, der Rücken gekrümmt. Die Thiere lagen viel und wurde es ihnen schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Im Liegen auf der Seite brüllte eine oder die andere Kuh vor Schmerzen so lange, bis sie auf die Viertel gelegt wurde. Die Fäcalsmassen von schwarzer Farbe und penetrantem Geruch. Die anfangs in gutem Ernährungszustande befindlichen Kühe magerten nach 3—4 Wochen bedeutend ab. Eine Kuh behielt den krummen Rücken, die andere, bei welcher sich Knochenaufreibung auf einigen Rippen zeigte, versagte bald das Aufstehen ganz. Da beide Kühe trotz Aenderung der Fütterung und Verwendung geeigneter Medicamente keine Besserung zeigten, wurden sie geschlachtet und ergab die Obduction das ausgesprochenste Bild der Osteomalacie. Bei einer Kuh wurde an der Hüftgelenkpfanne und vier Rippen ein Bruch constatirt. Dep.-Th. Prümers-Coblenz.

Parasiten im Muskelfleische eines Rindes. Dep.-Th. Wolff-Berlin theilt über die Beschaffenheit des im Laden mit Beschlag belegten Fleisches eines Rindes, welches in den öffentlichen Schlachthäusern geschlachtet worden war, Folgendes mit: Die Musculatur war durchweg mit grünlichen, theils rundlichen, linsengrossen, theils länglichen, reiskorngrossen Knoten durchsetzt, welche dem Fleische ein in hohem Grade ekelregendes Aussehen gaben. Bei näherer Untersuchung ergab sich, dass die zwischen den Muskelbündeln lagernden Knoten aus einer zarten Hülle mit einem gelbgrünen Inhalt von käsiger Consistenz bestanden. Herr Prof. Dr. Schütz, dem der Seltenheit des Befundes wegen eine Probe des Fleisches übersandt wurde, fand in dem eiterartigen Inhalt der Knötchen einen bis dahin noch unbekanntem, drehrunden Parasiten, der die Trichine etwas an Grösse übertrifft.

H. Krankheiten des Auges.

Kr.-Th. Lindenau berichtet, dass unter dem Rindvieh im Kreise Pilkallen von Ende Juni bis Mitte September ca. 400 Rinder an einer Augenentzündung gelitten, und zwar seien ausschliesslich Thiere davon befallen worden, die in der Nähe der Wälder geweidet worden. Die Krankheit stellte sich unter Fiebererscheinungen ein, worauf Thränen-

fluss und partielle oder völlige Trübung der Cornea, zuweilen auch defecte Stellen in derselben von gelblicher Farbe und Bluterguss in die vordere Augenkammer bemerkt wurden. Die Krankheit dauerte 3 Wochen und befiel bald nur ein Auge, bald beide. Dep.-Th. Kühnert bemerkt hierzu, dass er ebenfalls im August eine Conjunctivitis beim Rindvieh beobachtet habe, die nur beim Weidevieh, aber nicht in der Nähe bewaldeter Bezirke vorgekommen und fast ausschliesslich nur junge Thiere befallen habe. Ueber die Ursache und die Contagiosität dieser Krankheit wagen die Referenten keinen Ausspruch.

III. Materia medica.

Kr.-Th. Klein-Teltow und Eggeling-Nieder-Barnim empfehlen gegen die Affectionen der Klauen bei der Maul- und Klauenseuche tägliches Bestreichen derselben mit einer Mischung von Talg und Holztheer zu gleichen Theilen.

Von der Verabreichung von Kali chloric. im gepulverten Zustande mit Schrot oder Kleie vermischt will Kr.-Th. Klein-Teltow gute Resultate gesehen haben.

Bei den mit Maul- und Klauenseuche häufig verbundenen Erkrankungen des Euters empfiehlt Kr.-Th. Eggeling-Nieder-Barnim eine Lösung von Salicylsäure in Glycerin (2:100) als vorzügliches Mittel.

Kr.-Th. Bolle-Ober-Barnim empfiehlt die Anwendung des Naphthalins bei der Schlempeauke, besonders wenn Gangrän eingetreten ist. Der Berichterstatter hat das durch verhältnissmässige Billigkeit sich auszeichnende Mittel als Streupulver und beim Verbinden gebraucht und äussert sich bezüglich der Wirkung desselben dahin, dass dieselbe eine leicht ätzende, desinficirende und besonders austrocknende sei.

Kr.-Th. Schaefer-West-Prignitz wandte bei einer Kuh, welche, nachdem dieselbe vom Bullen besprungen, heftige Wehen und einen vollständigen Scheidenvorfall bekommen hatte, nach Reinigung und Reposition der vorgefallenen, nicht verletzten Theile Cloralhydrat in 2 Dosen à 30 Grm. mit bestem Erfolge an.

Juckreiz bei einem Jagdhunde, für den Kr.-Th. Eberhardt-Fulda eine parasitäre Hauterkrankung nicht aufzufinden vermochte, und dem er eine Reizbarkeit der Hautnerven zu Grunde liegend annahm, behandelte derselbe dadurch mit Erfolg, dass er die vom Hunde beleckten Stellen mit Schwefeläther betupfen liess.

Kr.-Th. Regenbogen-Neumarkt hat Phosphorsäure und phosphorsauren Kalk bei der Kälberruhr mit gutem Erfolge angewandt.

(Schluss folgt.)

Referate und Kritiken.

- Vulpian**, Recherches experimentales sur l'excitabilité électrique du cerveau proprement dit. Compt. rend., Tome C., p. 829.
- Sur les différences qui paraissent présenter les diverses régions de l'écorce grise cérébrale, dites centres psycho-moteurs sous le rapport de leur excitabilité. Compt. rend., Tome C., p. 1038.
- Recherches relatives à la durée de l'excitabilité des régions excito-motrices du cerveau proprement dit après la mort. Compt. rend., Tome C., I., p. 212.

Früher nahm man an, dass die graue sowohl als die weisse Substanz des Gehirns gegen jeden mechanischen, chemischen und physikalischen Reiz unempfindlich wäre. Seitdem aber Fritsch und Hitzig entdeckt haben, dass an der Oberfläche des Gehirns gewisse Stellen vorhanden sind, durch deren Reizung bestimmte Bewegungen der Gliedmassen oder der Gesichtshälfte der entgegengesetzten Seite ausgelöst werden, hat eine grosse Anzahl von Untersuchern durch zahlreiche Experimente die Localisation von Nervencentren im Gehirn bestätigt. Der experimentelle Nachweis solcher Centren kann dadurch geführt werden, dass nach elektrischer Reizung bestimmter Theile der Grosshirnoberfläche stets dieselben Bewegungen gewisser Muskeln ausgeführt werden, oder dadurch, dass nach Entfernung dieser Theile Lähmung der unter ihrem Einfluss stehenden Muskeln eintritt. Vulpian hat bei den von ihm in dieser Richtung angestellten Untersuchungen gefunden, dass nach Wegnahme des ein motorisches Centrum enthaltenden Rindenschichttheils die Reizung der darunter gelegenen Marksubstanz auch dieselben Bewegungen auszulösen vermag. Wollte er durch Reizung der weissen Schicht dieselbe Wirkung hervorrufen, so musste der elektrische Strom ein wenig stärker sein als der, mit welchem er die Bewegungen im sogenannten motorischen Centrum auslösen konnte. Wurde aber die graue Masse nicht entfernt, sondern das freie Ende eines mit Guttapercha umwickelten Drahtes in die unter ihr liegende Marksubstanz eingeführt, so wurde schon bei viel schwächeren Strömen dieselbe Wirkung hervorgebracht. Hieraus ergibt sich, dass die Erregbarkeit der Gehirnoberfläche eine geringere ist als die der an sie grenzenden Theile des Centrum ovale. Dass der grauen Hirnmasse zum Unterschiede von der weissen eine gesetzmässige Erregbarkeit zukomme, und dass sie mit speciellen functionellen Kräften begabt sei, erkennt V. nicht an, da er ohne

Rücksicht darauf, ob er weisse oder graue Hirnmasse desselben Centrums reizte, stets dieselben charakteristischen Bewegungen bezw. epileptischen Anfälle hervorbrachte.

V. unterscheidet an dem motorischen Centrum der Grosshirnrinde drei Regionen: Regio cerebro-facialis, Regio cerebro-brachialis, Regio cerebro-cruralis. Wenn er die erstere Region bei einem Hunde mittelst eines schwachen Stromes reizte, so entstanden Bewegungen in der Wange und den Augenlidern; wenn er dagegen dieselbe Stromstärke auf die beiden anderen Regionen anwandte, so übte er auf die Musculatur der Gliedmassen keine Wirkung aus. Dieses Ergebniss widerspricht der Pflüger'schen Lawinentheorie und begründet die Annahme, dass die Wirkung des auf einen Nerven ausgeübten Reizes proportional der Länge des zurückgelegten Weges abnimmt. Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht auch der folgende Versuch: V. legte bei einem chloralirten Hunde den N. ischiadicus und den N. tibialis frei und erzeugte durch Reizung des Tibialis mittelst schwachen Stromes Bewegungen der Gliedmasse, welche er durch die Anwendung desselben Stromes auf den Ischiadicus nicht hervorbringen konnte.

V. hat die Zeit festgestellt, welche nach eingetretenem Tode vergeht, ehe die Erregbarkeit der excitomotorischen Regionen des Gehirns erlischt und hierzu den linken Scheitellappen bei einem Hunde freigelegt, um sodann vermittelst elektrischen Stromes die an dieser Stelle gelegenen erregbaren motorischen Bezirke der Rinde, wie sie von Fritsch und Hitzig zuerst entdeckt worden sind, zu reizen. Der Tod wurde dadurch herbeigeführt, dass vermittelst einer Nadel ein sehr starker Inductionsstrom durch das Herz geführt und letzteres hierdurch zum Stillstand gebracht wurde. Es ergab sich bei der Reizung der einzelnen Punkte der Hirnrinde an der freigelegten Stelle, dass die Erregbarkeit sofort nach dem Herzstillstand anfang abzunehmen und eine Minute, selten eine Minute und einige Secunden nach erfolgtem Herzstillstand erlosch. Sie verschwand zuerst in dem Bezirk, welcher für die Hinterextremitäten bestimmt ist, und zuletzt in dem für das Gesicht. Nach der angegebenen Zeit konnten keine Bewegungen mehr durch Reizung der bezeichneten Stellen ausgelöst werden, auch wenn die Leitungsdrähte für den Inductionsstrom tief in den Lappen eingestochen wurden. Dagegen traten bei letzterem Experiment Bewegungen in Theilen derjenigen Körperhälfte auf, welche physiologisch dem gereizten Hirnthheil entgegengesetzt ist, d. h. bei Reizung der linken Hirnhälfte in der linken Körperhälfte. V. erklärt diese Erscheinung durch directe Reizung der betreffenden Muskeln resp. ihrer Nerven. Die Augenlidreflexe erloschen 1 Min. 3—4 Sec. nach eingetretenem Herzstillstand. Reizungen am centralen Stumpfe des durchschnittenen Hüftnerven ergaben, nachdem das Herz eine Minute lang aufgehört hatte zu arbeiten, heftige Reflexbewegungen in beiden Hinterbeinen, den Bauchmuskeln und dem Schwanz. nach $1\frac{1}{2}$ Min. langem Herzstillstand nur in der gleichseitigen Gliedmasse und dem Schwanz. nach 2 Min. nur ganz schwache Reflexbewegungen im Schwanz. und nach $2\frac{1}{2}$ Min. war jede Reflexerregbarkeit verschwunden. Die Respiration hörte bereits $1\frac{1}{2}$ Min., zuweilen 2 Min. nach dem Eintritt des Herzstillstandes auf. V. meint, dass alle Behauptungen, die eine längere Erregbarkeit der motorischen Bezirke in den Scheitellappen angeben, auf Irrthümern

beruhen, indem stets directe Reizung der Muskeln oder ihrer Nerven vorgelegen habe. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Erklärung erbrachte V. folgendermassen: Einem Hunde wurde nach eingetretenem Herzstillstand das Gehirn herausgenommen und nach einigen Minuten wieder in die Schädelhöhle hineingelegt. Reizt man nun vermittelt eines kräftigen Inductionsstromes einen Hirnlappen, so treten Muskelcontractionen in der dem Lappen correspondirenden Körperhälfte, d. h. nur am Kopfe und Halse, auf; ja dasselbe Resultat ergiebt sich, wenn statt des Gehirns ein feuchter Schwamm in die Schädelhöhle gelegt wird. Auf diese Weise kann man Muskelcontractionen 25—35 Min. lang auslösen. V. sagt, dass, obgleich diese Resultate am erwachsenen Hunde gewonnen sind, sie doch auch wahrscheinlich bei den übrigen Säugethieren, mit Ausnahme der Winterschläfer, Gültigkeit haben dürften, und zwar auch dann, wenn der Tod nicht durch Herzstillstand eingetreten ist. Dagegen sind junge Hunde, wie Rouget, Soltmann, Tarchanoff gezeigt haben, von dieser Regel ausgeschlossen, da ihr Gehirn nicht reizbar ist und durch das Rückenmark Reflexe noch nach 22 Min. ausgelöst werden können. Frick.

Vulpian, Recherches experimentales concernant: I. Les attaques epileptiformes provoquées par l'électrisation des régions excitomotrices du cerveau proprement dit. Comp. rend., Tome C., p. 1101.
— Expériences relatives aux phénomènes qui se produisent dans le domaine de la vie organique pendant les attaques d'épilepsie. Compt. rend., Tome C., p. 885.

Vulpian hat die Gyri sigmoidei durch Anwendung von Methylchlorür gefrieren lassen, dann durch elektrische Reizung der unter ihnen gelegenen weissen Hirnmasse heftige epileptische Anfälle erzeugt und dadurch einen neuen Beweis geliefert, dass dieser Hirnmasse dieselbe Bedeutung als motorisches Centrum zukommt, welche bis dahin der grauen Masse der genannten Gyri ausschliesslich zugesprochen wurde.

Bei der Faradisirung der Gyri sigm. eines chloralisirten Hundes hat V. festgestellt, dass der Blutdruck gleich nach Entfernung der Elektroden auf einige Secunden stark herabgesetzt wird; die Respiration wird frequenter, die Pupillen erweitern sich und die abgelenkten Augen gehen in ihre normale Stellung zurück. Bewegung von Gliedmassen und Speichelfluss werden nicht wahrgenommen, dagegen wird an den Maulwinkeln ein spasmodisches Zucken bemerkt.

V. hat auch untersucht, welchen Einfluss die durch Elektrizität erzeugten epileptischen Anfälle auf den Stand der Rectaltemperatur haben. Er fand, dass bei einem Hunde mit $39,2^{\circ}\text{C}$. die Temperatur nach dem Anfall schnell auf $39,3^{\circ}$ stieg; bei demselben Hunde sank sie in der Anästhesirung mit Chloralhydrat in kurzer Zeit auf $37,6^{\circ}$. Während und nach der Reizung der Gyri sigm. fiel sie sodann rapid um $0,02$ in der Minute. Die Eigenwärme eines curarisirten Hundes stand auf $37,10^{\circ}$, nahm nach dem Anfall um $0,10^{\circ}$ ab und stieg bald darauf wieder um $0,08^{\circ}$. Epileptiforme Anfälle bei morphinisirten Hunden riefen eine Steigerung von $0,02$ — $0,13^{\circ}\text{C}$. hervor.

V. hat ferner experimentell die epileptischen Anfälle studirt, welche nach elektrischer Reizung gewisser Theile des Grosshirns, des Gyrus sigmoideus, bei Hunden auftreten. Er fand neben Convulsionen der Skelettmusculatur auch Störungen in der Circulation und in der Athmung. Die Herzschläge waren stärker, ihr Rhythmus langsamer und unregelmässig. Die Athembewegungen waren zum Theil verlangsamt, zum Theil beschleunigt, asphyktische Erscheinungen wenig ausgeprägt. Ferner wurden wesentliche Störungen in den Functionen drüsiger Organe beobachtet. Es bestand Speichelfluss und die Secretion der Galle war vermehrt. In der Production des Pancreassaftes wurden Abweichungen nicht festgestellt. Die Harnsecretion der Nieren war verringert und hörte bisweilen ganz auf. Die letzteren Erscheinungen erklärt V. aus dem Contractionszustande der Nierengefässe, welcher durch die Reizung des N. splanchnicus bewirkt werde.

V. hat auch an curarisirten Hunden experimentirt, bei denen bekanntlich die motorischen Nerven gelähmt sind. Durch elektrische Reizung der Grosshirncentren wird diese Lähmung nicht aufgehoben; dagegen treten nach Reizung des Gyrus sigm. Störungen in den Bewegungen des Circulationsapparats, Erweiterung und Verengung der Pupille, Contractionen der Musculatur des Verdauungscanals und der Harnblase und secretorische Störungen in den Speicheldrüsen und in der Leber auf. Die Harnsecretion wird völlig aufgehoben, der Blutdruck stark erhöht. Die von V. experimentell erzeugten Erscheinungen entsprechen vollkommen denen, welche bei spontanen epileptischen Anfällen beobachtet werden.

Lüpke.

Vanlair, Nouvelles recherches sur la régénération des nerfs périphériques. Compt. rend., Tome C., p. 1605.

Vanlair hat sich mit den Veränderungen beschäftigt, welche an dem durchschnittenen Nervus ischiadicus beim Hunde eintreten. Hierbei sind namentlich die Vorgänge der Nervenregeneration, welche erst mehrere Jahre nach der Operation eintreten, beachtet worden.

Nach der Durchschneidung eines Nerven ergeben sich regelmässig folgende Veränderungen: Am centralen Stumpf proliferirt die Marginalzone der Nerven, die Axenfäden gehen zu Grunde und um jede Nervenfasern bildet sich eine Art Scheide von neuen Fasern, die mit der alten Faser verschmelzen, und schliesslich kommt es zur Bildung eines „Regenerationsneuroms“. Jetzt beginnen die Verschiedenheiten in der weiteren Entwicklung und Umformung des Neuroms.

Entweder bleibt die neuromatöse Verdickung steril, d. h. die nervöse Substanz verschwindet wieder, oder es kommt in ihr zur Bildung veritabler Nervenfasern, indem sich die Bündel des Neuroms in Längszügen anordnen. Oft bilden sich die neu entstandenen Nervenfasern wieder zurück, und entwickeln sich erst später persistirende Fasern.

Unter günstigen Bedingungen, wenn z. B. der periphere Stumpf gleichsam die Richtung für die Entwicklung der neuen Nervenfasern abgiebt, sieht man die am centralen Ende neugebildeten Nervenfasern wachsen und als besondere Stränge neben dem alten Nerven verlaufen.

Wenn sich die Wachstumsbedingungen noch günstiger gestalten, so dringen die neu entstandenen centralen Fasern selbst in die alten Nervenfasern des peripheren Stumpfes ein und verlängern sich gleichsam bis ans Ende der Gliedmasse, so dass es zu einer wirklichen Wiederbelebung der alten Nervenfasern kommt. Bemerkenswerth ist, dass manchmal nicht alle neugebildeten, centralen Nervenfasern in den peripheren Stumpf eindringen, sondern nur ein Theil derselben. Das Merkwürdigste jedoch ist, dass selbst eine sehr beschränkte Zahl eindringender Nervenfasern im Stande ist, den ganzen peripheren, abgetrennten Theil des Nerven wieder zu beleben.

Dass die mechanischen Bedingungen einen wesentlichen Einfluss auf die Regeneration haben, geht aus folgender Thatsache hervor: Durchschneidet man einen Nerven und schlägt den centralen Stumpf zurück, so dass derselbe eine Strecke weit einen Doppelstrang darstellt, so heilt der Nerv in dieser Lage an. Tritt nun Regeneration des Nerven ein, so bilden sich an diesem Doppelstrang zwei parallele Bündel von neuen Nervenfasern, von denen eins dem centrifugal laufenden Theil des Doppelstranges entspricht und centrifugal wächst, während das andere centripetal verläuft und dem anderen Theil des Doppelstranges angehört. Auf jeden Fall bildet die Umbiegungsstelle keine nervösen Elemente.

Die Richtung für die Regeneration des Nerven geben die alten Nerven, das intermusculäre Bindegewebe und die Gefäße ab, welche in den meisten Fällen von einem Nervenflechtwerk umgeben sind.

V. kommt zu dem Schlusse, dass die Nerven, wenn sie sich regeneriren sollen, eines gewissen Schutzes von Seiten der Nachbarschaft bedürfen, und dass andernfalls kein Ersatz eines herausgeschnittenen Nervenstückes erfolgt. Frick.

Boucheron, De l'acide urique dans la salive et dans le mucus nasal, pharyngeal, bronchique, utéro-vaginal. Cpt.rend., Tome C., p. 1308.

Bereits 1881 theilte Boucheron mit, dass er in dem Speichel Urämischer Harnsäure mittelst der Murexidprobe habe nachweisen können; auf dieselbe Weise gelang ihm der Nachweis der Harnsäure im Secret der Nasenschleimhaut, des Pharynx, der Bronchien, des Uterus, der Vagina, ja selbst im Magenschleim und den Augenmedien (Humor aqueus, Corpus vitreum). Diese Thatsachen veranlassten B., die Beziehungen zwischen der normalen Speichelsecretion und der Ausscheidung von Harnsäure durch die Speicheldrüsen zu studiren.

Brachte B. in den Mund eines Urämischen, der nur wenig Harnsäure im Speichel zeigte, einen Körper, der zwar zu schmecken, doch schwer zersetzlich war, z. B. einen Gummibonbon, so verschwand sofort die Harnsäure aus dem Speichel, d. h. die Speicheldrüsen schieden keine Harnsäure mehr aus.

Anders, wenn eine beträchtliche Menge Harnsäure im Speichel vorhanden war; in diesem Falle verschwand die Harnsäure nicht ganz beim Einführen eines schmeckbaren Körpers in den Mund, sondern sie nahm nur an Menge ab, so dass der abgesonderte Speichel ein Gemisch von Speichel und Harnsäure darstellte.

Tabakrauch verminderte die Menge der im Speichel nachweisbaren Harn-

säure nur unbedeutend und das Maximum der Harnsäuremenge im Speichel konnte vor der nächsten Mahlzeit constatirt werden.

B. sagt, dass die Harnsäure nicht die einzige Substanz sei, die auf solchem Wege aus dem Körper eliminirt werde, sondern dass die meisten Stoffe, welche für den Körper ohne Nutzen und im Ueberfluss vorhanden sind, auf diesem Wege ausgeschieden werden. Er glaubt, dass auch die Ptomaine auf diese Weise den Körper verlassen. weil er in dem Speichel mehrerer Kranken eine Substanz gefunden hat, die Ptomainereaction zeigte.

Weiter schliesst B., dass, wenn sich die Magendrüsen ebenso verhalten wie die Speicheldrüsen, eine Thatsache sich erklären würde, nämlich dass gastrische Störungen, welche sich eine Stunde nach der Mahlzeit einstellen, sofort verschwinden, wenn man eine nur kleine Quantität einer schmeckenden Substanz in den Magen bringt. In diesem Falle würde die Ausscheidung jener Körper, welche die gastrischen Störungen veranlassen, in dem Moment sistiren, wo der eingeführte Körper die Secretion des Magensaftes einleitet.

Zum Schlusse weist B. auf die diagnostische und prognostische Bedeutung hin, welche das Erscheinen der Harnsäure im Speichel Urämischer hat. Frick.

Villiers, Sur les urines pathologiques. Compt. rend., Tome C., p. 1246.

Bouchard und Pouchet haben im normalen Harn Alkaloide nachgewiesen; Villiers fand dieselben jedoch nur im Harn Kranker. Er konnte den Nachweis der Alkaloide im Harn von Personen führen, welche mit verschiedenen Krankheiten — Masern, Diphtherie, Pneumonie, Abscessen — oder nur mit einer leichten Indisposition behaftet waren. Verf. nimmt an, dass bei einer Reihe von krankhaften Leiden in verschiedenen Organen Alkaloide gebildet werden, welche durch den Blutstrom aufgenommen und durch die Nieren ausgeschieden werden. Hält die Elimination nicht gleichen Schritt mit der Bildung der Alkaloide, so kann es zu wirklichen Vergiftungen kommen, und er meint, dass auf derartige Vergiftungen eine grosse Anzahl von Todesfällen zurückzuführen sei. Lüpke.

Billet, Sur le Bacterium ureae. Compt. rend., Tome C., p. 1252.

Billet fand alle bei der ammoniakalischen Gährung des Harns gesehenen Bacterienformen — Mikroccoccus, Diplococcus, Streptococcus, Bacterium, Diplo-, Streptobacterium, Leptothrix und Vibrio — bisweilen in einem Faden vereinigt. Deshalb sieht er dieselbe als zu einer Art gehörig an, welche er Bacterium ureae nennt. Micrococcus und Streptococcus treten besonders im ammoniakalischen Harn auf. Leptothrix, Bacterium, Streptobacterium und Vibrio bilden sich, wenn der Harn noch sauer ist und mit der Luft in Berührung gelassen wird. In dem Masse wie die Säure im Harn verschwindet, sollen die längeren Fäden sich mehr und mehr theilen, bis schliesslich als Endglied dieser Theilungen lauter Mikroccocci entstanden sind. Lüpke.

Dareste, Sur le rôle physiologique du retournement des oeufs pendant l'incubation. Compt. rend.. Tome C., p. 813.

Dareste beobachtete, dass Bruthennen ihre Eier häufig umdrehen, und fragte sich, ob dieses Drehen der Eier nothwendig sei. Bei seinen früheren Untersuchungen hatte D. keinen Unterschied zwischen Eiern, die bewegt worden, und solchen, die nicht angerührt waren, constatiren können, und zwar aus dem Grunde, weil er das Auskriechen nicht abgewartet hatte. Neuere Untersuchungen haben ihm gezeigt, dass das tägliche Umwenden der Eier eine hohe Bedeutung besitzt, indem es die Verwachsung zwischen Eihaut und Dotter verhindert. Bei Eiern, die während der Brütezeit still liegen, bilden sich Adhäsionen zwischen Eihaut und Dotter aus, so dass letzterer in Folge eines Risses der Dotterhaut sich in das Eiweiss ergiesst. Dieser Riss bleibt entweder offen oder vernarbt; in beiden Fällen tritt der Tod des Hühnchens in der zweiten oder dritten Woche der Bebrütung ein. Erreicht der Embryo das Ende der Brütezeit, so kann er wegen der Verwachsung zwischen Dotter und Eihaut nicht auskriechen. D. hat den Nutzen der täglichen Umdrehung der Eier experimentell nachgewiesen: Zwei Gelege Eier wurden unter denselben Bedingungen bebrütet mit dem einzigen Unterschiede, dass die des einen Geleges zweimal umgedreht wurden, während die anderen unberührt blieben. Die Embryonen sämtlicher nicht berührter Eier waren in der zweiten oder dritten Woche abgestorben, während die täglich zweimal umgedrehten Eier bis auf eins, dessen Embryo gegen den 20. Tag gestorben war, lebende Küchlein auskriechen liessen. Den günstigen Einfluss, den dieses Umwenden der Eier ausübt, erklärt D. dahin, dass durch häufiges Bewegen verhindert wird, dass dieselben Stellen der Eihaut und des Dotters längere Zeit in Berührung sind und mit einander verkleben.

Frick.

Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Haussäugethiere. Von Dr. Carl Dammann, Medicinalrath und Professor, Director der Kgl. Thierarzneischule in Hannover. Verlag von Paul Parey, Berlin.

Das Erscheinen der zweiten Hälfte der Gesundheitspflege der Haussäugethiere von Dammann hat zwar längere Zeit auf sich warten lassen, diese Verzögerung rechtfertigt sich aber durch die Fülle des Inhalts, der denjenigen der ersten Hälfte an Umfang bedeutend überragt.

Die jetzt zur Abhandlung gelangten Capitel erforderten eine besonders grosse Summe eingehender Specialstudien und die Bewältigung einer, wie die angefügten Citate beweisen, eminent umfassenden Literatur; sie dürfen aber auch als die insofern werthvollsten bezeichnet werden, als sie auf dem weiten Felde der Gesundheitspflege dem Rath und Belehrung suchenden Leser am nächsten liegen, und derselbe aus ihnen am häufigsten praktischen Nutzen zu schöpfen Gelegenheit haben wird.

Hierher gehört in erster Linie die eingehend behandelte Fütterungslehre, welche allen Verhältnissen und Zielen der Viehhaltung Rechnung trägt und der sehr vollständige Tabellen über Nährstoffgehalt und Verdaulichkeit der Futter-

mittel beigegeben sind. Im Anschluss hieran werden nicht minder ausführlich die Krankheiten der Nährpflanzen und die Verderbnisse der Futterstoffe besprochen. ein Capitel, in welchem nicht allein der Landwirth eine Fülle praktischer Regeln über Gewinnung und Aufbewahrung des Viehfutters findet, sondern auch dem Thierarzt werthvolle Fingerzeige über Beurtheilung, Behandlung und Abwehr der zahlreichen auf Futterschädlichkeiten basirenden Gesundheitsstörungen gegeben werden. In einem besonderen Abschnitt über die gelegentlich in das Futter gelangenden Giftpflanzen ist neben der ausführlichen Symptomatologie der durch dieselben hervorgerufenen Intoxicationen auch eine bis ins Kleinste gehende, durch Abbildungen wirksamst unterstützte botanische Schilderung der einzelnen Giftpflanzen gegeben. Diese Abschweifung auf das Gebiet der Pflanzenkunde wird Allen willkommen sein, welche über allgemeine botanische Kenntnisse und die einschlägige Literatur nicht verfügen, und welche durch das vorliegende Werk in den Stand gesetzt werden, die interessirenden Giftpflanzen trotzdem mit Sicherheit zu bestimmen.

Eine besonders sorgfältige Bearbeitung ist der Beschaffenheit des Stalles und der Weide gewidmet worden. Sind in Bezug auf ersteren alle in der Literatur niedergelegten Erfahrungen mit grossem Fleiss gesammelt und ein reiches Material zusammengestellt, so wird andererseits die Beschreibung der durch Weideschädlichkeiten entstehenden Krankheiten und sämmtlicher dabei in Betracht kommenden Parasiten dem Landwirth von hohem Interesse sein. Auch das Capitel über die Hautpflege der Thiere verdient besondere Beachtung. Dass der Herr Verfasser es verstanden hat, bei der Lehre von Aufzucht und Nutzung, welche selbständige umfassende Disciplinen darstellen, sich auf das unmittelbar zur Gesundheitspflege Gehörige zu beschränken, ist anzuerkennen. Am Schlusse wird unter „Infection und Desinfection“ eine Charakteristik sämmtlicher wichtiger Infectionskrankheiten der Hausthiere entworfen und über Zweck und Ausführung der Desinfectionsmassregeln eine dem Landwirth gewiss erwünschte Aufklärung gegeben.

Das nunmehr vollendet vorliegende Werk ist jedenfalls eine mit ausserordentlichem Fleiss und geschickter Hand angelegte, denkbar vollständige Sammlung alles dessen, was bezüglich der Gesundheitspflege der Haussäugethiere wissenschaftlich werth und mit derselben irgendwie verwandt ist. Wenn man aber daraus den Vorwurf begründen sollte, dass das Buch sich vielfach auf zu entfernte Gebiete verliere und das darin aufgespeicherte umfassende Material zum grossen Theil anderen selbständigen Disciplinen entnommen sei, so muss zunächst bedacht werden, dass das Gebiet der Gesundheitspflege ein scharf abgegrenztes überhaupt nicht sein kann, ferner dass das Werk wohl besonders für den gebildeten Landwirth berechnet ist, der doch in seltenen Fällen über Specialkenntniss und Specialliteratur der verschiedenen naturwissenschaftlichen und medicinischen Fächer verfügt und dem es von höchstem Vortheil sein muss, die Antwort auf die mannigfachen Fragen, welche an ihn bei Haltung und Pflege der Hausthiere herantreten, mühelos in einem Werke auffinden zu können, ohne zur Vervollständigung noch eine Reihe anderer consultiren zu müssen.

Der Zweck des Buches wird wesentlich gefördert durch die anziehende und elegante Art der Darstellung, welche dem Herrn Verfasser eigenthümlich ist

und wodurch er rein sachliche Stoffe selbst dem Laien zu einer fesselnden Lectüre zu gestalten weiss.

Diesem äusseren Vorzuge ist von dem Verleger ein zweiter hinzugefügt in der musterhaften Ausstattung. Ganz besonders die der Beschreibung der Giftpflanzen beigegebenen 20 Farbentafeln sind tadellos treu und werden in den besten botanischen Bildwerken nicht vollendeter zu finden sein.

Das Werk wird sich zu den alten Freunden viele neue erwerben und darf dem Thierarzt wie dem Landwirth empfohlen sein. Schmalz.

Der Fuss des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und Hufbeschlag. Gemeinschaftlich in Wort und Bild dargestellt von Dr. A. G. T. Leisering, Geh. Med.-Rath und Prof. d. Anatomie. und N. U. Hartmann, weiland Lehrer des theoret. und prakt. Hufbeschlages an der Königl. Thierarzneischule zu Dresden. 6. Auflage, in ihrem zweiten, den Hufbeschlag betreffenden Theil umgearbeitet von A. Lungwitz, Lehrer des theoret. und prakt. Hufbeschlages an der Königl. Thierarzneischule zu Dresden. Mit 211 Holzschnitten von Prof. Bürkner. Dresden, G. Schönfeld's Verlagsbuchhandlung, 1886.

Das vorliegende Werk hat innerhalb 24 Jahren seine 6. Auflage erlebt und damit nicht nur den Beweis seiner Brauchbarkeit, sondern auch seiner Vorzüge geliefert. Die letzteren speciell hervorzuheben gegenüber den anderen Erscheinungen aus der nicht kleinen Literatur über Hufbeschlag liegt kein Anlass vor, um so weniger, als die beiden Herren Verfasser als Sachverständige ersten Ranges auf den von ihnen bearbeiteten Gebieten schon in den früheren Auflagen gezeigt haben, wie zweckentsprechend sie das Material zu verarbeiten verstanden. In Betreff des anatomisch-physiologischen Theiles verdient indessen noch besonders hervorgehoben zu werden, dass der seit dem Erscheinen der 5. Auflage entbrannte Kampf über das Wesen und die Erscheinungen des Hufmechanismus in seinen wesentlichsten Momenten Aufnahme gefunden hat. Der zweite, den Hufbeschlag darstellende Theil hat durch Aufnahme ganz neuer Capitel und durch Umarbeitung anderer eine wesentliche Bereicherung erfahren. Es sind die allgemeinen Nachtheile des Beschlages gesondert besprochen, die Einwirkung der Fussstellung und fehlerhafter Gangarten auf die Form des Hufes ist ausführlicher und detaillirter dargestellt, auch haben mehrere Fussleiden in einigen Capiteln eine gesonderte Besprechung erfahren. Als eine besondere Bereicherung des Werkes muss das Capitel über Unterlegesohlen und Hufeinlagen namhaft gemacht werden, in welchem Verf. das Brauchbare aus einer grösseren Reihe von Erfindungen hervorhebt, die Vortheile des Gebrauches bei den verschiedenen Hufleiden und Hufformen feststellt und Regeln für die Art der Application giebt. Bei allen Erörterungen und Anweisungen, die der Verf. giebt, macht sich durch die Bestimmtheit im Ausdruck jene Sicherheit geltend, welche nur durch ein grosses Erfahrungsmaterial, das kritisch verarbeitet worden, zu erringen ist. Für den angehenden Praktiker, welcher noch keine selbstständigen Erfahrungen über die zahlreichen aus den fehlerhaften Zurichtungen des Hufes resultirenden Lahm-

heiten des Pferdes gemacht hat, werden aus einer geläuterten Erfahrung entnommene Anweisungen willkommen sein und das Buch häufig ein treuer Rathgeber werden können. Obgleich der Verf. statistisch in seinem Buche nachweist, dass der vielfach gehörte Ausspruch: „unter 100 lahmen Pferden sind 90 huf-lahm“, gegenwärtig nur eine Phrase, und dass die Zahl der wirklichen Huf-lahmheiten bedeutend geringer ist, so bleibt doch eine grosse Reihe von Lahmheiten an den unteren Fussgelenken übrig, bei welchen ohne die exacte Regelung des Beschlages ein günstiges Resultat durch die Behandlung nicht zu erreichen ist, ja die Behandlung lediglich in jener Regelung besteht. Hier sei beispielsweise aus dem Capitel „Chronische Fussrollenentzündung“ auf eine schematische Zeichnung der Phalangenstellung hingewiesen, durch welche in mustergültiger Weise der therapeutische Effect der Trachtenerhöhung durch die mit ihr erreichte Entspannung der erkrankten Hufbeinbeugesehne dargestellt wird. Nicht nur die ange-deuteten, sondern auch noch viele andere Vorzüge werden dem Werk in seiner neuen Auflage, obwohl es ja hauptsächlich für Schmiede geschrieben ist, Anerkennung und Verbreitung im Kreise der Thierärzte erringen, wozu auch noch die vorzügliche Ausstattung und reiche Beigabe von künstlerischen Holzschnitten bei-tragen wird.

Peters.

Der Pferdefreund. Monatsblätter für Pferdezüchter und Pferdeliebhaber. Unter Mitwirkung hervorragender Mitarbeiter herausgegeben von Kreisveterinärarzt Dr. Schaefer aus Darmstadt.

Vorstehende Zeitschrift ist das officielle Organ des Pferdezuchtvereins im Grossherzogthum Hessen. Sie erscheint seit Januar 1885 und liegt uns in ihrem ersten Jahrgange vollständig vor.

Die Tendenz der Zeitschrift ist die Förderung und Hebung der Pferdezucht im Vereinsbezirk durch Veröffentlichung gemeinverständlicher Abhandlungen und Vorträge. Die bis jetzt vorliegenden Nummern enthalten viele Arbeiten, welche, von sachkundigen Männern verfasst, auch ein allgemeines Interesse in Anspruch nehmen. Besonders erwähnenswerth ist die von dem Königl. sächs. Landstallmeister Grafen zu Münster in Moritzburg in den Nummern 2—11 veröffentlichte grössere Arbeit über „Anleitung zur rationellen Haus-Pferdezucht“. Diese von dem oben genannten Verein preisgekrönte Schrift, welche auch im Sonderabdruck in einem Hefte erschienen ist, verdient in der That eine allgemeine Verbreitung unter den Landwirthben, da sie geeignet ist, Interesse für die Pferdezucht zu erwecken und eine gute Anleitung zur Züchtung brauchbarer Pferde zu geben.

E.

Personal-Notizen.

Ernennungen und Versetzungen.

Der Professor Dr. med. E. Froehner von der Thierarzneischule in Stuttgart ist als Professor an die Thierarzneischule in Berlin berufen worden. Derselbe hat die Vorlesungen über Pharmakognosie, Pharmakologie, Toxikologie, Receptirkunde und die Leitung des Spitals für kleinere Haustiere übernommen.

Der Dr. Bissinger ist zum Assistenten des Professors der Chemie an der Thierarzneischule in Berlin ernannt worden.

Der Kreisthierarzt B. Malkmus in Heydekrug commissarisch zum Repetitor an der Thierarzneischule in Berlin.

Der Thierarzt W. Brietzmann in Krone a. B. zum Kreisthierarzt des Kreises Belgard, Reg.-Bez. Köslin, mit dem Amtswohnsitz in Belgard.

Der Thierarzt P. Fenner in Greifenberg zum Kreisthierarzt des Kreises Norder-Dithmarschen, Reg.-Bez. Schleswig, mit dem Amtswohnsitz in Wesselburen.

Der Kreisthierarzt W. Günther in Kösfeld. unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Kreisthierarzt des Kreises Oels, Reg.-Bez. Breslau.

Der Kreisthierarzt G. Martens zu Sangerhausen nebenamtlich zum stellvertretenden beamteten Thierarzt für den Amtsbezirk Allstedt des Grossherzogthums Weimar.

Der Thierarzt H. Matzker zu Schlochau zum Kreisthierarzt des Kreises Schlochau, Reg.-Bez. Marienwerder.

Der Kreisthierarzt des Kreises Hamm E. Mummenthey zu Unna, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Kreisthierarzt des Kreises Hoyerswerda, Reg.-Bez. Liegnitz.

Der Repetitor an der Thierarzneischule in Berlin, J. Peters, unter Entbindung von seinem gegenwärtigen Amte, zum Kreisthierarzt des Kreises Aschersleben, Reg.-Bez. Magdeburg, mit dem Amtswohnsitz in Aschersleben.

Der Kreisthierarzt Wulf in Pelm hat seinen Amtswohnsitz nach Gerolstein, Kr. Daun, Reg.-Bez. Trier, verlegt.

Definitiv übertragen wurde die bisher commissarisch verwaltete Kreisthierarztstelle:

der Kreise
Neustadt i. O.-S.
Eckernförde

den Kreisthierärzten
Grüner in Neustadt i. O.-S.;
Eckeberg in Schuby;

der Kreise	den Kreisthierärzten
Heydekrug	Malkmus in Heydekrug;
Unter-Taunus	Macks in Langenschwalbach;
Hofgeismar	Schlitzberger in Grebenstein;
Königsberg Nm. (südl. Theil)	Pusch in Küstrin.

Aus dem Staatsdienst sind geschieden:

Der Kreisthierarzt J. E. R. Ebinger in Bischofsburg, Rg.-Bz. Königsberg.
 Der Kreisthierarzt E. A. H. Ewald in Bergheim, Reg.-Bez. Köln.
 Der Departements- und Kreisthierarzt Fuchs in Trier, Reg.-Bez. Trier.
 Der Kreisthierarzt Dr. C. A. F. Lemke in Halberstadt, Rg.-Bz. Magdeburg.

Ordens-Verleihungen.

Dem Kreisthierarzt K. F. Einicke in Wreschen der Kronen-Orden 4. Cl. mit der Zahl 50.
 Dem Thierarzt A. Tillmann in Mülheim a. Rh. der Kronen-Orden 4. Cl.

Todesfälle.

Der Stabs-Rossarzt a. D. Bovenschen in Ostrowo, Reg.-Bez. Posen.
 Der Ober-Remonte-Rossarzt a. D. Dienemann in Kremmen, Reg.-Bez. Potsdam.
 Der Kreisthierarzt Dr. C. L. Heinen in St. Johann-Saarbrücken, Reg.-Bez. Trier.
 Der Thierarzt Kühn in Belzig, Reg.-Bez. Potsdam.
 Der Thierarzt E. Puppel in Bockenem, Reg.-Bez. Hildesheim.
 Der Thierarzt J. Sieverling in Kemme, Reg.-Bez. Hildesheim.

Die Niederlassung eines Thierarztes wird gewünscht:

In Freienwalde i. Pomm., Kr. Saatzig, durch den Apotheker Reinsch daselbst.
 In Leck, Kr. Tondern, Reg.-Bez. Schleswig. Auskunft ertheilt der Gemeindevorsteher Marcussen daselbst.
 In Lobsens, Kr. Wirsitz, Reg.-Bez. Bromberg. Auskunft ertheilt der Magistrat daselbst.
 In Sensburg, Reg.-Bez. Gumbinnen. Die durch Ableben des Kreisthierarztes Kaesewurm vacant gewordene Kreisthierarztstelle soll wieder besetzt werden. Nähere Auskunft ertheilt der Rittergutsbesitzer v. Bieberstein in Barrowen, welcher die thierärztliche Praxis im Kreise Sensburg als eine ausgedehnte und sehr lohnende bezeichnet.
 In Tangermünde, Kr. Stendal. Auskunft ertheilt der Magistrat daselbst.

Vacanzen.

(Die mit * bezeichneten Vacanzen sind seit dem Erscheinen von Bd. XII, Heft 2 dieses Archivs hinzugetreten oder von Neuem ausgebaut.)

Regierungs-Bezirk	Kreisthierarztstellen des Kreises	G e h a l t.	Zuschuss aus Kreis- resp. Com- munalmitteln.
Königsberg	Heilsberg	600 Mark	300 Mark
"	Fischhausen	600 "	300 "
"	Rössel *	600 "	300 "
Gumbinnen	Sensburg *	600 "	300 "
Frankfurt	Züllichau-Schwiebus ¹⁾	600 "	— "
Köslin	Bublitz	600 "	— "
Oppeln	Grottkau	600 "	— "
Magdeburg	Halberstadt *	600 "	— "
Merseburg	Schweinitz ²⁾	600 "	750 "
Erfurt	Schleusingen *	600 "	300, 150 "
Schleswig	Oldenburg ³⁾	600 "	— "
"	Herzogth. Lauenburg ⁴⁾	600 "	— "
Münster	Kösfeld *	600 "	— "
Arnsberg	Arnsberg	600 "	— "
"	Iserlohn	600 "	300 "
Köln	Bergheim *	600 "	— "
Trier	Saarbrücken *	600 "	— "
"	Stadt- und Landkreis Trier *	600 "	322, 98 "
"	Depart. - Thierarztstelle f. d. Reg.-Bez. Trier *	900 "	— "

Veränderungen im militär-rossärztlichen Personal.**Beförderungen.**

Zum Ober-Rossarzt sind ernannt:

Die Rossärzte: Gaedtke vom 2. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Leib-Drag.-Rgmt.) No. 24 bei diesem Regiment; Torzewski vom Ostpreuss. Train-Bat. No. 1 beim 2. Hannov. Ul.-Rgmt. No. 14; Verfürth vom Westfäl. Train-

¹⁾ Mit dem Amtswohnsitz in Schwiebus.

²⁾ " " " " Herzberg.

³⁾ " " " " Neustadt i. Holst.

⁴⁾ " " " " Ratzeburg.

Bat. No. 7 beim Braunschweig. Hus.-Rgmt. No. 17; Voigt vom 2. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 17 bei diesem Regiment.

Zu Rossärzten sind ernannt:

Die Unter-Rossärzte: Bens vom 1. Hess. Hus.-Rgmt. No. 13; Dietrich vom 1. Brandenburg. Ul.-Rgmt. (Kaiser Alexander II. v. Russl.) No. 3; Hellebrandt vom Leib-Kür.-Rgmt. (Schles.) No. 1; Hentschel vom 1. Schles. Drag.-Rgmt. No. 4; Hübner vom 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9; Rexilius vom Thüring. Hus.-Rgmt. No. 12; Zeitz vom 3. Bad. Drag.-Rgmt. (Prinz Karl) No. 22.

Anstellungen.

Die Unter-Rossärzte: Becher beim Kurmärk. Drag.-Rgmt. No. 14; Dahlenburg beim Schlesw.-Holst. Drag.-Rgmt. No. 15; Geitmann beim Schlesw. Feld.-Art.-Rgmt. No. 9; Goerte beim 1. Garde-Feld-Art.-Rgmt.; Günther beim Magdeburg. Kür.-Rgmt. No. 7; Hagemann beim 2. Bad. Drag.-Rgmt. No. 21; Hischer beim Rhein. Ul.-Rgmt. No. 7; Koesters beim 1. Hess. Hus.-Rgmt. No. 13; Krause beim 1. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Garde-Drag.-Rgmt.) No. 23; Kutzner beim Oldenburg. Drag.-Rgmt. No. 19; Levin beim Schlesw.-Holst. Drag.-Rgmt. No. 13; Lück beim 1. Westfäl. Feld-Art.-Rgmt. No. 7; Mölhusen beim Niederschles. Feld-Art.-Rgmt. No. 5; Paul beim Thüring. Hus.-Rgmt. No. 12; Peter beim 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9; Reinländer beim Magdeburg. Feld-Art.-Rgmt. No. 4; Rottschalk beim 2. Hannov. Ul.-Rgmt. No. 14; Schieferdecker beim 3. Bad. Drag.-Rgmt. (Prinz Karl) No. 22; Tonndorf beim 2. Westfäl. Hus.-Rgmt. No. 11.

Die einj.-freiw. Unter-Rossärzte: Allemeyer beim Ostpreuss. Train-Bat. No. 1; Baranski beim 2. Garde-Feld-Art.-Rgmt.; Dillhof beim 2. Hannov. Feld-Art.-Rgmt. No. 26; Evers beim Holst. Feld-Art.-Rgmt. No. 24; Falk beim 1. Garde-Feld-Art.-Rgmt.; Hamann beim 1. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 2; Hertel beim Westpreuss. Feld-Art.-Rgmt. No. 16; Köser beim Schlesw. Feld-Art.-Rgmt. No. 9; Rekate beim 1. Hannov. Ul.-Rgmt. No. 13.

Der dreij.-freiw. Unter-Rossarzt Encke beim Leib-Kür.-Rgmt. (Schle-sisches) No. 1.

Versetzungen.

Die Rossärzte: Buchholtz von der Militär-Lehrschmiede zu Königsberg zum Ostpreuss. Train-Bat. No. 1; Buss vom Westpreuss. Kür.-Rgmt. No. 5 zum 2. Rhein. Feld-Art.-Rgmt. No. 23; Christiani vom Königs-Hus.-Rgmt. (1. Rhein.) No. 7 zur Militär-Lehrschmiede in Königsberg; Gaedtke vom Train-Bat. No. 15 zum 2. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Leib-Drag.-Rgmt.) No. 24; Gaertner vom Feld-Art.-Rgmt. No. 31 zum Train-Bat. No. 15; Goehring vom Pomm. Hus.-Rgmt. (Blüchersche Hus.) No. 5 zum Schlesw.-Holst. Train-Bat. No. 9; Hübner vom 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9 zum 2. Schles. Hus.-Rgmt. No. 6; Pichel vom Schlesw.-Holst. Ul.-Rgmt. No. 15 zum 2. Schles. Drag.-Rgmt. No. 8; Schmidt vom Westpreuss. Kür.-Rgmt. No. 5 zum Schles. Train-Bat. No. 6; Schmidt vom 1. Schles. Hus.-Rgmt. No. 4 zum Niederschles. Feld-Art.-Rgmt. No. 5; Schulz vom Pomm. Drag.-Rgmt. No. 11 zum 1. Pomm. Ul.-Rgmt. No. 4; Viehweger vom 2. Schles. Drag.-Rgmt. No. 8 zum Westfäl. Train-Bat. No. 7.

Die charakterisirten Rossärzte: Bochnig vom 2. Schles. Hus.-Rgmt. No. 6 zum 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9; Wiegand vom 2. Leib-Hus.-Rgmt. No. 2 zum Westpreuss. Kür.-Rgmt. No. 5.

Die Unter-Rossärzte: Griesor vom Magdeburg. Feld-Art.-Rgmt. No. 4 zum 1. Rhein. Feld-Art.-Rgmt. No. 8; Herrmann vom Rhein. Ul.-Rgmt. No. 7 zum 1. Pomm. Ul.-Rgmt. No. 4; Lopitsch vom 2. Brandenburg. Ul.-Rgmt. No. 11 zum Magdeburg. Drag.-Rgmt. No. 6; von Müller vom Magdeburg. Drag.-Rgmt. No. 6 zum Magdeburg. Hus.-Rgmt. No. 10; Ott vom 1. Garde-Feld-Art.-Rgmt. zum Thüring. Ul.-Rgmt. No. 6; Richter vom Kür.-Rgmt. Königin (Pomm.) No. 2 zum 2. Pomm. Ul.-Rgmt. No. 9; Trautwein vom Brandenburg. Kür.-Rgmt. (Kais. Nicolaus I. v. Russl.) No. 6 zum Feld-Art.-Rgmt. No. 31.

Abgegangen.

Der Corps-Rossarzt Voigt vom 15. Armee-Corps.

Der Ober-Rossarzt Kuhr vom Schlesw.-Holst. Ul.-Rgmt. No. 15.

Die Rossärzte: Angenheister vom Schles. Train-Bat. No. 6; Brilke vom Oldenburg. Drag.-Rgmt. No. 19; Fenner vom Hus.-Rgmt. No. 16; Hellebrandt vom Leib-Kür.-Rgmt. (Schles.) No. 1; Koch vom Westfäl. Ul.-Rgmt. No. 5; Meitzner vom 1. Garde-Ul.-Rgmt.; Rodewald vom 1. Pomm. Ul.-Rgmt. No. 4; Roolf vom Westfäl. Feld-Art.-Rgmt. No. 7; Schruba vom 2. Rhein. Feld-Art.-Rgmt. No. 23; Ullrich vom Schlesw.-Holstein. Drag.-Rgmt. No. 13.

Die charakterisirten Rossärzte: Plischke vom 2. Pomm. Ul.-Rgmt. No. 9; Rudloff vom Niederschles. Feld-Art.-Rgmt. No. 5; Schneider vom 1. Pomu. Ul.-Rgmt. No. 4; Siebert vom Magdeburg. Hus.-Rgmt. No. 10.

Die Unter-Rossärzte: Borstorff vom Schlesw.-Holst. Drag.-Rgmt. No. 13; Weigt vom Garde-Hus.-Rgmt.

Die einj.-frei. Unter-Rossärzte: Hammer vom Bad. Train-Bat. No. 14; Lorenz vom 2. Garde-Feld-Art. Rgmt.; Pitz vom Nass. Feld-Art.-Rgmt. No. 27; Weber vom Kurmärk. Drag.-Rgmt. No. 14.

Der dreij.-frei. Unter-Rossarzt Pährisch vom 2. Westfäl. Hus.-Rgmt. No. 11.

Gestorben.

Der Ober-Rossarzt Kresse vom 2. Grossherzogl. Hess. Drag. Rgmt. (Leib-Drag.-Rgmt.) No. 24.

Der Rossarzt Skorna vom Schlesw.-Holst. Train-Bat. No. 9.

Commandos.

Der Ober-Rossarzt Rust vom 2. Hannov. Ul.-Rgmt. No. 14 ist behufs Wahrnehmung der Geschäfte des Corps-Rossarztes zum General-Commando des 15. Armee-Corps commandirt worden.

S a m m l u n g

eines Stammcapitals zur Begründung einer Unterstützungskasse für die Hinterbliebenen deutscher Thierärzte.

VI. Liste.

Die Kreisthierärzte des Herzogthums Braunschweig haben nach dem Bekanntwerden des letzten Circulars des Erstunterzeichneten, betreffend die Sammlung eines Stammcapitals behufs Gründung einer Unterstützungskasse für die Hinterbliebenen deutscher Thierärzte, bei den Collegen ihrer Kreise Sammlungen veranstaltet. In Folge dessen sind von den Braunschweiger Thierärzten nachstehende Beiträge eingegangen und durch Herrn Hofthierarzt Lies-Braunschweig uns übermittelt worden.

Von den Herren: Thierarzt Ahrend-Cremlingen 100 M.; Thierarzt Dorman-Helmstedt 50 M.; Ober-Rossarzt Daubenkropf-Braunschweig 100 M.; Rossarzt Enders-Braunschweig 50 M.; Thierarzt Freund-Pabstorf 100 M.; Thierarzt Günther-Vechelde 20 M.; Thierarzt Haberkorn-Schöningen 50 M.; Thierarzt Herweg-Wendelburg 50 M.; Thierarzt Herweg-Braunschweig 50 M.; Rossarzt Hilpert-Braunschweig 50 M.; Thierarzt Hoffmeister-Semmenstedt 150 M.; Thierarzt Hillendahl-Vorsfelde 20 M.; Kreisthierarzt Isernhagen-Holzminen 75 M.; Thierarzt Koch-Barum 75 M.; Thierarzt Koch-Lesse 50 M.; Hofthierarzt Lies-Braunschweig 150 M.; Thierarzt Nabel-Jerxheim 50 M.; Thierarzt Nahde-Braunschweig 30 M.; Thierarzt Ohlms-Calvörde 50 M.; Thierarzt Ritter-Wolfenbüttel 50 M.; Kreisthierarzt Schrader-Helmstedt 100 M.; Thierarzt Samplebe-Schöppenstedt 50 M.; Thierarzt Sieverling-Wolfenbüttel 100 M.; Thierarzt Stietenroth-Halle a. d. Weser 30 M.; Rossarzt Sievert-Braunschweig 40 M.; Kreisthierarzt Saake-Wolfenbüttel 100 M.; Kreisthierarzt Trolldenier-Blankenburg 50 M.; Kreisthierarzt Uhde-Gandersheim 100 M.

Angesammelte Zinsen 15,25 M. — Zusammen 1905 M. 25 Pf.

Allen diesen hochherzigen Gebern sprechen wir für die reichlichen Spenden unseren tiefgefühltesten Dank aus.

Hannover, den 15. März 1886.

Dammann. Geiss.

Das **Directorium der Sterbekasse für Thierärzte in Dresden** erstattet durch seinen Vorstand Prof. Dr. Johne einen Rechenschaftsbericht, nach welchem im Jahre 1855 4 Mitglieder der Sterbekasse gestorben und 12 Mitglieder aufgenommen sind. Die Einnahmen betragen im Jahre 1885 2919 M. 8 Pf., die Ausgaben 1744 M. 64 Pf. Das Vermögen der Kasse ist von 8222 M. 20 Pf. im Jahre 1884 auf 8975 M. 21 Pf. im Jahre 1885, mithin um 753 M. 1 Pf. gestiegen. Die Zahl der Mitglieder am Schlusse des Jahres 1885 betrug 292.

XI.

Bericht über die Königl. Thierarzneischule zu Berlin 1885/86.

Von

Müller.

Die wesentlichste Aenderung des Lehrplans unserer Anstalt während des Berichtsjahres ist die seit Beginn des Wintersemesters 1885/86 eingetretene Theilung der Klinik für grössere Hausthiere in eine Station für innere und eine Station für äussere Krankheiten. Erstere wird von Prof. Dieckerhoff, letztere von Prof. Dr. Möller geleitet; jedem der beiden Genannten ist ein Assistent überwiesen. Der bisher der gesammten Klinik für grössere Hausthiere zugetheilte Repetitor besorgt in erster Linie die Geschäfte der Poliklinik und hat ausserdem die Professoren Dieckerhoff und Dr. Möller nach Bedarf zu unterstützen.

Das Spital für kleinere Hausthiere ist während des Wintersemesters provisorisch von dem als Assistenten am pathologischen Institut beschäftigten Repetitor Lüpke und zuletzt vom Prosector Dr. Schmaltz geleitet, sodann gleich nach Ende des Berichtsjahres von dem aus Stuttgart berufenen Prof. Dr. Fröhner übernommen worden.

Wegen der sehr bedeutend gesteigerten Zahl der an den anatomischen Uebungen theilnehmenden Studirenden ist noch ein Assistent für die Anatomie angestellt worden.

Die längere Krankheit und der am 22. December 1885 eingetretene Tod des Geh. Medicinalrathes Prof. Dr. Roloff hatte einzelne Verschiebungen der Vorlesungen zur Folge. Die im Wintersemester von dem Director der Anstalt zu haltenden Vorlesungen hat der Lehrer Eggeling übernommen.

Die in unserem Bericht für das Jahr 1884/85 angeführten Bemerkungen über den Studienplan im Allgemeinen und über die Verhältnisse, welche den im Sommer eintretenden Studirenden die Beendigung der Studien in sieben Semestern wesentlich erschweren, müssen auch für das Jahr 1885/86 wiederholt werden (s. dieses Archiv, Bd. XI, S. 346).

Die Zahl der bei der Anstalt inscribirten Studirenden betrug:
 im Sommersemester 1885: 257, und
 im Wintersemester 1885/86: 330.

Ausser 5 Studirenden, welche bereits eine andere Anstalt besucht hatten, wurden Ostern 33 und Michaelis 53 Civilstudirende und 44 Militärstudirende recipirt. Neben den Studirenden nahmen, abgesehen von den Thierärzten, welche zum Zweck ihrer Vorbereitung für die kreisthierärztliche Prüfung eine kurze Zeit die Vorlesungen besuchten, im Sommer 13 und im Winter 19 Hospitanten an dem Unterricht Theil.

Zu der naturwissenschaftlichen Prüfung meldeten sich Ostern 1885: 51 Candidaten, von denen 8 sehr gut, 9 gut, 13 genügend bestanden, während 15 die Censur „ungenügend“ und 6 die Censur „schlecht“ erhielten. Von den Civilstudirenden, welche zur Ablegung der Prüfung berechtigt waren, meldeten 19 sich nicht und verliessen 6 die Anstalt.

Die 15 Candidaten, welche Ostern die Censur „ungenügend“ erhalten hatten, wiederholten die Prüfung im October mit günstigem Erfolge. Ausserdem meldeten sich zu der Prüfung im October 15 Civilstudirende, welche Ostern zurückgeblieben waren bezw. erst im April 1884 das Studium begonnen hatten; von denselben bestanden 1 sehr gut, 1 gut, 6 genügend, während 4 die Censur „ungenügend“ und 3 die Censur „schlecht“ erhielten.

Der thierärztlichen Fachprüfung unterzogen sich Ostern 1885: 58 Candidaten. Von denselben bestanden 1 sehr gut, 10 gut und 29 genügend, 2 Candidaten traten krankheitshalber, nachdem sie den ersten Prüfungsabschnitt bestanden hatten, von der Prüfung zurück, während 2 Candidaten im ersten, 13 im zweiten und 1 im dritten Prüfungsabschnitt durchfielen. Im October wiederholten von letzteren Candidaten 17 die Prüfung, von denen aber wiederum 1 Candidat im zweiten Abschnitt und 2 Candidaten im dritten Abschnitt die Censur „ungenügend“ erhielten, während die übrigen 14 die Prüfung

vollendeten. Ausserdem meldete sich im October 1 neuer Candidat zur Prüfung, welcher dieselbe auch mit der Censur „genügend“ bestand.

Bericht über die Anatomie.

Von Prof. Müller.

Im Wintersemester 1885/86 nahmen an den anatomischen Uebungen Theil: während des 1. Quartals 130 und während des 2. Quartals 215 Studirende. Unter den 130 Studirenden befinden sich 29 im Beginn des Sommersemesters 1885 aufgenommene, welche durch Theilnahme an der im Sommer für die Studirenden der landwirthschaftlichen Hochschule gehaltenen Vorlesung über Anatomie und durch osteologische Demonstrationen hinreichend genug vorbereitet worden waren, um sofort bei Beginn des Wintersemesters mit den anatomischen Uebungen beschäftigt werden zu können.

Für die Zwecke des anatomischen Unterrichts sind im Wintersemester 85 Pferde zum Gesamtpreise von 3825 Mark angekauft worden; diese Pferde wurden vor ihrer Ablieferung nach der Anatomie zu den Operationsübungen der Studirenden benutzt. Von der Abdeckerei sind als Material für die Präparirübungen bezogen worden: 79 Köpfe von Pferden, 3 Köpfe vom Rindvieh, die Cadaver von 2 Fohlen, 4 Kälbern, 4 Schafen, 3 Schweinen. Durch Ankauf im Schlachthause wurden zu demselben Zwecke beschafft: 1 Kuhkopf, 2 Magen vom Rindvieh, die Geschlechtsorgane eines Bullen, die Geschlechtsorgane einer trächtigen Kuh und einer trächtigen Sau. Ausserdem sind wie in früheren Jahren zahlreiche Cadaver von den in der Anstaltsklinik vergifteten Hunden für den anatomischen Unterricht verwerthet worden.

**Tabellarische Zusammenstellung der in der Klinik für grössere Hausthiere vom
1. April bis zum 30. September 1885 behandelten resp. untersuchten Thiere.**

Von Prof. Dieckerhoff.

Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.					
	Zahl der Pferde etc.	A u s g ä n g e.				
		geheilt	gebessert	ungeheilt	getödtet	gestorben
1. Allgemeine (infectiöse, toxische, constitutionelle, parasitäre) Krankheiten.						
Pferdestaupe	21	15	5	—	—	1
Brustseuche	85	56	13	—	1	15
Scalma	5	4	1	—	—	—
Septhämie	2	—	2	—	—	—
Blutfleckenkrankheit der Pferde	6	3	2	—	—	1
Diabetes insipidus	1	—	1	—	—	—
Druse	25	17	6	—	—	2
Kreuzrhehe (Windrhehe)	1	—	—	—	—	1
Hufrrhehe	20	5	12	2	—	1
2. Organkrankheiten.						
Krankheiten des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven.						
Hydrocephalus acutus	33	—	21	5	1	6
Tetanus	12	—	3	2	—	7
Congestion nach dem Gehirn	3	3	—	—	—	—
Lähmung des Mastdarms	1	—	1	—	—	—
Krankheiten der Haut.						
Dermatitis	7	5	2	—	—	—
Prurigo	4	1	3	—	—	—
Urticaria	2	1	1	—	—	—
Decubitus	3	2	1	—	—	—
Dermatitis und Stomatitis pustulosa	2	1	1	—	—	—
Eczema	4	—	4	—	—	—
Krankheiten der Kopf- und Halsorgane.						
Aderlassfistel	1	—	1	—	—	—
Nasenkatarrh	2	—	2	—	—	—
Luftsackkatarrh	1	—	—	1	—	—
Amyloide Geschwülste der Nase	2	1	1	—	—	—
Laryngitis	41	33	6	1	—	1
Krankheiten der Kopfhöhlen.						
Chronischer Oberkieferhöhlenkatarrh	3	1	1	1	—	—
Krankheiten der Zunge und des Kehlganges.						
Wunden an der Zunge	2	2	—	—	—	—
Latus	289	150	90	12	2	35

Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.					
	Zahl der Pferde etc.	A u s s a g e n g e.				
	geheilt	gebessert	ungeheilt	getödtet	gestorben	
Transport	289	150	90	12	2	35
Krankheiten des Schlundes, des Schlundkopfes und der Schilddrüse.						
Pharyngitis	3	3	—	—	—	—
Schlunddivertikel	1	—	—	1	—	—
Krankheiten der Zähne.						
Zahnfistel	1	1	—	—	—	—
Caries	13	8	5	—	—	—
Karpfengebiss	1	—	1	—	—	—
Periostitis alveolaris	7	4	2	1	—	—
Sonstige Zahnfehler	13	5	7	1	—	—
Krankheiten des Auges.						
Conjunctivitis	10	10	—	—	—	—
Keratitis	3	2	1	—	—	—
Entropium	1	1	—	—	—	—
Periodische Augenentzündung	1	—	—	1	—	—
Krankheiten der Brustorgane.						
Krankheiten der Bronchien, der Lungen und der Pleura.						
Bronchitis	16	9	6	—	1	—
Pneumonia gangraenosa	3	—	—	—	—	3
Pleurodynia	10	6	3	—	—	1
Pneumonia catarrhalis	6	3	3	—	—	—
Krankheiten des Herzens.						
Myocarditis septica	1	1	—	—	—	—
Insufficienz der Aortenklappen	3	—	—	3	—	—
Krankheiten der Bauchhöhle.						
Krankheiten der Leber, des Magens und Darmes.						
Gastricismus	23	18	4	—	—	1
Gastroenteritis	10	5	3	1	—	—
Kolik	114	76	13	1	—	24
Mastdarmlruptur	1	—	—	—	—	1
Leberruptur	1	—	—	—	—	1
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.						
Metritis	3	—	—	3	—	—
Hämaturie	1	—	—	1	—	—
Samenstrangfistel	7	2	5	—	—	—
Phimosis	1	—	1	—	—	—
Castrationen bei Pferden	21	20	—	—	—	1
Mastitis	2	1	1	—	—	—
			(Kuh)			
Krankheiten des Rumpfes und des Beckens.						
Abscesse	8	5	3	—	—	—
Latus	574	330	148	25	3	68

Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.					
	Zahl der Pferde etc.	A u s g ä n g e.				
		geheilt	gebessert	ungeheilt	getödtet	gestorben
Transport	574	330	148	25	3	68
Brustbeulen	5	3	1	—	1	—
Druckschäden	7	5	2	—	—	—
Quetschungen	17	4	9	4	—	—
Widerristfistel	3	1	2	—	—	—
Fistel an der Kruppe	2	1	1	—	—	—
Wunden	48	26	18	1	1	2
Beckenbruch	4	—	—	3	1	—
Bruch der Halswirbel	1	—	—	—	1	—
Bruch des äusseren Darmbeinwinkels	3	3	—	—	—	—
Papilläre Fibrome	8	6	2	—	—	—
Melanosarcome	2	1	—	1	—	—
Sarcom	1	—	—	1	—	—
Krankheiten der Vorder- und Hinterextremitäten.						
Wunden	22	12	8	—	—	2
Mauke	5	3	2	—	—	—
Stollbeule	7	4	3	—	—	—
Fistelgeschwüre	1	—	1	—	—	—
Blutextravasat	2	—	2	—	—	—
Varix	1	1	—	—	—	—
Oedem	1	—	1	—	—	—
Krankheiten der Musculatur, Sehnen und Sehenscheiden.						
Chronische Kreuzlähmung	1	—	1	—	—	—
Uebermüdung	5	5	—	—	—	—
Tendovaginitis	42	16	24	2	—	—
Entzündung des Fesselbeinbeugers .	3	2	1	—	—	—
Quetschung der Fascien am Becken	2	2	—	—	—	—
Necrose der Fascien	1	—	1	—	—	—
Hahnentritt	5	1	3	1	—	—
Ruptur des Schienbeinbeugers	1	—	—	1	—	—
Krankheiten des Periost und der Knochen.						
Exostosen	9	2	3	4	—	—
Hasenhacke	1	—	1	—	—	—
Fissur des Fesselbeins	2	—	1	1	—	—
Fractur des Armbeins	1	—	—	1	—	—
Fractur des Fesselbeins	1	—	—	1	—	—
Luxation des Caput femoris	2	—	—	2	—	—
Krankheiten der Gelenke.						
Arthritis traumatica	6	—	2	—	1	3
Arthritis deformans	1	—	—	—	1	—
Periarthritis	9	3	5	1	—	—
Gonitis	13	—	1	11	1	—
Latus	819	431	243	60	10	75

Namen der Krankheiten.	Zahl der Pferde etc.	Spitalklinik.				
		Ausgänge.				
		geheilt	gebessert	ungeheilt	getödtet	gestorben
Transport	819	431	243	60	10	75
Distorsion des Fesselgelenks	5	—	4	1	—	—
Spatlahmheit	70	28	34	8	—	—
Sprunggelenksgalle	3	—	3	—	—	—
Krankheiten des Hufes.						
Quetschung der Fleischsohle	20	13	7	—	—	—
Steingallen, einfache	37	18	19	—	—	—
Steingallen, eiternde	9	5	3	—	1	—
Hufknorpelfistel	4	1	2	1	—	—
Kronentritt	12	5	7	—	—	—
Vernagelung	6	6	—	—	—	—
Nageltritt	4	2	2	—	—	—
Strahlfäule	1	1	—	—	—	—
Hornspalten	6	2	2	2	—	—
Zwanghuf	10	—	8	2	—	—
Entzündung des Strahlpolsters	2	—	2	—	—	—
Schale	24	9	15	—	—	—
Verbällung	2	—	2	—	—	—
Krankheiten des Schweifes und Afters.						
Myotomie	3	2	1	—	—	—
Summa	1037	523	354	74	11	75

Auf Gewährsfehler wurden 394 Pferde untersucht. Davon waren behaftet mit:

Namen der Mängel.	Spital- klinik. Zahl d. Pferde.	Namen der Mängel.	Spital- klinik. Zahl d. Pferde.
Dummkoller	65	Transport	218
Kehlkopfspfeifen	49	Samenstrangfistel	1
Dämpfigkeit	23	Amaurosis	2
Stätigkeit	36	Grauer Staar	1
Spatlahmheit	16	Periodische Augenentzündung	4
Chronische Hufgelenkslahmheit	7	Untersuchung auf Alter	7
Tendinitis chronica	3	Zahnfistel	2
Schale	4	Thrombose der Schenkelarterien	2
Epilepsie	1	Leistenbruch	1
Krippensetzer	7	Nicht behaftet mit gesetzlichen Fehlern	156
Bösartigkeit	3		
Trächtigkeit	3		
Blasenlähmung	1		
Latus	218	Summa	394

General-Uebersicht.

Spitalklinik: 1. Wegen Krankheit behandelt	1037 Pferde.
2. Auf Gewährfehler untersucht	394 „
	Summa 1431 Pferde.

**Tabellarische Zusammenstellung der in der Klinik für grössere Hausthiere
(Abtheilung für innere Krankheiten) vom 1. October 1885 bis 31. März 1886
behandelten resp. untersuchten Thiere.**

Von Prof. Dieckerhoff.

Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.					
	Zahl der Pferde etc.	A u s s g ä n g e.				
		geheilt	gebessert	ungeheilt	getödtet	gestorben
1. Allgemeine (infectiöse, toxische, constitutionelle, parasitäre) Krankheiten.						
Rotz	3	—	—	—	3	—
Pferdestaupe	2	2	—	—	—	—
Brustseuche	98	73	3	1	2	19
Scalma	4	1	—	—	—	3
Blutfleckenkrankheit der Pferde	5	3	1	—	—	1
Druse	31	28	2	—	—	1
Kreuzrhehe (Windrhehe)	10	2	3	—	—	5
Räude	1	1	—	—	—	—
Chron. Lymphangitis und Lymphadenitis	1	—	1	—	—	—
Hufrehe	2	—	2	—	—	—
Diabetes insipidus	2	2	—	—	—	—
2. Organkrankheiten.						
Krankheiten des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven.						
Hydrocephalus acutus	14	—	11	1	—	2
Tetanus	4	—	2	1	—	1
Lähmung des N. facialis	2	—	1	1	—	—
Krankheiten der Haut.						
Phlegmone	7	5	2	—	—	—
Krankheiten der Kopf- und Halsorgane.						
Nasentkatarrh	5	2	3	—	—	—
Laryngitis	38	30	5	1	1	1
Stomatitis pustulosa	2	2	—	—	—	—
Krankheiten der Zähne.						
Alveolarperiostitis	1	—	—	1	—	—
Krankheiten der Brustorgane.						
Krankheiten der Bronchien, der Lungen und der Pleura.						
Bronchitis	8	6	2	—	—	—
Latus	240	157	38	6	6	33

Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.					
	Zahl der Pferde etc.	A u s s a g e n g e.				
		geheilt	gebessert	ungeheilt	getödtet	gestorben
Transport	240	157	38	6	6	33
Pneumonia gangraenosa	3	—	—	—	1	2
Pleurodynia	6	6	—	—	—	—
Pneumonia catarrhalis	7	3	—	1	1	2
Pneumonia ephemera	2	2	—	—	—	—
Lungencongestion	2	2	—	—	—	—
Krankheiten der Bauchhöhle.						
Krankheiten der Leber, des Magens und Darmes.						
Gastricismus	25	21	4	—	—	—
Gastroenteritis	1	—	—	—	—	1
Kolik	93	71	1	—	—	21
Ruptur der Leber	1	—	—	—	—	1
Proctitis	1	—	1	—	—	—
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.						
Katarrh der Harnröhre	1	1	—	—	—	—
Mastitis	2	—	2	—	—	—
Schweregeburten	2	1	—	—	—	1
Dysurie	1	—	—	1	—	—
Krankheiten des Rumpfes und des Beckens.						
Beckenbruch	6	1	—	1	—	4
Krankheiten der Musculatur, Sehnen und Sehenscheiden.						
Uebermüdung	1	1	—	—	—	—
Periarthritis	1	1	—	—	—	—
Summa	395	267	46	9	8	65

Auf Gewährsfehler wurden 270 Pferde untersucht. Davon waren behaftet mit:

Namen der Mängel.	Spitalklinik. Zahl d. Pferde.	Namen der Mängel.	Spitalklinik. Zahl d. Pferde.
Dummkoller	49	Transport	139
Kehlkopfpfeifen	29	Koppen	1
Dämpfigkeit	10	Samenstrangfistel	1
Stätigkeit	20	Amaurosis	3
Spatlahmheit	12	Grauer Staar	2
Rhehe	2	Periodische Augenentzündung .	2
Chronische Hufgelenkslahmheit	4	Untersuchung auf Alter	3
Tendinitis chronica	9	Thrombose der Schenkelarterien	1
Gonitis chronica	1	Nicht behaftet mit gesetzlichen Fehlern	118
Schale	2		
Bösartigkeit	1		
Latus	139	Summa	270

General-Uebersicht.

Spitalklinik: 1. Wegen Krankheit behandelt	395	Pferde.
2. Auf Gewährsfehler untersucht	270	"
	<u>Summa</u>	665 Pferde.

General-Uebersicht vom 1. April 1885 bis zum 31. März 1886.

1. Wegen Krankheit behandelt	1432	Pferde.
2. Auf Gewährsfehler untersucht	662	"
	<u>Summa</u>	2095 Pferde.

**Bericht der äusseren Station des Spitals für grössere Nausthiere
vom 1. October 1885 bis 31. März 1886.**

Von Prof. Dr. Möller.

Namen der Krankheiten.	A u s g ä n g e .						Summa.
	geheilt	gebessert	ungeheilt	gestorben	getödtet	unbekannt	
Krankheiten des Kopfes und des Halses.							
Wunden am Kopfe	4	—	1	—	—	—	5
Canceroid der submaxillaren Lymphdrüsen	—	—	—	1	—	—	1
Wunden der Cornea	1	1	—	—	—	—	2
Periodische Augenentzündung	—	—	1	—	—	—	1
Knochenfistel am Augenbogen	—	1	—	—	—	—	1
Knochenfistel am Unterkiefer	1	—	—	—	—	—	1
Exostose am Unterkiefer	1	—	—	—	—	—	1
Fractura spinae occipitis	1	—	—	—	—	—	1
Wunden im Maule	2	—	—	—	—	—	2
Kantiges Gebiss	4	—	—	—	—	—	4
Zu lange Zähne	3	—	—	—	—	—	3
Alveolarperiostitis	22	—	—	—	—	—	22
Zahnfistel	4	1	1	—	—	—	6
Abscess am Halse	1	—	—	—	—	—	1
Eitriger Luftsackkatarrh	—	—	1	—	—	—	1
Krankheiten des Rumpfes.							
Decubitus	—	—	1	—	—	—	1
Muskelwunden an der Brust und am Brustkorb	3	1	—	—	—	—	4
Widerristdruckschaden	6	—	1	—	—	—	7
Fibrome vor der Brust	2	—	—	—	—	—	2
Brustbeule	5	1	—	—	—	—	6
Rippenfistel	1	—	1	—	—	—	2
Latus	61	5	7	1	—	—	74

Namen der Krankheiten.	A u s g ä n g e .						Summa.
	geheilt	gebessert	ungeheilt	gestorben	getödtet	unbekannt	
Transport	61	5	7	1	—	—	74
Brustbeinfistel	—	—	2	—	—	—	2
Muskelwunden an der Kruppe . .	5	—	—	—	—	—	5
Beckenfractur	—	—	4	—	—	—	4
Mastitis acuta	2	—	—	—	—	—	2
Mastitis chron. interstit.	1	—	—	—	—	—	1
Samenstrangfistel	3	—	—	—	—	—	3
Phimosis	1	—	—	—	—	—	1
Carcinom der Glans penis	1	—	—	—	—	—	1
Stenose der Harnröhrenmündung .	1	—	—	—	—	—	1
Krankheiten der Gliedmassen.							
Phlegmone	5	—	1	—	—	—	6
Acuter Muskelrheumatismus . . .	1	—	—	—	—	—	1
Elephantiasis	—	—	1	—	—	—	1
Haut- und Muskelquetschungen . .	5	—	—	—	—	—	5
Verätzung der Haut	2	—	—	—	—	—	2
Haut- und Muskelwunden am Vorder- schenkel	11	2	—	—	—	—	13
Abscess am Vordersehenkel	—	1	—	—	—	—	1
Buglahmheit	2	2	1	—	—	—	5
Lähmung des N. radialis	1	—	—	—	—	—	1
Fractur des Condyl. ext. hum.	1	—	—	—	—	—	1
Sarcom am Armbein	1	—	—	—	—	—	1
Stollbeule	4	—	—	—	—	—	4
Eitrige Entzündung des Ellenbogen- gelenks	—	—	1	—	—	—	1
Periostitis ossif. am Vorarm	1	—	1	—	—	—	2
Periostitis supp. am Vorarm	1	—	—	—	—	—	1
Fissur am Vorarm	1	—	—	—	—	—	1
Periostitis ossif. am Metacarpus . .	4	8	1	—	—	—	13
Fractur des Metacarpus	—	—	1	—	—	—	1
Sehnentzündung	8	9	4	—	—	—	21
Sehnenscheidenentzündungen:							
Obere Sehnenscheide des Huf- beinbeugers	2	2	1	—	—	—	5
Untere Sehnenscheide des Huf- beinbeugers	7	3	—	—	—	—	10
Haut- und Muskelwunden am Hinter- schenkel	15	2	—	—	—	—	17
Abscess am Hinterschenkel	3	—	—	—	—	—	3
Bursit. troch. musc. glut. med. . . .	1	2	—	—	—	—	3
Lähmung des N. cruralis	—	—	1	—	—	—	1
Gonitis chron.	1	1	2	—	—	—	4
Gonitis supp.	—	—	1	—	—	—	1
Periostitis ossif. der Tibia	1	—	—	—	—	—	1
Fractur der Tibia	—	—	1	—	—	—	1
Latus	153	37	30	1	—	—	221

Namen der Krankheiten.	A u s g ä n g e .						Summa.
	geheilt	gebessert	ungeheilt	gestorben	getötet	unbekannt	
Transport	153	37	30	1	—	—	221
Periarthritis des Sprunggelenks .	5	—	—	—	—	—	5
Spat	14	1	3	—	—	25	43
Hahnentritt	1	—	—	—	—	1	2
Ruptur des Schienbeinbeugers . .	1	—	—	—	—	—	1
Sprunggelenkentzündung	—	—	1	—	—	—	1
Fractur des Fersenbeins	—	—	1	—	—	—	1
Piphacke	—	1	—	—	—	—	1
Gleichbeinlähme	1	—	1	—	—	—	2
Bursitis am Fesselgelenk	—	1	—	—	—	—	1
Zerreißung der äusseren Verstärkungssehne des längeren gemeinschaftlichen Zehenstreckers . .	—	—	1	—	—	—	1
Distorsion des Fesselgelenks . . .	6	6	3	—	—	—	15
Eitrige Entzündung des Fesselgelenks	—	—	1	—	—	—	1
Mauke	3	—	—	—	—	—	3
Brandmauke	—	—	—	3	—	—	3
Fistel am Fessel	1	—	—	—	—	—	1
Fissur des Fesselbeins	3	2	—	—	—	—	5
Distorsion des Kronengelenks . . .	8	3	2	—	—	—	13
Schale	13	2	4	—	—	1	20
Wunden der Krone	5	1	1	—	—	—	7
Kronentritt	12	1	1	—	—	—	14
Verknöcherung der Hufknorpel . .	—	2	—	—	—	—	2
Chronische Hufgelenkslahmheit . .	2	—	2	—	—	—	4
Eitrige Hufgelenkentzündung . .	—	—	3	—	—	—	3
Hufknorpelfistel	20	1	2	—	—	—	23
Zwanghuf	3	2	—	—	—	—	5
Hornspalte	5	2	—	—	—	—	7
Vernagelung	—	—	—	1	—	—	1
Nageltritt	4	—	4	—	—	—	8
Hufkrebs	—	—	1	—	—	—	1
Rhehe	4	—	1	—	—	—	5
Entzündung der Fleischwand . . .	1	1	—	—	—	—	2
Necrose der Fleischwand	1	—	2	—	—	—	3
Quetschung der Fleischsohle . . .	14	—	1	—	—	—	15
Steingallen	10	—	—	—	—	—	10
Eiternde Steingallen	26	3	5	—	—	—	34
Castrationen wurden an Pferden ausgeführt	—	—	—	—	—	—	17
Summa	316	66	70	5	—	27	501

Operationen wurden ausgeführt:

Namen der Operationen.	Zahl der Operationen.	Namen der Operationen.	Zahl der Operationen.
Brennen mit dem Glüheisen bei:		Transport	78
Sehnenscheidenentzündung	5	Stenose d. Harnröhrenmündung	1
Sehnentzündung	4	Samenstrangfistel	3
Bursitis	1	Periostitis supp.	1
Spat	20	Neurotomie	20
Schale	4	Tenotomie	1
Periostitis ossificans	7	Hahnentritt	2
Chronische Kniegelenkentzündung	2	Spatschnitt	15
Distorsion des Fesselgelenks	2	Nageltritt	2
Luftsackschnitt	1	Eitrige Steingalle	8
Fractura spinae occipitis	1	Neecrose der Fleischwand	2
Exostose am Unterkiefer	1	Hufknorpelfistel	15
Brustbeule	2	Fibrom	2
Zahnziehen	24	Sarcom	1
Brustbeinfistel	1	Cancroid	1
Widerristdruckschaden	1	Carcinom	1
Exstirpation des Euters	1	Castrationen bei:	
Phimosis	1	Pferden	17
		Schweinen	10
		Ziegen	1
		Summa	181
Latus	78		

Klinik für kleinere Haustiere.

Von Repetitor Lüpke.

Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.	Poliklinik.	Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.	Poliklinik.
1. Allgemeine Krankheiten.			Transport	153	1138
Staupe	151	1086	Marasmus	—	4
Tuberculose	—	29	Polysarcie	—	6
Hühnercholera	—	7	Rachitis	1	56
Hühnerdiphtherie	—	9	Rheumatismus	18	149
Vergiftung	2	7			
Latus	153	1138	Latus	172	1343

Namen der Krankheiten.			Namen der Krankheiten.		
	Spitalklinik.	Poliklinik.		Spitalklinik.	Poliklinik.
Transport	172	1343	Transport	294	2214
2. Organkrankheiten.			Epulis	3	2
Krankheiten des Nerven-			Zahncaries	1	17
systems.			Zahnfistel	—	1
Epilepsie	3	10	Pharyngitis	2	18
Krämpfe	12	67	Parotitis	1	6
Commotio cerebri	1	10	Fremdkörper im Maul	1	4
Torticollis	1	7	" " Rachen	5	4
Tetanus	2	—	" " „ Schlund	3	7
Meningitis	18	89	" " „ Darm	6	8
Lumbago acuta	2	6	Erbrechen	2	12
Hemiplegie	1	6	Gastricismus	32	165
Lähmungen	8	34	Magenkatarrh	—	43
Lähmg. d. Unterkiefers	1	5	Gastroenteritis acuta	30	192
" " N. cruralis	—	1	" " chronica	2	15
" " ischadic.	3	4	Enteritis	1	3
" " radialis	—	1	Icterus	1	6
Krankheiten der Kreis-			Mastdarmkatarrh	1	3
lauforgane.			Mastdarmvorfall	—	8
Blutextravasate	11	25	Diarrhoe	5	36
Blutungen	—	4	Verstopfung	34	145
Oedem	1	5	Tenesmus	—	1
Pericarditis	—	1	Helminthen	15	120
Herzfehler	4	6	Hernien	—	8
Lymphadenitis	—	9	Peritonitis	4	7
Krankheiten d. Athmungs-			Ascites	8	35
organe.			Entzündung der Anal-		
Nasentkatarrh	4	36	drüsen	4	28
Laryngitis	3	46	Obesitas	—	1
Bronchitis acuta	16	181	Krankheiten der Harn- und		
Bronchitis chronica	14	168	Geschlechtsorgane.		
Angina	—	2	Harnbeschwerden	—	3
Pneumonie	6	65	Hämaturie	2	1
Pleuritis	1	1	Nephritis	—	1
Lungenblutung	—	1	Prostatitis	3	—
Kehlkopfspfeifen	—	1	Gonorrhoe	—	16
Lungenemphysem	2	17	Präputialkatarrh	—	2
Asthma	—	2	Blasensteine	—	1
Hydrothorax	2	4	Harnröhrensteine	3	7
Entzündung d. Schild-			Blasenlähmung	—	4
drüse	2	—	Lähmung des Sphincter		
Struma	—	31	vesicae urinariae	—	3
Krankheiten der Verdau-			Phimosis	—	2
ungsorgane.			Castration	7	5
Stomatitis	4	25	Milchfieber	2	5
Glossitis	—	1	Scheidenkatarrh	3	8
			Endometritis	4	14
			Mastitis	3	2
Latus	294	2214	Latus	482	3183

Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.	Poliklinik.	Namen der Krankheiten.	Spitalklinik.	Poliklinik.
Transport	482	3183	Transport	775	4940
Schweregeburt	20	19	Fistel	5	17
Scheidenvorfall	2	3	Hautemphysem	—	2
Uterusvorfall	—	1	Necrose der Schwanzspitze	11	16
Leistenbruch	—	3	Decubitus	—	9
Krankheiten des Auges.			Verbrennung	1	2
Trichiasis	9	38	Verätzung	—	5
Blepharitis	1	6	Herpes	5	52
Conjunctivitis	9	131	Acarusräude	4	45
Keratitis	6	133	Sarcoptesräude	62	362
Ulcus corneae	1	2	Warzen	4	27
Iritis	—	8	Weisser Kamm der Hühner	1	—
Hyperästhesie d. Retina	—	1	Entzündung d. Bürzeldrüse	—	2
Glaucom	—	1	Ungeziefer	—	29
Hämophthalmos	—	1	Krankheiten der Muskeln, Knochen, Sehnen und Gelenke etc.		
Panophthalmie	2	3	Myositis	—	5
Staphylom	1	4	Periostitis	2	4
Dermoid der Cornea	2	2	Carionecrose	1	4
Grauer Staar	2	33	Fissur	—	2
Schwarzer Staar (Amaurosis)	1	8	Fractur	58	163
Hydrops Bulbi	—	2	Distorsion	3	25
Exophthalmos	7	6	Luxation	6	72
Wucherung des Blinzknorpels	4	11	Arthritis	3	47
Thränenfistel	—	2	Ankylose des Kiefergelenks	1	—
Krankheiten des Ohres u. des Gehörorgans.			Bandzerreissung	—	3
Taubheit	—	3	Tendovaginitis	—	1
Otitis	35	329	Bursitis	2	15
Blutohr	26	78	Panaritium	2	9
Krankheiten der Haut.			Entzündung d. Fleischwand der Krallen	1	1
Prurigo	—	95	Kleine Operationen	15	102
Urticaria	—	10	Tumoren	90	228
Psoriasis	3	5	Beobachtung auf Tollwuth	45	—
Pemphigus	2	14	Untersuchungen	8	227
Hundepocken	—	9	Zum Vergiften eingestellt	1	—
Acutes Eczem	32	193			
Chronisches Eczem	39	257			
Wunde	48	197			
Quetschung	7	53			
Phlegmone	4	11			
Abscess	28	80			
Geschwür	2	5			
			Summa	1106	6416
Latus	775	4940			

Obductionen.

Von Prof. Dr. Schütz.

Vom 1. April 1885 bis 31. März 1886 sind 193 Pferde zur Obduction gekommen. Dieselben haben an nachstehenden Krankheiten gelitten:

Krankheiten.	Summa.	Krankheiten.	Summa.
1. Infectiouskrankheiten.		Transportfangreichen, multiplen Herden (Embolien) in Leber, Nieren, Darm	109
Brustseuche (Lungen-Brustfellentzündung)	28	Tuberculosis (Kuh)	1
Druse	8	4. Krankheiten des Circulationsapparates.	
Pferdestaupe (Rothlaufseuche)	3	Verblutung bei Exstirpation einer „Brustbeule“ (Fibrom)	1
Tetanus	13	Diabetes insipidus	1
Typhus	6	Haemoglobinurie	5
Rotz	13	Ruptur des Herzens bei perforirender Brustwunde . .	1
Septicämie	5	Ruptur des Aneurysma der Arteria ileo-coeco-colica mit Verblutung in den Blinddarm	1
2. Krankheiten des Nervensystems.		Sarcoma telangiectodes (Ruptur, Verblutung in die Bauchhöhle)	1
Hydrocephalus acutus	4	5. Krankheiten des Verdauungsapparates.	
" chronicus	2	Acuter Meteorismus	1
Lähmung des Mastdarms und der Blase nach Neuritis chronica der Kreuznerven	1	Enteritis diphtherica	1
Paraplegia acuta	2	Fäcalstase	
3. Krankheiten der Respirationsorgane.		im Hüftdarm	1
Bronchopneumonia putrida	5	im Blinddarm	1
Canceroid der oberen Halsdrüsen	1	im Grimmdarm	3
Perforirende Brustwunde . .	2	durch Embolie der Blinddarmarterie	1
Pleuropneumonia fibrinosa . .	6	durch Drehung d. Grimmdarms um seine Längsaxe	5
" gangraenosa	5	durch Drehung d. Grimmdarms um seine Queraxe im Grimmdarm, Verletzg. des Mastdarms	1
Pneumonia chronica — nach Bronchitis chronica — mit bronchiectatischen Herden und ulcerösen Höhlen . .	1		2
Pneumonia gangraenosa multiplex	3		
Pneumonia embolica (gangraenosa) multiplex nach Necrose an der Huflederhaut	1		
Pneumonia dissecans (gangraenosa) centralis mit um-			
Latus	109	Latus	137

Krankheiten.	Summa.	Krankheiten.	Summa.
Transport	137	Transport	168
Fäcalstase		Strangulation des Leerdarms	
durch Straugulation des		durch Lipoma pendulans .	2
Leerdarms	2	Strangulation des Hüftdarms	
nach Darm lähmung durch		durch Lipoma pendulans .	4
Embolie (im Grimm- u.		Verwundung des Mastdarms	1
Blinddarm)	3		
Gastritis diphtheritica . . .	1	6. Krankheiten des Bewegungs-	
Incarceration des Leerdarms		apparates.	
nach Operation (Kryptor-		Arthritis purulenta	4
chide)	1	Beckenbruch	3
Partielle Necrose des Leer-		Brandige Wunde am Schenkel	
darms durch Embolie . . .	1	(getödtet)	1
Peritonitis universalis nach		Brandmauke	1
partieller Necrose der Leber		Bruch des Unterschenkel-	
(Embolie)	1	beins	1
Ruptur		Bruch der Wirbelsäule . . .	2
der Leber mit Verblutung	2	Gonitis chronica sinistra . .	1
des Grimmdarms nach		Rippenbrüche	1
Fäcalstase	10		
des Magens nach Stran-		7. Krankheiten des Urogenital-	
gulation des Leerdarms	4	apparates.	
des Magens nach Invagi-		Endometritis putrida post	
nation im Leerdarm . . .	1	partum	1
des Magens nach Fäcal-		Altersschwäche (vergiftet) .	1
stase im Grimmdarm . . .	3	Todesursache nicht festzu-	
des Mastdarms nach Fä-		stellen	2
calstase im Mastdarm . . .	1		
des Mastdarms nach Fä-			
calstase durch Periprocti-			
titis chron. adh.	1		
		Summa	193
Latus	168		

Ambulatorische Klinik.

Von Lehrer Eggeling.

In der Zeit vom 1. April 1885 bis zum 31. März 1886 sind in der ambulatorischen Klinik der Königl. Thierarzneischule in der Stadt Berlin und den benachbarten Ortschaften

360 Besuche

gemacht worden.

Es wurden in Summa untersucht und behandelt:

- a) wegen Seuchen und Herdekrankheiten:
 13 Rindviehherden,
 6 Schweineherden,
 4 Schafherden;
- b) wegen sporadischer Krankheiten:
 408 Stück Rindvieh,
 1 Schaf,
 12 Ziegen,
 41 Schweine.

Diese Krankheitsfälle vertheilen sich der Zeit ihres Vorkommens und ihrer Art nach, wie folgt:

Jahr.	M o n a t.	Z a h l der Besuche.	Seuchen und Herde- krankheiten in			Z a h l der Untersuchungs- und Behandlungsobjecte.			
			Rindvieh- herden	Schaf- herden	Schweine- herden	Rindvieh	Schafe	Ziegen	Schweine
1885	April	40	—	—	—	48	—	—	—
	Mai	37	5	—	2	33	—	2	11
	Juni	44	2	4	2	36	—	—	7
	Juli	27	1	—	—	33	—	3	5
	August	32	—	—	—	37	—	—	3
	September	21	—	—	—	29	—	2	3
	October	31	4	—	1	31	—	—	2
	November	31	—	—	1	34	—	2	6
	December	20	1	—	—	31	—	2	—
	1886	Januar	27	—	—	—	33	—	—
Februar		16	—	—	—	20	—	1	—
März		34	—	—	—	43	1	—	2
Summa		360	13	4	6	408	1	12	41

Seuchen und Herdekrankheiten.

Namen der Krankheiten.	I n		
	Rindvieh- herden	Schaf- herden	Schweine- herden
Milzbrand	3	—	—
Lungenseuche	8	—	—
Klauenseuche	—	—	2
Kuhpocken	1	—	—
Magenwurmseuche	—	1	—
Rothlauf	—	—	4
Drehkrankheit	—	1	—
Bandwurmseuche	—	1	—
Lupinose	—	1	—
Milchfehler	1	—	—
Summa	13	4	6

Einzelne Krankheitsfälle, Untersuchungen, Obductionsen und Operationen.

Bezeichnung der Krankheiten.	Stückzahl.			
	Rindvieh	Schafe	Ziegen	Schweine
Contagiöse und infectiöse Krankheiten	38	—	—	3
Vergiftungen	—	—	—	3
Parasitäre Krankheiten	1	—	—	—
Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks . .	14	—	—	—
" der Augen	1	—	—	—
" der Circulationsorgane	16	—	—	—
" der Respirationsorgane	32	—	—	2
" der Digestionsorgane	98	—	6	3
" der Harnorgane	2	—	—	—
" der Geschlechtsorgane	49	—	—	—
" des Euters	29	—	—	—
" der Knochen und Gelenke	23	—	5	6
" der Muskeln und Sehnen	7	—	—	—
" der Haut und Unterhaut	21	—	—	—
Fusskrankheiten	20	—	—	1
Neubildungen	5	—	—	—
Untersuchungen auf Gewährsfehler	12	—	—	—
Obductionsen	34	—	—	8
Operationen	3	—	—	—
Castrationen	—	—	—	14
Behandlung von Schwereburten	3	1	1	1
Summa	408	1	12	41

Ausserdem wurden gelegentlich der Reisen in der ambulato-
rischen Klinik 67 Pferde behandelt und 10 Pferde wegen Rotz-
krankheit obducirt.

XII.

Ueber die Verdauungssäfte und die Verdauung des Pferdes.

Experimentelle Untersuchungen

von

Ellenberger und V. Hofmeister.

(Schluss. — S. dies. Arch. Bd. XI, S. 381.)

IX. Schlussbetrachtung.

Unsere Untersuchungen über die Verdauung des Pferdes, deren Resultate in diesem Archiv niedergelegt worden sind und die einen Zeitraum von 5 Jahren umfassen, haben sich nicht allein auf die Verdauungssäfte und die Verdauungsvorgänge, sondern auch auf die Anatomie und Histologie der Verdauungsorgane erstreckt. In der Schlussbetrachtung werden jedoch die Resultate unserer anatomischen und histologischen Untersuchungen unberücksichtigt bleiben. Die histologischen Untersuchungsergebnisse sollen in dem Lehrbuch der Veterinär-Histologie publicirt werden. In der nachstehenden Schlussbetrachtung wird nur die Verdauung des Pferdes auf Grund unserer Untersuchungsergebnisse in kurzer Uebersicht dargestellt. Dabei wollen wir es vermeiden, auf die Einzelheiten der Experimente einzugehen und namentlich keine störenden Zahlenangaben machen. Weit entfernt davon, anzunehmen, dass wir das bearbeitete Capitel in irgend einer Richtung erschöpft hätten, glauben wir aber immerhin, eine Basis für eine rationelle Verdauungslehre des Pferdes geschaffen zu haben, auf welcher weiter gebaut werden kann. Damit wäre die Absicht unserer Untersuchungen, welche einzig und allein dies bezweckte, erreicht und unserem Bestreben, die Verdauungslehre des Pferdes nach allen Seiten experimentell und thatsächlich zu basiren, genügt. Die Verdauungsorgane dieses Thieres bieten schon

anatomisch und histologisch so viele Besonderheiten, dass eine experimentelle Erforschung der Verdauungsvorgänge desselben durchaus geboten war. Es erschien uns ungerechtfertigt, aus den Resultaten der bei Menschen, bei Hunden und Kaninchen angestellten Versuche auf die beim Pferde statthabenden Vorgänge zu schliessen. Aus diesem Grunde und nicht aus Pedanterie oder übertriebener Gründlichkeit haben wir unsere Untersuchungen auch auf scheinbar selbstverständliche Einzelheiten ausgedehnt.

Die früheren Versuche, welche zum Theil auch die Verdauungsvorgänge beim Pferde festzustellen strebten, z. B. die Experimente von Tiedemann u. Gmelin, Bidder u. Schmidt, Colin, Lassaigue u. s. w., sind zum Theil veraltet, so dass neue Forschungen dringend nöthig wurden.

In unseren Versuchsergebnissen glauben wir nicht nur eine Basis für die Verdauungslehre des Pferdes zu finden, sondern wir sind der Meinung, dass sich aus denselben auch neue Gesichtspunkte in Bezug auf die Beurtheilung der Verdauung pflanzlicher Nährstoffe beim Menschen und bei den Herbi- und Omnivoren überhaupt gewinnen lassen. So dürften z. B. unsere Versuche die frühere Lehre von der Magenverdauung erschüttert und die Grundlage für eine neue Lehre der im Magen ablaufenden Vorgänge geschaffen haben.

Bei der nachstehenden Darstellung haben wir ausser den unter obigem Titel erschienenen Artikel noch zwei weitere Artikel von uns, einen über die functionelle Bedeutung des Blinddarms der Pferde (dieses Archiv, Bd. V) und einen zur Magenverdauung (Fortschritte der Medicin, Bd. III, 1885, No. 18), und vier Artikel von Goldschmidt¹⁾, der in unserem Laboratorium und unter unserer Leitung arbeitete, benutzt.

Bei der Besprechung der Verdauung des Pferdes sind die einzelnen Perioden derselben nach einander und die in den einzelnen Regionen des Verdauungstractus in Frage kommenden Verdauungssäfte zu betrachten. Die Mechanik der Verdauung soll in der nachfolgenden Abhandlung unberücksichtigt bleiben.

Der erste für uns in Betracht kommende Act ist die während des Kauens statthabende Einspeichelung, d. h. die Durchtränkung, Durchfeuchtung und Einhüllung der Nahrungsmittel mit einer von

¹⁾ Goldschmidt: 1) Ist im Parotidenspeichel ein Ferment vorgebildet vorhanden? Zeitschr. f. physiolog. Chemie, Bd. X, Heft 4. 2) Ist das Speichelferment ein vitales oder chemisches Ferment? Ibid. 3) Enthält die Luft lebende, auf Stärke verdauend einwirkende Fermente? Ibid. 4) Die Magenverdauung des Pferdes. Ibid., Heft 5.

Drüsen, welche mit ihren Ausführungsgängen in die Mundhöhle münden, herstammenden Flüssigkeit, dem Mundspeichel.

Die Veränderungen, welche die Nahrungsmittel während der Einspeichelung und überhaupt in der Mundhöhle erleiden, werden als Mundverdauung zusammengefasst. Dieselbe besteht in mechanischer Zerkleinerung, Lösung und chemischer Umwandlung der Nahrungsmittel. Die letzteren Vorgänge beruhen auf den Eigenschaften des Speichels und event. der in der Mundhöhle vorhandenen Gährungspilze.

Die gut eingespeichelten Nahrungsmittel werden bittenweise geschlungen und gelangen so in den Magen. Nun beginnt die Magenverdauung, indem die Nahrungsmittel im Magen eine Reihe von Veränderungen erleiden, die namentlich im Löslichmachen gewisser in Wasser unlöslicher Nährstoffe bestehen. Diese Veränderungen erfolgen unter Einwirkung des abgeschluckten Speichels, des von der Magenschleimhaut producirten Magensaftes und eventuell der dort vorhandenen niederen Organismen und ihrer Secrete.

Nachdem die Nahrungsmittel im Magen mehr oder weniger bedeutende Umwandlungen durchgemacht haben, gelangen sie in den Darm und verfallen der Darmverdauung. Bei dieser kommen, abgesehen von dem aus dem Magen in den Darm hinüberbeförderten Magensaft, die Galle, der Pancreassaft, der Darmsaft und die im Darm vorhandenen Gährungs- und Fäulnisserreger in Betracht. Die Vorgänge im Darm sind nicht nur echte Verdauungs-, sondern auch Gährungs- und Fäulnisprocesse.

Während der Verdauung findet lebhaftes Resorption, d. h. Aufnahme des Gelösten und Emulgirten, in den Säftestrom des Körpers statt. Das nicht Resorbirte, Unverdaute und Unverdauliche wird per anum nach aussen entleert. Die eigentlichen Verdauungsvorgänge bestehen wesentlich im unter chemischer Umwandlung erfolgenden Löslichmachen von Stärke, Eiweisskörpern und Fetten. Im Uebrigen findet nur Zugänglichmachen und Lösung des Löslichen statt.

Aus vorstehender Uebersicht ergibt sich, welche Vorgänge und Säfte wir nachstehend einer Betrachtung zu unterziehen haben. Die Vorgänge sind: Einspeichelung, Mund-, Magen-, Darmverdauung, Gährungs- und Fäulnisvorgänge, Resorption; die Säfte sind: Speichel, Magen- und Darmsaft, Galle und Bauchspeichel. Zum Schluss ist dann ein Blick auf die Bestandtheile der Excremente zu werfen.

A. Die Mundverdauung.

1. Die Einspeichelung. — Um die oft rauhen und trockenen Nahrungsmittel schlüpfrig und schlingbar zu machen, ergiessen die Mundhöhlendrüsen während des Kauens ein flüssiges, aber zähes und schleimreiches Secret in die Mundhöhle, welches durch die Bewegungen der Kiefer, der Zunge, der Wangen etc. mit den Nahrungsmitteln gründlich gemischt wird und dieselben förmlich einhüllt.

Die Menge des bei dem Kauen secernirten Speichels ist verschieden je nach der Natur, der Trockenheit, Rauhigkeit u. s. w. der Nahrung. Die von uns in dieser Richtung angestellten Versuche ergeben, dass bei dem Genusse von Heu die vierfache Gewichtsmenge desselben an Speichel während des Kauens abgesondert wird (bei 500 Grm. Heu ca. 2000 Grm. Speichel), während bei Genuss von Hafer und Häcksel nur etwa die doppelte Gewichtsmenge (bei 470 Grm. hiervon ca. 900 Grm. Speichel) und beim Genusse von Gras nur die Hälfte seines eigenen Gewichts an Speichel (bei 500 Grm. Gras 320 Grm. Speichel) erfordert wird. Die dem Vorstehenden entgegenstehenden Angaben Colin's, welcher behauptet, dass beim Kauen von Hafer mehr Speichel secernirt wird als bei dem von Heu, dürften auf einem Versehen beruhen, wobei allerdings auch in Berücksichtigung gezogen werden muss, dass wir nicht Hafer allein, sondern Hafer mit Häcksel verabfolgt und dabei das genannte Resultat erzielt haben. Lassaigue hat bei seinen Versuchen Resultate erhalten, welche den unseren ähnlich sind.

Unser Versuchsergebnis bestätigt die Regel, dass sich die Menge des ergossenen Speichels nach der Natur, speciell nach der Trockenheit und Rauhigkeit der Nahrung, nicht aber nach ihrem Stärkemehlgehalt richtet, und dass sie um so grösser ist, je rauher und trockener die Nahrung ist, gleichgültig, ob dieselbe viel oder wenig Amylum enthält. Kommt dazu noch, dass die Speicheldrüsen bei denjenigen Thieren, welche rauhe und trockene Nahrung geniessen, sehr entwickelt, während sie bei den von weicher und wasserreicher Nahrung lebenden nur klein sind und bei den im Wasser lebenden Thieren sogar ganz fehlen und nur durch unbedeutende Schleimdrüsen vertreten sind, dann liegt der Schluss nahe, dass der Speichel eine hervorragend mechanische Bedeutung hat

und wesentlich zum Durchfeuchten und Schlüpfzig- resp. Schlingbarmachen der Nahrung dient.

Was die Secretionskraft der einzelnen grösseren Speicheldrüsen anlangt, so wird diese durch nachfolgende Zahlen, die wir als das Resultat bereits besprochener und neuerer noch nicht publicirter Versuche erhalten haben, illustriert:

Die Parotis einer Seite secretirte z. B. bei einem Pferde in $\frac{1}{2}$, bei einem anderen in $\frac{1}{4}$ Stunde 1000 Grm., bei einem dritten in 2 Stunden 4000, bei einem vierten in derselben Zeit nur 2000, bei einem fünften in 3 Stunden 3000, bei einem sechsten in 4 Stunden 8000 Grm. Da anzunehmen ist, dass die Parotis der anderen Seite in derselben Zeit eine gleiche Quantität absondert, so würden die genannten Zahlen zu verdoppeln sein, wenn man sich die Secretionskraft beider Parotiden vorstellen will. Das 6. Pferd hätte demnach in 4 Stunden (beim Kauen von Hafer, Häcksel und Heu) aus beiden Parotiden 16 Liter Speichel geliefert.

Die Submaxillaris einer Seite ergab bei einem Pferde während einer Mahlzeit 160, bei einem zweiten 360, bei einem dritten 500 Grm.

Bei künstlicher Anregung zum Speicheln wurden sehr verschiedene Quantitäten gemischten Speichels gewonnen und haben diese Zahlen kein Interesse.

2. Der Speichel. — Das Gemisch der Secrete aller Drüsen, welche mit ihren Ausführungsgängen in die Mundhöhle münden, stellt die Mundflüssigkeit resp. den gemischten Speichel dar. Diese Flüssigkeit reagirt alkalisch, enthält 98—99 pCt. Wasser, nur geringe Mengen fester Stoffe und hat ein specif. Gewicht von 1,004. Unter den in demselben enthaltenen Salzen wiegt das Chlornatrium vor. Bemerkenswerth ist auch die Gegenwart von kohlsaurem Kalk. Von organischen Bestandtheilen sind verschiedene Arten von Eiweisskörpern vorhanden, worunter auch die Hemialbumose und Mucin zu erwähnen sind. Das im menschlichen Speichel vorhandene Rhodankalium fehlt im Pferdespeichel.

Der Pferdespeichel wandelt sowohl Kleister wie auch rohe Stärke nach einiger Zeit in lösliche Kohlehydrate, vor allen Dingen in Zucker (Ptyalose) um. Die Umwandlung erfolgt bei Kleister schon nach $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$, bei roher Stärke nach einigen Minuten. Ausserdem invertirt der Speichel Rohrzucker, beeinflusst aber Eiweisskörper, Oele, Fette und Cellulose nur wenig oder nicht. Fette kann er (als alkalische Flüssigkeit) etwas emulgiren. Im Magen kann

er letztere Wirkung aber nicht entfalten, weil dort Säure zugegen ist.

Die einzelnen Speichelarten. a) Das Secret der Parotis ist schleimfrei, aber sehr reich an kohlensaurem Kalk, welcher bei Gegenwart überschüssiger CO_2 als saurer kohlenaurer Kalk im gelösten Zustande in dem Speichel vorkommt. Beim Stehen an der Luft entweicht Kohlensäure, und es fällt unlöslicher kohlenaurer Kalk aus. Zuleitung von Kohlensäure wirkt klärend, Erwärmen trübend auf den Speichel ein. Controlversuche mit künstlichen Gemischen aus Natrium bicarbonicum und kohlensaurem Kalk bestätigen die Richtigkeit unserer Vorstellung vom Zustandekommen der Trübung des Speichels. Er trübt sich nicht, wie man früher annahm, weil Kohlensäure zu ihm tritt und das in ihm enthaltene Kalkhydrat in kohlenaurer Kalk umwandelt, sondern er trübt sich, weil Kohlensäure entweicht. Die Zeit des Eintritts der Trübung ist wechselnd und scheint es, als ob bei verschiedenen Thieren und unter verschiedenen Verhältnissen die Kohlensäure verschieden fest gebunden sei.

Das saccharificirende Vermögen des Parotidenspeichels ist unbedeutend. Er hat auch ein, aber sehr geringgradiges, peptonisirendes Vermögen auf Eiweisskörper.

b) Die Secrete aller anderen Munddrüsen enthalten Mucin; das Secret der Backen- und namentlich der Lippendrüsen besitzt aber nur einen geringen Mucingehalt. Der Gehalt an kohlensaurem Kalk ist bei allen diesen Secreten geringer als beim Parotidenspeichel. Kein Secret enthält Rhodankalium. Sie wirken sämmtlich diastatisch auf Kleister ein; ihr amylolytisches Vermögen ist aber unbedeutend. Dabei ist zu bemerken, dass die ausgeruhten Drüsen einen stärker verdauenden Speichel liefern als die ermüdeten Drüsen, und dass der zu Beginn der Secretion (resp. des Kauens) gelieferte Speichel bedeutend wirksamer ist als der später gewonnene.

Interessant und zunächst unerklärlich ist die im Vorstehenden markirte Thatsache, dass die einzelnen unvermischten Secrete aller Speicheldrüsen des Pferdes nur schwach auf Kleister einwirken, während die gemischte Mundflüssigkeit, wie sie beim Kauen erhalten wird, stark diastatisch wirkt. Die einfache Mischung multiplicirt, wie unsere Versuche darthun, die Wirkung nicht in der Weise, dass sich daraus die bedeutende Wirksamkeit des gemischten Speichels erklären liesse. Woher kommt also die stark diastatische Wirkung des gemischten Pferdespeichels? Ist es die Ein-

wirkung der Luft, sind es lebende Keime derselben? sind es Keime, welche in der Mundhöhle sich befinden und dort wuchern? oder was ist es sonst, was diesem Speichel das amylytische, namentlich bei der Magenverdauung hervortretende Vermögen verleiht? Eine Lösung dieser Fragen haben wir noch nicht finden können, sind aber mit Versuchen beschäftigt, welche diese Lösung bezwecken¹⁾. Soviel steht aber schon jetzt fest, dass sich in der Luft Keime befinden, welche diastatisch auf Stärke wirken, dass sich diese auch in der Mundhöhle ansiedeln und unwirksamen Speichel wirksam machen können.

3. Die Mundverdauung. — Wenn wir unter Verdauung fermentative und chemische Vorgänge verstehen, durch welche unlösliche Nährstoffe löslich gemacht werden, dann kann beim Pferde von einer Mundverdauung keine Rede sein. Der Kau- und Schlingprocess erfordern eine so kurze Zeit, dass in derselben die gedachten Vorgänge gar nicht oder wenigstens nicht erheblich statthaben können. Dies bewiesen unsere Versuche, welche darthaten, dass das aus dem Schlunde aufgefangene, normaliter gekaute und eingespeichelte Futter keine nennenswerthen Mengen von Verdauungsproducten direct enthielt. Es geht dies aber auch aus folgenden Thatsachen hervor: Die Umwandlung von roher Stärke durch gemischten Pferdespeichel erfolgt auch erst nach ca. 2 Minuten, während die von Kleister schon nach 15 bis 30 Secunden eintritt. Die Pferde erhalten aber bekanntlich in der Regel nur rohe Stärke.

Dass beim Kauen und Einspeicheln Nährstoffe zugänglich, lösliche gelöst, und dass das Futter für die weitere Verdauung vortheilhaft vorbereitet wird, ist selbstverständlich. In diesem Sinne kann man von einer Mundverdauung sprechen.

B. Die Magenverdauung.

Bei der Magenverdauung kommen als verdauende Secrete in Betracht: der Speichel und das Secret des Magens, der Magensaft.

1. Der Speichel. — Die Eigenschaften des Speichels sind vorher schon erwähnt worden. Da aber, wie wir im Voraus bemerken, der Magensaft und Mageninhalt sauer reagirt, die gewöhnliche Speichelwirkung aber bei alkalischer Reaction abläuft, so blieb die Frage zu lösen,

¹⁾ Beim Druck des Artikels können wir constatiren, dass die Lösung der Frage erfolgt ist, worüber in einem Sonderartikel berichtet wird.

ob der Speichel auch in Gegenwart von Säuren zu wirken vermag. Die in dieser Richtung angestellten Versuche haben ergeben, dass die Speichelwirkung bei niederen Säuregraden noch statthaben kann, bei stärkerer Säureconcentration aber aufgehoben wird. Salzsäure hebt schon bei 0,03—0,04 proc. Concentration die Speichelwirkung auf, während dies die Milchsäure erst bei 0,5 pCt. thut. Demnach kann im Magen der Speichel seine Wirkung so lange auf Stärke entfalten, als die genannten Säuregrade nicht überschritten werden. Sobald dies eintritt, erlöscht die Wirkung des diastatischen Ferments. Bemerkenswerth ist noch, dass die Säuren die Speichelwirkung in wässerigen Flüssigkeiten früher stören als in dem schleimigen Magensaft.

2. Der Magensaft. — a) Die Secretion desselben. Der Magensaft des Pferdes wird von der Drüsenabtheilung der Schleimhaut des Magens producirt. Der Schlundsack (Vormagen) ist an der Magensaftproduction nicht betheiligt. Die Drüsenportion producirt nicht an allen Partien mit gleicher Energie. Da, wo sich nur Hauptzelldrüsen (Pylorusdrüsen, Schleimdrüsen) finden, — es ist dies an der kleinen Curvatur, in der nächsten Umgebung des Margo plicatus und im Antrum pyloricum der Fall, — wird nur wenig wirksamer Magensaft gebildet. Der hier producirte Saft ist arm an Fermenten und enthält keine Salzsäure. Ob diese Bestandtheile normaliter überhaupt hier gebildet werden, ist zweifelhaft. Die eigentliche Quelle des Magensaftes ist in der kleinen Abtheilung der Schleimhaut zu suchen, welche die Belagzelldrüsen (Fundusdrüsen, Labdrüsen) enthält, verhältnissmässig dick und blutreich ist und nur eine Fläche von ca. 2 Handbreiten umfasst. Diese Drüsen sind die eigentlichen Magensaftproducenten, wie sich aus unseren zahlreichen Versuchen zweifellos ergibt. Wir wollen keineswegs bestreiten, dass auch in den Pylorus- und Cardiadrüsen (Hauptzelldrüsen) Pepsin producirt werden kann und dass dieselben vicariirend für die Belagzelldrüsen eintreten können. Wir sind aber der festen Ueberzeugung, dass bei gesunden Pferden unter normalen Verhältnissen von den Hauptzelldrüsen nur sehr wenig Ferment und gar keine Säure producirt wird.

Das Extract der Schleimhaut der Fundusdrüsenregion enthält mehr Säure und mehr Fermente, mehr Pepton, mehr Syntonin und Hemialbumose und merkwürdigerweise meist auch mehr Mucin, als das der Pylorusdrüsenregion. Die Ferment- und Säuremengen, welche man in der letzteren Schleimhaut findet, können vielleicht als

in der ersteren Region producirt und von letzterer imbibirt angesehen werden, wofür auch die Thatsache spricht, dass das Extract der cutanen Schleimhaut des Schlundsackes imbibirte Fermente und imbibirte Säuren (Milch- und Salzsäure), wenn auch in sehr geringer Menge, enthält.

Da die angestellten Versuche ergaben, dass die sogen. Fundusdrüsen des Pferdes enorm viel mehr Pepsin enthalten, als dessen Schleim- oder Pylorusdrüsen, und da man aus bekannten Gründen schliessen kann: wo das meiste Pepsin in der todten Schleimhaut angetroffen wird, da wird intra vitam am meisten producirt, so können wir zunächst den Satz als sicher hinstellen, dass die Labdrüsen des Pferdes bedeutend mehr Pepsin produciren, als dessen Schleimdrüsen.

Eine noch zu lösende Frage ist aber: produciren die Schleimdrüsen überhaupt Pepsin, oder wird dies von den Labdrüsen allein geliefert?

Die ersteren enthalten zweifellos im todten Zustande Pepsin. Dieses kann hier producirt worden sein; es ist aber auch möglich, dass es in der anderen Schleimhautregion gebildet und hier nur imbibirt wurde (v. Wittich).

Es ist klar, dass das Pepsin sich mehr in den oberflächlichen Regionen der Schleimhaut befindet, wenn es imbibirt, dass es dagegen in den tieferen Drüsen resp. Schleimhautpartien sitzt, wenn es daselbst von den Hauptzellen producirt worden ist.

Ein Vergleich der Extracte der oberflächlichen und tieferen Drüsenpartien unter einander und resp. noch des Schleimbelags der *Curv. minor* musste also die Lösung obiger Frage bringen.

Aus den Ergebnissen unserer Versuche ist mit Sicherheit zu folgern, dass in den tieferen Schichten der *Curv. minor* resp. des Antrum pylorici kein oder nur verschwindende Mengen Pepsin enthalten sind, während die oberflächlichen Partien und der dieselben bedeckende Schleim nicht unbedeutende Pepsinmengen enthält. Reich an Pepsin ist die Schleimhaut der *Curv. major in toto*, die tieferen Theile scheinen aber reicher zu sein als die oberflächlichen. Aus diesen Thatsachen ergibt sich, dass das in der Schleimdrüsengegend des Pferdemagens vorhandene Pepsin daselbst wahrscheinlich nicht producirt worden ist. Das im Schleim und den Drüsen vorhandene Ferment ist durch Imbibition aufgenommen worden.

Fassen wir die Resultate der angeführten Untersuchungen zusammen, so müssen wir als den Ort der Pepsinbildung die dem Fundus der einfachen Mägen entsprechende Schleimhautpartie des Pferdemagens, d. h. die Labdrüsengegend oder die Belagzellregion desselben bezeichnen. Beim Pferde kommen in den Drüsen der Fundusregion verhältnissmässig nur wenig Hauptzellen vor; die dunklen, stark gekörnten sogen. Labzellen überwiegen derart, dass die Hauptzellen im Pferdemagen leicht übersehen werden können. Da nun das Pepsin im Pferdemagen wesentlich in der Fundusregion gebildet wird, so müssen die grossen dunklen, stark gekörnten Zellen in Beziehungen zur Pepsinbildung stehen. Ein sehr wohl zu beachtender Beweis für die Bildung des Pepsin in der Fundusregion ist die Thatsache, dass die Schleim-

haut dieser Region resp. ihr Extract reich an Pepton ist, während das Extract der Pylorusregion kein oder wenig Pepton enthält, welche Thatsache auf eine grössere Selbstverdauung in der Fundusdrüsenregion hinweist.

Es folgt aber aus unseren Untersuchungsergebnissen auch, dass die Hauptzellen der Labdrüsenregion den Drüsenzellen der Schleimdrüsenregion nicht gleich zu erachten sind. Die ersteren scheinen Vorstufen der Belagzellen zu sein; die letzteren dagegen gehen für gewöhnlich nicht in Belagzellen über. Ob sie unter Umständen, namentlich wenn die Schleimhaut der Labdrüsenregion ausser Function gesetzt wird, sich zu adaptiren und sich zu Pepsinbildnern oder zu Belagzellen umzuwandeln vermögen, wissen wir nicht; es scheint uns dies aber nicht unwahrscheinlich. Ob bei der Verdauung Drüsenzellen zu Grunde gehen, wagen wir nicht zu entscheiden, da wir lebende Magenschleimhaut nicht untersucht haben. In der todten Schleimhaut finden sich stets zerstörte Zellen, freie Kerne, Zellenstücke, Lücken, veranlasst durch ausgefallene Zellen u. s. w. Namentlich sind die Hauptzellen zerstört; die Belagzellen scheinen resistenter zu sein.

Diese Erscheinung von zu Grunde gegangenen Hauptzellen kann postmortaler Natur sein; sie beweist keineswegs, dass intra vitam dieselben Zerstörungen stattfinden, und dass etwa die zu Grunde gehenden, sich dem Secret beimischenden Zellen diesem das Ferment liefern. Es ist möglich, dass diese Vorgänge statthaben, und dass durch Theilungsvorgänge der Belagzellen fortwährend neue Hauptzellen gebildet werden. Von den Tochterzellen bilden sich die einen durch Wachsthum zu neuen Mutterzellen (Belagzellen) aus, während die anderen bei der Secretion zu Grunde gehen u. s. w. Einige Forscher huldigen in neuester Zeit ähnlichen Anschauungen. Wir wagen wegen mangelnder exacter Untersuchungen kein Urtheil in dieser Frage zu fällen.

Wie das Pepsin scheinen auch die andern Fermente des Magensaftes in der Labdrüsenregion producirt zu werden.

Ueber die Aenderung des Pepsingehalts der Schleimhaut in den verschiedenen Verdauungsperioden wurden genaue Versuche angestellt.

Dieselben führten rücksichtlich der Fundusdrüsen Schleimhaut zu den Resultaten, dass die Schleimhaut der Belagzellenregion im ruhenden, leeren Magen reich an Pepsin ist, dass in den ersten Stunden der Digestion eine nicht unbedeutende Verminderung des Pepsingehalts eintritt, während im weiteren Verlauf der Verdauung sich wieder eine wesentliche Steigerung bemerklich macht. Offenbar geben die Drüsen im Beginn der Verdauung mehr Pepsin ab als sie bilden, dadurch erklärt sich die anfängliche Verminderung des Pepsingehalts.

Rücksichtlich der Pylorusdrüsen Schleimhaut wurde ermittelt: dass diese auf der Höhe und unmittelbar nach der Verdauung Pepsin

in geringen Mengen enthält, dagegen in den ersten Verdauungsstunden fast kein Ferment.

Diese Untersuchungsergebnisse sprechen ganz und gar für unsere Anschauung, dass das in der Pylorusregion vorhandene Pepsin nur imbibirt ist. In den ersten Verdauungsstadien ist der Mageninhalt so arm an Pepsin u. s. w., dass eine Imbibition desselben nicht stattfinden kann. Das in den oberen Drüsenpartien noch vorhandene Pepsin wird von den Nahrungsmitteln aufgenommen und von den arbeitenden Drüsenzellen ausgestossen. So kommt es, dass die Schleimhaut pepsinfrei wird, Tödtet man jetzt das Pferd, so findet man in der Schleimhaut kein oder wenig Pepsin; die postmortale Pepsinimbibition unterbleibt, weil der Mageninhalt nur wenig Pepsin enthält. Später sammelt sich das von den Labdrüsen fortwährend gebildete Pepsin im Magen an, die Schleimhaut imbibirt sich entweder schon *intra vitam* oder *postmortal*, denn der Mageninhalt eines 7 oder 12 Stunden *post coenam* getödteten Pferdes enthält viel Pepsin; dieses kann also leicht imbibirt sein. Das Pepsin der Magenschleimhaut ist theilweise durch Glycerin, Wasser etc., theilweise aber nur durch Säuren und Kochsalz extrahirbar.

Die entzündete Magenschleimhaut und diejenige fiebernder und anämischer Thiere enthält je nach dem Grade dieser Krankheit wenig oder kein Ferment.

Die Drüsenzellen ändern ihr Aussehen während der Verdauung.

b) Eigenschaften des Magensaftes ¹⁾. Fast ganz reinen Magensaft findet man nur gegen Ende der Verdauung bei fast leerem Magen. Derselbe ist wasserklar, farblos, reagirt stark sauer, enthält etwas Mucin etc.; sein Säuregrad beträgt 0,2 pCt., die Säure besteht aus Salzsäure und Spuren von Milchsäure. Der Pferdema-gensaft hat demnach einen entschieden geringeren Säuregehalt, als der Carnivoren-Magensaft. Im Uebrigen ergeben sich aus den Eigenschaften der Drüsenextracte die des Magensaftes; diese enthalten Mucin, Salzsäure, Milchsäure, verschiedene Albuminate (Propepton, Syntonin, Albumin etc.), Salze etc.

Die Drüsen-schleimhaut des Magens enthält sowohl Salz- als Milchsäure. Der Säuregrad scheint 0,04 pCt. kaum zu übersteigen.

Im Pferdema-gensaft resp. dem Fundusdrüsenextract findet sich ein sehr wirksames proteolytisches Ferment, welches alle Eiweisskörper (Casein, Fibrine, Albumine) in Pepton und den Leim in der Weise umwandelt, dass derselbe leicht diffusibel wird und seine Gelatinirbarkeit verliert.

¹⁾ Wir verstehen darunter nicht die durch Ausdrücken und Filtriren des Mageninhalts zu gewinnende Magenflüssigkeit, sondern den reinen Magensaft resp. das Extract der Magenschleimhaut.

Das Ferment ist sehr schwer diffusibel in Wasser, Glycerin, leicht in Salz-, Säure- und Alkalilösungen löslich, durch Alkohol, Bleizucker, kohlensaurer Magnesia u. s. w. fällbar. Es wirkt nur in Gegenwart von Säuren proteolytisch; es wird durch Fäulnis- und Alkoholgährung zwar zerstört, widersteht aber lange; die Milchsäuregährung beeinträchtigt das Ferment in seiner Wirkung nicht, wenn nicht die Milchsäureconcentration einen sehr hohen Grad erreicht. Die proteolytische Wirkung erfolgt am besten bei Gegenwart einer 0,15—0,5 proc. Salzsäure. Die Salzsäure ist durch organische Säuren gleicher Concentration nicht ersetzbar. Erst eine 2 proc. Milchsäure leistet nahezu dasselbe, wie eine 0,2 proc. HCl. Die Milchsäure kann aber die Salzsäure in ihren Wirkungen unterstützen, so dass eine 0,1 proc. und noch schwächere Salzsäure bei Gegenwart von einer 0,1—0,5 proc. Milchsäure ebenso gut wirkt wie die 0,2 proc. HCl.

Zu viel Säure beeinträchtigt die Pepsinwirkung ebenso wie zu wenig Säure. Während bei Gegenwart einer 0,05 proc. HCl das Pepsin gar nicht und bei 0,1 proc. nur unvollkommen wirkt, tritt auch schon durch eine 0,6 proc. HCl eine Beeinträchtigung der Pepsinwirkung ein. Viel Milchsäure im Magen stört die Magenverdaung ebenfalls und veranlasst durch Reizung der Magenschleimhaut Magenkatarrhe.

Das Pepsin muss in gewissen Mengen in der verdauenden Flüssigkeit sein, um wirken zu können. Seine Wirksamkeit steigert sich mit der Zunahme seiner Menge bis zu einem gewissen Grade. Eine weitere Steigerung des Pepsingehalts ist nutzlos, ja sogar schädlich.

Das Pepsin wirkt nur in Gegenwart von Wasser und am besten bei einer Temperatur von 37—55° C. Steigerung und Sinken der Temperatur bewirkt Störungen. Steigt die Temperatur über 60°, dann wird das Pepsin wirkungslos. Gekochter Magensaft verdaut nicht. Das Pepsin verdaut sich nicht selbst, oder wenigstens ausserordentlich langsam.

Der reine Pferdemaßensaft enthält ein Lab-, Milchsäure-, Fett- und Stärkeferment, die letzteren beiden aber in so unbedeutender Menge, dass sie nicht in Betracht kommen. Diese Fermente sind sämtlich durch Alkohol fällbar. Das Labferment ist schwer oder nicht diffusibel, die anderen Fermente dagegen sind diffusibel.

Der Pferdemaßensaft verdaut die Cellulose nicht.

Derselbe verdaut dagegen Bindegewebe, Fettgewebe, Knorpel, Fleisch leicht. Knochen und elastisches Gewebe werden von demselben auch verdaut, aber langsamer, schwerer. Horngewebe wird vom Pferdemaßensaft nur wenig angegriffen.

Die Schleimhaut der Portio cardiaca des Pferdemaßens enthält nur Spuren eines proteolytischen Ferments und geringe Mengen von Säure. Da diese Schleimhaut von mehrschichtigem Plattenepithel bedeckt ist und weder Drüsen noch Follikel enthält, müssen diese Stoffe als imbibirt angesehen werden.

Pepsinlösungen resp. Extracte der Magenschleimhaut können in schwacher Carbol- oder Salicylsäurelösung oder in einfachem Glycerin lange Zeit aufbewahrt werden, ohne an ihrer Wirksamkeit einzubüßen.

Die vorstehend notirten Ergebnisse unserer Versuche zu b) sind auch vom praktischen Standpunkte betrachtet vielfach interessant:

Wir fanden, dass die entzündete Schleimhaut wenig oder keine Fermente producirt, und dass bei fieberhaften Leiden wenig oder keine Säure abgesondert wird.

Diese Thatsachen sind wichtig bezüglich der Behandlung von Thieren, die an Magenkatarrhen und an fieberhaften Krankheiten leiden. Wir müssen es den Klinikern überlassen, die praktischen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

Auch die von uns constatirte Thatsache, dass der Pferdemagensaft Sehnen, Leim, elastisches Gewebe, Bindegewebe, Fleisch u. dgl. verdauen kann, lässt sich zu Zeiten des Futtermangels praktisch verwerthen.

Sodann geben unsere Untersuchungen die Methode der Bereitung des Pepsin aus dem Pferdemagen und die Art und Weise, wie man dasselbe aufheben und in seiner vollen Wirksamkeit conserviren kann, dem praktischen Thierarzt an die Hand, die für ihn von Bedeutung ist, da das Pepsin als Heilmittel benutzt wird. Auch muss der Thierarzt wissen, dass die Zufuhr von grossen Pepsinmengen den Thieren gar keinen Vortheil, sondern sogar Nachtheil bringt, und dass es sich mit der Salzsäure ebenso verhält. Die Verdauungskraft des Magensaftes steigt nicht mit der Menge des Pepsin und der HCl, sondern nimmt bei dem Zuviel beider Körper entschieden ab. Ferner ist zu beachten, dass die Salicyl- und Carbolsäure in medicamentösen Gaben verabreicht die Magenverdauung nicht beeinträchtigen.

3. Die Beschaffenheit des Mageninhalts. — Der Mageninhalt stellt bei Haferfutter meist eine verhältnissmässig trockene, krümelige Masse von 60—70 pCt. Wassergehalt dar; bei Heufütterung ist derselbe etwas feuchter und enthält 75—80 pCt. Wasser.

Er reagirt unter normalen Verhältnissen stets deutlich sauer und enthält Milch- und Salzsäure, unter Umständen auch Essig- und Buttersäure.

Der Säuregehalt des Saftes des Mageninhalts (auf HCl berechnet) übersteigt selten 0,2 pCt. oder 2 pMl. Unmittelbar nach dem Fressen ist er am niedrigsten (0,05 pCt.), er steigt dann allmählich auf 0,2, ja 0,3 pCt. Er enthält stets ein proteolytisches und ein amylytisches, wie auch ein Milchsäure- und ein Labferment.

Besonders bemerkenswerth ist, dass ein Unterschied der Säureverhältnisse zwischen den einzelnen Abtheilungen des Pferdemagens besteht. Namentlich deutlich tritt dieser Unterschied zu Anfang der Verdauung hervor. Wie lange derselbe besteht und wie hochgradig er ist, hängt wesentlich von der Menge und Trockenheit der genossenen Futtermassen und der Energie der Verdauung ab.

In dem reichlich mit trockenen Inhaltmassen gefüllten Magen währt die Scheidung längere Zeit. Anfangs bezieht sich dieselbe sowohl auf die Concentration als auch auf die Natur der Säure, später nur auf die letztere. Im Schlundsack herrscht die Milch-, im Darmsack die Salzsäure vor. Zu Anfang der Verdaunung ist der Inhalt des Schlundsackes alkalisch, bald erscheint er neutral und dann sauer, letzteres in Folge der sehr reichlichen Umwandlung der Verdaunungsproducte der Stärke in Milchsäure. Es kommt zuweilen, namentlich bei stark gefülltem Magen und träger Verdaunung zu einem sehr bedeutenden Milchsäuregrade (1—1,5 pCt.). Der Säuregrad kann im Schlundsack entschieden höher als rechts sein und herrscht in dieser Richtung keine Constanz; im Antrum pylori ist der Säuregrad meist geringer als in dem Schlundsack und als an der grossen Curvatur und den Flächen. In späteren Verdaunungsstunden tritt auch links etwas HCl auf in Folge von Diffusion der Säuren; je wasserreicher der Inhalt ist, um so rascher wird dies eintreten. Im Darmsack tritt gleich zu Beginn der Verdaunung HCl auf; ihre Menge steigt während der Verdaunung; ihr ist stets Milchsäure beigemischt, aber weniger als links, weil sie die Milchsäuregährung hindert.

Dieser Unterschied in den Säureverhältnissen der Inhaltmassen beider Magenabtheilungen ist, ebenso wie die Thatsache, dass in den ersten Verdaunungsstunden die Säuremenge, namentlich die Menge der Salzsäure, eine nur unbedeutende bleibt, von grosser Bedeutung.

Man halte als Wesentliches fest:

Die Säure des Pferdemagens ist zu Anfang der Verdaunung organischer Natur; es ist Milchsäure. Später tritt auch Salzsäure auf. Erstere fehlt aber niemals und ist während der ganzen Verdaunung vorhanden. Bei Haferfutter ist sie reichlicher als bei Heufütterung, bei welcher letzterer die Salzsäurebildung im Magen vorherrscht. Mit dem Ansteigen des Salzsäuregehalts sinkt der Milchsäuregehalt. Man findet also zunächst wenig, dann sehr viel Milchsäure und wenig Salzsäure, später mehr Salz- und weniger Milchsäure¹⁾.

¹⁾ Der Anschauung, dass die Milchsäuremenge im Magen dadurch vermindert werde, dass bei Gegenwart von Chloriden Salzsäure gebildet und Milchsäure durch die Alkalien neutralisirt werde, vermögen wir uns nicht anzuschliessen. Ueberhaupt stimmen wir auch nicht der Vorstellung bei, nach welcher die Salzsäure des Magensaftes durch Einwirkung der Milchsäure auf Chloride entsteht. Milchsäure und Chloride sind im Magen stets in grossen Mengen und überall vorhanden; Salzsäure entsteht aber nur an ganz beschränkten Stellen des

Die Natur der Säure ist durch das Verhalten der Anilinfarben, der Weinfarben, des Carboleisens (Carbolsäure, Eisentinctur und Wasser), des Tropäolins und des Aethers gegen organische und unorganische Säuren sicher nachweisbar.

Auch gelingt dies durch Prüfung des Verhaltens der betreffenden Flüssigkeit zum diastatischen Ferment auf Grund der Thatsache, dass anorganische Säuren die Verzuckerung der Stärke durch Ptyalin schon bei 0,02 proc. Concentration aufheben, während dies organische erst bei 0,4 proc. thun.

Auch nach der bekannten Methode der Chlorbestimmung von C. Schmidt lässt sich das Vorkommen der Salzsäure im Pferdewagen ebenso bestimmt darthun, wie das der Milchsäure durch Darstellung des Zinklactat.

Wir haben durch Bestimmung des Salzsäuregehalts einerseits und des Säuregrades andererseits mit absoluter Sicherheit die Gegenwart der Milchsäure nachgewiesen. Weiter aber wurde auch durch die Darstellung des Zinklactat und durch die obigen Reactionen diese Thatsache bestätigt. Es erwiesen sich sonach die Angaben von Kietz und von Ewald, welche dahin gingen, dass bei normaler Magenverdauung keine Milchsäure im Magen vorkomme, als entschieden unrichtig. Ewald¹⁾ hat in neuerer Zeit, nachdem unsere Untersuchungen schon einige Jahre vorher publicirt worden waren, das Unzutreffende seiner früheren Angaben selbst zugestanden (S. 342 des unten citirten Artikels).

Genauere Untersuchungen des Mageninhalts durch Goldschmidt, der in unserem Laboratorium arbeitete, lehren, dass auch der Inhalt, welcher sich an der kleinen Curvatur, im Antrum pyloricum und dessen Nachbarschaft befindet, in der Regel nur Milchsäure oder wenigstens nur geringe Mengen Salzsäure enthält. Die Salzsäure tritt zuerst an der grossen Curvatur und an den Magenflächen an denjenigen Stellen auf, wo sich Fundusdrüsen finden. Zuerst ist sie nur in der peripheren Portion der hier gelegenen Inhaltmassen nach-

Magens! Die Verminderung der Milchsäure in späteren Verdauungsperioden beruht nach unserer Meinung darin, dass die Bildung derselben mit der Salzsäuresteigerung sistiren, und dass in Folge dessen, da ein Theil der Milchsäure durch Resorption und Abfluss nach dem Darm verschwindet, die Milchsäuremenge im Magen gemindert werden muss.

¹⁾ Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Verdauung. Virchow's Archiv, 10. Folge, I. Bd., S. 325.

weisbar; mit der Zeit dringt sie immer tiefer in den Inhalt ein und verbreitet sich auch nach rechts und links. In die höher, dorsalwärts gelegenen Cardia- und Pyloruspartien gelangt sie nicht oder nur in Spuren.

Auf der Höhe der Verdauung muss man mindestens drei Portionen des Mageninhalts unterscheiden, eine Milchsäureportion im Schlundsack, eine Milchsäureportion in der Pylorusregion, eine zwischen beiden liegende Salzsäureportion. Die Salzsäure wird offenbar so rasch resorbirt resp. zersetzt, dass sie nicht oder nur in Spuren in den Pylorus gelangt. Nur so ist es erklärlich, dass der vorher mit Salzsäure durchtränkte Inhalt, sobald er in dem Antrum pyloricum verweilt, diese Säure zum grössten Theil verloren hat.

Hier beginnt schon die Vorbereitung für die Darmverdauung durch Abschwächung des Säuregrades und vielleicht auch des Pepsingehalts.

Es versteht sich von selbst, dass bei wasserreichem Mageninhalt die betreffenden Unterschiede weniger deutlich nachweisbar sind; sie treten nur bei verhältnissmässig trockenem Inhalt scharf hervor.

Beachtenswerth ist auch noch, dass der Mageninhalt im Bereiche der Belagzellregion und der grossen Curvatur wasserreicher ist als im Schlundsack. Es liegt dies zum Theil an der tieferen Lage der erstgenannten Theile, zum Theil wohl auch in der dort statthabenden Secretion des Magensaftes.

4. Ablauf der Magenverdauung. — Die Magenverdauung des Pferdes ist von höherer Bedeutung, als man früher angenommen hat. Dieselbe dauert von einer Mahlzeit bis zur anderen. Der Magen enthält noch Futtermassen von der vorhergehenden Mahlzeit, wenn die neue beginnt. Wenn keine neue Futterraufnahme erfolgt, währt die Magenverdauung ausserordentlich lange, dann findet man nach 24 Stunden noch Futter im Magen. Die Magenverdauung der Pferde besteht wesentlich in der Amylo- und Proteolyse und der Milchsäurebildung.

Im Pferdemagen findet in der ersten Zeit nach der Nahrungsaufnahme die Verdauung der Stärke und zwar in bedeutendem Masse statt. Es beweist dies einmal die Thatsache, dass der in der ersten Zeit der Verdauung dem Mageninhalt entnommene Saft im Brütöfen eine lebhaft verzuckernde Wirkung auf Kleister entfaltet, und sodann die Thatsache, dass der Mageninhalt bedeutende Mengen Zucker enthält. Die Verdauung der Stärke geht in der ersten Zeit

der Verdauung (1—2 Stunden) am lebhaftesten vor sich, dann nimmt sie ab und sistirt wahrscheinlich später gänzlich. Ueber die Zeit des Aufhörens der Zuckerbildung entscheidet Quantität und Qualität der Nahrung. Nach einer sehr reichlichen Mahlzeit dauert die Zuckerbildung viel länger, findet aber zuerst auch weniger intensiv statt. Die längere Dauer ist dadurch bedingt, dass bei bedeutendem Mageninhalt, der bekanntlich mindestens zu $\frac{2}{3}$ aus alkalischem Speichel besteht, eine lange Zeit verstreicht, bis so viel Säure secernirt ist, um eine Concentration derselben im Mageninhalt zu bedingen, welche die Zuckerbildung hindert. Stärkere Säureconcentrationen kommen anfangs immer nur partiell in der Nähe der Magenwände und zwar in der Belagzellregion vor und bedingen dort kräftige Eiweissverdauung.

Der Zuckergehalt des Pferdemagens beträgt zu Anfang der Verdauung noch nicht 0,2 pCt. und steigt später auf 1 und 2, ja über 3 pCt. Die Gesamtmenge des Zuckers im Magen beträgt bei Haferfütterung anfangs 4—5 Grm. und erreicht später 30—60 Grm., ja in einzelnen Fällen 100 und 120 Grm. Gegen Ende der Verdauung sinkt die Zuckermenge wieder, sowohl procentisch als absolut. Bei Heufütterung beträgt der Zuckergehalt anfangs 0,26 pCt., steigt dann auf 0,56 pCt. und sinkt dann wieder. Im Ganzen wurden im Magen 5—8,5 Grm. Zucker bei Heufütterung gefunden. Wem die Zuckermenge im Verhältniss zur Menge der aufgenommenen Stärke klein erscheinen sollte, der möge bedenken, dass einmal fortwährend resorbiert, gespalten und nach dem Duodenum fortgeschafft und dadurch der gebildete Zucker entfernt wird, dass aber auch ferner neben dem Zucker ansehnliche Mengen gelöster Stärke (aus unlöslicher entstanden), nämlich 3—5 pCt. vorhanden sind. Gelöste Stärke ist aber als verdaute Stärke anzusehen. Vor Allem aber muss man berücksichtigen, dass sehr grosse Mengen Zucker in Milchsäure umgesetzt werden. Die Bildung der Milchsäure erfolgt sehr lebhaft und in grosser Menge in der ersten Periode der Verdauung. Die Milchsäurebildung stellt einen bedeutenden Theil der Magenverdauung dar. In einzelnen Fällen kann man bis zu 30 Grm. Milchsäure im Magen nachweisen. In der späteren Verdauungszeit nimmt die Milchsäurebildung ab und damit auch die Milchsäuremenge im Magen. Die secernirte Salzsäure hindert offenbar die Milchsäurebildung.

Das Pflanzeneiweiss wird im Pferdemagen eifrig verdaut und in Pepton umgewandelt. Die Peptonisirung ist zu Anfang der Verdauung nur unbedeutend, steigt dann aber fortwährend. Darüber, wie

rasch die Peptonisirung erfolgt und wann sie ihren Höhepunkt erreicht, entscheidet die Quantität und Qualität der Nahrung. Nach einer reichlichen Mahlzeit ist die Peptonisirung anfangs sehr unbedeutend, weil die Magendrüsen nicht genügend Säure und Pepsin zu liefern vermögen, und deshalb wird der Höhepunkt der Peptonisirung erst spät erreicht. Folgt in diesem Falle bald eine neue Mahlzeit, dann werden die Nahrungsmittel in wenig verdaulichem Zustande nach dem Darm geschafft. Bei einer mässigen Mahlzeit ist die Verdaugung nach 3—4 Stunden auf dem Höhepunkte, d. h. dann sind die Nahrungsmittel genügend verdaulich; bei reichlicherer Mahlzeit tritt dies erst nach 6—8 Stunden, bei Ueberladungen noch viel später ein.

Im Magen findet man bei Haferfütterung unmittelbar nach Beendigung der Mahlzeit ca. 0,3 pCt. Pepton, später 1,5—2 pCt. In toto findet man im Magen anfangs ca. 5, später bis 50 Grm. Pepton und darüber. Diese Menge nimmt gegen Ende der Digestion ab, weil die Massen fortgeschafft und resorbiert und durch die Verdaugungssäfte verdünnt werden. Nach Heufütterung ist die Peptonmenge bedeutend geringer. Wir fanden z. B. nach 6 Stunden nur 0,26 pCt. oder in toto ca. 5 Grm. Pepton.

Aus den Versuchsergebnissen ergeben sich auch praktische Anhaltspunkte. Da die Magenverdaugung in zwei Perioden zerfällt, in die der Amylaceen ohne HCl und die der Proteine mit HCl, so wäre es durchaus unrichtig, Pferden, welche an sogen. Dyspepsien, Unverdaulichkeiten leiden, zu Anfang der Verdaugung, also etwa mit dem Getränk während oder unmittelbar nach dem Fressen Salzsäure als Heilmittel zu verabreichen. Leider ist dies bis jetzt geschehen. Bei einer derartigen Behandlung schadet man den kranken Thieren. Man stört die ohnedies schon schlechte Verdaugung noch mehr. Die verabreichte HCl hindert die nothwendige Amylaceenverdaugung. Wenn demnach Indicationen für die Verabreichung von HCl vorliegen, dann gebe man dieses Mittel, ebenso wie Pepsin, erst ca. in der dritten Verdaugungsstunde.

Es geht ferner aus unseren Versuchen hervor, dass die Regel, viel Futter auf einmal zu geben und dann grössere Zwischenräume zwischen die Mahlzeiten zu legen, durchaus unrichtig ist. Unsere Versuche zeigen evident, dass kleine Mengen viel besser ausgenutzt werden, als grosse Quantitäten, dass kleine rasch und leicht verdaulich werden, und dass also die Regel sein muss, wenig auf einmal, aber um so öfter zu füttern. Es kommt dies namentlich bei Reconvalescenten und schwächlichen Thieren in Betracht. Grosse Quantitäten Nahrung verzögern die Verdaugung um Stunden und geben dadurch Gelegenheit zu Zersetzungs Vorgängen und zu Belästigungen des Magens. In Folge davon treten nicht selten bedenkliche Magenkatarrhe auf.

Wenn die Thiere aber grosse Futtermengen aufgenommen haben, dann lasse

man eine lange Zeit verstreichen, ehe man den Thieren wieder etwas verabreicht, und gebe kein Getränk, um die Magensäure nicht zu verdünnen.

Es ergibt sich aus unseren Beobachtungen weiter, dass ein guter Magensaft das beste Mittel gegen Gährungs- und Fäulnisvorgänge ist. Wenn also derartige Vorgänge krankhafterweise in dem Magen eines Thieres bestehen, dann hat der Arzt die Aufgabe, für guten Magensaft zu sorgen. Das geschieht durch Anregung der Magensaftsecretion oder durch Verabreichung eines guten Magensaftes, unter Umständen durch Eingeben von HCl.

Unsere Versuche lehren auch, dass ein Futter um so besser verdaut wird, je mehr ein Thier bei dessen Aufnahme kaut. Es wirkt hier nicht die Zerkleinerung, sondern die durch das Kauen angeregte Speichelsecretion. Der Speichel hat ein bedeutendes verdauendes Vermögen. Je mehr davon in den Magen gelangt, um so besser findet die Verdauung statt. Es ist also unter normalen Verhältnissen falsch, den Thieren zerkleinertes Futter zu geben. Wenn dies geschieht, dann kauen die Thiere wenig und secerniren wenig Speichel.

Die Natur der Magensäuren und der sonstigen im Magen enthaltenen Stoffe zu kennen, ist sehr wichtig rücksichtlich der Frage, welche Veränderungen die Arzneimittel im Pferdemagen erleiden und wie sich darnach ihre Wirkung abändert.

Wenn im Pferdemagen nur eine Eiweissverdauung statthätte, dann wäre es ganz widersinnig, den Pferden während oder nach dem Fressen Getränk zu verabfolgen; es wäre auch falsch, den Thieren rauhe, unzerkleinerte Sachen zur Nahrung zu geben.

Das Wasser des Getränks und der bei rauher Nahrung beim Kauen massenhaft secernirte alkalische Speichel würde die Eiweissverdauung enorm stören. Eiweiss wird nur verdaut, wenn ein bestimmter Säuregrad erreicht wird. Dieser Säuregrad kann aber wegen des hinabgelangenden Speichels und des Getränks in der ersten Zeit nicht erreicht werden.

Unsere Untersuchungen ergeben, dass es nicht schadet, wenn das Getränk gleich nach dem Fressen gegeben wird und dass man die Thiere stark kauen lassen muss. Dadurch wird die Amylaceenverdauung befördert, die störende Einwirkung der von der Magenschleimhaut secernirten HCl, die bei 0,02 pCt. schon die diastatische Wirkung des Speichels hemmt, verhindert. Dadurch wird das Stadium der Amylaceendigestion zum Wohle der Thiere verlängert. Es kommt dadurch der zur Eiweissverdauung nothwendige Säuregrad später zu Stande.

Noch eines Umstandes ist zu gedenken. Wenn einem Pferde aus therapeutischen Gründen eine Säure verabreicht werden soll und dies nicht anders als im Getränk geschehen kann, dann empfiehlt es sich, eine organische Säure zu wählen; diese stören nach unseren Untersuchungen die saccharificirenden Fermente erst bei starker Concentration und können die Pepsinwirkung in verhältnissmässig concentrirtem Zustande hervorrufen. Aus diesem Grunde sind, auch wenn man Selbstverdauungen befürchtet und doch Säuren geben will, organische Säuren am Platze.

Bekanntlich ist es das kreisende alkalische Blut, welches den Magen vor Selbstverdauung bewahrt. Bei entzündlichen Zuständen des Magens und bei Krankheiten, welche zu embolischen Processen disponiren, kommt es nicht selten vor, dass einzelne Schleimhautpartien durch Stasenbildung in den Blutgefäßen blutleer werden. Diese blutleeren Schleimhautstücke werden bekanntlich durch guten Magensaft verdaut. Dadurch entstehen Magengeschwüre u. dgl. Um dem vorzubeugen, secernirt bei solchen Krankheiten die Magenschleimhaut keine Salzsäure.

Würde man nun Salzsäure geben, dann würde man die Gefahr der Selbstverdauung hervorrufen. Wenn die bestehende Krankheit die Verabreichung von Säuren indicirt, dann giebt man demnach diejenigen Säuren, welche das Pepsin nicht zur Wirksamkeit bringen, also die Gefahr der Selbstverdauung nicht hervorrufen. Das sind nach unseren Untersuchungen die organischen Säuren.

Aus unseren Untersuchungen ist auch zu ersehen, wie man bei krankhaftem Erbrechen bei unseren Hausthieren das Erbrochene auf Säuren, auf Peptone, Zucker u. dgl. untersuchen kann. Diese Untersuchungen bieten gewisse Schwierigkeiten, die mit den von uns angegebenen Methoden leicht überwunden werden können.

5. Kohlehydratverdauung im Magen. — Wir können es nicht unterlassen zu betonen, dass erst durch unsere Versuche auf exactem Wege der Beweis geliefert worden ist, dass ein nicht unbedeutender Theil der Kohlehydrate im Magen verdaut wird, und dass die Peptonverdauung erst mehrere Stunden nach der Nahrungsaufnahme ihre Höhe erreicht.

Wir wissen sehr wohl, dass schon vor einiger Zeit entgegen der modernen Anschauung, wonach der saure Magensaft jegliche Speichelwirkung und Stärkeverdauung hindert, die Vermuthung einer bedeutenderen Amylolyse für die erste Zeit der Verdauung ausgesprochen worden ist (v. d. Velden, Leube, Uffelmann etc.); uns ist aber auch ebenso bekannt, dass von keiner Seite der Beweis für die Richtigkeit dieser Vermuthung erbracht worden ist. Einer so feststehenden Lehre gegenüber, wie es die von der fehlenden Speichelwirkung im Magen und ihrer Unmöglichkeit war, mussten aber Thatssachen, welche durch exacte Versuche basirt waren, entgegengestellt werden, wenn ihre Unrichtigkeit bewiesen werden sollte. Die Untersuchungen über den Säuregehalt und die Säurenatur des Mageninhaltes konnten diesen Beweis nicht liefern, namentlich die letzteren nicht, weil die auf die Säurenatur gerichteten Untersuchungsmethoden nicht einwurfsfrei sind. Wir haben gerade diese Frage genau geprüft und sind zu dem Resultate gelangt, dass die Bestimmung der Säurenatur stets sehr precär ist. Im Magen sind immer

Salz- und Milchsäure gemischt vorhanden. Deshalb handelt es sich darum, festzustellen, wie viel Salz- und wie viel Milchsäure zugegen ist, wenn man die Frage der Möglichkeit der Amylo- und Proteolyse lösen will. Diese Feststellung ist aber mit den gewöhnlichen Farbenreactionen nicht möglich. Mit diesen ist es nur schwer möglich, festzustellen, ob in dem Mageninhalt überhaupt Salzsäure zugegen ist. In reinem Wasser ist diese Säure leicht nachzuweisen, in dem Pepton, Syntonin, Mikroorganismen, Dextrin, Zucker, Schleim etc. enthaltenden Mageninhalt aber schwer. Will man aber die Mengen der Säuren feststellen, dann müsste man die zeitraubende Chlorbestimmung vornehmen. Nächst ihr geben noch am besten Aufschluss die mit der Magenflüssigkeit auf Stärke und Eiweiss angestellten Verdauungsversuche.

Die Kohlehydratverdauung konnte nur durch Bestimmung des Zuckergehalts des Magens und durch Analysen des gesammten Inhalts desselben festgestellt werden. Die von uns auf diese Weise erwiesene bedeutende Kohlehydratverdauung im Magen ergibt, wie unrichtig die früheren Angaben in Bezug auf den Pferdespeichel waren, welche dahin gingen, dass derselbe unwirksam auf Stärke sei, also kein diastatisches Ferment enthalte. Die einzelnen Speichelarten wirken, wie vorn betont, allerdings nicht hervorragend auf Kleister ein, wohl aber der gemischte Speichel. Nicht die Mischung der Speichelarten allein aber ist es, welche die Verstärkung der Wirkung macht, sondern es müssen neue uns noch unbekannte Momente (etwa die in der Mundhöhle wuchernden Pilze, oder freie Luftpilze oder Lebewesen, welche sich im Magen finden) influiren. Der Magensaft selbst ist es nicht. Die Magenschleimhaut liefert wenig diastatisches Ferment. Vielleicht liegen die Verhältnisse auch so, dass das Ferment ein lebendes ist und in der Mundhöhle und im Magen besonders günstige Bedingungen zu seiner Multiplication findet. Es sind dies Fragen, die noch der Lösung harren.

In Bezug auf die Mächtigkeit der Magenverdauung ergeben die von uns angestellten Analysen, dass ca. 12—14 Stunden nach der Mahlzeit 20—41 pCt. der Kohlehydrate und 45—65 pCt. Eiweisskörper des Mageninhalts verdaut waren; bei einer 7stündigen Verdauung von Hafer waren ca. 60 pCt., von Heu bei 6stündiger Verdauung nur ca. 20 pCt. der genossenen Eiweisskörper gelöst. Man ersieht hieraus, dass die verdauende Thätigkeit auch des Pferdemagens eine recht bedeutende ist. Die Ausgiebigkeit der

Magenverdauung richtet sich wesentlich nach der Aufeinanderfolge der Mahlzeiten. Folgt die nächste Mahlzeit bald, dann kann die Magenverdauung nicht ausgiebig wirken, weil die neu aufgenommenen Nahrungsmittel den alten Mageninhalt nach dem Darmcanale vorschieben.

Beachtenswerth ist auch, dass beim Pferde schon während jeder einigermaßen bedeutenden Mahlzeit ein Theil der aufgenommenen Futtermassen in den Darmcanal befördert wird, weil der Pferdemagen so klein ist, dass er die bei einer Mahlzeit aufgenommenen Nahrung incl. des secernirten Speichels nicht zu fassen vermag. Demgemäss unterliegt ein Theil der genossenen Futtermassen der Magenverdauung fast gar nicht. Ihre Ausnutzung wird dem Darmcanal fast ganz und gar überlassen.

6. Perioden der Magenverdauung. — Wenn wir uns früher bestimmt dahin ausgesprochen haben, dass die Magenverdauung der Pferde in zwei auf einander folgenden Perioden, einer amylytischen und einer proteolytischen ablaufe, so müssen wir diese Angabe jetzt etwas einschränken. Versuche, welche von Herrn Goldschmidt in unserem Laboratorium und von uns neuerlich über die Magenverdauung der Pferde angestellt worden sind und unsere in diesem Journal publicirten Versuche über die Magenverdauung der Schweine beweisen, dass die Verhältnisse nicht so einfach, wie früher angegeben, liegen.

Während und unmittelbar nach der Mahlzeit findet im ganzen Magen Amylyolyse und damit Zucker-, Dextrin- und Milchsäurebildung statt. Bald aber beginnt auch die Proteolyse, auch ohne Gegenwart der theoretisch nothwendigen Salzsäuremenge. Wodurch die Lösung und Peptonisirung der Eiweisskörper in dieser ersten wesentlich amylytischen Verdauungsperiode geschieht, ist noch zweifelhaft. Man muss aber an die Wirkung von Mikroorganismen denken.

Der ersten Verdauungsperiode folgt eine zweite, welche bei trockenerem Mageninhalt darin besteht, dass im Schlundsacke die Amylyolyse andauert, während sie im eigentlichen Magen immer unbedeutender wird und bald sistirt. Eiweissverdauung findet während dieser Periode im ganzen Magen statt, rechterseits durch wirksamen Magensaft (Pepsin und Salzsäure), linkerseits durch noch unbekanntes Einflüsse.

Dieser Periode folgt eine dritte, während welcher die Amylyolyse im ganzen Magen sehr unbedeutend ist oder ganz sistirt, während die Proteolyse anhält. In dieser Periode findet man aber stets noch

Milchsäure im Magen. Bei recht trockenem Mageninhalt (60—65 pCt. Wasser) tritt diese Periode bei normaler Aufeinanderfolge der Mahlzeiten (d. h. bei einem Zwischenraum von höchstens 10—12 Stunden zwischen je 2 Mahlzeiten) überhaupt nicht ein, sondern bleibt die Amylolyse im Schlundsacke bestehen. Bei mehr flüssigem Inhalte tritt dagegen die Periode entschieden ein. — Ob aber unter gewöhnlichen Verhältnissen bei mehr flüssigem Inhalte auch eine Verdauungsperiode folgt, in welcher die Milchsäure fehlt und nur HCl vorhanden ist, haben wir nicht feststellen können. Bei Genuss von Holztheilen fanden wir allerdings nur Salzsäure im Magen und keine Milchsäure.

7. Gährungsprocesse. — In dem Magen laufen ausser den eigentlichen Verdauungsvorgängen noch besondere Gährungsprocesse ab. Die Möglichkeit für den Eintritt und den Ablauf derselben ist dadurch gegeben, dass die Salzsäuremengen in den ersten Stunden der Verdauung nur ganz unbedeutende sind und demnach nicht gährungshemmend wirken können. Es ist aber ausserdem auch durch uns erwiesen, dass in dem höher gelegenen Schlundsacke überhaupt keine oder nur verschwindende Menge Salzsäure, welche bekanntlich in den tiefer gelegenen Partien der Curvatura major und den betreffenden Partien der Seitenflächen secernirt wird, auftreten. Eine schon erwähnte Gährung, die im Magen in sehr bedeutendem Masse stattfindet, ist die Milchsäuregährung. Sofort nach der Lösung der Kohlehydrate geht ein bedeutender Theil derselben in Milchsäure über. Die Essigsäure- und Buttersäuregährung ist kaum von Belang. Auf andere Gährungsprocesse, die sich durch die bei der Magenverdauung entwickelnden Gase kennzeichnen, haben wir unsere Untersuchungen nicht ausgedehnt. Dieses Gebiet hat speciell Tappeiner bearbeitet und zuerst auf die wahrscheinlich wesentlich linkerseits auftretenden Magengährungen aufmerksam gemacht und auf die dort vielleicht erfolgende Celluloselösung hingewiesen. Er hat Sumpfgas in dem Magen nachgewiesen und andererseits festgestellt, dass sich aus Cellulose Sumpfgas bildet, glaubt, dass die von ihm bei künstlicher Verdauung beobachteten Sumpfgasgährungen der Cellulose auch im Schlundsacke des Pferdemagens stattfinden, weil im übrigen Magen die Salzsäure die Gährungen verhindern würde.

Wir glauben nicht, dass bedeutende Mengen Cellulose in der linken Seite des Pferdemagens gelöst werden können. Dazu ist denn doch die Aufenthaltszeit der Futtermassen eine zu geringe. Dies ergibt sich auch aus den Tappeiner'schen künstlichen Gährungsver-

suchen. Immerhin finden zweifellos im Pferdemagen und ganz besonders im Schlundsacke Gährungsprocesse statt, welche auf die Cellulose möglicher Weise einen Einfluss ausüben. Ausnahmsweise können hier Futtertheile, z. B. Heuklumpen trotz neuer Mahlzeiten längere Zeit, z. B. 24 Stunden liegen bleiben. In dieser Zeit könnte etwas Cellulose gelöst werden.

Unsere vorstehend niedergelegten Anschauungen über den Ablauf der Magenverdauung, wie wir uns dieselben auf Grund der Resultate unserer Untersuchungen gebildet haben, stehen mit der modernen Lehre von der Magenverdauung theilweise im Widerspruche, und freut es uns deshalb, dass ein Theil unserer Resultate durch neuere Untersuchungen von Ewald und Boas (a. a. O.), die beim Menschen angestellt wurden, bestätigt worden sind. Die genannten Forscher haben beim Menschen das Vorkommen von Milchsäure im gesunden Magen während der Verdauung constatirt. Sie haben ferner gefunden, dass zunächst fast nur Milchsäure im menschlichen Magen zugegen ist, dann Milch- und Salzsäure und schliesslich nur Salzsäure. Mit steigendem Salzsäuregehalt sinkt die Menge der Milchsäure. Ferner haben die genannten Autoren dargethan, dass die Proteolyse (die Peptonbildung) beim Menschen ähnlich abläuft, wie wir dies in Bezug auf das Pferd früher bewiesen haben, d. h. dass die Peptonbildung anfangs gering ist, dann ansteigt, bis sie ihre Höhe erreicht, und dann wieder absinkt. Ewald und Boas haben also für die Magenverdauung des Menschen das bestätigt, was wir in Bezug auf das Pferd vor längerer Zeit schon festgestellt hatten. Sie haben aber, wie es scheint, unsere, die Verdauung des Pferdes betreffenden Artikel nicht gekannt. Dies erklärt ihr Schweigen über unsere den Nachweis der Säurenatur betreffenden Versuche, über unsere oben aufgeführten Feststellungen in Betreff der Säuren im Magen, in Betreff des Ablaufs der Magenverdauung etc., es erklärt dies auch ihre nicht zutreffende Angabe, nach welcher vor ihnen von Niemandem der Ablauf der Magenverdauung gradatim verfolgt worden wäre. Es ist dies von uns geschehen.

Die höchst interessante Arbeit von Ewald und Boas verliert keineswegs dadurch an Werth, dass wir die oben erwähnten Feststellungen vor ihnen gemacht haben. Es ist dies aber eine Thatsache, die allerdings beiden Autoren nicht bekannt gewesen zu sein scheint.

C. Die Darmverdauung.

Bei der Darmverdauung des Pferdes kommen als neue wirksame Säfte in Betracht: 1. die Galle, 2. der pancreatische Saft und 3. der Darmsaft. Als weitere Einfluss ausübende Momente müssen der aus dem Magen in den Darm gelangende Magensaft, die im Darm ablaufenden Gährungs- und Fäulnisprocesse in Betracht gezogen werden. Die mechanische Thätigkeit der Darmwände dürfte keine hervorragende Einwirkung auf die Verdauung des Darminhalts ausüben.

1. Die Galle. Die Pferdegalle unterscheidet sich in ihren chemisch - physikalischen Eigenschaften nicht von der Galle anderer Thiere. In Bezug auf ihre physiologische Wirkung ist von uns festgestellt worden, dass sie auf den Kleister und die Fette, nicht aber auf die Eiweisskörper einwirkt. Kleister wird durch Pferdegalle gelöst resp. verzuckert. Eiweisskörper bleiben unverändert. Fette werden emulsirt und zu einem geringen Theile gespalten.

2. Der Pancreassaft ist von uns nicht direct gewonnen worden, sondern wir haben nach verschiedenen Methoden Drüsenextracte hergestellt und schliessen aus den Eigenschaften dieser auf die des Secretes. Demgemäss gilt für den Pancreassaft Folgendes:

Das Secret des Pferdepancreas saccharificirt Stärke, löst Eiweisskörper, spaltet Fette, bringt das Casein zum Gerinnen und wandelt Zucker in Milchsäure um, löst aber Cellulose für sich allein nicht auf. Der Reichthum der Pancreasdrüsenzellen an Ferment ist nicht so bedeutend, als der Reichthum der Zellen der Magendrüsen an demselben. Das amylolytische Ferment ist in reicher Menge im Pancreas zugegen. Dieses Ferment wird durch Säuren in seiner Wirkung beschränkt und je nach der Concentration derselben (schon bei 0,2 pCt.) ganz unwirksam gemacht, und zwar derart, dass das Ferment auch beim späteren Alkalisiren nicht wieder wirksam wird.

Zusatz von Galle unterstützt die amylolytische Wirkung. Die Fermentwirkung steht in proportionalem Verhältniss zur Menge des vorhandenen Ferments. Wasserentziehung tödtet das Ferment nicht, ebenso wenig die Kälte, während hohe Temperaturen das Ferment vernichten. Am besten wirkt das Ferment bei einer Temperatur von 35—50° C. Dasselbe ist schwer diffusibel.

Das proteolytische Ferment löst Eiweiss je nach der Quantität, in welcher es vorhanden ist, verschieden rasch. Säuren beeinträchtigen, Alkalien unterstützen die Fermentwirkung. Die durch

Säurezusatz (0,02—0,2 proc. HCl, 0,3—0,4 proc. Milchsäure) unwirksam gemachten Extracte werden beim Alkalisiren bei schwächerem Säurezusatz wieder wirksam, bei stärkerem Zusatz nicht.

Ausnahmsweise kann nur eine Abschwächung der Wirkung erfolgen und im Dünn darm bei Gallenzufluss wieder eine Fermentwirkung hervortreten. Bei Zusatz von alkalischen Salzen steigert sich die Fermentfunktion, und ganz besonders bei Sodabeigabe. Das Ferment wirkte am besten bei einer Temperatur von 35—50° C. Kälte und Wasserentziehung tödtet das Ferment nicht, Hitze vernichtet dasselbe. Gallenzusatz beeinträchtigt die Proteolyse nicht. Die Diffusionskraft des Ferments ist gering.

Das Trypsin ist in den Drüsenzellen nicht als solches, sondern in Form einer Vorstufe (Zymogen) enthalten. Es wandelt die Zwischenproducte der Magenverdauung rasch in Pepton um. Bei der Trypsinverdauung der Eiweisskörper bildet sich als Zwischenproduct Hemialbumose, die später in Pepton übergeht.

Das Fettferment führt Neutralfette durch Abspaltung von Fettsäuren, die zur Seifenbildung verwendet werden können, in den ranzigen Zustand über und macht diese dadurch leicht emulsionirbar.

Das Labferment bringt Casein zum Gerinnen, diffundirt schwer, während das Fettferment leichter diffundirt.

Das Milchsäureferment findet sich in dem Pancreas nur in Spuren; es entwickelt deshalb der Pancreassaft aus Zucker nur sehr langsam Milchsäure.

Von den Nahrungsmitteln verdauten die Extracte: Hafer, elastisches Gewebe, Fleisch, Käse; dagegen wurde die Knorpelsubstanz, Sehnen-, Horn- und Knochengewebe kaum angegriffen. Rohes Fleisch wurde rascher gelöst als gekochtes. Die in dem Magen des Pferdes befindlichen, Zwischenproducte der Magenverdauung (Syntonin) enthaltenden, Futtermassen werden durch den Pancreassaft lebhaft verdaut. Bei der Pancreasverdauung entsteht Tyrosin und Leucin. Die Fäulniss tritt in den nicht mit Desinfectionsmitteln versetzten Verdauungsgemischen verhältnissmässig früh ein.

Zieht man nun einen Vergleich zwischen den Fermentwirkungen des Pancreassaftes und denen der anderen Verdauungsdrüsen, so fällt zunächst auf, dass der Pancreassaft die Wirkungen fast aller anderen Verdauungssäfte in sich vereinigt. Die peptische und die Labwirkungen des Magensaftes finden wir beim Pancreassaft wieder, ebenso die saccharificirende des Maulspeichels und des Darmsaftes, wie auch die emulsionirende der Galle. Die Fette spaltende Wirkung scheint nur dem Pancreassaft und in geringem Grade noch der Galle zuzukommen.

Quantitativ übertrifft die proteolytische Wirkung des Magensaftes diejenige des Pancreassaftes, während umgekehrt die amylolytische Wirkung des letzteren die des Speichels und des Darmsaftes übertrifft. Der pancreatische Saft kann zweifellos bei Störungen der Eiweissverdauung im Magen und bei verringertem Fermentationsvermögen des Speichels vicariirend eintreten. Das Pancreas kann den Magen bis zu einem gewissen Grade vertreten.

3. Der Darmsaft. Das Secret der Brunner'schen und Lieberkühn'schen Drüsen übt keinen Einfluss auf Eiweisskörper aus, wohl aber wirkt das der Dünndarm- und Blinddarmdrüsen verdauend auf Stärke ein.

4. Darmflüssigkeit. Die in dem Dünndarm vorhandenen, durch Coliren und Filtriren seines Inhalts zu gewinnenden Flüssigkeiten, welche ein Gemisch von gelösten Nahrungsmitteln etc. und Verdauungssäften darstellen, wirkten auf Eiweisskörper, Kohlehydrate und Fette und ganz geringgradig auf Cellulose verdauend ein. Die Dickdarmflüssigkeiten zeigten diese Wirkungen in geringerem Grade, namentlich wirkten sie nicht mehr auf Eiweiss ein.

Die Dickdarmflüssigkeiten wirkten lösend auf Cellulose ein. Bei 3 tägiger Digestion wurden von 100 Gr. 50—60 Gr. gelöst. Die genaueren Vorgänge hierbei sind von uns nicht studirt worden und verweisen wir in dieser Richtung auf die Versuche von Tappeiner. (Zeitschr. f. Biologie, Bd. 20, S. 52f.)

5. Die Darmverdauung. Dauer der Darmverdauung. In dem Verdauungsschlauche des Pferdes verweilen die Nahrungsmittel wegen der grossen Ausdehnung und der vielfachen Ausbuchtungen, Knickungen und Windungen des Darmcanals eine verhältnissmässig lange Zeit. Gewöhnlich verfliessen bei Hafer-, Häcksel- und Heufütterung ca. 3 Tage, bis die aufgenommenen Futtermassen entleert worden sind. Sie verweilen ungefähr 6—12 Stunden im Magen und Duodenum, 6—12 Stunden im Jejunum, 24 Stunden im Coecum, 12—24 Stunden im ventralen und ebenso lange im dorsalen Colon und dem gewundenen Theil des Rectum. Diese Angaben sind natürlich nur bestimmt, annähernd eine Vorstellung von dem Verweilen des grösseren Theils des Darminhalts {zu geben. Ein Theil der aufgenommenen Nahrung geht schon während der Mahlzeit in den Dünndarm über und ist schon 5—6 Stunden nach derselben im Coecum und nach weiteren 4 Stunden zum Theil schon im Colon. Besonders auffallend ist beim Pferde die colossale Entwicklung des Coecum und Colon. Daher auch die bedeutenden Aufenthaltszeiten

dasselbst. Beide Darmabschnitte sind auch mit Poschenbildungen versehen. Im Coecum langen die ersten Portionen der genossenen Nahrung 8 bis 10 Stunden nach der Nahrungsaufnahme an.

Reactionen des Darminhalts. Die Reaction des Darminhalts verhält sich wie folgt: Der Inhalt des Duodenum und des Anfangstheils des Jejunum (ca. erstes Drittel) reagirt sauer, der des grössten Theils vom Jejunum, vom Ileum und Coecum alkalisch; die Reaction des Colon- und Rectalinhalts ist wechselnd. Der Inhalt des ventralen Colon ist meist alkalisch, der des dorsalen Colon und Rectum meist sauer. Bei Fäcalstasen wird unter Umständen der ganze Darminhalt sauer.

Verdaunungsvorgänge. Im Anfangstheile des Duodenum finden noch dieselben Vorgänge wie im Magen wenn auch abgeschwächt statt. Die ca. 12—15 cm hinter dem Magen in das Duodenum einfließenden Secrete, die Galle und der pancreatische Saft heben schon durch die Abschwächung der Säure durch die Alkalien, welche sie enthalten, die Magensaftwirkung auf. Ausserdem wird aber auch das Pepsin direct durch die Gallensäuren ausgefällt und damit unwirksam. Es beginnt nunmehr der pancreatische Saft und die Galle ihre Wirkungen auszuüben. Ganz besonders kommen die des Pancreassaftes in Betracht. Dieser kann sowohl in schwach saurer als in alkalischer und in neutraler Lösung seine Wirkung entfalten und zwar um so besser, als die Nährstoffe durch das Kauen, Einspeicheln, Verweilen im Magen etc. durchaus zugänglich gemacht worden sind.

Die Dünndarmverdauung ist sehr ausgiebig und von grösster Wichtigkeit, sie kann die Magenverdauung unter Umständen mit übernehmen. Beim Pferde tritt wegen der Kleinheit des Magens ein nicht unbedeutender Theil der Nahrungsmittel ganz unverändert und fast ohne jeden Verlust in den Dünndarm über, während allerdings ein Theil der Nahrungsmittel schon 40—50 pCt. ihrer Kohlehydrate und Eiweissstoffe im Magen eingebüsst hat. Im Dünndarm findet man unter Umständen nur noch 23—30 pCt. oder auch wohl bis 50 pCt. des aufgenommenen Eiweisses und 38—59 pCt. der stickstofffreien Bestandtheile, so dass demnach 70—77 pCt. des Eiweisses und 41 bis 62 pCt. der stickstofffreien Bestandtheile bereits zur Verdauung gelangt waren. Für diejenigen Nahrungsmittel, welche fast direct, ohne längeren Aufenthalt im Magen in den Darm übertreten, ist demnach die Darmverdauung eine sehr bedeutende. Bei denjenigen Nahrungsmitteln, welche längere Zeit im Magen verweilen, steigert

sich die Menge der verdauten Nährstoffe im Dünndarm um ca. 20 pCt.; während im Magen von den organischen Nährstoffen des aufgenommenen Hafers ca. 40—50 pCt. verdaut werden, steigert sich dies im Dünndarm auf 60—70 pCt.

Aus dem Magen tritt auch ein nicht unbedeutender Theil des Verdauten in den Darm über und wird erst dort resorbirt.

Der Blinddarm des Pferdes ist ganz zweifellos nicht nur als ein Resorptions-, sondern auch als ein Verdauungsorgan anzusehen. In demselben dürften nach unseren Versuchen noch ca. 10 unter Umständen aber sogar 30 pCt. der aufgenommenen Nährstoffe (abgesehen von Cellulose) verdaut werden. Schon die anatomischen Verhältnisse des Cöcum und die Thatsache, dass die Nahrungsmittel so lange in demselben verweilen, weisen darauf hin, dass das Cöcum Verdauungsorgan sein muss. Diese Schlussfolgerung wird aber auch durch unsere und Paladino's Versuche noch gestützt und als thatsächlich richtig bewiesen. Wenn dieses Organ nur Resorptionsapparat wäre, dann bliebe das Factum unbegreiflich, dass der Inhalt des Cöcum stets sehr wasserreich ist. Wäre das Cöcum hervorragendes Resorptionsorgan, denn müsste sein Inhalt wegen des langen Verweilens desselben trocken werden. Im Cöcum findet zweifellos eine nicht unerhebliche Resorption, daneben aber auch eine bedeutende Secretion und Verdauung (Pepton- und Zuckerbildung) neben den Gährungs- und Fäulnisprocessen statt.

Im Colon und Rectum laufen echte Verdauungsvorgänge, wie es scheint, nicht mehr ab. Hier treten Gährungs- und Fäulnisprocesse an ihre Stelle und hier wird namentlich auch resorbirt, so dass der Wassergehalt des Darminhaltes allmählich abnimmt.

Gährungsprocesse. Was die Gährungen und Fäulnisvorgänge, welche im Darmcanale des Pferdes ablaufen, anlangt, so sind dieselben von Tereg und von Tappeiner theilweise studirt worden. Es erscheint uns zweifellos, dass die Gährungs- und Fäulnisprocesse, welche schon im Dünndarm constatirt werden können, welche sich aber im Cöcum und Celon bedeutend steigern, neben Anderem auch eine verdauliche Bedeutung haben. Sie wandeln z. B. Eiweiss in Pepton um, spalten die Fette u. s. w. Zu einem grossen Theile aber sind die Gährungs- und Fäulnisvorgänge nicht allein ohne Nutzen, sondern sogar schädlich. Die Gährungsproducte sind meistens als Nährstoffe nicht verwendbar. Einige stellen sogar Gifte für den Organismus dar und ist deren Resorption schädlich.

Celluloseverdauung. Die Betrachtung der Gährungs- und Fäulnisprocesse und die darüber vorliegenden Tappeiner'schen Angaben führen uns zu der Frage der Celluloseverdauung. Durch frühere und durch unsere letzten Versuche ist dargethan worden, dass im Darmschlauche des Pferdes ca. 30—40 pCt. der aufgenommenen Cellulose verschwindet. Je ärmer an wahren Nährstoffen die Nahrungsmittel sind, um so mehr Cellulose wird verdaut. Es ist auch dargethan worden, dass die Darmflüssigkeiten (nicht die reinen Drüsen-secrete) in 2—3 Tagen bedeutende Mengen (bis 60 pCt.) Cellulose aufzulösen vermögen. Auf Grund unserer Versuche müssen wir annehmen, dass im Magen und Dünndarm nur Spuren von Cellulose gelöst werden können, weil bei normaler Fütterung der Pferde die Nahrungsmittel im Magen und im gesammten Dünndarm höchstens 24 Stunden verweilen. Sie können sich daselbst nicht länger aufhalten, weil sie durch die nachkommenden neuen Futtermassen fortgeschoben werden. Als Ort der eigentlichen Celluloseverdauung muss das Cöcum und das ventrale Colon bezeichnet werden. Im Dorsalcolon und Rectum ist der Inhalt schon zu trocken geworden, als dass ausgiebige Gährungsprocesse daselbst ablaufen könnten.

Seit Haubner's, Stöckhardt's, Stohmann's etc. Untersuchungen ist allgemein angenommen worden, dass die gelöste Cellulose zu einem bedeutenden Theile als Nährstoff in das Blut aufgenommen und im Körper verwendet wird, dass also Cellulose ein Nährstoff sei. Tappeiner's Versuche lassen Zweifel an dieser Ansicht aufkommen. Weiske hat in neuester Zeit die Frage, ob Cellulose ein Nährstoff sei, direct verneint. Nach unserer Ansicht ist diese Frage noch keineswegs gelöst, namentlich nicht für Thiere, die in Zeiten von Hungersnoth nur wenig andere Nährstoffe und wesentlich Cellulose als Nahrung erhalten. Tappeiner's Versuche beweisen, dass die Cellulose in Sumpfgasgährung übergehen kann und dass dieselbe im Verdauungsschlauch theilweise thatsächlich in Sumpfgas auch übergeht. Es ist damit aber nicht dargethan, dass die gesammte gelöste Cellulose zu Sumpfgas wird, und dass dieses Gas für den Körper werthlos ist.

Wir beobachten im Magen und Darm eine sehr lebhaftes Milchsäuregährung des Zuckers, glauben aber trotzdem keineswegs, dass der gesammte Zucker, welcher im Darmkanale verschwindet, zu Milchsäure wird, sondern nehmen an, dass ein Theil auch als Zucker resorbirt wird. Ebenso mag es sich mit der Cellulose verhalten.

Es ist sehr wohl möglich, dass die Cellulose, wenn sie überflüssig ist, zu Sumpfgas, während sie, wenn sie nöthig ist, im gelösten Zustande resorbirt wird. Die Cellulose geht wahrscheinlich zunächst in eine zuckerähnliche lösliche Modification über, welche theilweise resorbirt wird und theilweise der Sumpfgasgährung verfällt. Die Resorptionskraft des Darmkanals entscheidet darüber, ob viel oder wenig Cellulose zu Sumpfgas wird, wie sie auch darüber entscheidet, ob viel oder wenig Eiweiss verfault. Alles Organische im Darminhalt verfällt der Gährung und Fäulniss, wenn es nicht rasch genug resorbirt wird. Die Frage der Celluloseverdauung ist noch immer eine offene. Es zeigen dies auch die von Henneberg und Stohmann neuerdings gegen die Tappeiner'schen Angaben geltend gemachten Bedenken. Zur Lösung einer so schwierigen Frage, wie es das Kapitel der Celluloseverdauung ist, bedarf es zahlreicher Untersuchungen. Jedenfalls hat sich Tappeiner durch seine Arbeiten über die Sumpfgasgährung der Cellulose ein entschiedenes Verdienst um die Aufklärung der genannten noch dunklen Frage erworben.

Die Resorption im Pferdedarm. Ueber die Resorptionsverhältnisse im Pferdedarm sind wir noch mit Untersuchungen beschäftigt. Unsere früheren in dieser Richtung angestellten Experimente ergeben aber immerhin einige Anhaltspunkte: a) Ein Pferd, welches in 3 Tagen 15 Kgrm. Hafer und 2 Kgrm. Heu und damit 1974 Grm. Eiweiss und 9883 Grm. stickstofffreie Stoffe erhalten, hatte davon bei der 10 Stunden nach der letzten Fütterung vorgenommenen Tödtung bereits: 74 pCt. Eiweiss 72,0 pCt. N-freie Stoffe und 30,5 pCt. Faser, welche in den resorbirbaren Zustand übergegangen waren, resorbirt. — b) Ein zweites Pferd hatte in 4 Tagen 24 Kgrm. Hafer erhalten und war 12 Stunden nach der letzten Mahlzeit getödtet worden. Es waren resorbirt: 77,0 pCt. Eiweiss, 72,8 N-freie Nährstoffe und 15,8 pCt. Cellulose von 3045 Grm. Eiweiss und 14700 Grm. Kohlehydraten der Aufnahme. — c) Ein drittes Pferd erhielt in 4 Tagen 12 Kgrm. Hafer, 12 Kgrm. Heu und 2 Kgrm. Häcksel und wurde 12 Stunden nach der letzten Mahlzeit getödtet. Es waren von 2792 Grm. Eiweiss und 13100 Grm. Kohlehydraten, die in der Nahrung enthalten waren, resorbirt: 81,2 pCt. Eiweiss, 72 pCt. N-freie Stoffe und 47 pCt. Faser.

Es geht ferner aus unseren Versuchen mit Sicherheit hervor, dass im Colon und Rectum und wohl auch im Coecum nur sehr unbedeutende Mengen Nährstoffe resorbirt werden. Die wesentlichste Resorp-

tion der Nährstoffe findet im Dünndarm statt. Im Dickdarm werden nicht unerhebliche Mengen Flüssigkeit, die aber nur wenig Nährstoffe enthalten, aufgesaugt.

Die Resorption im Dünndarm ist experimentell sehr schwer festzustellen. Im Dünndarm findet man so enorme Mengen Schleim, Galle, Pancreassaft und Darmsaft, dass die Resorption viel geringer erscheinen muss, als sie thatsächlich ist. Man kann höchstens aus dem Vergleiche des Ileuminhalts. (woselbst weniger Schleim ist) oder des Coecalinhalts mit dem des Magens Schlüsse auf die Resorptionsgrösse des Dünndarms machen. Gegenwärtig werden in unserem Laboratorium noch Versuche angestellt, welche nähere Aufschlüsse über die Resorption im Pferdedarm geben sollen.

Aus unseren früheren Versuchen ergibt sich ungefähr Folgendes: 1. Bei Haferfütterung waren im Coecum ungefähr 72 pCt. der mit dem Hafer aufgenommenen Eiweissmenge resorbirt; dies steigerte sich im Colon auf 74,2 pCt. und im Rectum auf 84,5 pCt. Das in Bezug auf das Coecum Festgestellte giebt einen Anhalt über die Resorption im Dünndarm, da im Coecum selbst nur wenig Nährstoffe resorbirt werden. Es ergeben diese Zahlen auch wie unbedeutend die Nährstoffresorption im Dickdarm ist. Dieselbe hat sich im ganzen Dickdarm nur um 13 pCt. der aufgenommenen Nährstoffe gesteigert.

2. Bei Fütterung von Hafer mit Strohhäcksel ergab die Untersuchung des Coecuminhalts, dass von den Eiweissmengen, welche dem vorhandenen Fasergehalt nach zugegen sein müssten, wenn nichts resorbirt worden wäre, 80 pCt. fehlten. Dies steigerte sich im Colon auf 81,8 und im Rectum auf 85 pCt. Demnach sind im Dickdarm (abgesehen etwa vom Coecum) nur 5 pCt. der Eiweisskörper resorbirt worden.

3. Bei einem aus Hafer, Häcksel und Heu bestehenden gemischten Futter mussten zufolge der vorgenommenen Analyse des Blinddarms ungefähr 70 pCt. der Eiweisskörper als resorbirt angenommen werden. Im Colon waren es 76, im Rectum 95 pCt. Demnach ist bei diesem Pferde die Resorption im Dünndarm etwas weniger bedeutend gewesen, als bei den beiden anderen. Der Dickdarm hat über 20 pCt. der Eiweisskörper resorbirt.

Aehnlich verhielt es sich mit den Kohlehydraten. Bis zum Coecum wurden 75, 78 und 76 pCt. resorbirt und im Colon und Rectum noch ca. 2—4 pCt.

Aus Allem ist ersichtlich, dass, wie oben schon erwähnt, die

eigentliche Nährstoffresorption im Dünndarm und zum Theil im Magen stattfindet, dass sie zwar im Dickdarm noch anhält, aber unbedeutend ist, und dass sich die hier ablaufende Resorption wesentlich auf Wasser und weniger auf Nährstoffe erstreckt.

Nebenbei sei noch bemerkt, dass die procentische Zusammensetzung des Inhaltes der einzelnen Darmabtheilungen sich in der Weise verhält, dass vom Magen bis zum Rectum der Eiweissgehalt entschieden ab-, der Faser- und Salzgehalt dagegen zunimmt, während die Nfreien Bestandtheile ebenfalls etwas abnehmen. So fand man bei dem mit Hafer gefütterten Pferde im Magen-inhalte 7, im Kothe 2,6 pCt.; bei dem Hafer-Häckselpferde im Magen 6, im Rectum 3,3, bei dem mit Hafer, Heu und Häcksel gefütterten Pferde im Magen 8,1, im Rectum 3 pCt. Eiweiss.

An Faser fand man 25,7, 20,9 und 30,6 pCt. im Magen, dagegen 39,0, 30,6 und 40 pCt. im Rectum.

An Nfreien Bestandtheilen 64,5, 70,0, 57,5 pCt. im Magen und 51, 5, 60,6 und 47 pCt. im Rectum.

Die Excremente. — Der Gehalt der Excremente an Nährmaterial ergibt, wie hochgradig die aufgenommene Nahrung ausgenutzt worden ist. In dieser Richtung liegen zahlreiche Versuche von mehreren Autoren vor. Bei den von uns angestellten Untersuchungen haben wir nur festgestellt, welche Zusammensetzung der Pferdekoth bei verschiedener Nahrung hat. Ausnutzungsversuche wurden nicht angestellt. Die Zusammensetzung des Kothes war bei unseren Experimenten folgende:

In 100 Grm. Trockensubstanz fanden sich:

1) bei Haferfütterung:	2) bei Hafer und Strohhäcksel:
3,3 Eiweiss,	2,8 Eiweiss,
30,6 Faser.	30,6 Faser,
60,6 stickstofffreie Bestandtheile.	57,6 stickstofffreie Bestandtheile.
5,5 Mineralsalze incl. Sand,	9,0 Mineralsalze incl. Sand.
<hr/>	<hr/>
100,0 Grm.	100,0 Grm.
3) bei Hafer, Heu und Strohhäcksel:	
3,0 Eiweiss,	
40,0 Faser.	
47,0 stickstofffreie Bestandtheile,	
10,0 Mineralsalze incl. Sand,	
<hr/>	
100,0 Grm.	

XIII.

Ueber den *Actinomyces musculorum* der Schweine.

Von

Dr. **Hertwig**, städtischem Ober-Thierarzt in Berlin.

(Hierzu Taf. VI.)

Schon im Jahre 1865 hatte Herr Geheimrath Virchow in seinem Archiv, Band 32, Jhrg.. 1865 S. 353, sowie auch in seinem Büchlein „Die Lehre von den Trichinen“ auf das Vorkommen von Kalkknoten hingewiesen, welche eine gewisse Aehnlichkeit mit verkalkten Trichinen darbieten und daher genau unterschieden werden müssen. Diese Knoten, welche Herr Geheimrath Virchow damals im Herzen eines Schweines gesehen hatte, in dem bekanntlich Trichinen bisher nicht gefunden sind, unterschieden sich von den verkalkten Trichinen durch ihre weit beträchtlichere Grösse, durch ihre solide Beschaffenheit und ihre breite, weniger gestreckte, häufig mehr rundliche Form. Obgleich diese und alle anderen in der Muskulatur der Schweine vorkommenden Kalkknoten wiederholt den eingehendsten Untersuchungen unterzogen sind, war es doch erst im Februar 1884 meinem Collegen, dem städtischen Thierarzt Dunker gelungen, durch das gleichzeitige Auffinden von Kalkknoten neben frischen, sowie nur zum Theil verkalkten Knoten den Nachweis zu führen, dass der von Herrn Geheimrath Virchow beschriebenen Art von Kalkknoten, Pilzrasen zu Grunde liegen. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurde alsdann die Identität der frischen mit den in Kalkknoten gefundenen Pilzen festgestellt, welche Dunker wegen ihrer — unten näher beschriebenen -- Form zu den Strahlenpilzen rechnete und mit diesem Namen belegte. Dieser Befund und die Berechtigung der gewählten Benennung ist von Herrn Geheimrath Virchow, Dr. O. Israel, Professor Dr. Schütz, Zopf, Zürn, Dr. Plaut und von anderen hervorragenden Forschern auf Grund

ihrer diesseits erbetenen Controll-Untersuchungen bestätigt worden. Die Veröffentlichungen über die Untersuchungen vom Herrn Geheimrath Virchow und Dunker befinden sich in Virchow's Archiv Band 95, 1884, und in Dunker's Zeitschrift für Mikroskopie und Fleischschau 1884, No. 3.

Bei vielen Lesern dieser Veröffentlichungen hat die Bezeichnung „Strahlenpilze“ zu dem Glauben geführt, dass die von Dunker entdeckten Pilze dadurch für identisch erklärt werden sollten mit den von Ponfick, J. Israel und Bollinger entdeckten *Actinomyces hominis* und *bovis* (Harz); diese Absicht hat niemals vorgelegen. Wie ich bereits im vorigen Jahre in einem Vortrage, gehalten in der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege, ausgesprochen habe, ist der Name „Strahlenpilze“ gewählt worden, weil die keulenförmigen Pilzfäden strahlenartig (radiär) um den Mittelpunkt gelagert sind. Auch ist die Benennung *Actinomyces suis*, welche der Bezeichnung *Act. hominis* und *bovis* entsprechen würde, absichtlich vermieden worden, weil bei den Schweinen noch eine andere *Actinomyces*-Krankheit vorkommt, welche sowohl durch die pathologischen Veränderungen als auch durch die Form der Pilze mit der bei Menschen und Rindern beobachteten Actinomykosis genau übereinstimmt.

Es kommen also bei den Schweinen 2 Arten von Strahlenpilzen und Strahlenpilzkrankheiten vor, von welchen die eine ihren Sitz ausschliesslich in der Muskulatur hat, während die andere zur Bildung von Geschwülsten in der Lunge, in der Zunge, vorzugsweise im Euter, und zu eiterigen Zerstörungen der Knochen ¹⁾, besonders der Rückenwirbel und Dornfortsätze, führt.

¹⁾ Weder aus der Literatur noch durch private Mittheilungen ist mir ein Fall von Actinomykose bei Schweinen bekannt geworden, welcher mit Zerstörung der Knochen verbunden war, so dass ich die beiden diesseits auf dem Schlachthofe beobachteten Fälle als die ersten ihrer Art bezeichnen darf, welche zur öffentlichen Kenntniss gelangen. In dem Euter eines Schweines war eine hühnereigrosse Geschwulst gefunden worden, welche bei genauer Untersuchung als eine actinomykotische festgestellt wurde und zu einer weiteren Untersuchung des Fleisches in dieser Richtung Veranlassung gab. Zu diesem Zweck musste das Thier der Länge nach getheilt werden, wobei in mehreren Rückenwirbeln und Dornfortsätzen runde oder ovale Höhlen von 1–3 Centimeter Durchmesser gefunden wurden, welche mit einer dicklichen, eiterähnlichen Flüssigkeit von grau-grüner Farbe angefüllt waren. Die Oberfläche der betr. Knochenhöhlen waren rau und ziemlich tief angefressen. In der Geschwulst des Euters und in dem Inhalt der Knochenhöhlen wurde das Vorhandensein zahlreicher *Actinomyces*-rasen

Um in Zukunft jedem Missverständniss vorzubeugen und mit Bestimmtheit darzuthun, dass wir beide Pilzarten unterscheiden, will ich an dieser Stelle mit Dunker's Zustimmung die in der Muskulatur vorkommende Strahlenpilzart als *Actinomyces musculorum* suis bezeichnen.

Der nachstehende Aufsatz soll sich jedoch mit der ersteren Art allein beschäftigen.

Nach den hier vorliegenden Beobachtungen, welche sich auf ein Material von 187 Schweinen stützen, muss die Aufnahme der Pilzkeime während der Sommermonate oder mit Beginn des Herbstes stattfinden, denn während man zu dieser Zeit in der Muskulatur ausschliesslich verkalkte Strahlenpilze findet, zeigen sich schon im Monat October in der Entwicklung begriffene oder entwickelte frische Rasen neben zahlreichen Sporen und mikrokockenartigen Körperchen. In Folge der fortschreitenden Entwicklung der Pilze findet man in den Monaten November und Dezember beinahe nur noch völlig entwickelte und frische Rasen, während im Monat Januar schon vereinzelte verkalkte Rasen auftreten, und je mehr wir uns dem Sommer nähern, desto zahlreicher und häufiger hat man Gelegenheit verkalkte Rasen zu finden, bis schliesslich nur solche Rasen vorhanden sind.

Die mikroskopischen Präparate von dem mit Strahlenpilzen durchsetzten Fleisch liefern im Allgemeinen folgende Bilder.

Bei 40—50 facher Vergrösserung bemerkt man an Quetschpräparaten zwischen den normalen Muskelfasern andere, welche in ihrem Verlaufe ungleichmässig unterbrochene, mehr oder weniger dunkel, grau oder braun gefärbte Stellen enthalten, in welchen, ebenfalls in ungleichmässigen Zwischenräumen dunkle runde oder rundliche, meistens scharf abgegrenzte Körperchen, deren Durchmesser gewöhnlich die Breite einer Muskelfaser oder darüber besitzt, liegen.

Diese Muskelfasern haben ihre gestreckte Form verloren, sie sind zusammengezogen und haben dadurch eine unregelmässige wellige Gestalt erhalten, bisweilen sind sie in ihrem ganzen Verlaufe, bisweilen nur an einzelnen Stellen breiter als die gewöhnlichen Muskelfasern. Bei stärkerer, etwa 300 facher Vergrösserung sieht man, dass die dunkel gefärbten Stellen in den Muskelfasern aus einem stark lichtbrechenden Inhalte von feinen Fetttröpfchen, zerfallener Muskel-

nachgewiesen, und zwar war es diejenige *Actinomyces*art, welche bei der Actinomykose der Menschen und Rinder festgestellt worden ist.

substanz und vorzugsweise aus kleinen mikrokokkenartigen Körperchen (Sporen?) besteht, zwischen welchen häufig keulenförmige Pilzfäden liegen. Die Querstreifung ist gewöhnlich nur noch un-
deutlich zu erkennen, oft vollständig verschwunden. Die Muskel-
fasern enthalten häufig bis in die Mitte gehende Querrisse, auch voll-
ständige Zerreibungen. In einem jedenfalls weiter vorgeschrittenen
Stadium ist die contractile Substanz in unregelmässige rundliche oder
viereckige Schollen von verschiedener Grösse zerfallen. Zwischen
diesen Partien liegen die vorerwähnten, rundlichen, scharf abgegrenz-
ten Körper, — die Strahlenpilze.

In der Umgebung der Rasen ist das Sarkolemma verdickt und
reichliche Lagerung von Granulationszellen vorhanden. An Präpa-
raten, welche mit Cochenille gefärbt sind, hebt sich diese Umgebung
etwas heller von den dunkler gefärbten Pilzen ab.

Von dem Mittelpunkt des Rasens erstrecken sich nach allen
Seiten gleichsam in Strahlen, neben und übereinanderliegend, und sich
dadurch zum Theil deckend, zarte, stark lichtbrechende Keulen, welche
in der Regel eine längliche birnenförmige Gestalt besitzen, doch
fehlen auch solche nicht mit kolbenartigen Anschwellungen oder mit
dichotomischen Theilungen an den Endpunkten. Wiederholt ist auch
beobachtet worden, dass zwei Keulen aus einem Mycelfaden ent-
springen, und dass eine Septirung zwischen Faden und Keule besteht.

An der Basis der Keulen befindet sich das Mycelium als ein
dichtes Flechtwerk von äusserst feinen Fäden, mit kleinen mikro-
kokkenartigen Körperchen durchsetzt. Dasselbe ist bei durchfallendem
Lichte durchscheinend und hebt sich heller gegen die Umgebung ab.
In dieser Weise sieht man die Rasen nur bei einer bestimmten Lage,
bei einer anderen Lage sieht man die Keulen gegen sich ge-
kehrt, wodurch ein Bild entsteht, welches Ponfick mit dem Frucht-
boden gewisser Compositen vergleicht und Plaut in der Weise be-
zeichnet hat, als wenn man viele dicht zusammengebundene Nadel-
spitzen von oben betrachtet.

Pilzfäden von derselben Art wie an den ausgebildeten Rasen
findet man vereinzelt oder in grösserer Zahl und in verschiedenen
Wachstumsstadien aus der contractilen Substanz und aus den zer-
fallenen Schollen derselben hervorwachsen, wodurch die Annahme ge-
rechtfertigt erscheint, dass die contractile Substanz das materielle
Substrat für die Ernährung der Pilze darstellt, und dass die Form
der erwähnten Schollen auf die runde oder längliche Gestalt der

Pilze von Einfluss ist. Der Verkalkungsprocess geht nicht von einer bestimmten Stelle aus, sondern beginnt bald im Mittelpunkt, bald an der Peripherie.

In dem ersteren Falle zeigen sich, wenn die Verkalkung schon einen grösseren Umfang erreicht hat, unter dem Mikroskop besonders hübsche Bilder dadurch, dass ein grösseres, völlig dunkles Centrum von den hellen Endtheilen der Keulen, wie von einem feinen Strahlenkranz umgeben wird.

Solange die Verkalkung der Pilze nicht vollständig eingetreten ist, gelingt es durch Zusatz von Säuren die Kalksalze zu lösen und die Pilzfäden wieder aufzuhellen, nach eingetretener vollständiger Verkalkung ist letzteres diesseits nicht gelungen; es scheint, dass durch die vollständige Verkalkung die Pilzfäden zu Grunde gehen.

Aus diesem Befunde ergibt sich, dass die Pilze eine zerstörende Einwirkung auf die Muskelfasern — und dadurch auf die Muskeln selbst — ausüben, es lässt sich wenigstens füglich nicht anders denken, als dass die vorgefundenen Veränderungen eine Folge der Einwanderung der Pilzkeime und deren weiteren Entwicklung ist, weil in pilzfreien Muskeln diese Veränderungen nicht vorkommen. Die Schwellung der Muskelfasern, das Verschwinden der Querstreifung, der Zerfall der Muskelfasern, die Verdickung des Sarcolemmas und die Bildung von Granulationszellen in der Umgebung der Pilzrasen lassen dauernde formative Störungen ausser Zweifel und vorübergehende functionelle und nutritive mit Bestimmtheit voraussetzen.

Dem mikroskopischen Befunde entspricht die makroskopische Beschaffenheit des Fleisches. Dasselbe ist erweicht, lässt sich mit dem Finger leicht durchstossen und ist im hohen Grade wässrig-schlüpfrig. An den pilzhaltigen Stellen verliert dasselbe die rothe, normale Farbe und nimmt eine gelblich-graue Färbung an. Diese Veränderungen sind zwar schon unmittelbar nach dem Schlachten wahrzunehmen, treten aber nach dem Erkalten des Fleisches schärfer hervor. Am deutlichsten sind dieselben zu sehen, wenn man ein etwa handgrosses Stück Fleisch nach dem Erkalten auf einen Teller legt und ungefähr 8—12 Stunden hindurch mit einer Glasglocke bedeckt. Alsdann treten nicht nur die oben erwähnten Veränderungen des Fleisches sehr ausgeprägt hervor, sondern es befindet sich auf dem Teller eine verhältnissmässig bedeutende Menge einer röthlichen, wässrigen Flüssigkeit, welche aus dem Fleisch gelaufen ist, dasselbe macht den Eindruck des Zerfliessens.

Dieser Befund beweist, dass die Strahlenpilze in der Muskulatur nicht nur in der äusseren Form, sondern auch in der zerstörenden Tendenz mit den *Actinomyces hominis* und *bovis* verwandt und mit Recht den Actinomyceten zugeordnet worden sind. Die Widerstandsfähigkeit der Pilze gegen äussere Einwirkungen ist eine grössere, als es bei dem ersten Bekanntwerden derselben der Fall zu sein schien. So wird z. B. durch leichtes Aufkochen in Kalilauge oder in verdünnter Essigsäure die Form derselben nicht zerstört, sie bleiben nach dieser Behandlung stets deutlich erkennbar. In einem Stück gepökeltten Fleisch, welches von dem Thierarzt Hasselbach in Pitschen mir übersandt wurde, waren die Pilze ebenso unverändert wie in frischem Fleisch zu erkennen. In concentrirter Salzlösung lässt sich Fleisch mit Strahlenpilzen, ohne eine Veränderung der Pilze herbeizuführen, lange Zeit conserviren. Ich besitze in Salzlösung aufbewahrtes derartiges Fleisch seit 10 Monaten und benutze dasselbe noch heute zur Anfertigung von Präparaten. Zur Herstellung von Färbungen der Pilze empfiehlt sich noch immer am besten die Dunker'sche Methode (schwache alkoholische Cochenillelösung mit nachheriger Besspülung von mit Essigsäure angesäuertem Wasser; auch Färbungen mit Rosalin liefern sehr schöne Bilder. Die von Plaut empfohlene Färbemethode, Hämotoxilin und Weigert'sche Salzsäure ist schwer ausführbar, lässt aber die Rasen sehr schön erkennen; auch ist nach den hier gemachten Erfahrungen diese Methode nicht ganz zuverlässig, da merkwürdiger Weise die Rasen den Farbstoff nicht gleichmässig aufnehmen, einzelne sogar ganz ungefärbt bleiben. Durch Tinction mit Lithion-Carmin und nachträglicher Behandlung mit einer Alkohol-Salzsäure-Mischung werden die durch die Pilze verursachten Veränderungen in den Muskelfasern sehr schön zur Anschauung gebracht¹⁾).

Die Frage über das Vorkommen der Pilze bzw. der Pilzkeime ausserhalb des thierischen Körpers, sowie über die Art der Verbreitung in demselben, muss vorläufig noch als eine offene betrachtet werden, jedenfalls aber ist es zweifellos, dass die Aufnahme der

¹⁾ In neuester Zeit hat Dunker gefunden, dass Lithion-Cochenille ein ausgezeichnetes Tinctionsmittel für sämtliche bis jetzt bekannte Actinomyceten ist. Bei der gelegentlich der letzten hier tagenden Naturforscher-Versammlung auf dem Central-Schlachthof von mir arrangirten Ausstellung mikroskopischer Präparate hatten Mitglieder der verschiedensten Sectionen Gelegenheit, sich von der Vorzüglichkeit des Färbungsmittels zu überzeugen.

Pilze oder Pilzkeime durch das Futter erfolgt, und steht hiermit vielleicht die Thatsache im Zusammenhange, dass die Strahlenpilze am häufigsten, zuerst und stets am weitesten entwickelt in den Zwerchfellspfeilern, in den Bauchmuskeln und Zwischenrippenmuskeln gefunden werden¹⁾.

Für die Fleischschau ist nun die wichtigste Frage, ob das mit Strahlenpilzen durchsetzte Fleisch als Nahrungsmittel für Menschen zugelassen werden darf oder nicht. Ich habe mich von Anfang an für die Zurückweisung aus folgenden Gründen entschieden. Wenngleich durch den Genuss des mit Strahlenpilzen durchsetzten Fleisches die Actinomykose bei Menschen vielleicht nicht hervorgerufen wird, so ist es doch nicht ausgeschlossen, dass die Pilze in anderer Weise als Krankheitserreger auf den menschlichen Organismus wirken können.

Wenn man die grosse Widerstandsfähigkeit der Pilze gegen äussere Einwirkungen in Betracht zieht, so erscheint es in der That fraglich, ob sie durch den Verdauungsprocess zerstört und unschädlich aus dem Körper entfernt werden. Aber von dieser möglichen Schädlichkeit ganz abgesehen, sind die Veränderungen des Fleisches selbst Grund genug zur Zurückweisung; denn Fleisch, welches mit Pilzen durchsetzt, erweicht und von wässerig-schlüpfriger Beschaffenheit ist, besitzt den Charakter von verdorbener ekelregender Esswaare und ist nicht zum Genuss für Menschen geeignet. In Berlin werden die betreffenden Schweine unter Aufsicht ausgeschmolzen und das hierbei gewonnene Fett zur menschlichen Nahrung verwerthet²⁾.

¹⁾ Ueber das Vorkommen des *Actinomyces hominis* oder dessen Sporen ausserhalb des menschlichen Körpers hat Herr Professor Dr. Soltmann in Breslau in dem Jahrbuch für Kinderheilkunde, XXIV. Bd., 1. und 2. Heft eine Abhandlung „über Aetiologie und Ausbreitungsbezirk der Actinomykose“ veröffentlicht, nach welcher es zweifellos erscheint, dass entweder die Pilze oder deren Sporen an den Aehren von *Hordeum murinum* sich befunden, und bei einem Knaben, welcher eine solche Aehre verschluckt hatte, Actinomykose mit tödlichem Ausgange herbeigeführt haben.

²⁾ In Eulenberg's Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medicin B. X, L. IV, H. I, S. 156 befindet sich in dem Aufsatz: „Die Ergebnisse der neueren Untersuchungen des Schweinefleisches“, eine Abhandlung über Strahlenpilze, nach welcher sich der Aufbau des Pilzkörpers je nach der Verschiedenheit des Substrats in verschiedener Weise vollzieht, und zwar derartig, dass zwischen drei „Entwicklungsformen“ unterschieden werden kann. Obwohl diese Darstellungsweise nicht ganz unberechtigt ist, und ich selber, wie aus meinem vorstehenden Artikel zu ersehen ist, der Ansicht bin, dass die Strahlenpilze vorzugsweise in

drei Formen vorkommen, so dürfte doch eine so bestimmte Unterscheidung, wie in dem Euleberg'schen Aufsatz, zu Irrthümern und Missverständnissen führen. Ich mache daher darauf aufmerksam, dass in jedem actinomycotischen Schweine neben den erwähnten die verschiedenartigsten Zwischenformen vorkommen.

Erklärung der Abbildungen (Taf. VI).

Fig. 1. Quetschpräparat.

a a frische Rasen. Dazwischenliegend ein degenerirter Theil der Muskelfaser.

b b theilweis verkalkte. beim Quetschen zerbröckelte Rasen.

Fig. 2. Muskelquerschnitt. (Celloidinpräparat mit Lithion-Cochénille gefärbt.)

a a Zum Theil verkalkte Rasen.

b b Seitlich angeschnittene Rasen.

c c Quer durchschnittene Rasen.

XIV.

Mittheilungen aus dem pathologischen Institut der Kgl. Thierarzneischule zu Berlin.

Von

A. Sticker, Assistent a. d. Kgl. Thierarzneischule.

I. Drei Fälle von allgemeiner Sarcomatose beim Pferde.

A. Ein zu schwerem Arbeitsdienste gebrauchtes Pferd wurde unter Symptomen, die zunächst an Darmkolik denken liessen, in die innere Klinik der Thierarzneischule aufgenommen. Es erhielt eine subcutane Injektion von 00,8 Grm. Physostigmin. Der Tod erfolgte innerhalb 6 Stunden.

Autopsie: Wohlgenährtes Cadaver. Hinterleib stark aufgetrieben. An der Körpermusculatur Todtenstarre. Das Unterhautfettgewebe und das subperitoneale Polster gut entwickelt.

In der Bauchhöhle ca. 10 Liter flüssiges, dunkelrothes Blut. Die Wand des Zwölffingerdarmes an der Uebergangsstelle in den Leerdarm blutig infiltrirt, besonders in der Nähe der Gekrösanheftung. Gleiche Beschaffenheit an der Wand des Anfangstheiles des Mastdarmes. In der linken Nierengegend eine kindskopfgrosse, schwarzröthliche, weiche Masse, zum Theil bedeckt vom Bauchfell, zum Theil durch letzteres hervorgebrochen. Die Masse besteht aus grösseren Klumpen geronnenen Blutes, aus Fettgewebe (Nierenfettkapsel) und aus hasel- bis wallnussgrossen Geschwülsten. Letztere liegen an der Innenfläche der Capsula adiposa, sind wenig derbe, trübe und grauröthlich gefärbt. Arteria et Vena renales sind intact, ebenso die mit vieler Mühe herauspräparirte linke Nebenniere; die Gefässe der Nierenkapsel vergrössert, stellenweise zerstört. In der Umgebung der fetzigen Ränder weiche, bröcklige Geschwulstmassen und dunkelrothes Blutgerinnsel. Die linke Niere 25 Cm. lang, 12 Cm. breit. Die Fettkapsel zwei Finger stark; die

eigene Kapsel mässig verdickt. Die Oberfläche der Niere dunkelroth, höckerig. Die Rindenschicht auf der Durchschnittsfläche dunkelroth, ihre histologische Einrichtung verwischt; die Grenzschrift undeutlich; die Markschicht hellröthlich gestreift. — Die rechte Niere 21 Cm. lang, 15,5 Cm. breit. Die Oberfläche hell grau-braun. Die Rindenschicht gelb-röthlich, deutlich streifig; Glomeruli nicht sichtbar. Grenzschrift dunkler gefärbt, Markschicht hellgelb. Beim Ueberstreichen quillt aus den Warzengängen eine gelblich-weiße, zähe Flüssigkeit.

In den Pleurasäcken und in dem Herzbeutel kein abnormer Inhalt. Das Herz vergrößert; von der Basis zur Spitze 22 Cm. lang. Die Dicke der linken Herzwand 3,5 Cm., die der rechten 1,5 Cm. Das viscerele Blatt des Pericardiums durchsichtig. Der Herzmuskel grau, anämisch, stark brüchig. Die zweizipflige Klappe stark, die linken Semilunarklappen mässig verdickt und verkürzt. Klappen der rechten Herzhälfte normal. Das Endocard der linken Kammer mässig geschwollen; unter demselben an den Papillarmuskeln, den Herzbalken und am untern Rande der Klappen zahlreiche, röthliche Herde. An mehreren Stellen kleine, bis linsengrosse weiße Herde. Letztere fehlen in der rechten Kammer; die blutigen Herde zahlreich an den Papillarmuskeln und der freien Wandfläche. In den Vorkammern nichts Abnormes.

Die Geschwulstmassen bestehen aus grossen, spindelförmigen Zellen mit wenig Intercellularsubstanz, dagegen reichlich entwickeltem Blutgefässsystem. Ebenso bestehen die kleinen, trüben Herde der linken Kammerwand aus deutlichen Spindelzellen mit länglich ovalem Kerne. Danach gestaltet sich die pathologisch-anatomische Diagnose, wie folgt: Sarcoma fusocellulare in der Bauchhöhle, Druckatrophie der linken Niere, Myocarditis parenchymatosa, metastatische Herde und Hypertrophie des linken Herzens, Ruptur der Gefässe der Nierenkapsel, Haematocoele, Endocarditis retrahens valvularum bicuspidalis et semilunarum aortae, Anämie der grossen Parenchyme.

B. Ein Pferd, welches wegen allgemeiner Sclerose der Haut, multipler Abscessbildung, Schwellung der Lymphdrüsen das Bild von chronischer Rotzerkrankung darbot, wurde getödtet. Die am Tage der Tödtung vorgenommene Section ergab das Folgende.

Autopsie: Die Haut ist fast um das Doppelte verdickt; an zahlreichen Stellen mit schmutziggrauem Schorfe bedeckt. Die Unter-

haut, besonders an den Extremitäten stellt eine derbe, fibröse, bis zu 2 Cm. dicke Schicht dar, welche von zahlreichen kleinen gelben Zerfallsherden durchsetzt ist. Die Lymphgefässe, stark geschwollen, enthalten klares, bernsteinfarbenes Serum. Die Lymphdrüsen, besonders die Leisten- und Achseldrüsen bedeutend vergrössert, auf dem Durchschnitt weisslichgrau, trübe, feucht. In den Gelenkhöhlen und Sehnenscheiden eine grössere Menge klaren Serums.

Unter der Serosa des Magens gries- bis hirsekorngrosse, dicht gedrängt stehende, weisse, derbe Knötchen. Die Milz bedeutend vergrössert, — 49 Cm. lang, 26 Cm. breit, 4,5 Cm. hoch; ihre Oberfläche stahlblau. Unter der Kapsel der dem Magen abgewandten Fläche drei kirschgrosse, weissgefärbte, derbe Geschwulstknoten, in ihrer Nähe reichliche Vascularisation. Die Lymphdrüsen der Milzrinne taubeneigross, derbe. Durchschnittsfläche granulirt, weissgrau, aus hirsekorngrossen derben Knötchen zusammengesetzt. Die Leber vergrössert, derb; unter der Kapsel einzelne zerstreut liegende, grieskorngrosse, weisse Knötchen; dicht gehäuft in der Leberpforte. Die Lymphdrüsen der letzteren von Faustgrösse, derbe, auf dem Durchschnitt trocken und feinhügelig. Auf dem peritonealen Ueberzuge des Zwerchfells in der Nähe der Wirbelsäule zahlreiche gries- bis hirsekorngröse, derbe Knötchen; ebenso auf der Pleura an der Zwerchfellsfläche beider Lungen. Das Lungengewebe lufthaltig, hellröthlich. Die bronchialen, mediastinalen und unteren Halslymphdrüsen geschwollen, derbe, auf der Durchschnittsfläche grauweiss, höckrig. Am Bruststück der Luftröhre sind die Knorpelringe an ihren oberen Theilen zu haselnussgrossen, derben Geschwülsten aufgetrieben, deren Durchschnitt in der Peripherie höckrig, derbe, im Centrum weissgelbliche, eitrige Zerfallsmassen enthält. Auf dem Pericard zahlreiche miliare Knötchen.

Das Herz ist bedeutend vergrössert, wiegt 9 kg. Die linke Kammer 24 Cm. hoch, die rechte 21 Cm. Das rechte Herzohr fast kindskopfgross, aus einzelnen wallnussgrossen, derben Knoten zusammengesetzt. Unter dem Epicard des linken Herzohres dichtgedrängt gries- bis hirsekorngrosse, weisse derbe Knötchen; ebenso unter dem Epicard der Kammern, besonders an der Herzspitze; ferner unter dem Endocard, besonders an der Scheidewand der linken Kammer und an der zweizipfligen Klappe; in der linken Vorkammer bilden sie eine zusammenhängende Schicht.

Die Schleimhaut der Nase mit zähem Schleim bedeckt, stellen-

weise verdickt, undurchsichtig, besonders am hinteren Theile der mittleren Nasenmuschel. Unter der Schleimhaut der letzteren trübe, submiliare Knötchen bis zu den Choanen hin.

Im mittleren Nasengange zahlreiche, hirsekorn-grosse, weisse, derbe Knötchen, die zum Theil zu einer gelben käsigen Masse zerfallen.

Kleine, derbe Knötchen dicht gedrängt an einzelnen Stellen der Zwischenrippenmuskeln.

Die mikroskopische Untersuchung der in so verschiedenen Geweben und so zahlreichen Organen sich vorfindenden Neubildung ergibt, dass diese zum grössten Theile aus spindelförmigen Zellen mit grossem, ovalem Kerne und faseriger Intercellularsubstanz besteht. Die Deutung als Spindelzellensarkom ist somit gerechtfertigt. In den Lymphdrüsensarkomen war das Drüsengewebe zum grossen Theile noch erhalten.

Chronologisch ordnen sich muthmasslich die krankhaften Veränderungen in folgender Weise:

Peritonitis, Pleuritis, Pericarditis sarcomatosa. Metastasen in der Milz, in den Muskeln, Herzfleisch, Zwerchfell, Magen, Luftröhrenringen, Nasenschleimhaut. Lymphadenitis sarcomatosa der retroperitonealen Drüsen, der Drüsen der Leberpforte, Milzrinne, der mediastinalen, bronchialen Drüsen.

Chronische Prozesse in der Unterhaut, den Lymphdrüsen und Lymphgefässen der Extremitäten. Chronischer Katarrh der Nasenschleimhaut.

C. Ein 10jähriger Wallach wurde in der Klinik auf Pneumopleuresia dextra behandelt. Im unteren Drittel der rechten Brustwandung war vollständige Dämpfung bei der Percussion und deutlich wahrnehmbares bronchiales Athmen vorhanden. Andere Symptome waren weniger ausgeprägt ¹⁾. Das Pferd verendete am dritten Tage unter dyspnoischen Erscheinungen. Bei der Autopsie wurde Folgendes festgestellt.

Im freien Raume der Bauchhöhle eine grosse Menge einer dunkel-

¹⁾ „Die Diagnose auf ein Pleurasarcom ist nach den vorhandenen Symptomen positiv nicht zu stellen, führt vielmehr häufig zu Irrthümern. Eine Verwechslung mit käsig-pneumonischen Infiltrationen der Lungen leicht.“ Fraentzel in v. Ziemssen's Handbuch der spec. Pathol. u. Therapie. Bd. IV.

rothen Flüssigkeit. Die Lage der Baueingeweide ohne besondere Abweichungen. Die Schleimhaut der linken Magenhälfte grünlichweiss, in zahlreiche Längs- und Querfalten gelegt, an vielen Stellen vom Epithel entblösst. Am gefranzten Rande eine wallnussgrosse, gestielte Geschwulst, die von Plattenepithe bedeckt. Die Labdrüsen- und Schleimdrüsenpartie geschwollen, trübe und mit festanhaftendem Schleime bedeckt. Die Dünndarmschleimhaut grau weiss; die Peyer'schen Haufen leicht netzartig geschwollen, die Follikel deutlich sichtbar. Der Blind- und Grimmdarm durch Gase stark aufgetrieben, die Schleimhaut grau-röthlich, stellenweise grünlich gefärbt. Der Mastdarm in seiner ganzen Länge mit Koth gefüllt und über armdick. Die Serosa heftig geröthet. Zwischen derselben und der Muscularis gleich nach dem Uebergange des Grimmdarmes in den Mastdarm eine zwei faustdicke Geschwulst, welche in das stark verengte Lumen des Darmes ragt und von aussen kaum sichtbar. Das Ende des Gekrösthails des Mastdarmes auf einer Länge von 26 Cm., von hühnerei- bis apfelgrossen, rundlichen, derben Geschwülsten ringsum besetzt. Die Milz 1100 Grm. schwer; ihre Kapsel mässig verdickt; Consistenz ziemlich derb. Das Balkengewebe auf der Durchschnittsfläche deutlich hervortretend; die Pulpa fest, braunroth gefärbt.

Beide Nieren wiegen zusammen 2500 Grm. Ihre Kapsel leicht abziehbar; Marksubstanz geröthet, deutlich gestreift, Grenzschicht dunkelroth. Die Markstrahlen der Rindenschicht und die gewundenen Harncanälchen verbreitert, trübe, grauweiss. Die Glomeruli injicirt.

Die Leber 6500 Grm. schwer. Ihre Kapsel dünn und zart. Am rechten und mittleren Lappen zahlreiche, hirsekorn-grosse, verkalkte Knötchen, meist reihenartig angeordnet. Das Leberparenchym derbe, braunroth.

In der Schaufelknorpelgegend, vom Bauchfell überzogen, eine kindskopfgrosse, derbe Geschwulst (2000 Grm. Gew.). Sie erscheint gelappt und aus zahlreichen, runden Knoten zusammengesetzt.

Am Herzen, welches 3000 Grm. wiegt, keine besonderen Veränderungen. In den Pleurasäcken kein abnormer Inhalt. Die Pleura costalis und diaphragmatica mit zahlreichen, bis zu 4 Cm. langen Anhängseln besetzt, die den Charakter von Schleimgewebe besitzen. Am hinteren Rande der rechten Lunge eine pferdekopfgrosse, 6500 Grm. schwere Geschwulst. Dieselbe lässt sich in Unterabtheilungen zerlegen. Auf dem Durchschnitt markiren sich tauben- bis hühnerei-

grosse Knoten, zwischen denselben Züge von Bindegewebe und Blutgefässe, die zum Theil in die Geschwulstmassen hineinziehen.

Die einzelnen Knoten erscheinen weiss, mit einem Stich ins Gelbe, sind weich, jedoch ohne Spur von Zerfall und besitzen grosse Aehnlichkeit mit Gehirnmasse.

Die von der Geschwulstmasse ausgehenden Venen verlaufen dicht unter der Pleura und bilden am hinteren und inneren Rande der Lunge griffelstarke, mit Blutgerinnseln gefüllte Stämme, die im Mediastinum nach vorne ziehen. Hier findet sich zwischen beiden Lungen eine ebenso beschaffene Geschwulstmasse, deren Gesamtgewicht 7400 Grm. beträgt. Der Schlund liegt oberhalb derselben; seine Muskulatur im hinteren Abschnitt bis zu 1 cm verdickt. Die bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen sind derb, bläulich-roth gefärbt. Das interstitielle Gewebe vermehrt, das Parenchym atrophisch. Beide Lungen stark retrahirt; ihre Durchschnittsfläche spiegelnd, dunkelroth gefärbt, luftleer, mit Ausnahme der zungenförmigen Lappen und des unteren scharfen Randes.

An mikroskopischen Schnitten, die aus den Mastdarmsarkomen angefertigt wurden, konnte man den Ausgang der Sarkome von der Gefässwand beobachten. Die spindelförmigen, mit ovalem Kerne versehenen Zellen waren sämmtlich dem Verlaufe der Gefässe längsgerichtet, von einer Gefässwand wenig vorhanden. Die Zellen besaßen einen langgestreckten Leib und bildeten mit ihren benachbarten faserige Züge, denen jede Intercellularsubstanz fehlte.

Diagnose: Mastdarmsarkom, Metastasen unter dem Bauchfell, unter der linken Lungenpleura und zwischen den Blättern des Mittelfells. Stenosirung des Mastdarmes, Tympanitis des Dickdarmes; Compressionsatelektase beider Lungen.

Alle drei Fälle haben das Gemeinschaftliche, dass eine Weiterverbreitung der Sarkome durch die Blutbahn und nicht durch die Lymphbahnen stattfand. Im Falle I war das retroperitoneale Sarkom primäre Geschwulst.

In die stark vergrösserten Venen der Nierenkapsel war die Geschwulst hineingewuchert, einzelne Stücke hatten sich losgerissen und waren mit dem Blutstrom nach dem rechten Herzen gebracht worden, hatten die Lunge ohne Nachtheil passirt und waren durch die linke Kranzarterie nach der Wand des linken Ventrikels gelangt, um dicht

unter dem Endocard zu linsengrossen, metastatischen Herden heranzuwachsen. — In Fall III bestand ebenfalls keine Affection der Lymphdrüsen, obschon eine allgemeine Verbreitung der Sarcome von der Bauchhöhle nach der Brusthöhle stattgefunden. Das Sarcom im Mediastinum war gewissermassen in die Blutbahn zwischen Lungensarcom und Herz eingeschoben. Die mediastinalen und bronchialen Lymphdrüsen waren nicht sarcomatös erkrankt; sie zeigten nur die im Befunde wiedergegebenen Veränderungen.

Der Fall II, bei welchem die grösste Ausbreitung der Sarcome stattfand, bietet eine schwierigere Beurtheilung. Doch glaube ich auch hier nicht fehl zu gehen, wenn ich die sarkomatösen Veränderungen der Lymphdrüsen als das sekundäre hinstelle. Es ist eine charakteristische Eigenschaft der Sarkome, sagt Billroth, die Lymphdrüsen gar nicht oder erst spät zu inficiren. Das Herz war das primär erkrankte Organ. Sein Gewicht betrug 9 Kgr., also das Dreifache eines normalen Herzens von einem mittelgrossen Pferde. Die Sarcome der übrigen Organe erreichten nur die Grösse einer Haselnuss. Später erfolgte die Affection der Lymphdrüsen, welche in kurzer Zeit die Grösse einer Faust erreichten. Durch ihre Erkrankung boten sie sämtlichen Lymphdrüsen der Bauch- und Brusthöhle für die Fortleitung der Lymphe ein Hinderniss und dies macht die Hypernutrition der Haut, besonders an den Extremitäten erklärlich.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass sämtliche Pferde im äusseren Habitus keinen Rückgang der Ernährung zeigten. Das subcutane Fettpolster war gut entwickelt; das Haarkleid glatt und glänzend.

Eine Bestätigung finden aus Obigem folgende Thesen:

1. Die Verbreitung der Sarcome geschieht durch die Blutbahn.
2. Die Affection der Lymphdrüsen erfolgt gar nicht oder erst sehr spät.
3. Die allgemeine Sarcomatose führt, entgegen früherer Anschauung, nicht nothwendig einen kachektischen Zustand herbei.

2. Polyarthritits deformans beim Pferde (polyarticulärer chronischer Rheumatismus).

Ein Fall von tödtlich verlaufener Peritonitis (Folge von Blinddarmruptur; klin. Diagnose: Colica chronica) bot insofern Bemerkenswerthes, als eine über das ganze Scelett verbreitete, mit Missbildung einhergehende Affection der Gelenke bestand. Eine functionelle Störung dieser Apparate war intra vitam nicht zur Beobachtung gelangt; ein innerer Zusammenhang mit den Symptomen chronischer Kolik nicht ersichtlich, immerhin nicht ausgeschlossen.

Mit Uebergehung des übrigen Sectionsbefundes schildere im Folgenden die an den Gelenken vorgefundenen Veränderungen. Untersucht wurden sämmtliche Gelenke an den Gliedmassen, ferner das Unterkiefergelenk, das Hinterhauptsgelenk und das Kreuzdarmbeingelenk. An allen war der Gelenkknorpel deutlich abgeschliffen. Die Ränder mit unregelmässigen, blumenkohlähnlichen Knorpel- bez. Knochenneubildungen besetzt, besonders am Tibio-astragal- und Kniegelenke. Die Synovialmembran verdickt, an einzelnen Stellen, besonders in der Nähe der Ränder der Gelenkknorpel und an der Beuge- und Streckseite mit zottigen, stark gerötheten Anhängseln besetzt. Die sub-synovialen Gefässe stark injicirt. Die Synovia vermehrt, dünn und trübe.

Vom anatomischen Standpunkte aus betrachtet stellen vorliegende Veränderungen das Bild einer Polyarthritits deformans dar. Aetiologisch stellt sich die Frage schwieriger. Nach Stockfleth, der ähnliche Veränderungen an den Gelenken einer Besprechung unterzieht, sollen sie im Gefolge der Gelenkwassersucht, der Gelenkgalle auftreten, deren Ursachen theils Ueberanstrengungen, theils wiederholte Erkältungen seien. So sehr auch, zumal in neuerer Zeit, die „Erkältung“ als Krankheitsursache zurückgedrängt worden ist, neige ich im vorliegenden Falle dazu, obige Gelenkveränderungen auf ihren Einfluss zurückzuführen und somit von einem polyarticulären, chronischen Rheumatismus zu sprechen.

3. Psorospermien im Herzfleisch des Schafes.

Leisering und Dammann veröffentlichten in den Jahren 1866 bez. 1867 in Virchow's Archiv zwei Fälle von Psorospermienkrankheit beim Schafe. Hauptsächlich war es die Musculatur des Schlundes, welche erbsen- bis haselnussgrosse Knoten aufwies, bei deren Oeffnung eine milchig-eitrige Flüssigkeit sich entleerte, die aus hufeisenförmigen Körperchen bestand, sowie aus vollständig erhaltenen Rainey'schen Schläuchen. In beiden Fällen waren die Muskelfasern vollständig zu Grunde gegangen. Obwohl nun, besonders in den von Dammann beschriebenen Falle, das Vorkommen von Psorospermien in der übrigen Musculatur verfolgt und angegeben wurde, finde ich nirgends eine Angabe über Psorospermienbefund in der Herzmusculatur. In einem vor Kurzem zur Section gelangten Falle wurde ausser der starken Abmagerung, der anämischen Beschaffenheit sämtlicher Organe, der hyperplastischen Vergrösserung der intestinalen Lymphdrüsen, eines hochgradigen Lungenödems und einer entzündlichen Röthung des Knochenmarkes, an der Ansatzstelle der Stimmbänder am Giesskannenknorpel zwei beiderseits bis in die submucosa reichende hirsekorn-grosse Geschwüre, deren aetiologischer Zusammenhang mit dem übrigen Krankheitsbilde des Späteren einmal erörtert werden soll, gefunden. Das Herz zeigte keine Veränderungen des Epicardiums; das Fett in den Furchen war atrophisch; das Endocard glatt und glänzend. Unter dem Letzteren konnten bei Loupenvergrösserung weisse, trübe, dicht gesäte Pünktchen wahrgenommen werden, die an den Stellen, wo sie reihenweise angeordnet, mit den Purkinje'schen Fäden grosse Aehnlichkeit besaßen. Nach Entfernung des Endocards wurden sie in dem blossrothen Untergrunde der Musculatur deutlich sichtbar.

Unter dem Mikroskope bilden sie längliche, ovale Körper, an denen sich eine äussere feine Hüllenschicht weissen lässt, die sich gleichzeitig in das Innere senkt und mehrere Unterabtheilungen bildet. Der Inhalt besteht aus 0,14—0,20 μ langen und 0,05—0,08 μ breiten, runden Körperchen, die ein glänzendes Korn an einem Pole bergen. Ein derartiges Gebilde liegt jedesmal innerhalb einer Muskelfibrille und ist die Querstreifung der letzteren vollkommen erhalten.

Die Muskelkerne erscheinen geschrumpft; sonst ist keine Veränderung des Muskelplasmas nachzuweisen.

In der Literatur finde ich eines gleichen Befundes Erwähnung gethan in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (herausgegeben von Siebold und Kölliker) V. Band 1854. v. Hessling fand bei der Untersuchung der Purkinje'schen Fäden in der Herzmusculatur theils runde, theils längliche Körper von dunklem, körnigem Aussehen sowohl innerhalb der Purkinje'schen Fäden als auch innerhalb der Muskelmasse des Herzens selbst. Auch in Schichten des Endocardiums, von dessen Fasern eingehüllt und umspinnen, sollen sie vorkommen. Ueber ihre Genesis ist er im Unklaren, ebenso v. Siebold. Doch bemerkt letzterer in einem Zusatz, dass er gleich Miescher an eine parasitäre Natur derselben glaube. Er sei geneigt, sie den schimmelartigen Entophyten beizuzählen.

Auch heute nach 32 Jahren sind die Ansichten über das Wesen dieser Körperchen noch nicht geklärt. Man rechnet sie bald zu den Mycophyceten, bald zu den Gregarinen. Die Schläuche werden als Pseudonavicellenbehälter der Gregarinen gedeutet.

XV.

Ueber perniciöse Anämie beim Pferde.

Von

Prof. Dr. Fröhner in Berlin.

(Vortrag, gehalten auf der 59. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte.)

Von allen Krankheiten der internen Medicin sind die sog. constitutionellen Blutanomalien: Anämie, Chlorose, Leukämie, Pseudo-leukämie, noch am wenigsten erforscht. Auch die perniciöse Anämie, über welche ich heute sprechen will, ist ein bezüglich ihrer Aetiologie noch ziemlich unklares Leiden. Seit ihrer Entdeckung durch Addison im Jahre 1855 und den grundlegenden Beobachtungen Biermers in den Jahren 1868—1872 haben sich in der Menschenheilkunde neuerdings eine Reihe von Forschern bemüht, etwas mehr ätiologisches Licht über das Wesen der Krankheit zu verbreiten. An dieser Stelle sind vor allem die Namen Quinke, Eichhorst, Sorensen, Laache, Zenker, Immermann, Ponfick, Gusserow, Frankenhäuser u. A. zu nennen. Ich will zunächst versuchen, in Kürze unsere heutigen Kenntnisse über Aetiologie, Symptomatologie und Sectionsbefund bei der perniciösen Anämie des Menschen zusammenzufassen, um bezüglich dieser Krankheit bei unseren Hausthieren von vornherein einen Anhaltspunkt zu bieten.

Man unterscheidet beim Menschen gewöhnlich 2 Formen von perniciöser Anämie, eine idiopathische oder essentielle und eine symptomatische. Die Ursachen der ersteren Form, welche eigentlich allein berechtigt ist, als eine Krankheit im eigentlichen Sinne des Wortes zu gelten, sind nicht bekannt. Im allgemeinen werden schlechte Ernährungs- und Wohnungsverhältnisse und ähnliche Einflüsse als Ursachen angenommen. Dem Wesen nach halten die einen

das Leiden für eine Infectionskrankheit, wohl die richtigste Auffassung, welche sich auch mit Thatsachen aus der Veterinärpathologie belegen lässt, die anderen für ein constitutionelles Leiden des Blutes oder des rothen Knochenmarks. In den bis jetzt beobachteten Fällen hat sich die Krankheit fast immer als unheilbar erwiesen.

Die 2. Form ist bezüglich ihrer Ursachen besser gekannt. Sie wird nämlich durch gewisse blutsaugende Eingeweidewürmer hervorgerufen, von denen *Ankylostomum (Dochmius) duodenale* und *Botriocephalus latus* die wichtigsten sind. Ersteres wurde von Perroncito im Jahre 1880 als die Ursache der progressiven perniciosösen Anämie unter den Arbeitern im Gotthardtunnel, sowie später übereinstimmend von anderen Beobachtern bei der in verschiedenen Bergwerken und Ziegelbrennereien vorkommenden Anämie constatirt. Diese Form der Anämie ist selbstverständlich heilbar; sie verdient jedoch als blosses Symptom einer Helminthiasis den Namen einer besonderen Krankheit nicht.

Die Erscheinungen während des Lebens bestehen der Hauptsache nach in allgemeiner Blutarmuth, Anämie der Schleimhäute, leichter Ermüdung, Dyspnoë, schwachem, leicht erregbarem Pulse, Herzklopfen, Aftgeräuschen, Fieber, Abmagerung trotz zuweilen nicht alterirtem Appetite, Netzhautblutungen, Knochenschmerzen, sowie zum Schlusse des Krankheitsbildes in wassersüchtigen Anschwellungen der Haut. Der Beginn des Leidens ist gewöhnlich ein sehr allmählicher, seltener ein acuter.

Bei der Section findet man allgemeine Anämie als Haupterscheinung. Daneben Verfettung der wichtigsten Organe ohne anderweitige Veränderungen, so der Herz- und Körpermuskulatur, der Leber, Milz, der Blutgefässe u. s. w. Sodann gewöhnlich, wenn auch nicht constant, Hämorrhagien fast in allen Organen, namentlich unter den serösen Häuten, in den Muskeln, in der Retina, den grossen Körperdrüsen. Die Milz ist zuweilen geschwellt; das Knochenmark zeigt sich verändert, seine Consistenz ist geléeartig, die Farbe himbeerroth; ausserdem enthält es zahlreiche kernhaltige rothe Blutkörperchen. In der Leber findet man, wie auch in anderen Organen, reichliche Eisenablagerung. Den wesentlichsten patholog. Befund bietet das Blut. Es sind nämlich die rothen Blutkörperchen an Zahl vermindert und in ihrer äusseren Form sehr verändert: sie haben unregelmässige, eckige Conturen, die verschiedenartigsten Gestalten (Bisquit-, Hammer-, Ambos-, Keulen-, Trommel-

schlängelform) und verschiedene Grösse (Makro- und Mikrocyten); auch kernhaltige rothe Blutkörperchen kommen vor. Ganz kurz lässt sich der Zustand des Blutes mit dem Worte Poikilocytose bezeichnen.

Die geschilderte Krankheit ist nun bei unseren Hausthieren zuerst von Zschokke beim Pferde nachgewiesen worden. Im 25. Bande (1885) des „Schweizer Archiv für Thierheilkunde“ beschreibt derselbe 8 Fälle. In ätiologischer Beziehung wurde einmal anstrengender Militärdienst, einmal eine vorausgegangene Lungenentzündung eruiert; ferner erkrankten in einem und demselben Stalle mehrere Pferde. Sonst war an Ursachen nichts zu finden. Stets waren es ausgewachsene Pferde, welche erkrankten. In einem Falle wird ausserdem angegeben, dass das betreffende Pferd nach 10tägigem ruhigem Stehen im Stalle in die Krankheit verfiel.

Das Leiden begann mit Mattigkeit und nervöser Depression, Vermehrung des Pulses und der Athmung, wozu sich blasse Schleimhäute und ein unregelmässig remittirendes, oft tagelang aussetzendes Fieber mit langsam zunehmender Abmagerung gesellten. Die Futteraufnahme war gewöhnlich eine sehr gute. Localerkrankungen liessen sich nicht nachweisen. Nach monatelanger Dauer der Krankheit, wobei zuweilen wochenlange Besserungen zu konstatiren waren, endete dieselbe unter häufiger Ausbildung wassersüchtiger Erscheinungen regelmässig mit Tod.

Bei der Section fiel vor allem der negative Befund auf — kein wichtiges Organ schien in hervorragender Weise erkrankt. Ausser hochgradiger allgemeiner Anämie fand man nur Hämorrhagien, besonders unter den serösen Häuten, Leber- und Milzschwellung, Verlust der Querstreifung der Herzmuskelfasern, Zelleninfiltration und blutige Flecken im Knochenmark, sowie bei der mikroskopischen Untersuchung des Blutes eine Verminderung und auffallende Formveränderung der rothen Blutkörperchen genau wie bei der perniciösen Anämie des Menschen, endlich kleine Stäbchenbakterien.

Die Natur des Leidens glaubt Zschokke etwa mit dem Wechselfieber des Menschen vergleichen zu können.

Aus seiner Beschreibung geht die Identität der geschilderten Pferdekrankheit mit der perniciösen Anämie des Menschen unzweifelhaft hervor, neu ist der Nachweis von Bacterien.

Auch bei anderen Hausthieren sind Fäll von perniciosöser Anämie beobachtet worden. So konstatierte Mégnin bei Hunden und Katzen eine symptomatische durch Ankylostomen hervorgerufene Anämie, welche sich unmittelbar an die symptomatische Form beim Menschen anschliesst. John e fand die Krankheit secundär bei einem Hunde, der mit chronischen Eiterungsprocessen behaftet war. Imminger will sie enzootisch in vielen Fällen beim Rinde beobachtet haben.

Meine eigenen Beobachtungen von perniciosöser Anämie beim Pferde beziehen sich auf 3 Fälle; einen 4. hat Friedberger kürzlich in seiner Klinik zu beobachten die Gelegenheit gehabt. Ich gebe im Folgenden einen kurzen Auszug aus den 3 Krankheitsgeschichten:

I. Fall, beobachtet vom 24. März bis 9. April 1886. Der 8jährige braune Wallach soll seit Jahresfrist krank sein. Anfangs unter den Erscheinungen eines Catarrhes (Husten, Ausfluss etc.) erkrankt. soll das Thier im Verlaufe eines Jahres trotz sehr gutem Appetite auffallend matt geworden sein. Die früher normal gefärbten Schleimhäute wurden zunächst gelblich, weshalb anfangs die Diagnose auf ein Leberleiden lautete, dann ganz blass. Zuletzt soll sich eine Anschwellung des Schlauches und der Unterbrust, sowie eine Vergrösserung der Schilddrüse eingestellt haben. Status praesens am 24. März: Mässig gut genährtes Thier mit glänzendem, glatt anliegenden Haarkleide. In der Widerriestegend lässt sich ein Knötchenekzem mit vereinzelt, stecknadelkopf- bis linsengrossen Knötchen nachweisen. Die äussere Körpertemperatur ist gleichmässig vertheilt. Die Schleimhäute der Augen und der Maulhöhle sind sehr blass; die linke Kehlgangsdrüse ist unbedeutend geschwollen. Mastdarntemperatur 38,3⁰ C.. Pulse 44 p. Min., der erste Herzton unrein, verschwommen, blasend. Futteraufnahme sehr gut, wenn auch langsam, Hinterleib aufgezogen, Koth und Harn durchaus normal. Zahl der Athemzüge 20 p. Min., Nasenschleimhaut sehr blass, Auskultation und Perkussion lassen nichts krankhaftes in derLunge erkennen. Bewegung etwas matt, Psyche leicht eingenommen. Die mikroskopische Untersuchung des Blutes ergiebt eine Verminderung der rothen zu den weissen Blutkörperchen, so dass etwa ein Verhältniss wie 150 : 1 besteht. Die rothen Blutkörperchen zeigen unregelmässige Formen und verschiedene Grössen, das Blut makroskopisch betrachtet, ist blass und dünnflüssig. Auf Grund dieses Untersuchungsbefundes wurde die Diagnose „hochgradige Anämie ohne Lokalaffectationen“ gestellt und eine combinirte Eisen-Arsenikbehandlung eingeleitet. Am 4. Tage der Behandlung stieg die bis dahin normale Temperatur plötzlich auf 40,6 und blieb mit kurzen Remissionen auf dieser Höhe bis zu dem am 16. Tage erfolgten Tode. Grössere Dosen Chinin (20 Gr.) hatten im Anfange einen antipyretischen Erfolg, später aber nicht mehr. Die Blässe der Schleimhäute nahm zu, die Bewegung wurde immer matter, das Sensorium trüber; schliesslich kam noch eine starke ödematöse Anschwellung der Extremitäten hinzu. Das Thier verendete unter raschem Abfall der Innentemperatur.

Die wesentlichsten Sektionserscheinungen waren: mässig gut ge-

nährtes Cadaver, Fett- und Bindegewebe blassgelb gefärbt, Schleimhäute und die meisten Innenorgane sehr anämisch. In der Pleurahöhle, im Perikardium und in der Bauchhöhle gelbrothe Transsudate. Unter dem Endokardium, zwischen den Herzmuskelfasern, im Lungenparenchym, unter dem Peritoneum, in der Niere, in der Darmschleimhaut, im Gehirn mehr oder weniger zahlreiche, meist punktförmige Hämorrhagien. Milz und Leber stark geschwollt; in den grösseren Gefässen derselben befinden sich gelbe, geschichtete Thromben. Darminhalt im Blind- und Grimmdarm blutig; die Schleimhaut daselbst blutig gefärbt, mit zahlreichen Blutpunkten besetzt. Die Nieren sind ausserordentlich vergrössert, die rechte wiegt 2240, die linke 2250 Gramm. Die fibröse Kapsel an beiden Nieren ist zufolge der starken Spannung vielfach eingerissen. Das Nierengewebe ist ausserordentlich blutreich; die Rinde ist von zahlreichen punktförmigen Hämorrhagien durchsetzt. Die Schnittfläche der Nierenrinde ist eigenthümlich granulirt, indem die Glomeruli zu hirsekorngrossen Knötchen angeschwollen sind (hämorrhagische Glomerulo-Nephritis). Die Epithelien der Harnkanälchen sind theils trübe geschwollt, theils verfettet und colloid entartet und enthalten vielfach Hämoglobininfarcte. In der Leber sowie in den Muskelfasern des Herzens zeigt sich beginnende Verfettung. die Oberfläche der linken Grosshirnhemisphäre ist mit einer dünnen Blutschichte bedeckt; am vorderen Ende des linken Streifenhügels findet sich ein kleiner, bohnenförmiger, blutig-seröser Zerstörungsheerd. Das Blut ist wie oben beschrieben beschaffen.

Die Berechtigung der Diagnose: perniciöse Anämie dürfte für den vorliegenden Fall nicht zweifelhaft sein.

Die hochgradigen anämischen Zustände im Leben und bei der Section, die Poikilocytose, Mikro- und Makrocytose, die Verfettung der Muskeln, Leber, Nieren, die allgemeinen Hämorrhagien, der chronische, bis zu tödtlichem Ausgange sich steigernde fieberhafte Verlauf, das Fehlen jedweder anderen Localisation lassen keine andere Deutung zu.

Wie hat man sich nun die Pathogenese des vorliegenden Krankheitsfalles, überhaupt der perniciösen Anämie vorzustellen? Für die nachfolgenden Betrachtungen kommen zunächst die offenbar primären Momente aus dem Krankheits- und Sectionsbefund in Betracht:

- 1) die Poikilocytose und allgemeine Anämie;
- 2) die Gelbfärbung der Schleimhäute, des Körperfettes und der Thromben;
- 3) die Hämoglobininfarcte der Nieren;
- 4) die Milz-, Leber- und Nierenschwellung.

Die übrigen auffallenden Symptome: die Verfettung zahlreicher Organe

und die allgemeine hämorrhagische Diathese werden als secundäre später besprochen.

Ein Einblick in die dunklen Vorgänge bei den Krankheiten des Blutes, insbesondere bei der vorliegenden, ist meines Erachtens erst möglich geworden durch die vor wenig Wochen veröffentlichten Experimentaluntersuchungen aus dem Laboratorium von Ponfick, welche Silbermann in den Nummern 29 u. 30 der „Berliner klinischen Wochenschrift“ vorläufig mitgetheilt hat.

Den genannten Forschern ist es nämlich gelungen, künstlich bei Thieren perniciöse Anämie zu erzeugen und zwar dadurch, dass sie denselben allmählich, d. h. wochenlang kleine Dosen blutauflösender Agentien wie Glycerin, Pyrogallussäure u. s. w. oder lackfarbigen, d. h. hämoglobinhaltigen Blutes einverleibten. Die Thiere — es waren Hunde und Kaninchen — wurden von der 3. Woche ab schlafsüchtig und sehr matt, die Reflexerregbarkeit war bei ihnen gesteigert, die Schleimhäute wurden blass, oder schwach icterisch, die Herzthätigkeit war sehr unregelmässig, der Puls sehr schwach, und es wurden sogar blasende Geräusche bei der Auscultation des Herzens vernommen. Dabei zeigte die Temperatur erhebliche Schwankungen und bewegte sich häufig zwischen 39,8 und 40,6 ° C. Die Excremente waren zuweilen mit Blut vermengt. Die mikroskopische Blutuntersuchung ergab in der ersten Woche noch ziemlich normale Verhältnisse, von der 3. und 4. Woche an war jedoch das Blut auffallend blass, blutwasserähnlich und zeigte die ausgesprochene Poikilocytose, Makro- und Mikrocyten.

Bei der Section fand man sehr starke Anämie, Verfettung der Herzmuskelfasern, der Intima der Arterien, der Leber- und Nierenepithelien, sowie Hämorrhagien in fast allen Organen, namentlich unter den serösen Häuten, in den Schleimhäuten, in der Lunge, in Gehirn- und Rückenmark, den Gehirnhäuten, in der Retina, in der Subcutis.

Die Experimentatoren erklären sich nun ihre Resultate folgendermassen: Die blutauflösenden Agentien trennen das Hämoglobin von den rothen Blutkörperchen, wodurch diese in ihren vitalen Verhältnissen schwer gestört werden, was sich auch äusserlich darin zeigt, dass sie die verschiedensten Formen annehmen; die Poikilocytose, das Hauptkriterium der perniciösen Anämie, ist also identisch mit chronischer Hämoglobinanämie. Hierbei kommt es wegen der ganz allmählichen Auflösung des Blutes nicht zu Häm-

globinurie, welche in acuten und subacuten Fällen immer vorhanden ist. Vielmehr wird das freigewordene Hämoglobin in Milz, Leber und Niere hinreichend eliminiert, welche in Folge dessen anschwellen.

Das im Blute fort und fort aus den Erythrocyten sich abspaltende Hämoglobin wirkt nun aber auf die Regeneration des Blutes in sehr ungünstiger Weise ein. Wie die genannten Autoren durch eine anderweitige Versuchsreihe bewiesen haben, kommt dem freien Hämoglobin im Blute die Rolle zu, dass dasselbe durch die Zerstörung der weissen Blutkörperchen die Bildung des Fibrin-fermentes fördert. Grössere Mengen dieses Fermentes bedingen aber dadurch eine schwere Störung der Circulation, dass sie in Folge der vermehrten Neigung des Blutes zu Gerinnung die Circulation verlangsamten und so eine ausgiebige Regeneration des Blutes in den blutbildenden Organen hemmen. Der Organismus verarmt also sowohl durch den massenhaften Untergang der Blutkörperchen als auch durch ihre mangelhafte Regeneration so sehr an Hämoglobin und damit an Sauerstoff, dass die wichtigsten Organe der Verfettung anheimfallen, welche ihrerseits wieder zu Hämorrhagien Veranlassung giebt. Letztere können indess bei der leichten Gerinnbarkeit des Blutes auch durch capilläre Embolien verursacht sein.

Wenn ich die eben entwickelte Theorie für unseren Fall beim Pferde acceptire, so geschieht dies im Hinblick auf die oben hervorgehobenen Befunde. Die Hämoglobinfarcte in der Niere lassen sich lediglich durch eine Abscheidung des Hämoglobins von den rothen Blutkörperchen, also eine Hämoglobinämie erklären. Die Schwellungen der Milz, Leber und der Nieren sind secundär in Folge der Aufnahme der Bluttrümmer und des Hämoglobins genau so entstanden, wie dies bei der acuten (rheumatischen) Hämoglobinämie des Pferdes beobachtet wird. Die Gelbfärbung der Schleimhäute im Anfange der Krankheit sowie der übrigen Theile ist offenbar als eine hämatogene, nicht als eine hepatogene aufzufassen — und schliesslich einen plausibleren Grund für die auffallende Form der rothen Blutkörperchen, als ihre Trennung vom Hämoglobin zu finden, dürfte schwer sein. Vielleicht lässt sich auch die nach 4 tägigem Stehen in ganz auffallender Weise hervortretende Verschlimmerung in der Weise erklären, dass die Circulationsverhältnisse durch das Stehen noch mehr beeinträchtigt wurden, indem Bewegung ja die Circulation beschleunigt, Ruhe sie dagegen hemmt.

Was nun aber bei der perniciosen Anämie die eigentliche Ursache,

das eigentliche blutauflösende Princip ist, bleibt einer anderen Betrachtung vorbehalten, die ich bei Gelegenheit des 3. Falles anstellen möchte. Vorerst fahre ich damit fort, Ihnen in Kürze den 2. Krankheitsfall zu skizziren:

II. Fall, beobachtet vom 10.—20. December 1885. Das 8jährige Pferd (brauner Wallach) wurde zur Untersuchung auf Dampf mit dem Vorbericht übergeben, dass es vor Kurzem gekauft worden sei und nach ganz kurzer Fahrt so hochgradige Athembeschwerden zeige, dass es zusammenzufallen drohe. Durch gerichtliche Zeugenvernehmung wurde anamnestisch eruiert, dass das Pferd vor etwa einem Jahre an einer schweren, fieberhaften Affection der Brustorgane erkrankte und seit jener Zeit sehr matt war, abmagerte und blasse Schleimhäute bekam. dabei sich jedoch von Zeit zu Zeit wieder scheinbar vollkommen erholte.

Status praesens: Gutgenährtes Thier mit glänzendem, glattem Haarkleid; Lidbindehäute graugelb gefärbt, Kehlgangsdriisen leicht geschwellt. Mastdarmtemperatur 38,8° C., Pulszahl 60, Herzschlag pochend. der Puls klein. Futteraufnahme sehr gut, der Appetit ist sogar gierig zu nennen. Maulschleimhaut blassgelb, Koth und Harn normal. Die Athmung geschieht angestrengt mit 20 Zügen p. Min. und steigt bei der geringsten Aufregung des Thieres durch Geräusch, z. B. auf 28—32. Nasenschleimhaut sehr blass, Auskultation und Perkussion normal. Die Bewegung ist matt, die Psyche des Thieres ziemlich frei.

Schon am Tage darauf stieg die Mastdarmtemperatur auf 40,2, die Athemfrequenz auf 40 Züge p. Min., die Herzthätigkeit war eine sehr aufgeregte, die Bewegungen des Thieres wurden sehr matt. Das Fieber verblieb mit ganz geringen Remissionen bis zum Tode des Thieres auf dieser Höhe, die Futteraufnahme war jedoch bis 3 Tage vor dem Tode eine ganz vorzügliche. Dagegen fiel eine allmählig zunehmende Abmagerung auf; der Harn enthielt ferner mässige Eiweissmengen. Die Behandlung mit Digitalis, Campher, Alkohol und Wein blieb erfolglos. Die Untersuchung des Blutes ergab einen bedeutenden Mangel an rothen Blutkörperchen, viele Blutplättchen, unregelmässige Form und Grösse der rothen Blutkörperchen, körnige Schollen, sowie zahlreiche weisse Blutkörperchen. Am 10. Tage der Behandlung verendete das ganz anämische, hinfällig gewordene Thier, ohne dass bis zu diesem Zeitpunkt ausser der Blutveränderung irgend eine Organaffektion nachweisbar geworden wäre.

Bei der Sektion fand man zunächst die Residuen einer alten adhäsiven Pleuritis; in den Brustfellsäcken, im Herzbeutel sowie in der Bauchhöhle, sodann hämorrhagisches Transsudat. Sämmtliche Organe waren hochgradig anämisch, die Muskulatur des Herzens, die Skelettmuskulatur, das Leber-, Lungen- und Nierenparenchym fettig degenerirt. Im Hüft-Blinddarmast der vorderen Gekrösarterie sass ein alter geschichteter Thrombus. Das Blut zeigte die oben erwähnten Veränderungen.

Ausser in wissenschaftlicher war dieser 2. Fall auch in praktischer Hinsicht insofern bemerkenswerth, als die gerichtliche Frage, ob das Leiden bei der vorhandenen starken Athembeschwerde pro foro als Dampf erklärt werden könne oder nicht, im gegebenen Falle

verschiedene Beantwortung erfahren hat. Der eine Sachverständige sprach sich neulich dafür aus, weil die „Dämpfigkeit“ nur eine Collectivbezeichnung sei, welche die allerverschiedensten pathologischen Processe umfasse, und weil das Thier nachgewiesener Massen 1 Jahr lang die Symptome des Dampfes gezeigt habe; so gut ein Herzleiden Dampf im Gefolge haben könne, dürfe dies auch von einem Blutleiden behauptet werden. Ausserdem sei das Leiden unheilbar und chronisch gewesen. Der andere Sachverständige vermisste jedoch eine Hauptbedingung für die Aufstellung des Dampfes: Die Fieberlosigkeit und wies darauf hin, dass, wie unter andern der folgende 3. Fall zeigt, die Krankheit nicht absolut unheilbar sei, dass sie jedoch gewöhnlich direct zum Tode führe, entgegengesetzt den die Dämpfigkeit hervorrufenden Ursachen; auch habe sich das Leiden zur Zeit der Untersuchung jedenfalls in einem acuten Stadium befinden. Ich selbst schliesse mich der letzteren Auffassung an und hätte die Angelegenheit nicht zur Sprache gebracht, wenn es nicht von principieller Bedeutung wäre, ob die bei Anämie, Leukämie, Chlorose u. s. w. symptomatisch vorhandene Dyspnoe unter den Begriff des Dampfes fällt oder nicht.

III. Fall, beobachtet vom 4.—23. Februar 1886. Vom 21. Januar bis 3. Februar wurde in der Stuttgarter Klinik ein schweres Zugpferd an Kronentritt behandelt, in Folge dessen das Thier (13jähriger brauner Wallach) die ganze Zeit über im Stalle stehen musste. Bei der Aufnahme war an dem Thierte ausser dem Kronentritte etwas krankhaftes nicht zu bemerken; dagegen schien die Constitution desselben von Anfang an ziemlich schlaff zu sein, was auch der Kutscher insofern bestätigte, als er mittheilte, dass das Thier nach längerem Gebrauche leicht ermüde und dann stark schwitze. Am 3. Februar war nun der ganze äusserliche Krankheitsprocess abgeheilt und das Thier sollte am anderen Tage abgeholt werden, als dasselbe plötzlich am 4. Februar im Stalle in eigenthümlicher Weise erkrankte. Hiebei muss darauf hingewiesen werden, dass die Ventilations- und Abzugsvorrichtungen dieses Stalles sehr ungünstige waren und dass genau dasselbe Krankheitsbild, wie es im folgenden beschrieben werden soll, in diesem Stalle früher schon öfters bei Pferden nach längerem Aufenthalte in demselben aufgetreten war und in früheren Jahren selbst einen tödtlichen Ausgang genommen hatte, Umstände, welche zur Annahme eines Stallmiasmas, einer Stallseuche, Veranlassung gaben. Die Krankheit begann mit einem plötzlichen Fieberanfall; während die Temperatur am 3. Februar noch 37,6 betrug, stieg sie am 4. in der Früh auf 39,1, Abends auf 40,0° C., desgleichen der Puls von 36 auf 44 Schläge p. Min. Die Schleimhäute der Augen erscheinen gegen früher deutlich blässer. Der Puls ist schwach, aber regelmässig und gleichmässig, der Herzschlag pochend, die Herztöne rein. Aus beiden Nasenöffnungen entleert sich seröser Ausfluss in mässiger

Menge; der Kehlkopf ist bei Palpation etwas empfindlich. Perkussion und Auskultation ergeben normale Verhältnisse. Die Futteraufnahme ist eine sehr gute geblieben; die Bewegungen des Thieres geschehen etwas matt. In den nächsten 2 Tagen stieg der Puls auf 60 und 64 Schläge p. Min., die Temperatur auf 40,0° C.; der Nasenausfluss wurde stärker und nahm eine schleimig-eiterige Beschaffenheit an, dazu kam ein häufiger, schmerzhafter, matter Husten und eine sehr starke Empfindlichkeit des Kehlkopfes. Auch die Mattigkeit des Thieres nahm so zu, dass dasselbe mit dem Hintertheil beim Gehen schwankte; die Füsse waren leicht angelaufen. Am 4. Tage hatten der Ausfluss und der Husten noch mehr zugenommen; die Blässe der Augenschleimhäute war eine sehr auffallende. Der Harn reagirte sauer und enthielt ziemliche Mengen von Eiweiss (2,5 pCt.). Die Temperatur erhielt sich auf gleicher Höhe; irgend eine Organerkrankung war nicht nachzuweisen. Am 5. und 6. Tage Zustand gleich; der Husten hat etwas nachgelassen. Es wird eine Blutuntersuchung vorgenommen. Das der Jugularis entnommene und sofort, ohne jede Zusatzflüssigkeit unter das Mikroskop gebrachte Blut zeigte keine wesentliche Veränderung des Verhältnisses der rothen zu den weissen Blutkörperchen, ausser dass die ersteren an Zahl etwas verringert schienen. Dagegen fiel die verschiedene Grösse und Form der rothen Blutkörperchen auf, man sah abnorm grosse und wieder sehr kleine, sowie in der allerverschiedensten Weise missgestaltete rothe Blutkörperchen, sodann übereinstimmend in mehreren Präparaten, feinste Stäbchenbakterien zwischen den Blutkörperchen und zwar etwa $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ so lang, als der Durchmesser eines normalen rothen Blutkörperchens, jedoch nicht ganz von der Dicke, wie die von Zschokke gezeichneten. In einem Gesichtsfeld befanden sich etwa 4—6 Stück. Am 7. und 8. Tage Temperatur 40,3, Pulszahl 56; Nasenausfluss sehr reichlich; Augen- und Nasenschleimhäute sehr blass, Futteraufnahme verringert. Vom 9. Tage ab die ersten Anzeichen der Besserung; zunächst Sinken der Temperatur auf circa 39,7, des Pulses auf 50, sodann wird der Appetit wieder ein normaler, das Thier frisst sogar noch eine Zulage von 4 Pfund Brot. Der Harn ist noch anhaltend sauer und eiweisshaltig (2 pCt.) Am 15. Tage betrug die Temperatur 39,3° C., die Pulszahl 46, der Nasenausfluss dauert immer noch an, der Husten ist indess ganz verschwunden. Die Anämie der Schleimhäute ist eine sehr bedeutende. Die Futteraufnahme vorzüglich, der Appetit ist sogar ein gieriger zu nennen. Dagegen ist die Mattigkeit des Thieres noch erheblich. An Arzneimitteln wurden in den letzten 10 Tagen verabreicht 80 Grm. Chinin, ausserdem Eisen, Kochsalz, Salzsäure und Wein mit Campher. Vom 15.—20. Tage ging die Temperatur allmählich wieder zur Norm zurück, der Puls erhielt sich jedoch andauernd auf einer Höhe von 40—44 Schlägen. Die Mattigkeit des Thieres hatte sich ebenfalls gemindert, die Anämie dagegen nicht gehoben. In den letzten 5 Tagen bekam das Thier zusammen 200 Grm. Fowler'scher Lösung. Die Rekonvalescenz dauerte jedoch, als es vom Spital abgeholt worden war, noch volle 4 Wochen.

Wenn ich den eben verlesenen 3. Fall trotz seines günstigen Verlaufes den beiden ersten anschliesse und für perniciöse Anämie erkläre, so glaube ich bei der offenbaren Gleichheit der Symptome

und des ganzen Krankheitsverlaufes hierzu berechtigt zu sein; dass ferner die Krankheit mit den von Zschokke beobachteten identisch ist, dürfte ausserdem noch die mikroskopische Untersuchung des Blutes beweisen, welche selbst bis auf den Bacterienbefund übereinstimmende Resultate ergeben hat. Der günstige Ausgang erklärt sich wohl aus der sofort energisch gegen das Fieber eingeleiteten Behandlung und der Schonung des Thieres überhaupt.

Vielleicht lässt der Fall auch einen Rückschluss auf die Aetio-
logie der perniciösen Anämie des Pferdes zu. Auch ohne weitere Berücksichtigung der im Blute gefundenen Bacterien, welche ihrer Natur nach doch noch mehr Wahrscheinlichkeit als Infectionserreger für sich haben dürften, als die von Klebs und Frankenhäuser beim Menschen als Ursache bezeichneten Cercomonaden, deuten verschiedene Umstände auf einen Infectionsstoff als Ursache der Krankheit hin, so dass gleichzeitige Erkranken mehrerer Thiere eines und desselben Stalles, der plötzliche Fieberanfall im Beginn und die wechselfieberähnlichen Steigerungen und Remissionen des Fiebers im Verlaufe des Leidens, die anfängliche Reizung der Respirationsschleimhaut, sowie die vorwiegende Localisation der Krankheitsprocesse im Blute. Von mehr prädisponirender Wirkung scheinen schwere körperliche Anstrengungen, sowie umgekehrt lange Unthätigkeit bei guter Fütterung, ferner, wie 2 Fälle lehren, entzündliche Lungenaffectionen zu sein; sie leisten offenbar dem Eindringen des Infectionsstoffes durch die Schwächung der Körperconstitution Vorschub.

Ich kann das Thema nicht verlassen, ohne auf die Aehnlichkeit meiner und der Zschokke'schen Fälle von perniciöser Anämie mit einem Theile der von Dieckerhoff in der neueren Zeit als Scalma bezeichneten Krankheitsfälle hinzuweisen. Dieckerhoff hat 9 Krankheitsfälle beschrieben, welche allerdings bei milderem Verlaufe ganz dieselben Symptome zeigten, wie die oben genannten Anämiefälle. Seuchenhafter Charakter, ausgeprägte Anämie der Schleimhäute, auffallende Ermüdung, atypischer Fieverlauf bei relativ guter Futteraufnahme, Fehlen jeder Localisation, nur Reizerscheinungen Seitens der Respirationsschleimhaut, sehr langes Reconvalescenzstadium bilden hier und dort die Hauptsymptome. Eine Identität beider Krankheiten jetzt schon zu behaupten, halte ich bei der relativ kleinen Zahl von Beobachtungen für verfrüht — vielleicht lässt aber ein in Zukunft zur Verfügung stehendes grösseres Material positivere Schlüsse zu.

XVI.

Anwendung der Magenpumpe beim Hunde und einige Schlundoperationen bei demselben.

Von

Frick, Assistenten i. d. chirurg. Klinik der Kgl. Thierarzneischule zu Berlin.

(Vortrag auf der Naturforscher-Versammlung im September 1886 zu Berlin.)

Während in der humanen Medicin die Magenpumpe bereits seit vielen Jahren sowohl zu therapeutischen wie diagnostischen Zwecken verwendet wird, fehlen Angaben über die Anwendung dieses Instrumentes bei unseren Hausthieren gänzlich, wenn man absieht von einer Mittheilung, welche Mayhew in „Veterinarian“ von 1847 macht. Genannter Autor hat beim Pferde ein Katheter durch die Nase in den Schlund eingeführt, um so Arzneimittel direct in den Magen zu bringen.

Im hiesigen Spital für kleine Hausthiere hatte ich Gelegenheit, vielfach bei Hunden Verdauungsstörungen und Inappetenz zu beobachten, deren ursächliches Moment im Magen zu suchen war. Die Hunde zeigten folgendes Symptomenbild: Wählerischer oder gänzlich fehlender Appetit, häufige Würgeanstrengungen, im Verlaufe welcher es schliesslich zu Erbrechen einer kleinen Quantität zähen, glasigen Schleimes kam unter gleichzeitigen Hustenstössen. Dieser Husten war oft das auffälligste Symptom ausser dem fehlenden Appetit und gab häufig zu dem Vorbericht Veranlassung, der Hund leide an Husten. Ausser genannten Symptomen waren Zeichen eines akuten Darmleidens nicht vorhanden. Ausgehend von der Idee, dass es sich um perverse Gährungen im Magen handle, in Folge deren abnorme Säurebildung und Brechanstrengung zu Stande kam, hielt ich folgende Behandlung für zweckentsprechend: Entfernung der krankhaften Gährungs-

produkte und Zerstörung der Gährerregere. In der humanen Medicin hat man in der Magenpumpe ein Instrument, vermöge dessen es möglich ist, den Magen zu entleeren und ihn mit anticymotischen Mitteln auszuspülen. Eine directe Anwendung der menschlichen Magenpumpe beim Hunde, war jedoch nicht möglich wegen des Widerstandes seitens des Patienten. Ich benutzte daher einen Harnröhrenkatheter, wie ein solcher für männliche Pferde gebraucht wird und führte diesen vermittelt eines Holzes, wie es beim Einführen der Schlundröhre beim Rinde gebraucht wird, bis in den Magen ein. Auf das freie Ende des Katheters wird sodann vermittelt eines etwa 50 Cm. langen Gummischlauches ein Trichter aufgesetzt und der Apparat ist zum Einführen der Spülflüssigkeit fertig. Als Flüssigkeit zum Ausspülen des Magens benutzte ich anfangs reines Wasser, um ein ungeübtes Urtheil über die Beschaffenheit des Mageninhaltes zu bekommen. Nachdem ein oder zwei Mal der Magen so ausgespült, benutze ich zuletzt lauwarmes Salicylwasser (1 : 300) zur definitiven Spülung. Das Anfüllen und Entleeren des Magens erfolgt in folgender Weise: In den hochgehaltenen Trichter giesst man eine, der Grösse des Magens entsprechende, Quantität Spülflüssigkeit, knetet gleichzeitig sehr vorsichtig die Magengegend, um Mageninhalt und Spülflüssigkeit zu mischen, senkt sodann den Trichter, ehe derselbe ganz entleert ist, tief herab und entleert vermittelt des so entstandenen Hebers den Magen.

Was das Kaliber des Katheters betrifft, so ist dasselbe auch für kleine Hunde zu verwenden, ja, die Weite des Katheters ist sogar erforderlich, um eine Verstopfung durch körperliche Elemente zu verhüten. Sollte wider Erwarten das Ausfliessen der Spülflüssigkeit sistiren, so hat man nur nöthig, den Katheter einige Male hin und her zu schieben, um den Abfluss zu bewerkstelligen. Ist das Quantum der Spülflüssigkeit zu gross, oder drückt man beim Kneten des angefüllten Magens zu heftig, so erfolgt leicht Erbrechen. In diesem Falle muss schnell der Katheter entfernt werden, da sonst leicht Aspiration des Erbrochenen mit ihren Folgen eintritt.

Der Erfolg dieser Behandlung war auffällig. Hunde, welche die Futteraufnahme vollständig verweigerten, verzehrten ihr Futter mit grossem Appetit nach einmaliger Anwendung der Magenpumpe. Wenn ich auch bisher diesen Apparat nur beim Hunde angewendet habe, so glaube ich doch, dass auch bei unseren anderen Hausthieren eine erfolgreiche Verwendung möglich ist.

Im Anschluss hieran mögen einige Operationen, die wegen Fremdkörper (Knochen) ausgeführt worden sind und bei denen der oben erwähnte Katheter ein wesentliches Hülfsmittel abgab, Platz finden.

Der erste Fall betrifft einen kleinen Mops, welcher nach Angabe des Besitzers seit 8 Tagen kein Futter zu sich genommen hatte. Es liessen sich äusserlich keinerlei Symptome für einen Fremdkörper im Schlunde wahrnehmen. Erst die Einführung des Katheters ergab dicht vor dem Zwerchfell einen Widerstand und gleichzeitig fühlte man ein Kratzen am Katheter. Es musste hiernach ein fremder Körper mit rauher Oberfläche im Schlunde dicht vor dem Zwerchfell sitzen. Da eine Entfernung des Fremdkörpers per os nicht möglich war und sich derselbe auch nicht in den Magen einstossen liess, so schritt ich sofort zur Operation, indem ich dicht hinter dem Schaufelknorpel die Bauchhöhle in der weissen Linie eröffnete, sodann einen Schnitt durch die Magenwand, senkrecht zur grossen Curvatur führte und den Körpers (Knochen) mittelst der amerikanischen Kugelzange aus dem Endtheile des Schlundes entfernte. Der Ausgang war leider ein letaler; als Ursache musste der mangelhafte Ernährungszustand des Hundes angesehen werden, der einem derartigen operativen Eingriffe nicht gewachsen war.

Im zweiten Falle handelt es sich um die Entfernung zweier Lendenwirbel vom Hasen, welche im Schlundkopf eingekeilt waren und vom Maule aus nicht entfernt werden konnten. In der rechten Drosselrinne wurde ein Schnitt angelegt, welcher bis auf den Schlund reichte. Die starken Querfortsätze und Dornfortsätze der eingekeilten Wirbel traten sofort in der Wunde zu Tage, da dieselben den Schlund an mehreren Stellen perforirt hatten. Bei der Eröffnung des Schlundkopfes und der Entfernung der Knochen kam es zu verschiedenen Zerreiassungen und Quetschungen der Schlundwunde, so dass eine gequetschte Risswunde des Schlundes vorlag, in die man bequem zwei Finger einführen konnte. Die weitere Behandlung bestand in viertägigem Fasten des Hundes und täglicher Reinigung der Wunde. Die Heilung vollzog sich in 3 Wochen ohne Hinterlassung einer Fistel. Merkwürdig im Verlauf der Heilung war der Umstand, dass beim Abschlucken von Futter und Getränk keine Spur derselben aus der Operationswunde herauskam. Nach Verlauf eines Vierteljahres starb der Hund im hiesigen Spital an der Staupe und bei der von mir vorgenommenen Section fand ich trotz der argen Zerstörung, welche der

Schlund erlitten hatte, weder eine Stenose noch irgend welche Narbenbildung an der Operationsstelle im Schlunde, so dass ich glaube, den Schluss ziehen zu dürfen, dass selbst grössere Verletzungen des Schlundes keinerlei Verengung seines Lumens bewirken.

Sublimatglyceringelatine.

Bei unseren Hausthieren ist nicht überall ein Verband anzulegen, so dass die Bedingungen für eine strenge Antisepsis nicht immer durchführbar sind. Diesem Mangel glaube ich durch die Herstellung und Anwendung der Sublimatglyceringelatine abgeholfen zu haben. Die Herstellung dieses Mittels erfolgt in der Weise, dass man gewöhnliche Speisegelatine mit möglichst wenig (1 pCt.) Sublimatwasser übergiesst und dieselbe darin aufquellen lässt. Nach vier Stunden giesst man das überschüssige Wasser ab und schmilzt die Masse bei ganz gelinder Wärme ein. Der geschmolzenen Masse werden sodann 10 pCt. Glycerin zugesetzt, um die nöthige Elasticität nach dem Trocknen zu erhalten. Die Anwendung des Mittels geschieht einfach in der Weise, dass man dieselbe in geschmolzenem Zustande vermittels eines Haarpinsels in nicht allzu dicker Schicht auf die sorgfältig vernähte Wunde aufträgt. Diese Schicht erstarrt sehr schnell und bildet dann eine elastische Decke auf der Wunde, welche 1) selbst desinficirt ist, 2) die in der Luft enthaltenen Infectionserreger von der Wunde abhält, 3) allen Bewegungen des kranken Theiles nachgiebt, ohne spröde und brüchig zu werden und den Vorzug vor dem Collodium hat, dass es auch auf feuchter Unterlage haftet.

Mittheilungen
aus den
amtlichen Veterinär-Sanitätsberichten.
Berichtsjahr 1883/84.

Zusammengestellt von
Dr. J. Esser und Dr. W. Schlitz.

(Schluss — s. S. 279.)

IV. Öffentliche Gesundheitspflege.

A. Ueberwachung der Schlachtviehmärkte, der Schlachthäuser und des Fleischverkaufes.

Bei der Revision der Fleisch- und Fischmärkte in Berlin fanden 958 Beschlagnahmungen statt; es betraf dies in 853 Fällen Fleisch mit einem Gesamtgewicht von 8517 Kgr., in 44 Fällen Wildpret mit einem Gewichte von 775,75 Kgr. und in 61 Fällen Fische, welche ein Gesamtgewicht von 329,12 Kgr. repräsentirten. Den grössten Theil der Beschlagnahmen bildete das Fleisch, das auf den Bahnhöfen mit Beschlag belegt wurde und bestand zumeist aus unzureichend entwickeltem, fettlosem, wässerigem Kalbfleisch von übelem Aussehen. — Der auf dem Centralviehhof stattgefundene Viehauftrieb, und der von dort erfolgte Viehexport betrug für das Jahr 1883/84

a) Auftrieb	b) Export
Rinder: 149600	52948
Schweine: 422728	148403
Kälber: 107348	ca. 29000
Hammel: 685965	449573.

Unter den aufgetriebenen Rindern befanden sich
26188 Bullen,
70688 Ochsen,
52724 Kühe und Fersen.

Der verhältnissmässig starke Auftrieb an Bullen, der wohl in ähnlichem Verhältniss an keinem anderen Markttorte wieder angetroffen wird, beruht in der zu einer bedeutenden Höhe ausgebildeten Wurstfabrikation Berlins, da anerkanntermassen gerade das Fleisch von Bullen sich zur Herstellung einiger Sorten Wurst besonders eignet. In den öffentlichen Schlachthäusern wurden ausser zahlreichen einzelnen krankhaft veränderten Organen beanstandet, zurückgewiesen und der Polizeibehörde zur weiteren Veranlassung übergeben:

115 Rinder,
2087 Schweine,
16 Kälber,
13 Hammel.

Der Auftrieb auf dem Schlachthofe in Frankfurt a. M. bezifferte sich im Jahre 1883/84 auf:

22755 Ochsen,
15068 Kühe,
25421 Kälber,
7508 Hammel,
42469 Schweine,
6364 Ferkel und Lämmer.

Geschlachtet wurden in den städtischen Schlachthäusern und in Bornheim:

12557 Ochsen,
5008 Kühe,
39491 Kälber,
21117 Hammel,
35485 Schweine,
584 Ferkel und Lämmer.

In dem Schlachthause zu Bockenheim:

359 Ochsen,
3142 Kühe,
1789 Kälber,
679 Hammel,
3330 Schweine.

Beanstandet wurden im Ganzen 500 Stück; vom Grossvieh erwiesen sich als vollkommen ungeniessbar 3 Ochsen und 26 Kühe, und zwar 2 Ochsen wegen jauchiger Bauchfellentzündung in Folge von Blasenruptur und Darmverschlingung, 1 wegen zu später Nothschlachtung bei Apoplexie; 18 Kühe wegen Perlsucht und allgemeiner Tuber-

culose mit Cachexie; 3 Stück wegen jauchiger Gebärmutterentzündung und Pyämie, 1 Stück wegen Abscedirung in der Leber und dem Zwerchfell mit Cachexie, 1 Stück wegen Hydropericardium und Ascites, 1 Stück wegen allgemeiner Muskelentzündung; 5 Schweine wegen Trichinosis und 20 Schweine wegen Finnen; ferner 10 Kälber. Bei den übrigen beanstandeten Stücken wurden nur die einzelnen kranken Theile und Eingeweide beseitigt und der Wasenmeisterei überwiesen, das Fleisch aber resp. die gesunden Theile zum Genusse zugelassen.

Aufgetrieben wurden im Jahre 1883 zum Hamburger Centralviehmarkt:

61820 Rinder,
2483 Kälber,
6025 Schweine,
144361 Schafe;

zum Viehmarkt Sternschanze:

463 Rinder,
46828 Kälber,
736345 Schweine,
3530 Schafe.

Dem Frohn wurden zur Vernichtung überwiesen:

286 Schweine,
25 Rinder,
3 Kälber,
23 Schafe.

Die Frequenz des im Jahre 1883 im Kieler Viehhofe eingestellten Viehes beziffert sich folgendermassen:

1948 Stück Grossvieh,
2894 Kälber,
111140 Schweine,
3812 Schafe,

zusammen 119794 Stück Vieh. Hiervon wurden exportirt 109600 Stück, consumirt 9000 Stück.

Auf dem Kasseler Schlachthofe wurden geschlachtet:

3159 Ochsen bezw. Bullen,
2637 Kühe;

hiervon 30 tuberculös. Es wurden ferner geschlachtet:

21664 Hammel und Kälber,
37 Ziegen.

Bei 574 Thieren wurden Krankheiten festgestellt.

Im Landkreise Hanau wurden 3060 Rinder geschlachtet, hiervon 20 tuberculös, wovon in 2 Fällen das Fleisch als ungenießbar verworfen wurde. Im Schlachthause zu Hanau wurden 2141 Stück Rindvieh geschlachtet. 28 waren tuberculös, 3 so hochgradig, dass das Fleisch verworfen werden musste.

In der Stadt Breslau sind im Etatsjahre 1883/84 auf dem städtischen Schlachthause an Viehstücken zur Schlachtung gelangt:

8361 Ochsen,	gegen 1882/83	—	851,
10656 Kühe,	-	-	+ 188,
37530 Kälber,	-	-	+ 162,
44296 Schweine,	-	-	+ 1208,
28055 Hammel	-	-	— 1208.

Ausserdem sind in den 13 noch bestehenden Privatschlachtstätten ausgeschlachtet worden:

202 Ochsen,	gegen 1882/83	—	57,
659 Kühe,	-	-	— 21,
2959 Kälber,	-	-	— 389,
15035 Schweine,	-	-	+ 1563,
4103 Hammel,	-	-	— 1293,
548 Lämmer,	-	-	— 69.

Von den im städtischen Schlachthofe ausgeschlachteten Thieren sind bei der thierärztlichen Untersuchung vorgefunden worden:

- 25 Rinder mit allgemeiner Tuberculosis,
- 87 Rindslungen mit Tuberkeln,
- 47 Rindslungen mit Blasenwürmern,
- 1 Rindsleber mit Tuberkeln,
- 2 Rindslebern mit Verhärtung,
- 1 Rindsleber mit Blasenwürmern,
- 1 Rindsleber mit Abscessen,
- 12 ungeborene Kälber,
- 45 Schweine mit Finnen,
- 22 todte Schweine,
- 1 Schweinslunge und Leber mit Blasenwürmern,
- 4 Schweine mit Rothlauf,
- 4 todte Hammel,
- 2 Hammellungen und Lebern mit Blasenwürmern.

Diese als ungeeignet zur menschlichen Nahrung verworfenen Thiere und thierischen Theile sind entweder der Ausnutzung für technisch-gewerbliche Zwecke überwiesen oder unschädlich beseitigt worden.

Im Schlachthause zu Oels, woselbst die sämmtlichen Fleischer der Stadt schlachten, sind im Wintersemester

537 Rinder,
743 Kälber,
1394 Schweine,
474 Hammel

geschlachtet worden; eine thierärztliche Controle findet nicht statt.

Im Schlachthause zu Bochum wurden im Jahre 1883 15326 Schweine geschlachtet. Dem Genusse entzogen wurden 3 Kühe wegen hochgradiger Tuberculose, 4 Kühe wegen traumatischer Herzentzündung und Transsudation in Brust- und Bauchhöhle. 1 Kuh wegen Decubitus, 2 Schafe wegen Bauchwassersucht und 5 Schafe wegen Leberegelkrankheit, 2 Schweine wegen Tuberculose und Scrophulose.

Im Schlachthause zu Solingen wurden

2413 Stück Rindvieh,
3675 Schweine,
320 Schafe,
1742 Kälber

geschlachtet.

Hiervon wurden nur zur technischen Ausnutzung zugelassen: 3 Stück Rindvieh, 2 Schweine und 1 Kalb, während von 84 Stück Rindvieh, 20 Schweinen und 40 Schafen erkrankte innere Organe bezw. Körpertheile Beseitigung fanden.

In Mühlheim a. R. wurden unter 2378 geschlachteten Rindern 38 Stück tuberkulös und 72 Stück mit Vereiterungen innerer Organe und mit Echinokokken behaftet befunden.

In Neuss erwiesen sich unter 1953 geschlachteten Rindern 13 Stück tuberkulös.

In dem neuerrichteten Schlachthause zu Göttingen wurden in der Zeit vom 1. Juli 1883 bis 1. April 1884 geschlachtet:

1184 Stück Grossvieh,
4707 Schweine,
3891 Kälber,
2667 Stück Schafvieh,
47 Ziegen;

im Ganzen 12496 Schlachtthiere. Hiervon wurden zur menschlichen Nahrung ungeeignet befunden: 28 Stück Schlachtthiere und zwar 7 Stück Grossvieh, 13 Schweine, 2 Kälber und 6 Schafe.

Zur Fleischschau stellt sich in praxi immer mehr die Nothwendigkeit heraus, dass:

- 1) die Trichinenschau allgemein obligatorisch eingeführt werde und
- 2) dass über die Geniessbarkeit des Fleisches von perlsüchtigen Kühen allgemein gültige Gesetznormen entscheiden müssen.

Ad 1 hat die Königliche Reichsregierung zur Bekämpfung der Trichinosis das Verbot der Einfuhr von Amerikanischem Schweinefleisch für nothwendig erachtet; die perniciosen Epidemien im Inlande, wie sie sich neuerdings leider öfter wiederholen, drängen zur allgemeinen obligatorischen Trichinenschau.

Ad 2. In den städtischen Schlachthäusern, wo viele ältere Kühe geschlachtet werden, wird ein hoher Procentsatz derselben mit Perlsucht behaftet befunden. In dem Urtheil über die Geniessbarkeit solchen Fleisches gehen die Ansichten stark auseinander; dorten wird Alles als absolut ungeniessbar unter die Erde verscharrt, hier wird möglichst viel zum Genusse zu erhalten und zu verwerthen gesucht; es hängt dies meist nur von dem individuellen Gutdünken und Meinen des jeweiligen entscheidenden Beamten ab.

In Folge der Entdeckung des Koch'schen Tuberkelpilzes und der nunmehrigen vielseitigen Behauptung der absoluten Identität der Perlsucht mit Tuberculose haben sich selbst viele Thierärzte schon zum extremen Radicalismus zur Vernichtungspraxis hingeneigt; sie schädigen damit aber das Nationalvermögen, indem sie das kostspielige Produkt des Fleisches in manchen Fällen ohne bis jetzt genügende Gründe der Verwerthung entziehen. Denn eine Entdeckung, wie die des Tuberkelpilzes darf in ihrem unfertigen Ausbau nicht alsbald massgebend für weittragende Entscheidungen sein!

Wer durch vielfache Obductionen Gelegenheit hatte die Perlsucht in allen Stadien der Entwicklung genau zu beobachten, der wird zur festen Ueberzeugung gekommen sein, dass viele Fälle der Perlsucht gewiss nicht tuberkulöser Natur sind, die vollständige Mastfähigkeit der damit behafteten Thiere scheint auch dagegen zu sprechen. Ferner ist evident bewiesen, dass derartiges Fleisch unbeschadet genossen werden kann.

Die Entscheidung über die eventuelle Geniessbarkeit eines Stückes muss von allgemein gültigen festen Normen diktirt werden, sie darf aber nicht von der Willkühr und individuellen Anschauung der Person abhängig sein. Sodann muss das betreffende Fleisch auch als solches

mit der ausdrücklichen Bezeichnung etwa auf etablierten Freibänken verkauft werden. Hieran schliesst sich die weiter zu lösende Frage der Haftbarkeit und Entschädigungsfrist des Verkäufers eines perlsüchtigen Thieres innig an.

Wird ein Thier nach dem Schlachten mit Perlsucht behaftet gefunden, so pflegt der Metzger auch bei Geniessbarkeit des Fleisches Währschaftsansprüche an seinen Verkäufer zu stellen und verlangt Entschädigungen in einer Höhe, die den Werth der verlorenen Eingeweide übersteigen, d. h. er sucht sein Geschäft dabei zu machen, sonst löst er lieber das Geschäft ganz auf oder thut dies gleich von vornherein, um den vielleicht weit hergereisten Verkäufer — den Bauer — mit seinem rückfälligen Fleische in Verlegenheit zu setzen. Schliesslich kauft er das Fleisch um einen Spottpreis, — der Bauer musste Haare lassen, desgleichen muss es der Consument, denn er erhält dasselbe Fleisch wieder als untadelhafte Waare.

Diese Ausbeutung des Publikums verdient durch gesetzliche Regelung baldigst eingeschränkt zu werden. Prof. Dr. Leonhardt.

B. Trichinen- und Finnenschau.

Reg.-Bez. Gumbinnen. Im Kreise Tilsit sind im Jahre 1883 6518 Schweine mikroskopisch untersucht und unter diesen 4 trichinös und 4 finnig befunden worden. In Gumbinnen wurden von 5 Fleischbeschauern 2627 Schweine untersucht und 4 trichinös befunden.

Reg.-Bez. Marienwerder.

Lauf. Nummer.	Kreis.	Zahl der untersuchten Schweine.	Zahl der trichinös befundenen.	Zahl der trichinös befundenen amerikanischen Speckseiten und Schweinefleischpräparate.	Zahl der finnig befundenen Schweine.
1.	Flatow	2576	—	—	9
2.	Graudenz	7819	4	22	19
3.	Konitz	1948	2	—	6
4.	Dt. Krone	3330	—	—	7
5.	Kulm	6438	6	—	18
6.	Löbau	3007	12	—	9
7.	Marienwerder	4968	15	—	14
8.	Rosenberg	5203	13	—	34
9.	Schlochau	3062	—	—	10
10.	Schwetz	4939	6	—	2
Latus		43290	58	22	128

Lauf. Nummer.	Kreis.	Zahl der untersuchten Schweine.	Zahl der trichinös befundenen.	Zahl der trichinös befundenen amerikanischen Speckseiten und Schweinefleischpräparate.	Zahl der finnig befundenen Schweine.
11.	Transport	43920	58	22	128
	Strasburg	3126	10	—	2
12.	Stuhm	2119	9	—	17
13.	Thorn	8825	13	—	55
14.	Tuchel	2179	2	—	4
	Summa	59539	92	22	206

Winkler, Dep.-Th.

Reg.-Bez. Potsdam. Im Kreise Templin wurden 4 Schweine trichinös befunden, von denen 2 auf der Abdeckerei gemästet waren. — Im Kreise Prenzlau wurden 2500 Schweine von 6 Fleischbeschauern untersucht, von denen 3 mit Trichinen behaftet waren.

Im Kreise Storkow sind 8325 Schweine untersucht, von denen 7 Stück trichinös waren.

Im Kreise Luckenwalde wurden 6 Trichinenfälle constatirt.

Im Kreise Zauch-Belzig und Stadtkreis Brandenburg wurden 12712 Schweine untersucht, von diesen waren 2 trichinös.

44 Fleischbeschauer haben im Kreise Osthavelland 15172 Schweine untersucht und 15 trichinös befunden.

Im Jahre 1883 wurden im Reg.-Bez. Frankfurt 145609 Schweine von 446 Fleischbeschauern auf Trichinen und Finnen untersucht. Hiervon waren 137 Schweine trichinös und 809 Stück finnig.

Reg.-Bez. Stettin. In der Stadt Stettin wurden 4 Schweine und 30 amerikanische Speckseiten trichinös befunden; als finnig wurden 16 Schweine ermittelt.

Reg.-Bez. Posen. Es wurden im Berichtsjahre im Ganzen 139858 Schweine von 731 amtlichen Fleischbeschauern in 183 Gemeinden untersucht und hiervon 639 trichinös und 587 als finnig befunden.

Im Reg.-Bez. Oppeln wurden im Jahre 1883 286826 Schweine von 1150 Fleischbeschauern auf Trichinen und Finnen untersucht. Hiervon waren 32 Stück trichinös und 1781 finnig.

Reg.-Bez. Breslau. Im Kreise Münsterberg sind vom 1. Juli 1882 bis dahin 1883 durch 67 Fleischbeschauer 8821 Schweine untersucht und 12 davon finnig, aber keins trichinös befunden worden.

Von den 45 im Kreise Namslau angestellten Fleischbeschauern sind im Jahre 1883 7434 Schweine untersucht, davon 1 mit Trichinen durchsetzt und finnig befunden worden; 3 der letzteren waren sehr stark finnig und sind deshalb vernichtet worden.

Im Schlachthause zu Oels sind im Sommersemester 1331 und im W.-S. 1394 Schweine untersucht worden, aber bei keinem hat man Trichinen gefunden. Fünf finnige Schweine und 1 mit brandigem Rothlauf wurden polizeilich mit Beschlag belegt.

Im Kreise Pr.-Wartenberg sind von den Fleischbeschauern im Sommer bei einem Schweine Trichinen gefunden, und im Winter sind 8 Schweine für trichinös erklärt worden, von denen aber nur 6 in der That mit Trichinen behaftet waren.

Im Reg.-Bez. Liegnitz wurden im Ganzen 231898 Schweine von 1399 Fleischbeschauern untersucht. Hiervon waren 82 trichinös und 1151 finnig.

Im Reg.-Bez. Merseburg wurden im Jahre 1883 341374 Schweine auf Trichinen und Finnen untersucht. Hiervon wurden 60 trichininhaltig und 183 finnig befunden.

Reg.-Bez. Hildesheim. In Stadt und Amt Hildesheim wurden zusammen geschlachtet: 14172 Schweine, wovon 2 Stück trichinös und 13 finnig befunden wurden. — Im Kreise Göttingen fanden sich unter 24511 untersuchten Schweinen 5 trichinöse und 30 finnige.

Reg.-Bez. Osnabrück. In der Stadt Osnabrück wurden 5417 Schweine und 2967 amerikanische Speckseiten untersucht; hiervon erwiesen sich 2 Schweine finnig und 7 Speckseiten trichinös. Im Landkreise Osnabrück wurden 6711 Schweine untersucht, wovon 64 Stück finnig waren.

Reg.-Bez. Aurich. Es wurden daselbst von 56 Fleischbeschauern 10461 Schweine untersucht, wovon nur 2 als finnig und keins trichinös sich erwies. Dagegen wurden 10 Mal in amerikanischen Schweinefleischpräparaten Trichinen gefunden.

Im Reg.-Bez. Kassel sind 215107 Schweine untersucht, 55 trichinös und 132 finnig befunden worden. Im Schlachthause zu Kassel ergab die Untersuchung von 12320 Schweinen 17 trichinöse.

Reg.-Bez. Coblenz. Im Kreise Neuwied waren von 4247 geschlachteten Schweinen 10 mit Finnen behaftet, 79 hatten Echinococcus-Blasen in der Leber und der Lunge.

In Wetzlar wurden im Berichtsjahre 2927 Schweine geschlachtet, von welchen 1 finnig war.

Reg.-Bez. Düsseldorf. Von den im Schlachthause zu Solingen geschlachteten 3675 Schweinen war 1 finnig und keins trichinös.

In Mülheim a. Rh. waren von den 5049 geschlachteten Schweinen 4 finnig und 1 trichinös.

Reg.-Bez. Köln:

Lauf. Nummer.	Kreis.	Zahl der unters. Schweine.	Zahl der trichinös befundenen.	Gemeinde, in der die trichinösen Schweine gefunden sind	Zahl der trichinös. Schweine in den einzelnen Gemeinden.	Zahl der finnig befundenen Schweine.	Zahl der amtlichen Fleischbeschauer.
1.	Bergheim	6480	—	—	—	—	37
2.	Bonn	12223	—	—	—	1	30
3.	Köln (Stadt)	42046	3	Köln	3	78	36
4.	Köln (Land)	18260	—	—	—	17	58
5.	Enskirchen	7772	—	—	—	2	42
6.	Gummersbach	4072	—	—	—	1	36
7.	Mühlheim	3406	1	Mühlheima. R	1	4	25
8.	Rheinbach	5365	1	Münstereifel	1	4	48
9.	Sieg	7032	—	—	—	—	49
10.	Waldbröl	1873	—	—	—	—	19
11.	Wipperfürth	2503	—	—	—	—	24
Summa		111032	5		5	107	404

C. Rossschlächtereien.

In Berlin wurden behufs Schlachtens im Berichtsjahre 5929 Pferde vorgeführt. Hiervon wurden: a) vor dem Schlachten 79, b) nach dem Schlachten 78, zusammen 157 Pferde abgewiesen und der Abdeckerei überliefert.

Reg.-Bez. Danzig. In Danzig wurden 390 Pferde geschlachtet. Das Fleisch eines Pferdes wurde wegen mangelhaften Nährzustandes und das Fleisch von 3 Pferden wegen Eiterknoten in den Lungen von der Verwendung zur menschlichen Nahrung ausgeschlossen.

In Elbing wurden 55 Pferde geschlachtet, wovon 2 zur menschlichen Nahrung nicht zugelassen wurden.

Reg.-Bez. Potsdam. In Perleberg wurden 147 Pferde geschlachtet, davon ausgeschlossen 5, in Nauen von 110 geschlachteten 2.

Reg.-Bez. Frankfurt. Im Stadtkreise Frankfurt a. O. wurden im Jahre 1883 geschlachtet 283 Pferde.

Reg.-Bez. Stettin. In Anclam sind 27 Pferde geschlachtet worden.

Reg.-Bez. Breslau. In der Central-Rossschlächterei der Stadt Breslau sind im Jahre 1883 von 16 Rossschlächtern 2805 Pferde (resp. Esel) geschlachtet worden; davon sind:

- 1 Pferd wegen Rotz,
- 2 Pferde wegen Lungenentzündung,
- 1 Pferd wegen brandiger Leberentzündung,
- 2 Pferde, welche ohne thierärztliche Untersuchung geschlachtet waren,

als ungeeignet zur menschlichen Nahrung, verworfen und der Abdeckerei zur unschädlichen Beseitigung überwiesen worden.

In der Rossschlächterei zu Glatz sind während des Sommers 143 und im Laufe des Winters 198, zusammen 341 Pferde geschlachtet worden, an denen mit Ausnahme von ein Paar chronischen Bronchitiden, welche Verwerfung der Lungen zur Folge hatten, nichts Auffallendes vorgekommen war.

Im Kreise Waldenburg existiren 7 Rossfleischhandlungen; die Pferde werden alle in einer Schlächterei geschlachtet. Die Zahl der geschlachteten Pferde beträgt jährlich ca. 4—500.

In der Stadt Münsterberg befindet sich eine Rossschlächterei, die unter der Controle eines Privatthierarztes steht. Kr.-Th. Gieckel weiss daher nichts Näheres zu berichten.

Im Reg.-Bez. Merseburg wurden i. J. 1883 405 Pferde geschlachtet und dem menschlichen Consum überlassen.

Reg.-Bez. Erfurt: In Langensalza kamen 89 Pferde zur Schlachtung, wovon eins ungeeignet war für den menschlichen Consum.

In der Provinz Schleswig-Holstein wurden im Ganzen 1803 geschlachtet, wovon 22 vom menschlichen Consum ausgeschlossen wurden.

Reg.-Bez. Hildesheim. In Hildesheim kamen 320, in Peine 30 und in Alfeld 50 Pferde zum Consum; in Clausthal 34 Pferde. In Göttingen ist bis jetzt der Schlachthauszwang auf die Pferdeschlächterei noch nicht ausgedehnt worden; in der Privatrossschlächterei wurden 118 Pferde geschlachtet, wovon 1 von der Verwerthung zur menschlichen Nahrung ausgeschlossen werden musste.

Reg.-Bez. Münster. In Münster wurden 162 Pferde consumirt. Die Pferdeschlächtereien in den Landstädten unterliegen keinerlei sanitätspolizeilicher Beaufsichtigung.

Reg.-Bez. Arnsberg. In Dortmund wurden während des Berichtsjahres 352 Pferde und 1 Esel geschlachtet und consumirt.

In Kassel betrug die Zahl der geschlachteten Pferde 430, wovon 2 vom Consum ausgeschlossen wurden.

Reg.-Bez. Wiesbaden. In den zur Stadt Frankfurt a. M. gehörigen Pferdeschlächtereien wurden i. J. 1883 818 Pferde geschlachtet; hiervon wurden 3 Stück für ungeniessbar erklärt.

Reg.-Bez. Koblenz. In Koblenz und Ehrenbreitenstein wurden im Ganzen 58 Pferde geschlachtet, wovon 1 wegen Rotz unschädlich beseitigt wurde. Von 14 in Neuwied geschlachteten Pferden wurde das Fleisch eines wegen Lungenbrand getödteten verworfen.

Reg.-Bez. Düsseldorf. In Solingen gelangten 290 Pferde zur Schlachtung, 2 davon wurden vom Consum ausgeschlossen.

Reg.-Bez. Köln. In der Stadt Köln wurden im Berichtsjahre 1260 Pferde geschlachtet und von diesen als zum Genusse untauglich 10 verworfen; ausserdem wurden mehrfach krankhafte Einzeltheile der Abdeckerei überwiesen. In der Stadt Bonn wurden 152 Pferde geschlachtet, in Rheinlath 3, wovon eins wegen hochgradiger Abmagerung vom Consum ausgeschlossen wurde.

Reg.-Bez. Trier. In Saarbrücken wurden 172 Pferde geschlachtet, wovon 16 nicht geeignet zur menschlichen Nahrung befunden wurden.

Reg.-Bez. Aachen. In der Stadt Aachen wurden i. J. 1883 429 Pferde geschlachtet und hiervon 10 als zum menschlichen Consum nicht geeignet befunden.

D. Abdeckereiwesen.

Während des Berichtsjahres wurden der Abdeckerei in Frankfurt a. M. eingeliefert:

- 116 Pferdecadaver, davon
 - 3 ungeniessbar von der Pferdeschlächtereie (1 wegen Lungenrotz),
 - 6 Ochsen,
 - 31 Kälber,
 - 71 Schweine,
 - 7 Ziegen,
 - 1 Schaf,
 - 1 Lamm,
- 190 Eingeweide von grossen Thieren,

- 2 Stück Rehe,
- 1 Korb confiscirter Schellfische,
- 5 Hunde wurden crepirt eingeliefert,
- 7 zum Tödten,
- 181 wurden eingefangen,
- 67 davon getödtet,
- 144 wieder an ihre Besitzer ausgeliefert.

Prof. Dr. Leonhardt.

Aus dem polizeilichen Schlachthause zu Berlin wurden der Abdeckerei zur gewerblichen Ausnutzung überwiesen:

- 230 Rinder,
- 572 Schweine,
- 166 Kälber,
- 384 Hammel,

ferner 2181 einzelne Organe. Es betrug das Gewicht:

- a) der ganzen Thiere 164204,5 Kgr.
 - b) der einzelnen Organe 6286,5 -
-
- zusammen 170491,0 Kgr.

Aus der Pferdeschlächterei wurden der Abdeckerei zur gewerblichen Ausnutzung 154 Pferde überwiesen, während 3 mit der Rotzkrankheit behaftete Pferde chemisch vernichtet wurden.

V. Verschiedenes.

Vier Hörner bei einer Kuh. Dem Kr.-Th. Dr. Esser wurde der Kopf eines Rindes zugesandt, an dem sich 4 Hörner entwickelt hatten. Man bemerkt an demselben an der normalen Stelle zu beiden Seiten einen starken Hornfortsatz, der sich jedoch bald beiderseitig in 2 übereinander stehende Fortsätze theilt, die eine Länge von 9 Cm. erreichen. Entsprechend der Bildung der knöchernen Fortsätze sind auch die sehr verkümmerten Hörner gabelig getheilt.

Eine Kuh gebar 4 Kälber, die ein Gesamtgewicht von 134 Pfd. hatten, 2 davon starben bald nach der Geburt. — Eine 1 $\frac{1}{3}$ jährige Sau desselben Besitzers hatte in derselben Woche 24 Ferkel geworfen, wovon nur 3 starben. Kr.-Th. Buehrmann-Halle i. W.

Ein Fleischer kaufte eine fette Sau, die 2 Tage später 8 Ferkel zur Welt brachte und bei der bald nachher erfolgten Abschachtung trichinös befunden wurde. 2 von den Ferkeln wurden anderweitig verkauft, die übrigbleibenden 6 von dem Fleischer aufgezogen und nach ca. $\frac{3}{4}$ Jahren geschlachtet, wobei sich dieselben ebenfalls als trichinös erwiesen. Die 6 Ferkel hatten wahrscheinlich von den Ueberresten der Saumutter gefressen. Dep.-Th. Müller-Stettin.

Im Reg.-Bez. Oppeln werden häufig Thierleichen ausgegraben und verzehrt. In Gleiwitz erkrankten 13 Menschen, welche ein Rind ausgegraben und gegessen hatten, welches an einer brandigen Gebärmutterentzündung gestorben war. Dep.-Th. Schilling.

Im Gr. Strelitzer Kreise wurden 16 Personen bestraft wegen Aufgrabens von Milzbrandleichen.

In einer aus 7 Personen bestehenden Familie erkrankten 1 bis 2 Stunden nach dem Genusse des Frühkaffees mit Ausnahme eines Gesellen sämtliche Personen. Die Krankheit fing bei allen Patienten mit einem mehr oder weniger bedeutenden Schüttelfrost an, sie fühlten sich ausserordentlich matt und hinfällig, zeigten Uebelkeit, Schwindel, und klagten über intensiven Kopfschmerz. Bei den meisten stellte sich 18 Stunden nachher Brechdurchfall mit heftigen Leibschmerzen ein, der Appetit lag bei allen darnieder, doch war der Durst bei einigen Patienten kaum zu stillen. Die Wirthin, welche ihren Kaffee zur Hälfte mit Milch vermischt zu sich genommen hatte, erkrankte am heftigsten. Der Geselle dagegen, welcher seinen Kaffee schwarz getrunken, sonst aber bei allen Mahlzeiten dieselbe Nahrung wie alle Uebrigen zu sich genommen hatte, blieb gesund. Die Milch war von einer an brandiger Euterentzündung erkrankten Ziege entnommen, welche, obschon dieselbe an dem fraglichen Morgen sich schon krank zeigte, doch noch $\frac{1}{2}$ Liter Milch gegeben haben soll. Letztere war abgekocht von den Personen aufgenommen worden. Kr.-Th. Morro.

Kr.-Th. Hoppe-Stolp berichtet, dass in Folge des Genusses von Fleisch, das von einer an Tuberculose leidenden Kuh herrührte, 12 Personen schwer erkrankten. Die Kuh soll noch in ziemlich gutem Nährzustande gewesen und nicht nothgeschlachtet worden sein.

Erst nachdem die Massenerkrankung constatirt und seitens des behandelnden Arztes das Fleisch als Ursache beschuldigt worden, erhielten die Kr.-Th. Prahl und Hoppe etwas von dem Fleische sowie aus demselben hergestellte Wurst zur Untersuchung, woraus dieselben feststellten, dass das Thier an Tuberculose gelitten habe. Der Fleischer, welcher die Kuh geschlachtet und das Fleisch verkauft hatte, wurde mit 1 Jahr Gefängniss bestraft¹⁾.

¹⁾ Unter welchen Erscheinungen die betreffenden Personen erkrankt sind, ist nicht angegeben. Dass dieselben an Tuberculose erkrankt sind, ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht anzunehmen.

Referate und Kritiken.

Die 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Die Naturforscher-Versammlung ist mit festlichem Glanz, unter einer Betheiligung, wie sie eben wohl nur in Berlin zu erwarten war, und ohne jede Störung verlaufen.

Sie wurde am Sonnabend den 18. September im Circus Renz durch die erste allgemeine Sitzung eröffnet. Der gewaltige Raum, der geschmackvoll decorirt und auf eine sehr glückliche Weise seinem Zweck angepasst war, hatte sich bis auf den letzten Platz gefüllt, als der erste Geschäftsführer Geheimrath Virchow das Wort ergriff, um die Versammlung zu begrüßen.

In einer längeren Rede, deren innere Bedeutung und glänzende Form ihr einen hervorragenden Platz unter den Werken der öffentlichen Beredsamkeit für alle Zeit anweisen und die nicht der Vergessenheit anheimfallen wird, that er einen Rückblick auf den Schöpfer, die Gründung und die Geschichte der Naturforscher-Versammlungen und wies darauf hin, was dieselben auf wissenschaftlichem Gebiet geleistet hätten, wieviel ihrer Anregung entsprungen und ihrer Förderung zu verdanken sei. Er knüpfte daran den Nachweis, dass auch unter den heutigen veränderten Verhältnissen die Naturforscher-Versammlung voll ihre Berechtigung erhalten habe, und dass die rege Betheiligung, welche alle Erwartungen übertreffe, das beste Zeugniß dafür ablege. Mit einem Hoch auf Se. Majestät erklärte er die Versammlung für eröffnet.

Es schlossen sich daran begrüßende Ansprachen seitens des Unterstaatssecretärs Lucanus im Namen des Herrn Cultusministers, seitens des Oberbürgermeisters namens der Stadt und seitens des Rectors der Universität.

Trotz vorgeschrittener Stunde begann die Versammlung dann sofort ihre wissenschaftliche Thätigkeit, welche Bardeleben (Jena) mit einem Vortrag über Hand und Fuss und Werner Siemens mit einer Rede über das naturwissenschaftliche Zeitalter einleiteten.

Noch an demselben Tage constituirten sich die dreissig verschiedenen Sectionen in den ihnen meist in der Universität zugewiesenen Versammlungsräumen durch Wahl ihrer Vorsitzenden und Bestimmung der Stunden und Tagesordnung ihrer Sitzungen.

Virchow hatte in seiner Begrüßungsrede als die vornehmste Aufgabe der Versammlung bezeichnet, durch Zusammensein bei ernster Thätigkeit wie im heiteren Verkehr die deutschen Naturforscher und Aerzte einander nahe zu

bringen und zu ermöglichen, dass sie sich kennen lernten und aus der Anknüpfung persönlicher Beziehungen dauernde gegenseitige Anregung und Veranlassung zu fortgesetztem geistigen Verkehr schöpften.

Das Programm der Versammlung war diesem Princip entsprechend gestaltet und räumte dem Ernst und dem Frohsinn, der Wissenschaft und der Geselligkeit gleichmässig einen Platz ein.

Die umfassendsten Vorkehrungen waren getroffen worden, um allen Theilnehmern das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu geben und ausserdem für ihre Bequemlichkeit zu sorgen.

Der schöne Wintergarten des Central-Hotels, welcher zur ausschliesslichen Disposition der Versammlung gestellt war, bot einen angenehmen Ort zum Beisammensein und Stelldichein, einen sicheren Hafen, in welchem die vom Getriebe der Grossestadt Zerstreuten jederzeit zu guten Freunden sich retten konnten.

Ein Auskunftsbüreau im Central-Hotel, welches später nach der Universität verlegt wurde, stand jedem mit Rath und That in allen Fragen zur Seite.

Bezüglich ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit war den einzelnen Sectionen völlig freie Hand gelassen worden, ebenso betreffs der Theilnahme an den mannigfachen Excursionen nach verschiedenen, besonders städtischen Anstalten, z. B. den Rieselfeldern, dem Schlachthofe, den Wasserwerken, der Irrenanstalt u. s. w., zu welchen seitens der Stadt Einladung ergangen war.

Da am Mittwoch eine zweite allgemeine Sitzung stattfand und Freitag in einer letzten Gesamtsitzung die Versammlung geschlossen werden sollte, so blieben für die Sectionssitzungen 3 Vormittage und 4 Nachmittage disponibel. Wie fleissig dieselben ausgenutzt worden sind, beweist z. B. die 11. Section für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, welche es auf 36 Vorträge in 8 Sitzungen gebracht hat, und die Section für Chemie mit 35 Vorträgen und 11 Demonstrationen.

Die 28. Section für Veterinärmedizin hat excl. der constituirenden Sitzung drei Versammlungen unter dem Vorsitz der Herren Müller, Siedamgrotzky bezw. Schütz im grossen Hörsaale des pathologischen Instituts der Thierarzneischule abgehalten, deren eine Herr Geheime Ober-Regierungsrath Beyer mit seinem Erscheinen beehrte.

Durch interessante Vorträge erwarben sich ein Verdienst die Berliner Professoren Fröhner, Schütz, Möller, Professor Ellenberger-Dresden, ferner Dr. Schmidt-Aachen, die Assistenten Frick und Sticker-Berlin. Professor Möller schloss seinem Vortrag, die Demonstration einer Kehlkopfoperation beim Pferde in der chirurgischen Klinik an. Auf die Vorträge selbst näher einzugehen, ist hier nicht der Platz, da dieselben vollständig in diesem Archiv veröffentlicht werden sollen.

Nach der letzten Sitzung am Donnerstag wurde eine gemeinschaftliche Besichtigung des Schlachthofes unternommen, zu welcher der Oberthierarzt Dr. Hertwig freundlichst eingeladen hatte und bei welcher er die Führung übernahm. Das Interesse, welches diese grossartige städtische Anlage bei jedem erwecken muss, erhöhte Dr. Hertwig durch Ausstellung und Demonstration einer grossen Zahl interessanter Präparate aus dem Gebiete der Fleischschau. Demselben gebührt für die ganze Veranstaltung der Dank aller Betheiligten.

Einen mächtigen Anziehungspunkt bildete während der ganzen Dauer der Naturforscher-Versammlung die Ausstellung in der Kunstacademie. Ueber diese überaus reiche, vorzüglich geordnete Sammlung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Präparate herrscht nur eine Stimme des unbedingtesten Lobes.

Dieselbe umfasste Apparate aus allen einschlägigen wissenschaftlichen Gebieten, naturwissenschaftliche Sammlungen, Einrichtungen auf dem Gebiet der Hygiene und des Militärsanitätswesens, pathologische Präparate und anderes mehr. Hervorragend waren die Sammlungen aus dem Gebiet der Zoologie, welche besonders von der zoologischen Station in Neapel mit einer Collection prachtvoller Präparate beschickt worden war. Von besonderem veterinärwissenschaftlichem Interesse waren die von Dr. Hertwig ausgestellten pathologischen Präparate aus dem Gebiet der Fleischschau.

Nur einen Uebelstand hatte die übrigens auch dem grossen Publicum geöffnete Ausstellung, dass die fortwährende drückende Fülle in derselben eine eingehende Besichtigung oft sehr erschwerte.

Die grössten Schwierigkeiten scheint die Vertheilung der während bezw. zu Ehren der Versammlung erscheinenden Drucksachen gemacht zu haben.

Das täglich bisweilen zweimal zur Ausgabe gelangende Tageblatt, welches neben zahlreichen geschäftlichen Mittheilungen die auszugsweise gehaltenen Berichte der einzelnen Sectionssitzungen des vorhergehenden Tages brachte und zu einem stattlichen Bande herangewachsen ist, muss als eine bewundernswerthe Leistung der Redaction bezeichnet werden. Gefährlich war jedoch mitunter der Versuch, des Blattes habhaft zu werden, und trotzdem fortwährend neue Auflagen hergestellt wurden, musste man oft nach langem Harren in fürchterlichster Enge sich mit dem Bescheide, dass alles vergriffen sei, begnügen. Ebenso reichten die sehr werthvollen und prächtig ausgestatteten Festschriften, welche das Cultusministerium, das Reichsgesundheitsamt und die Stadt Berlin zur Vertheilung an die Theilnehmer der Versammlung hatten herausgeben lassen, für die grosse Zahl der letzteren nicht aus. Es sei übrigens bemerkt, dass die fehlenden Nummern des Tageblatts gegen Einreichung der Erkennungs-Karte bis auf Weiteres vom Bureau der Naturforscher-Versammlung, Leipzigerstr. 75, nachgeliefert werden, und dass die genannten Festschriften durch den Buchhandel zu beziehen sind.

Die Reihe der Festlichkeiten eröffnete das grosse Festmahl im Centralhotel, an dem 2000 Personen theilnahmen und welches trotzdem vorzüglich verlief.

Se. Majestät der Kaiser hatten Allerhöchst geruht, Festvorstellungen im Schauspielhaus und Opernhaus anzuordnen, zu welchen Zutrittskarten unter die Festgenossen vertheilt wurden.

Am Sonntag lockte eine von sämmtlichen Berliner Seglerklubs zu Ehren der Naturforscher veranstaltete Regatta den grössten Theil derselben an den Müggelsee, wohin sie auf Dampfern oder durch Extrazüge der Eisenbahn befördert wurden.

Der Dienstag Abend führte Alle im Zoologischen Garten zusammen und am Donnerstag Abend fand ein Ball statt, welcher durch die Zahl der Gäste, durch die künstlerische Ausschmückung des als Ballsaal dienenden Wintergartens und durch die Vollendung und Pracht aller Arrangements einen glänzenden Verlauf nahm, tanzende Damen und Herren werden ihn zweifellos als die Krone der Fest-

lichkeiten bezeichnen. Alle übrigen aber dürften darin einig sein, die Palme dem Gartenfest in der Kunstausstellung zuzuerkennen, welches die Stadt ihren Gästen zu Ehren am Mittwoch veranstaltete und womit sie sich selbst das glänzendste Zeugniß der Gastfreundschaft gegeben hat.

Fast sechstausend Einladungen hatte der Magistrat von Berlin zu diesem Fest ergehen lassen, für welches er 60000 Mark angewiesen hatte. Die schönen Garten-Anlagen um den Kunstausstellungspalast füllten sich um 6 Uhr Abends mit einer dichtgedrängten Schaar von Damen und Herren. Das Programm des Festes verhiess einen Dionysos-Zug, veranstaltet durch Berliner Künstler, und eine allgemeine Speisung, wobei die Stadt Berlin die Wirthin machen sollte.

An ca. 500 grösstentheils im Freien aufgestellten Tischen fand jeder der Geladenen ein angenehmes Plätzchen und alsbald entluden sich auf dieselben die Schätze überreich ausgestatteter Büffets und unzählige Körbe verheissungsvoller Flaschen mit der Aufschrift: „Hofmann's Tropfen und Lacrymae Virchow“ — eine Erinnerung an die beiden Geschäftsführer der Naturforscher-Versammlung.

Hofmann's Tropfen erwiesen sich als das vorzüglichste Arzneimittel aller Zeiten, Virchow's Thränen waren reinste Freudethränen, das zeigte die Stimmung der Gäste. Dazu trug aber auch nicht minder die ganz vorzügliche, über alles Lob erhabene Anordnung des Ganzen bei, welche das Hoch, das überall ertönte, sobald einer der Festordner sich zeigte, voll berechtigt erscheinen liess.

Der Dionysoszug, welcher sich um den Pergamontempel gruppirte, gewährte ein ausserordentlich malerisches Bild.

Der Gesamteindruck dieses grossartigen Festes wird seinen Theilnehmern ein dauernder sein und der Stadt Berlin manch fröhliches und dankbares Gedanken eintragen.

Am Freitag Vormittag fand in der letzten allgemeinen Sitzung die Naturforscher-Versammlung ihren Abschluss, wobei Virchow mit hoher Befriedigung auf ihr Ergebniss zurückwies.

Die Versammlung hat 2224 Mitglieder und 1931 Theilnehmer gehabt, von denen 2711 von Ferne her gekommen waren. 1496 Damen haben durch ihre Gegenwart die Feste der Versammlung verschönt. Im Ganzen haben also 5651 Personen an der Versammlung theilgenommen. An den Sectionssitzungen haben sich in den 30 Sectionen 3372 Herren betheiliget, darunter in der Section für innere Medicin allein 400, in der für Chemie 280. Auch in materieller Hinsicht ist ein erfreuliches Resultat zu verzeichnen, indem bei 80000 Mk. Einnahmen ein Deficit nicht zu fürchten steht.

Auch die Section für Veterinär-Medicin kann freudig auf ihre Thätigkeit zurückblicken. Die Zahl ihrer Theilnehmer hat die der früheren Jahre bedeutend übertroffen, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass die Vermehrung nicht auf in Berlin wohnende Theilnehmer allein zurückzuführen ist. Eingeschrieben waren in der 28 Section 92 Mitglieder und Theilnehmer, unter denen 60 nicht in Berlin wohnhafte, eine Zahl, wodurch die Section 13 andere Sectionen überflügelt hat. Unter den aus nichtpreussischen Ländern Herbeigeeilten befanden sich die Professoren Friedberger-München, Siedamgrotzky und Ellenberger-Dresden. Oesterreich und Schweden hatten je ein Mitglied entsandt.

Es ist zu hoffen, dass das rege Interesse, welches sich durch eine so zahl-

reiche Betheiligung kundgegeben hat, auch erhalten bleibe und dass alle, welche an der 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte sich betheiligt haben, eine bleibende angenehme Erinnerung an dieselbe sich bewahren werden.

Alle diejenigen aber aus dem Weiteren oder den Engeren, welche nicht volllauf befriedigten Herzens geschieden sind, mögen die launigen Worte Hofmann's beherzigen:

„In einer Versammlung von 6000 Personen ist es nicht möglich, es Allen recht zu machen. In der That hat es auch an Nackenschlägen nicht gefehlt; für diejenigen Nackenschläger aber, welche ihre Liebesgaben noch nicht an den Mann gebracht haben, sei hier bemerkt, dass die gütige Natur Ihre Geschäftsführer an der betreffenden Stelle mit einer Haut von nicht unbeträchtlicher Dicke ausgestattet hat.“

Schmaltz.

Annual Report of the Agricultural Department of the Privy Council Office for the year 1885.

Den Mittheilungen über die Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in England, Wales und Schottland entnehmen wir die folgenden Notizen:

1. Lungenseuche. Diese Krankheit wurde beobachtet:

1884 in 33 Grafschaften,	312 Beständen bei 1096 St. Rindv.
1885 - 41	- 424 - 1511 -

Von den 1511 im Jahre 1885 erkrankten Stück Rindvieh sind 1466 getödtet worden, 42 gestorben und 3 blieben am Ende des Jahres noch Bestand. Die gegen das Vorjahr grössere Zahl der Ausbrüche soll mehrfach durch die Einführung inficirter Thiere veranlasst sein; in 9 Fällen waren zum Beispiel Thiere aus Irland eingeführt und in der durchschnittlichen Incubationszeit trat die Seuche in den betreffenden Beständen auf, einige Male erfolgte der Ausbruch schon nach wenigen Tagen. Die grosse Zahl der erkrankten Thiere wird darauf zurückgeführt, dass die Ausbrüche öfters grössere Herden von 120 bis 200 Stück betrafen, deren Besitzer den Ausbruch nicht rechtzeitig angezeigt hatten. Hierdurch und durch die schlaife Handhabung des Seuchengesetzes von Seiten der Localbehörden erlangte die Seuche in den betreffenden Beständen eine weite Verbreitung. Es wird ferner Klage darüber geführt, dass die beamteten Thierärzte sich niemals bemühen, die frisch erkrankten Stücke ausfindig zu machen, sondern sich bei ihren wöchentlichen Revisionen darauf beschränken, die als krank bezeichneten Thiere zu besichtigen und die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Das Abschachten der ganzen Bestände, welche stark verseucht sind, wird als das beste Tilgungsmittel bezeichnet, dabei jedoch bedauert, dass die Localbehörden diese Massregel nicht gleichmässig zur Ausführung bringen und dadurch veranlassen, dass die Seuchentilgung nicht den gewünschten Erfolg hat. Die Lungenseuche kam in 27 Grafschaften Englands (2 mehr als 1884) vor, sie wurde in 8 Grafschaften neu eingeschleppt. In Wales ist nur ein Ausbruch beobachtet worden, während in Schottland 13 Ausbrüche (5 mehr als 1884) festgestellt wurden.

2. Die Maul und Klauenseuche ist nur in 8 Grafschaften Englands,

dagegen nicht in Schottland und Wales aufgetreten. Die Ausbrüche blieben fast durchweg vereinzelt und nur in wenigen Fällen verbreitete sich die Seuche über die Ortschaft hinaus, in welcher dieselbe constatirt worden war. Dieser Erfolg ist der strengen Durchführung der wesentlich verschärften Massregeln gegen eine Verschleppung der Seuche zuzuschreiben. Die letzten Fälle von Maul- und Klauen-seuche wurden am 24. October in Lincolnshire beobachtet; nach dieser Zeit sind bis zum Jahresschluss weitere Ausbrüche nicht zur amtlichen Kenntniss gelangt.

3. Ueber Ausbrüche der Schweineseuche wird aus 46 Grafschaften in England, 8 Grafschaften in Wales und 16 Grafschaften in Schottland berichtet. In 41 Gehöften herrschte die Seuche beim Beginn des Berichtsjahres, im Laufe des letzteren verseuchten 7967 Gehöfte, es erkrankten 38889 Schweine, von denen 27478 auf polizeiliche Anordnung getödtet wurden, 9919 starben, 1375 genesen und 117 am Schlusse des Jahres Bestand blieben. Die Zahl der Ausbrüche ist gegen das vorige Jahr auf mehr als das Vierfache, die Zahl der erkrankten Schweine auf das $3\frac{1}{2}$ fache gestiegen. Der Handel mit erkrankten Thieren, die Unterlassung der schleunigen Anzeige von den Ausbrüchen und der rechtzeitigen Tödtung aller Erkrankten, die Mangelhaftigkeit der Desinfection und die Verwechslung mit anderen Krankheiten der Schweine werden als die Ursachen des starken Umsichgreifens der Krankheit bezeichnet. Die Zahl der Ausbrüche nahm bis zum Juni stetig und auffällig zu und verminderte sich erst als am 20. Juli 1885 die England Markets and Fairs (Swine Fever) temporary Order erlassen wurde. Nach den Vorschriften der letzteren durften in ganz England Schweine nur mit Erlaubniss der Localbehörden öffentlich feilgeboten werden und zwar unter der Bedingung, dass alle auf öffentlichen Märkten ausgestellt gewesenen Schweine gezeichnet werden mussten, ehe sie fortgetrieben werden, und dass sie an keinem anderen Orte Grossbritanniens nochmals öffentlich zum Verkauf gestellt werden dürfen, sondern innerhalb der nächsten drei Tage geschlachtet werden müssen. Der Verkauf ohne behördliche Erlaubniss war nur gestattet, wenn die Schweine sich nicht weniger als 28 Tage auf den betreffenden Gehöften befanden, und wenn der Ort vollkommen seuchenfrei war. Die genannte Verordnung, welche nur bis Ende September Gültigkeit haben sollte, wurde bis Ende November in Kraft gelassen und zwar mit der Abänderung, dass zum Schlachten eine Zeit von 4 Tagen gewährt wurde. Nach Erlass dieser Marktordnung nahm die Zahl der Seuchenausbrüche stetig ab, so dass am Schlusse des Jahres die Zahl der erkrankten Schweine geringer war als zur Zeit des niedrigsten Standes der Seuche im Anfang März. Nur zwei Grafschaften Englands (Cumberland und Westmoreland) blieben frei von der Schweineseuche, welche im West Riding von Yorkshire die grösste Verbreitung erlangte. In Wales und Schottland sind nur wenige Fälle von Schweineseuche beobachtet worden.

4. Rotz und Wurm werden auch im diesjährigen Bericht als besondere Krankheiten auseinander gehalten, trotzdem die „nahen Beziehungen beider Krankheiten eine wesentliche Bestätigung dadurch erfahren haben, dass fast sämtliche Fälle von Wurm dort vorkamen, wo die meisten Rotzkrankungen beobachtet wurden“. Rotzausbrüche kamen in 364 Beständen vor, es erkrankten 538 Pferde (105 weniger als 1884) von denen 532 getödtet wurden und 6 starben. Von den Ausbrüchen entfallen 78 pCt., und von den erkrankten Thieren

82 pCt. auf die Stadt London. An Wurm erkrankten 408 Pferde (72 weniger als 1884) in 273 Beständen, 389 Pferde wurden auf polizeiliche Anordnung getötet, 5 sind gestorben, 11 genasen und 3 waren am Ende des Jahres noch am Leben.

5. Die Ausbreitung der Schafräude hat gegen das vorhergehende Jahr abgenommen. Die Räude wurde in 69 Grafschaften bei 23718 Schafen beobachtet, welche 1512 Beständen angehörten, während im vorhergehenden Jahre 28447 Schafe in 1509 Beständen und 72 Grafschaften räudekrank waren.

Ueber andere ansteckende Thierkrankheiten enthält der Bericht keine Mittheilungen.

Durch die thierärztliche Untersuchung der aus dem Auslande eingeführten Wiederkäuer und Schweine wurden folgende Seuchenkrankheiten ermittelt:

In 5 aus den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika eingeführten Rindviehtransporten wurden 7 Stück Rindvieh mit der Lungenseuche behaftet gefunden.

Am 11., 12. und 17. Februar erwies sich in je einem Schafransport, welcher aus Bremen beziehungsweise Hamburg stammte, ein Schaf mit der Maul- und Klauenseuche behaftet. Die betreffenden Transporte bestanden aus 2151, 246 beziehentlich 519 Schafen.

16 Schafe, welche aus den Niederlanden, den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika bez. Dänemark eingeführt wurden, litten an der Räude.

Ein aus Rotterdam eingeführtes Schwein war mit der Schweineseuche behaftet.

An Entschädigungen für auf polizeiliche Anordnung getödtete Thiere sind gezahlt worden:

für lungenseuchekranke Rinder . . .	15078 LSt.	18 Sh.	2 P.
für gesunde, mit lungenseuchekranken in Berührung gekommene Rinder . . .	10812	- 10	- 1 -
für an Schweineseuche leidende Schweine	18106	- 1	- 5 -
für gesunde, behufs Tilgung der Schweine- seuche getödtete Schweine . . .	4109	- 12	- 7 -
	<hr/>		
	48107 LSt.	2 Sh.	3 P.

Der Bericht spricht sich anerkennend über die Massregeln aus, welche zur Verhütung einer Verschleppung ansteckender Thierkrankheiten in den deutschen Exporthäfen und auf den grossen deutschen Schlachtviehmärkten getroffen worden sind. „Die hierauf bezüglichen Anordnungen sind so verschärft, dass sie überhaupt nicht mehr strenger gemacht werden können.“ Dennoch wurde am 13. Februar 1885 die Einfuhr von Schafen, Ziegen und Schweinen aus Hamburg und bald darauf auch die Einfuhr derselben Thiere aus Bremen und Geestemünde verboten, weil sich in grösseren Schafransporten je ein (!) mit Maul- und Klauenseuche behaftetes Schaf vorgefunden hatte. Dieses Verbot der Einfuhr aus Deutschland blieb bis zum 3. April 1885 in Kraft.

Durch Verordnung vom 1. August 1885 wurden für alle englischen Einfuhrhäfen diejenigen Bestimmungen in Kraft gesetzt, welche seit 1881 für Deptford-London massgebend gewesen sind und sich dort bewährt haben.

Der Hafen Granton wurde am 26. Januar 1885 wieder für dem Schlachtzwange nicht unterworfenen Thiere eröffnet, ferner sind im Laufe des Jahres für eben-

solche Thiere 2 Landungsstellen. in Bristol und eine in Thameshaven (London), eingerichtet worden. South Shields wurde am 31. Juli 1885 für die Vieheinfuhr geschlossen.

Am 1. Januar 1886 standen demgemäss der Einfuhr von Vieh folgende Häfen offen:

a) für dem Schlachtzwange nicht unterworfenen Wiederkäuer und Schweine: Granton, Harwich, Kirkwall, Leith, Newcastle o/T., Weymouth.

b) für dem Schlachtzwange unterworfenen Wiederkäuer und Schweine: Barrow in Furness, Cardiff, Falmouth, Grimsby, Plymouth, Portsmouth, Sunderland.

c) für beide obengenannte Arten von Wiederkäuern und Schweinen: Bristol, Glasgow, Hull, Liverpool, London, Southampton.

In Southampton befindet sich die Quarantäne-Station für aus dem Auslande eingeführtes Vieh.

Verboten war im Berichtsjahr die Einfuhr von Wiederkäuern und Schweinen (abgesehen von solchen Thieren, welche die Quarantäne gehalten hatten) aus: Oesterreich-Ungarn, einschliesslich Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Italien, Frankreich, Russland, Türkei, Serbien, Rumänien und Montenegro; ebenso die Einfuhr von Rindvieh aus Deutschland und Belgien, jedoch war die Einfuhr von Rindvieh aus Schleswig-Holstein unter Bedingung der sofortigen Abschachtung vom 21. Juni bis zum Schlusse des Jahres gestattet.

Ohne dem Schlachtzwang unterworfen zu sein, dürfen eingeführt werden: Wiederkäuer und Schweine aus den britischen Besitzungen in Nordamerika, aus Norwegen, Island, den Kanalinseln und der Insel Man, ferner Rindvieh, Schafe und Ziegen aus Schweden und Dänemark.

Dem Schlachtzwang unterworfen waren aus den Niederlanden und den Vereinigten Staaten von Amerika eingeführte Wiederkäuer und Schweine, Schafe und Schweine aus Deutschland und Belgien, sowie Schweine aus Dänemark und Schweden.

Das Landen von aus Irland eingeführten Wiederkäuern und Schweinen ist den Bestimmungen unterworfen, welche bezüglich Verhinderung einer Einschleppung der Maul- und Klauenseuche erlassen worden sind.

Aus allen übrigen Ländern dürfen Wiederkäuer und Schweine nur unter der Bedingung der sofortigen Abschachtung oder nach einer bestimmten Quarantäne eingeführt werden.

Von dem sehr eingehenden statistischen Material über die Einfuhr von Wiederkäuern und Schweinen dürften folgende Notizen von allgemeinem Interesse sein.

I. Aus Irland wurden eingeführt:

1884.	1885.
229603	243348 St. Rindvieh zum Schlachten,
387352	342938 St. Rindv. zu Zucht- und Mastzwecken,
2220	1884 St. Rindv. zu anderen Zwecken,
71245	52300 Kälber,
355466	430410 Schafe,
177819	198680 Lämmer,
437229	370639 fette Schweine,
19451	27925 magere Schweine.

Mithin ist der Import von Schafen aus Irland etwas gestiegen, während die Einfuhr von Rindvieh und Schweinen etwas abgenommen hat.

II. Vom europäischen Continent:

1884.	1885.
222263	165001 Rinder,
850779	700645 Schafe,
26469	16437 Schweine.
Darunter sind aus Deutschland excl. Schleswig-Holstein:	
450046	281702 Schafe,
8741	102 Schweine.

Aus Schleswig-Holstein:

24504	18463 Rinder,
50432	45167 Schafe.

Ein Blick auf die vorstehenden Zahlen zeigt, dass die Gesamteinfuhr von lebendem Vieh aus dem europäischen Continent im Vergleich zum vorigen Jahre erheblich abgenommen hat. Die Einfuhr aus Deutschland und Schleswig-Holstein ist durchweg bedeutend zurückgegangen.

III. Aus Canada:

1884.	1885.
61092	68556 Rinder,
61382	39734 Schafe,
75	— Schweine.

IV. Aus den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika:

138661	137377 Rinder,
30317	11829 Schafe,
17	57 Schweine.

Hiernach hat die Einfuhr von Rindvieh aus Canada etwas zugenommen, während sich der Import von Schafen um mehr als $\frac{1}{3}$ gegen das Vorjahr vermindert hat. Der Rindviehimport aus den Vereinigten Staaten ist in beiden Jahren fast derselbe geblieben, dagegen beträgt der Import von Schafen nur ca. $\frac{2}{3}$ des auf das vorige Jahr entfallenden. Eine Schweineeinfuhr aus Amerika hat in den letzten Jahren so gut wie garnicht stattgefunden.

Während des Transportes über den atlantischen Ocean mussten von den aus Canada und den Vereinigten Staaten eingeführten Thieren 2409 Stück Rindvieh und 1025 Schafe über Bord geworfen werden, bei der Landung in England wurden zusammen 75 Stück Rindvieh und 49 Schafe todt in den Schiffsräumen gefunden. Der Verlust während des Transportes betrug mithin im ganzen 2484 Stück Rindvieh (1,21 pCt.) und 1074 Schafe (2,08 pCt.). Ausserdem erwiesen sich bei dem Ausladen in den englischen Häfen zusammen 57 Stück Rindvieh und ebenso viele Schafe derartig verletzt, dass die Thiere sofort geschlachtet werden mussten.

Lüpke.

Die Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in den Niederlanden während des Jahres 1885. (Niederländischer Veterinär-Bericht für das Jahr 1885.)

1. Lungenseuche. Während des Jahres 1885 wurden Ausbrüche der Lungenseuche in zusammen 19 Rindviehbeständen (9 weniger als 1884) beobachtet, von demselben entfallen:

14 auf die Provinz Südholland,
3 - - - Limburg,
2 - - - Friesland.

Es erkrankten an Lungenseuche zusammen 83 St. Rindvieh (151 weniger als 1884), nämlich:

59 in Südholland,
10 in Limburg,
14 in Friesland.

Als der Ansteckung verdächtig wurden 380 Stück Rindvieh (2670 weniger als 1884) getödtet, unter diesen:

289 in Südholland,
31 in Limburg,
60 in Friesland.

Bei 56 von diesen 380 Stück Rindvieh (14,68 pCt.) wurden in den Lungen die der Lungenseuche charakteristischen krankhaften Veränderungen vorgefunden.

An Entschädigung für auf polizeiliche Anordnung getödtete kranke und der Ansteckung verdächtige Thiere sind gezahlt worden: 1885: 67450 Fl. 62 Cts. 1884: 714599 Fl. 9 Cts., oder nach Abzug der Erlöses für das Fleisch und die Häute der getödteten Thiere im Betrage von 32969 Fl. 62 Cts. bezw. 367709 Fl. 10 Cts., 1885: 34481 Fl., 1884: 346889 Fl. 99 Cts.

Ausserhalb des abgesperrten Bezirkes vom Schlempe-district (Spoelings-district) verseuchten in Südholland zusammen 4 Viehbestände, unter diesen 3 in der Ortschaft Overschie, welche zum Theil noch innerhalb des abgesperrten Bezirkes liegt, die Einschleppung erfolgte durch Aufnahme bezw. Ankauf von Thieren aus einem verseucht gewesenen Bestande der Nachbarschaft. Die Ursache eines Ausbruches in Hillegersberg sind nicht ermittelt worden. Alle übrigen Ausbrüche der Lungenseuche in Südholland entfallen auf den abgesperrten Theil des Schlempe-districts. Von den Rindviehstücken, welche während des Berichtsjahres in den Schlachthäusern des letzteren geschlachtet wurden, erwiesen sich nur 10 — gegen 134 im Jahre 1884 — mit der Lungenseuche behaftet. Die Impfung des Rindviehs im Schlempe-district wurde fortgesetzt, — die Thatsache, dass man keine frische Lymphe im Inlande beschaffen konnte, beweist am besten, wie weit die Tilgung der Lungenseuche auch in dieser am stärksten verseuchten Provinz vorgeschritten ist. Von 286 geimpften Stück Rindvieh starben 4 in Folge der Impfung. Der letzte Fall von Lungenseuche in Südholland wurde am 12. April 1885 constatirt in den letzten 8 Monaten des Jahres war die Provinz seuchefrei.

In der Provinz Limburg blieb die Lungenseuche auf je ein Gehöft der Ortschaften Mesch, Roosteren und Meersen-Limmel beschränkt, der letzte Ausbruch wurde am 8. April 1885 constatirt. Die Seuche ist nach Mesch durch eine —

wahrscheinlich in Belgien — angekaufte Kuh eingeschleppt und hat in anderen Beständen von Roosteren während des vorigen Jahres geherrscht. Die Ursachen des Ausbruchs in Meersen-Limmel blieben unaufgeklärt.

Die Provinz Friesland war in den beiden letzten Jahren seuchefrei geblieben, im April und Mai des Berichtsjahres brach die Krankheit in je einem Bestande der Ortschaften Wommels und Loenge aus, die Ursachen haben nicht mit Sicherheit ermittelt werden können.

Abgesehen von dem abgesperrten Bezirk des Schlempe-districts in Südholland, in welchem die Krankheit noch nicht als getilgt betrachtet werden kann, sind die Niederlande seit Mitte des Jahres 1885 frei von Lungenseuche. Eine dem Veterinär-Berichte beigefügte graphische Darstellung veranschaulicht die fortschreitende Tilgung der Seuche in den Jahren 1871 bis 1885, die Zahl der lungenseuchekranken Thiere betrug nach der Zusammenstellung des Berichtes:

1871:	6078 St. Rindv.	1879:	157 St. Rindv.
1872:	4008 -	1880:	44 -
1873:	2479 -	1881:	12 -
1874:	2414 -	1882:	11 -
1875:	2227 -	1883:	18 -
1876:	1723 -	1884:	234 -
1877:	956 -	1885:	83 -
1878:	701 -		

Ueber die Mikroorganismen in dem Contagium der Lungenseuche haben Dr. van Kleef und die Thierärzte A. J. Janné und L. Th. Janné in Maastricht, ausserdem Dr. Nolen und der stellvertretende Districtsthierarzt Poels in Rotterdam eingehende Untersuchungen angestellt. van Kleef und die beiden Janné stellen die Resultate ihrer Forschungen, welche durch 3 Tafeln erläutert werden, in den folgenden Conclusionen zusammen:

1. Die Bacterien, welche wir stets und ausschliesslich bei Lungenseuche vorgefunden haben, bestehen aus kleinen runden Kokken, an denen wir eine Umhüllung nicht nachweisen konnten.

2. Man findet diese Kokken durch die ganze Lunge in dem entzündeten Interlobulär-Gewebe, ebenso auch constant in allen anderen der Krankheit eigenthümlichen pathologischen Processen und Producten.

3. Die bei jungen Kälbern nach der Impfung auftretende — von Einigen als rheumatisch angesehen — Gelenkentzündung ist von derselben Art, wie die Lungenseuche; in den Gelenken finden sich dieselben Kokken, und man kann durch Einimpfen von Synovia aus den Gelenken den charakteristischen Krankheitsprocess in den Lungen hervorrufen.

4. Bei jungen, noch säugenden Kälbern kann durch Einimpfung in die Pleurahöhle oder die Lungen, sogar in das Unterhautbindegewebe ausschliesslich Polyarthritiden hervorgerufen werden, und die Thiere können an der zuletzt genannten Krankheit sterben, ohne dass irgend welche krankhafte Veränderungen in der Brusthöhle oder unter der Haut zu finden sind.

5. Auf den bisher gebräuchlichen Culturböden (Kartoffeln, Gelatine, Bouillon, Agar-Agar, sterilisirtem Blutserum) entwickeln und vermehren sich die Bacterien der Lungenseuche nicht.

6. Alle von uns aus Lungen-Lymphe entwickelten Bacterien scheinen Verunreinigungen zu sein und bei Einimpfungen keine specifischen Wirkungen auf Kälber auszuüben. Die meisten dieser Bacterien konnten von uns auch in dem Staube nachgewiesen werden, welcher den Haaren gesunder Rinder anhaftet.

7. Eine Abschwächung der Virulenz durch Kulturen wurde bisher nicht erzielt.

8. Da sowohl Lungen- als auch Brustfellentzündung, ferner Phlegmonen, Polyarthritis durchweg von demselben Virus abhängen, kann man sich durch Impfung eines nicht zu jungen Kalbes eine reichliche Menge Impfstoff verschaffen.

9. Die Lymphe lässt sich längere Zeit in sterilisirten Pipetten in brauchbarem Zustande aufbewahren, wenn die Cautelen gegen das Eindringen von fremden Keimen und jede hierdurch herbeigeführte Verunreinigung beobachtet werden.

10. Nach Pasteur'schen Untersuchungen soll jedoch diese Lymphe nach einigen Wochen ihre stark virulenten Eigenschaften verlieren, so dass dieselbe nach einem Monat Immunität gegen die Lungenseuche verleiht, ohne belangreiche locale Veränderungen hervorzurufen. Das wäre die alleinige augenblicklich bekannte Methode, durch welche eine Abschwächung des Lungenseuche-Virus erreicht werden könnte.

2. Maul- und Klauenseuche. Ausbrüche dieser Krankheit wurden in 3 Gemeinden der Provinz Gelderland und in je einer Gemeinde der Provinzen Seeland und Utrecht beobachtet. Durch strenge Absperrung der verseuchten Gehöfte — bei welchen mitunter die Hülfe des Militärs in Anspruch genommen wurde — gelang es eine weitere Verbreitung der Seuche zu hindern.

3. Rotz-Wurmkrankheit. Dieselbe wurde bei zusammen 40 Pferden constatirt, welche 32 Beständen angehörten, ein Besitzer verlor 3, in 6 Beständen betrug der Verlust 2 Pferde, alle übrigen Fälle blieben vereinzelt.

4. Räude der Pferde und Schafe. Frei von Räude blieben die Provinzen Gelderland, Nordbrabant und Limburg, in den Provinzen Seeland und Ober-Yssel wurde die Räude bei zusammen 5 Pferden beobachtet. Dagegen herrschte dieselbe in den übrigen Provinzen unter den Schafen, sie erlangte die grösste Verbreitung in Nordholland.

5. Schafpocken. In der Provinz Friesland wurden 2 Fälle von Schafpocken beobachtet. Die Einschleppung konnte nicht ermittelt werden.

6. Milzbrand. An Milzbrand sind gefallen: 172 St. Rindv., 15 Schafe und 1 Schwein. Die zahlreichsten Fälle wurden beim Rindvieh in den Provinzen Südholland (51), Nordbrabant (42) und Limburg (25) beobachtet. Durch die im Jahre 1885 erlassene Verordnung über „die unschädliche Beseitigung von Cadavern der an einer ansteckenden Krankheit gefallenen Thiere, sowie über die Desinfection von Ställen, anderen Gebäuden, von Viehwagen auf Eisenbahnen und Verladestellen für Vieh wurde angedordnet, dass die Cadaver von an Milzbrand gefallenen Thieren, wenn es irgend angeht, verbrannt werden müssten, und dass die beamteten Thierärzte, soviel wie möglich, diese unschädliche Beseitigung der Cadaver zu befördern hätten. Impfungen nach Pasteur's Verfahren sind nur in der Provinz Limburg, dort jedoch mit dem besten Erfolge

ausgeführt worden, dasselbe Verfahren wird von 1886 ab auch in Südholland Eingang finden.

7. Tollwuth. In Stein, Provinz Lüneburg, wurde ein der Tollwuth verdächtiger Hund getödtet. Zwei in der Provinz Oberyssel getödtete Hunde sollen aus Deutschland übergelaufen sein. Müller.

Salmon, Dr., Ueber die Hog cholera. The Breeder's Gazette, 1886.

Die unter den Schweinen in Nordamerika fortwährend herrschende Hogcholera richtet amtlichen Berichten zufolge alljährlich einen Schaden an, der sich auf Millionen beläuft. Trotzdem ist die Kenntniss der Art und des Wesens dieser Krankheit unter den Thierärzten der Vereinigten Staaten bisher eine so unzulängliche gewesen, dass noch in der letzten Zeit eine Autorität wie Professor Liautard in New-York behauptet, dass dieselbe mit dem „rouget“ der Schweine in Frankreich und mit dem Rothlauf in Deutschland, sowie mit der Pneumoenteritis in England identisch sei. Auf Grund dieser Annahme hat Liautard als bestes Tilgungsmittel der amerikanischen Schweineseuche die von seinem Landsmanne Pasteur gegen den „rouget“ angewandte Schutzimpfung empfohlen. Dem gegenüber macht Dr. Salmon in Washington mit Recht geltend, das durch die Ergebnisse der neuesten Forschungen in Deutschland als erwiesen gelten müsse, dass der rouget und der Rothlauf gleich seien, dass dagegen die Schweineseuche eine von beiden ganz verschiedene Krankheit sei, wie Schütz in Berlin einwandsfrei dargethan habe; auch die Hogcholera und die Pneumoenteritis hätten mit dem rouget nichts gemeinsam. S. ist mit dem Studium der ersteren Krankheit seit Jahren beschäftigt; er hat auch die von Pasteur empfohlene Schutzimpfung vorschriftsmässig mit wirksamen Vaccins angewandt, wobei er die Erfahrung machte, dass die geimpften Thiere doch an der Hogcholera erkrankten, nachdem sie der Einwirkung des Contagiums dieser Krankheit ausgesetzt waren.

S. schliesst die Möglichkeit nicht aus, dass ebenso, wie in Deutschland bisher mehrere seucheartige Krankheiten der Schweine mit dem Namen Rothlauf bezw. Schweineseuche bezeichnet worden sind, in Nordamerika mehr als eine Krankheit vorkommen könne, welche bei der gegenwärtigen unzulänglichen Kenntniss der Schweinekrankheiten bald als Hogcholera, bald als swine-plaque bezeichnet werden. Die von ihm besonders studirte „Hogcholera“ hält er auf Grund seiner Kenntnisse für eine ganz eigenthümliche Krankheit. In den von ihm vorliegenden Mittheilungen beschränkt er sich darauf, in grossen Zügen den Beweis zu liefern, dass Hogcholera und rouget resp. Rothlauf mit einander nicht zu verwechseln sind.

Um die Incubationszeit der in Rede stehenden Krankheit festzustellen, hat S. gesunde Thiere mit kranken in Berührung gebracht oder in Stallungen eingestellt, in welchen kranke sich kurz zuvor aufgehalten hatten. Auf diese Weise stellte er fest, dass im Sommer 5—18 Tage vergingen, bevor seine Versuchsthiere nachweislich erkrankten, im Winter dagegen schwankte diese Zeit zwischen 10—20 Tagen. Aus einer grösseren Anzahl von Versuchen fand er für den

Sommer die mittlere Incubationszeit von 7—8, für den Winter von 14 Tagen. Nach der Impfung, über deren Art und Ausführung nichts mitgeteilt ist, sollen die Thiere in 4—8 Tagen krank werden.

Der Verlauf der Krankheit bis zum tödtlichen Ausgang schwankt nach S.'s Angaben gleichfalls zwischen weiten Grenzen. In wenigen Fällen verenden die Kranken in 3—4, die meisten sterben zwischen 8—14 Tagen. Als mittlere Krankheitsdauer bezeichnet S. die Zeit von 8—10 Tagen.

Bei Uebertragungsversuchen durch Verfüttern von Organen und Theilen an der Krankheit gestorbener Thiere an gesunde Schweine ergab sich, dass die Versuchsthiere stets erkrankten, wenn sie durch vorherige Einwirkung des Contagiums nicht bereits Immunität erlangt hatten. Von 37 auf diese Weise resp. mit Culturen (!) gefütterten Thieren starben 34 an der Hogcholera; die 3 refractären Versuchsthiere sollen vorher dem Contagium ausgesetzt gewesen sein. Als mittlere Zeit zwischen Fütterung und Tod hat S. 15 Tage gefunden, also etwa einen 4 mal so langen Zeitablauf als Lydtin bei denselben Versuchen mit Verfütterung von Theilen rothlaufkranker Thiere ermittelte.

Die pathogene Wirkung des von S. angeblich festgestellten Krankheits-erregers der Hogcholera auf gewisse Impftiere ist sehr beachtenswerth. Denn S. führt an, dass Tauben sich gegen die Wirkung des Virus stets refractär verhalten hätten, wenn sie nicht mit einer „sehr grossen“ Dosis des Krankheitsgiftes geimpft worden wären; dagegen wären Meerschweinchen gegen das Contagium der Hogcholera so empfänglich, dass bei einzelnen bereits $\frac{1}{250}$ eines Tropfens (?) genügt habe, eine tödtliche Krankheit hervorzurufen.

Die Unterschiede, welche S. in den klinischen Erscheinungen zwischen beiden Krankheiten findet, sind aus dem Grunde sehr wenig beweiskräftig, weil er der irrigen Anschauung ist, dass die wesentlichsten Erscheinungen beim rouget bezw. Rothlauf in einer „erysipelatösen“ Veränderung der Haut beständen, und dass daher die Haut den eigentlichen Sitz der Krankheit darstelle, wohingegen die Hogcholera ihre Localisation vorwiegend in den „Eingeweiden“ finde. Fernere Angaben in dieser Richtung fehlen leider.

Von den nach dem Tode bei der Section beobachteten Organveränderungen werden als besonders charakteristisch Ulcerationen im Dickdarm hervorgehoben, welche so augenfällig und ausgebreitet sind, dass sie nicht übersehen werden können, und nur dann fehlen, wenn die Krankheit in 1 oder 2 Tagen nach Beginn des Anfalles zum Tode geführt hat. Weitere Abweichungen sind nicht erwähnt.

Der die Hogcholera erzeugende Mikroparasit ist S. angeblich bekannt; er will ihn in den Organen kranker Thiere entdeckt, auch cultivirt und seine Wirkungen nach Verimpfung und Verfüttern eingehend studirt haben. Der Organismus soll sich vom Rothlaufbacillus in Form, Wachstumsart auf verschiedenen Nährböden und sonstigen biologischen und pathogenen Eigenschaften unterscheiden.

Nach diesen allgemeinen Daten findet S. die nachstehenden Unterschiede zwischen

Hogcholera	und	Rouget
1. Incubationszeit 5—20, durchschnittlich im Sommer 7, im Winter 14 Tage.		1—6, Durchschnitt 3 Tage.

Hogcholera	und	Rouget
2. Dauer der Krankheit 8—10 Tage.		2 Tage.
3. Sterblichkeit nach Fütterung mit Organen an der Krankheit gestorbener Thiere, 90 pCt.		20 pCt.
4. Mittlerer Zeitraum zwischen Fütterung und Tod 15 Tage.		4 Tage.
5. Meerschweinchen sind sehr empfänglich, Tauben refractär gegen das Contagium.		Meerschweinchen unempänglich, Tauben sehr empfänglich.
6. Ulcerationen im Dickdarm constant.		Ulcerationen nur ausnahmsw. vorhanden (Schottelius, Cornevin).
7. Eigenthümlichen Organismus als Krankheitsursache.		Rothlaufbacillus.

Hieraus schliesst S., dass die Hogcholera mit dem rouget keineswegs identisch ist, und dass daher die Pasteur'sche Impfung gegen die letztere Krankheit keinen Erfolg in ihrer Anwendung gegen die Hogcholera haben kann. Welche Stellung die letztere zur Schweineseuche (Schütz) und zur Pneumoenteritis (Klein) einnimmt, lässt H. vorläufig unerörtert. Lüpke.

Amtlicher Bericht über die Viehzucht in der australischen Kolonie New South Wales für das Jahr 1885.

Der Bestand an Pferden, Rindvieh und Schafen in der Kolonie New South Wales betrug:

1875.	1885.
357696 Pferde,	344697 Pferde,
3134086 St. Rindvieh,	1317315 St. Rindvieh,
25353924 Schafe.	37820906 Schafe.

Die Zahl der wild lebenden (verwilderten) Pferde wird auf 9622 geschätzt.

Ueber das Auftreten von Seuchenkrankheiten enthält der Bericht folgende Bemerkungen von allgemeinerem Interesse:

In einigen Districten wurden Ausbrüche der Influenza bei Pferden beobachtet; die Verluste blieben fast durchweg geringfügig, sie beschränkten sich meistens auf die Fälle, in denen die Pferde beim Beginn der Krankheit noch hatten arbeiten müssen oder mit Purgirmitteln behandelt worden waren.

In 29 Districten herrschte die Lungenseuche unter dem Rindvieh, 30 Districte blieben frei von dieser Krankheit. Die Impfung der Lungenseuche ist vielfach und mit dem besten Erfolge angewendet worden. Der Bericht empfiehlt die obligatorische Impfung aller Viehbestände, welche der Ansteckung ausgesetzt gewesen sind und die Tödtung sämmtlicher erkrankten Thiere als ein Mittel um die Lungenseuche in Australien gänzlich zu unterdrücken. Mehrfach sind in den Schlachthäusern Rinder, welche mit der Tuberculose behaftet waren, von der Verwerthung als Fleischwaare ausgeschlossen worden.

Die Schafherden in New South Wales, Queensland, Victoria, Süd-Austra-

lion und Tasmanien sind frei von Räude, welche Krankheit — jedoch nur wenig verbreitet — unter den Schafen in Neu-Seeland und Westaustralien herrscht. Die Kolonie erlitt verhältnissmässig bedeutende Verluste an Schafen durch Ausbrüche des Milzbrandes (Cumberland disease), Bleichsucht und Leberegelseuche. Die Behauptung, dass zahlreiche Vergiftungen von Schafen durch Verzehren einer giftigen Euphorbia-Art (*E. Drummondii*) herbeigeführt worden seien, hat sich bei den eingehenden amtlichen Untersuchungen nicht bestätigt. In 5 Districten litten die Schafherden — jedoch nur in geringem Grade — an bösartiger Klauen-seuche.

Nach den letzten Ermittlungen werden in der Colonie 208694 Schweine gehalten; es ist sehr zu bedauern, dass die Landwirth der Schweinezucht keine grössere Aufmerksamkeit zuwenden.

Von den 37820906 Schafen gehörten 36517097 der Merino-, 355124 den langwolligen Racen an und 948685 Schafe waren Kreuzungsproducte. Das durchschnittliche Schurgewicht für ein Schaf betrug 5 Pfd. 7½ Unzen ungewaschene bzw. 3 Pfd. 2 Unzen gewaschene Wolle. Der Export wird für das Jahr 1885 auf rund 162 Millionen Pfund ungewaschene und auf 3 Millionen Pfund gewaschene Wolle geschätzt.

Müller.

Ellenberger, Prof. Dr. W., Lehrbuch der allgemeinen Therapie der Haussäugethiere. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Schütz in Berlin und Prof. Dr. Siedamgrotzky in Dresden herausgegeben. II. Bd. Berlin 1885. Verlag von August Hirschwald.

Dem von Professor Ellenberger allein bearbeiteten ersten Bande des Lehrbuches der allgemeinen Therapie der Haussäugethiere ist nunmehr der zweite, unter Mitwirkung der Proff. Schütz und Siedamgrotzky herausgegebene Band dieses Werkes gefolgt. Die Arbeitheilung in diesem letzteren Bande ist so eingerichtet, dass Prof. Schütz die Geschichte der Therapie, Prof. Siedamgrotzky Impfung, Desinfection, antiseptische, antizymotische und antiparasitische Methode, Anwendung von Kälte und Wärme, Electricität, Massage und Bewegung, Prof. Ellenberger endlich den Rest, und zwar namentlich die speciellen Heilmethoden, übrigens den weitaus grösseren Theil, übernommen hat. Man wird hierbei versucht die Frage aufzuwerfen, warum der Herausgeber nicht, wie sein Vorgänger Gerlach, das Lehrbuch allein fertiggestellt hat, nachdem ihm doch bezüglich der Seitenzahl des Buches so wie so der Löwenantheil zufällt, warum er namentlich nicht auch noch die wenigen von Siedamgrotzky behandelten Kapitel bearbeitet hat? (Es fallen nämlich der erste Band mit 345 Seiten ganz und von den 357 Seiten des zweiten Bandes über 200 auf den Herausgeber.) Auf diese Frage wird mit Recht erwiedert werden, dass die gemeinschaftliche Inangriffnahme eines Handbuches der allgemeinen Therapie durch 3 Fachmänner, von denen der eine das Gebiet der Physiologie und Pharmakologie, der andere das der pathologischen Anatomie, der dritte die klinischen Fächer beherrscht, günstigere Resultate verspricht, als die Bewältigung des in der neueren Zeit sehr umfangreich gewordenen Stoffes durch einen einzigen der

klinischen Praxis noch dazu fernstehenden Bearbeiter. Hierbei erlaubt sich indess der Referent seine Meinung dahin zu äussern, dass er sich eine derartige gemeinschaftliche Abfassung eines Lehrbuches der allgemeinen Therapie in etwas anderer Weise gedacht hat; er hatte es für besser gehalten, wenn statt der Vertheilung bestimmter Pensen an die einzelnen Mitarbeiter jeder einzelne Abschnitt gemeinschaftlich, von allen 3 Fachmännern zusammen überarbeitet worden wäre, wodurch Theorie und Praxis ebenmässig mit einander vereint und das Werk so gewissermassen wie aus einem Gusse geformt worden wäre.

Nur für die Geschichte der Therapie war eine separate Bearbeitung vorzuziehen. Dass dieser Abschnitt, welcher die wichtigsten Fragen des medicinischen Denkens und Handelns in sich schliesst, in die Hände eines so berufenen Bearbeiters, wie es Professor Schütz ist, gelegt wurde, muss dankbar anerkannt werden. Die feine, geistreiche Weise, in welcher derselbe seiner Aufgabe gerecht wurde, war von einem so intimen Schüler Virchow's nicht anders zu erwarten. Es ist ein Genuss, diese Geschichte der Therapie zu lesen, Schütz hat es verstanden, seinem Thema ganz neue Seiten abzugewinnen, was nach der Gerlach'schen Bearbeitung nicht gerade leicht war. Um nur einiges wenige hervorzuheben: Wie schlagend sind in der Studie über „Kunstheilung und Naturheilung“ die gegen den angeblichen therapeutischen Nihilismus gerichteten Argumentationen, wenn es S. 359 heisst: „Nichtsthun im Spital heisst: nichts Neues zu der Einrichtung eines Spitals hinzufügen. Wenn ich einen kranken Menschen oder ein krankes Pferd in ein Spital überführe, so ist dies schon ein therapeutisches Handeln, denn im Spital existiren vortheilhafte hygienische Verhältnisse. Diese reichen bei vielen Krankheiten schon aus, um Heilung derselben herbeizuführen und bei anderen, um auf ihren Verlauf günstig einzuwirken“. Ebenso zutreffend ist seine Kritik der älteren und neueren Homöopathie. Das in der That psychologische Räthsel die Anhängerschaft an Hahnemann's Schule erklärt Schütz folgendermassen (S. 366): „Ich sehe die gänzliche Unbekanntheit mit den Lehren der medicinischen Wissenschaften, die Neigung zur Charlatanerie, den Hang nach Wunderbarem, die Aussicht auf äussere Vortheile etc. als Ursache an, welche den Uebertritt veranlassten; bei Manchen mag auch das mangelhafte Urtheil entscheidend gewirkt haben, bei den Wenigsten indess die Ueberzeugung“. Ueber die thierärztlichen Homöopathen spricht er sich ebenso schroff als gerecht aus, wenn er S. 371 u. a. sagt: „Wer gewohnt ist, durch rechtschaffene und fleissige Geistesarbeit an den Fortschritten seiner Wissenschaft mitzuhelfen, dem kommen die durch die thierärztlichen „Aehnlichkeiten“ ausgesprochenen Ansichten widerlich vor, um so mehr, als ihnen der originelle Anstrich fehlt“. Ganz besonderen Dank aber hat sich Schütz nach des Ref. Gefühlen durch die Ehrenrettung verdient, die er dem absprechenden Urtheile auch Gerlach's gegenüber Rademacher zu Theil werden liess. Wer die Schriften Rademacher's gelesen hat, muss davon gefesselt werden; es ist nicht bloss die liebenswürdige Art und Weise der Darstellung, die unterhaltende, genial witzige Lektüre, sondern es ist entschieden das Werk eines „grossen Denkers“, wie ihn Schütz mit vollem Rechte benennt, was wir an Rademacher's Erfahrungsheillehre bewundern müssen. Wenige werden wohl wissen, dass Rademacher die Veröffentlichung des Hauptwerkes seines ganzen Lebens lediglich dem Berliner Verlagsbuchhändler G. Reimer zu verdanken hat, wie er

dies in der Vorrede zur 2. Auflage selbst erzählt — um so mehr muss es als ein Act der Pietät bezeichnet werden, dass nach fast 50 Jahren dieses jetzt so ziemlich überall vergessene Werk wenigstens in Berlin seine Wiederauferstehung feiert. — Zum Schlusse bespricht Schütz die moderne Therapie. Ich will von den diesbezüglichen Ausführungen nur noch kurz die Ansichten des verdienstvollen bacteriologischen Forschers über den Einfluss der gegenwärtig so allgemein cultivirten ätiologischen und bacteriologischen Richtung in der Medicin auf die Therapie wiedergeben, da sie mir von wesentlichem Belange zu sein scheinen. Schütz überschätzt diesen Einfluss durchaus nicht, vielmehr ist er der Meinung, dass die Entdeckung der mykotischen Natur verschiedener Krankheiten nicht den Einfluss auf die therapeutischen Anschauungen ausüben wird, welchen die anatomische Richtung in der Medicin bewirkt hatte, weil die Therapie von jeher den allerdings nur geahnten, nunmehr aber sicher constatirten Thatsachen Rechenschaft getragen habe — eine beherzigenswerthe Lektüre für manchen Jünger des bacteriologischen Sports unserer Tage.

Auf die Geschichte der Therapie folgen die Heilmethoden, mit deren Bearbeitung Prof. Siedamgrotzky den Anfang macht. Von Wichtigkeit sind hier namentlich die Kapitel über Impfung, Antisepsis und Electricität. Die Abhandlung über die letztere, welche in Anlehnung an die Werke der humanen Medicin, namentlich an Pierson's Compendium der Electrotherapie geschrieben wurde, ist das einzige, was wir in der Thierheilkunde über diesen Gegenstand besitzen. Es wäre daher immerhin eine kurze Vorbesprechung der einschlägigen physikalischen Verhältnisse, welche Siedamgrotzky wohl mit Unrecht als bekannt voraussetzt (da das Lehrbuch nicht nur für jüngere sondern auch für ältere Thierärzte bestimmt sein dürfte), wünschenswerth gewesen. Auch hatte der Bearbeiter die Bedeutung der Electrotherapie für die Thierheilkunde wohl in etwas unterschätzt, wenn er der Ansicht ist, dass dieselbe noch lange nur eine vereinzelt Anwendung finden werde. Namentlich bei Hunden treten die rein nervösen Leiden garnicht so selten auf und werden nicht nur in Kliniken, sondern auch allmählich in der Praxis draussen mit gutem Erfolge elektrotherapeutisch behandelt; es möge hier nur an die zahlreichen spinalen und cerebralen Lähmungen im Verlaufe der Hundestaupe oder an die sehr häufigen traumatischen Lähmungen der Nachhand bei Hunden erinnert werden. Der Preis derartiger elektrischer Apparate steht ihrer Anwendung nicht entgegen. Ref. ist z. B. mit einem Spamer'schen Inductionsapparate im Preise von 36 Mark in den meisten Fällen ausgekommen. Zum Schlusse sei die Bemerkung noch gestattet, dass sich der Verfasser die Leser des Buches sehr zu Dank verpflichtet haben würde, wenn er es unternommen hätte, die von ihm erwähnten motorischen Punkte, d. h. die Stellen des Körpers, wo die electricisch zu erregenden Theile der Haut am nächsten liegen, wenigstens beim Hunde zu bestimmen, nachdem er sich einmal mit dem Gegenstande literarisch befasst und das Bedürfniss selber empfunden hatte.

Der weitaus grösste Theil des Abschnittes über die Heilmethoden ist von Professor Ellenberger, dem Herausgeber des Gesamtwerkes übernommen. Von den allgemeinen Heilmethoden sind zunächst noch die giftwidrigen, die verdichtenden, erweichenden und diätetischen Methoden,

sodann die ganze Reihe der speciellen Heilmethoden bearbeitet, welche die einzelnen Körpersysteme, wie Nervensystem, Körperwärme, Blut und Circulation, Resorption, Haut, Harn-, Verdauungs- und Geschlechtsorgane, sowie die Athmung zum Gegenstande haben. Es kann nicht genug anerkannt werden, welche Summe von Arbeit auf diese Theile des Werkes vom Herausgeber verwandt und wie umsichtig die schwierige Aufgabe gelöst worden ist, die Grundmethoden der Therapie in einheitlicher und dabei doch erschöpfender Weise darzustellen. Namentlich muss die physiologische Grundlage, auf welcher das ganze beruht, als die einzig richtige und daher auch die Einschaltung besonderer Kapitel über die allgemeine Therapie der betreffenden Funktions- und anatomischen Störungen als ein sehr glücklicher Gedanke bezeichnet werden. Leider verbietet es der Raum dieses Referates, einzeln die Vorzüge der Bearbeitung zu besprechen; es kann nur im Allgemeinen hervorgehoben werden, dass insbesondere die giftwidrigen, die diätetischen, nervinen, fieberwidrigen und purgirenden Methoden mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet sind.

Im ganzen genommen sind es nur einige Punkte, in denen sich der Ref. den Ausführungen des Verfassers nicht unbedingt anschliessen kann. Möge es gestattet sein, einige derselben kurz zu berühren. S. 520 wird u. a. empfohlen, bei acuten Krankheiten der Verdauungsorgane viel kaltes Wasser zu verabreichen. Verf. möchte hierbei darauf aufmerksam machen, dass bei acutem Magenkatarrh der Hunde die Aufnahme von viel kaltem Wasser aus dem Grunde zu verhüten ist, weil dasselbe erfahrungsgemäss als neues Reizmittel auf die entzündete Magenschleimhaut wirkt, das Erbrechen steigert und so die Krankheit verschlimmert. S. 535 wären nach des Ref. Dafürhalten die „exacten Untersuchungen“ des daselbst genannten „bekanntesten thierärztlichen Forschers und Schriftstellers“ mit etwas mehr kritischer Vorsicht aufzunehmen gewesen; auch kann Referent die S. 537 neben der Oertel'schen als eine eigene Curmethode aufgeführte „Methode Schwenninger“ nicht als solche anerkennen. S. 559 wird bezüglich des Morphiums als Narkoticum gesagt, dass dasselbe in dieser Richtung nur wenig zu empfehlen ist. Dies gilt nur zum Theil, z. B. für Pferde. Für Hunde ist das Morphinum dagegen als Narkoticum ein geradezu unersetzliches specifisches Mittel und dem Chloroform, Chloralhydrat u. s. w. weit aus vorzuziehen. Ref. operirt, wie dies auch anderweitig der Fall ist, an Hunden ausschliesslich in der Morphinumarkose, welche neben ihrer Ungefährlichkeit ausserdem noch den Vortheil besitzt, dass sie lange Zeit hindurch, gewöhnlich 1—2 Tage, anhält und so die Thiere vom Abreissen des ersten Verbandes abhält. Nur bei Augenoperationen, in denen Cocain allein, wie z. B. bei der Staaroperation nicht ausreicht, empfiehlt sich eine complicirte Morphinum-Aethernarkose. S. 576 ist das Chinin in erster Linie als ein sehr wirksames Antipyreticum bei vielen fieberhaften Krankheiten bezeichnet, soweit sich dies auf den Menschen bezieht, ganz mit Recht. Bei unseren Hausthieren ist die Sache jedoch wesentlich anders. Die angegebene Dosis für grössere Hausthiere (10—15,0) dürften wohl in den meisten Fällen zu klein sein. Ref. hat selbst bei seinen gebräuchlichen Dosen von 20—25,0 Chininum hydrochloricum nicht immer einen Temperaturabfall erzielt, fast niemals aber ist er im Stande gewesen, bei den acuten Infectionskrankheiten der Hausthiere (Pferdestaupe, croupöse Pneumonie, infec-

tiöse Pneumopleuresie, Hundestaupe etc.) die Temperatur durch Chinin irgendwie erheblich herunterzudrücken. Es ist überhaupt eine wohl aufzuwerfende Frage, ob man nicht häufig durch die Verabreichung innerlicher antipyretischer Mittel mehr schadet als nützt. Ausgedehnte Versuche der Wiener medicinischen Klinik haben wenigstens für einige acute fieberhafte Krankheiten des Menschen (Pneumonie und Erysipel) dargethan, dass die Verabreichung von Fiebermitteln nicht nur fruchtlos war, sondern den Verlauf der Krankheit deutlich ungünstig beeinflusste. (Vergl. Verhandlungen des Kongresses für innere Medicin in Wiesbaden 1885, wo sowohl v. Jaksch S. 164 als auch Strümpell S. 166 sich in diesem Sinne aussprachen.) Ref. glaubt ähnliche Beobachtungen bei der Chininbehandlung der Hundestaupe gemacht zu haben und führt daher die innerlichen Antipyretica, von denen er das Antipyrin und Thalin im allgemeinen dem Chinin vorzieht, nur dann ins Feld, wenn anhaltende und sehr hohe, gefährdende Temperaturen vorliegen. — Neben den zahlreichen angeführten Antipyreticis hätte sodann noch die Blausäure erwähnt werden dürfen. Die Dosirung der Digitalis wird verschieden angegeben; die angeführten Dosen von 1—5,0 für das Pferd scheinen jedoch nach des Ref. Erfahrungen für einen antipyretischen Effect zu klein zu sein, indem derselbe nur nach 6—10,0, häufig erst nach 12,0 einen erheblichen Erfolg eintreten sah. S. 592 kommen dem Ref. die Indikationen für die Vornahme des Aderlasses allzu zahlreich vor; ganz auffallend aber erscheint demselben die Angabe, dass öfters wiederholte kleine Aderlässe bei Anämie, Chlorose und Hydrämie oft einen recht günstigen Erfolg haben sollen! Gerade das umgekehrte, Bluttransfusionen und subcutane Blutinjectionen werden neuerdings gegen diese Zustände angewandt. Unter den Indicationen zum Aderlasse vermisst Ref. sodann die rheumatische Hämoglobinämie (schwarze Harnwinde). Zu S. 639 wäre ergänzend zu bemerken, dass haarwuchsbefördernde Mittel (Spiritus, Perubalsam, Theer, Cantharidentinctur) in der Hundepaxis sehr häufig zur Verwendung kommen, zu S. 646, dass die Digitalis wohl noch von jedem Kliniker gegen den Ascites der Hunde ordinirt worden ist, zu S. 681, dass Eispillen nicht nur beim Menschen, sondern auch bei den Hausthieren, namentlich beim Hunde, eines der bekanntesten, vorzüglichsten Mittel gegen das Erbrechen sind und endlich zu S. 698, dass Apomorphin als vorzügliches Expectorans seit längerer Zeit auch beim Hunde angewandt wird.

Diese vereinzeltten Aussetzungen sollen und können jedoch dem Gesamtwerthe der Arbeit in keinerlei Weise erheblichen Abbruch thun. Verf. hat sich dabei von der Ansicht leiten lassen, dass die vorliegende Recension dem Herausgeber lieber sein dürfte, als jene schablonenhaften Referate, die immer des Lobes und schöner Worte voll sind und althergebrachter Weise mit der Versicherung schliessen, dass der Druck des Werkes ein ganz vorzüglicher sei. Möge der Schluss dieses Referates die wiederholte Versicherung sein, dass die thierärztliche Wissenschaft die von dem Herausgeber auf sein eigenes Pensum sowohl, wie auf das ganze Werk verwandte grosse Mühe und Arbeit immer hochschätzen wird.

Fröhner.

Arnold, Dr. C., Pharmakognosie, pharmaceutisch-chemische Präparate und Receptirkunde. Auf Grund der Pharmacopoea Germanica, editio altera, für die Thierheilkunde bearbeitet. Hannover 1886. Verlag von Schmorl und von Seefeld.

Das an Stelle der 3. Auflage der Begemann'schen Veterinär-Pharmacopoe erscheinende Arnold'sche Buch unterscheidet sich von dieser zunächst dadurch, dass die auf Botanik und reine Chemie sich beziehenden Abhandlungen weggeblieben und dass eine grössere Anzahl von Arzneimitteln als entbehrlich und veraltet nicht mehr aufgenommen worden ist, wogegen an ihrer Stelle neuere Arzneimittel eingetreten sind. Ausserdem ist bei jedem einzelnen Körper die nöthige Anleitung zur Prüfung auf seine Reinheit und Echtheit gegeben. Zunächst werden die Drogen des Pflanzenreiches nach ihren pharmakognostischen Merkmalen, ihren Bestandtheilen und der äusseren Anwendung, sodann die des Thierreiches und zuletzt die chemisch-pharmaceutischen Präparate (Wasser und chemisch einfache Stoffe, Säuren, Leicht- und Schwermetall-Verbindungen, Alkohole und Kohlenwasserstoffe, Alkaloide) in derselben Weise besprochen. Hierbei wäre es vom praktischen Standpunkte aus wünschenswerth gewesen, wenn der Verfasser ausserdem noch bei jedem Arzneimittel eine ganz kurze Bemerkung über seine therapeutische Verwendung gegeben hätte, wie dies auch anderweitig beim Vortrage über diesen Gegenstand üblich ist. Weiterhin enthält das Buch eine ausführliche Receptirkunde unter Berücksichtigung der Arzneiformen und zum Schlusse eine Reihe von Tabellen, von welchen die erste ein Verzeichniss der üblichen Arzneidosen „nach Hertwig's Arzneimittellehre und nach neueren Erfahrungen“ enthält. Eine derartige Dosentabelle ist wohl schwieriger aufzustellen, als es der Verfasser ahnen konnte, da die Dosirung der Arzneimittel bei unseren Hausthieren im Allgemeinen noch sehr im Argen liegt. So war es auch nicht zu vermeiden, dass einige unrichtige Zahlen mit untergelaufen sind, z. B. bei der Dosirung des Camphers für Hunde, wo es statt 0,05 — 3,5: 0,5 — 1,5, beim Krotonöl, wo es statt 1 — 30 gutt. für den Hund (30 Tropfen tödten jeden Hund): 1 — 8 Tropfen, beim Strychnin, wo es statt der angegebenen Dosen für das Pferd und Rind, welche unter Umständen tödtlich sein können, heissen muss: Pferd 0,05 — 0,15, Rind 0,05 — 0,2 (0,4 tödten ein mittelgrosses Rind ziemlich sicher). Auf der anderen Seite sind wieder einzelne Mittel zu niedrig dosirt, wie das Opium für Pflanzenfresser, desgleichen die Digitalis u. s. w. Sieht man indess von dieser Tabelle ab, die bei einer neuen Auflage wohl ganz weggelassen werden dürfte, so muss die Arnold'sche Pharmakognosie, um so mehr, als sie die einzige in der Thierheilkunde ist, sehr warm empfohlen werden.

Fröhner.

Schlamp, K. W., Das Dispensirrecht der Thierärzte, nebst den für Thierärzte wissenschaftlichen Abschnitten der Apotheker-Gesetzgebung. Für Studierende der Thiermedizin, Thierärzte, Apotheker und Beamte. Mit einem Vorwort von J. Feser. Wiesbaden 1886. Verlag von J. F. Bergmann.

Auf Anregung von Prof. Feser hat sich der Assistent an der Münchener

Central-Thierarzneischule, K. W. Schlampp, der nicht leichten Aufgabe unterzogen, die Frage des Dispensirrechtes der Thierärzte durch eine Nebeneinanderstellung der in den verschiedenen deutschen und ausserdeutschen Staaten über diesen Gegenstand vorhandenen Gesetze und Bestimmungen zu beleuchten. Im ersten Kapitel werden das Apothekenwesen und der Verkehr mit Arzneimitteln, namentlich die Apothekengesetzgebungen der verschiedenen deutschen Staaten, im 2. die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Verkehrs mit Giften, im 3. die Pharmakopoea Germanica, im 4. das Maass- und Gewichtswesen, im 5. die in den einzelnen Staaten über das Dispensirrecht der Thierärzte bestehenden Anschauungen und Bestimmungen, im 6. endlich die Arxneitaxe besprochen. Der Gegenstand der Schlampp'schen Arbeit ist gewiss ein sehr zeitgemässer und die Darstellung wird in massgebenden Kreisen wohl nicht ohne Wirkung bleiben. Möge diese möglichst bald in Form eines einheitlichen, das freie Dispensirrecht der Thierärzte garantirenden Reichsgesetzes an die Oeffentlichkeit treten — es wäre dies der schönste Lohn für die verdienstvolle Arbeit, die wir jedem Thierarzte bestens empfehlen.

Fröhner.

Anleitung zur Kenntniss und Gesundheitspflege des Pferdes. Von E. Zschokke, Prof. an der Thierarzneischule in Zürich. Verlag von Orell Füssli und Comp. Zürich 1885.

In obigem Verlage ist ein Buch im Taschenformat erschienen, das, obgleich ein Vorwort oder ein Hinweis im Titel fehlt, sofort zeigt, dass es für ein Laienpublikum geschrieben ist. Es sind das Exterieur und die Diätetik des Pferdes kurz abgehandelt, ausserdem finden sich zahlreiche Bemerkungen über Krankheiten des Pferdes und deren Behandlung eingestreut.

Frick.

Der Hufschmied. Zeitschrift für das gesammte Hufbeschlagwesen. Redig. von A. Lungwitz, Bezirksthierarzt a. D., Beschlaglehrer und Vorstand der Beschlagschmiede an der Kgl. Thierarzneischule in Dresden. III. Jahrg.

Die Verbreitung, welche diese Zeitschrift in der kurzen Zeit ihres Bestehens erlangt hat, beweist, dass dieselbe eine Lücke in unserer deutschen Literatur mit Erfolg ausgefüllt hat. Wie die früheren Jahrgänge — bietet auch der uns vorliegende eine Reihe schätzenswerther Arbeiten, welche sich zwar in erster Linie auf den praktischen Hufbeschlag beziehen, aber auch die Hufchirurgie betreffen und somit auch für den Veterinär von Interesse sind. Wir finden in denselben Abhandlungen über die Geschichte des Hufbeschlages, über Neuerungen in der Technik des Beschlages, ferner Mittheilungen über gesetzliche Bestimmungen, welche den Hufbeschlag betreffen, Berichte über die Thätigkeit der Hufbeschlagslehranstalten, sowie Auszüge und Besprechungen der auf dem Gebiete des Hufbeschlages erschienenen literarischen Neuigkeiten. Die Zeitschrift kann daher auch allen Thierärzten warm empfohlen werden, welche Gelegenheit haben, sich mit den einschlägigen Fragen zu beschäftigen.

Möller.

Veterinär- Receptir- und Dispensirkunde. Von G. A. Müller-Flöha. Verlag von Paul Parey. Berlin 1885.

Verf. hat auf Grund der Pharmacopoea Germanica ed. alt. obiges Werkchen im Taschenformat bearbeitet. Der erste, allgemeine Theil behandelt die einzelnen Arzneiformen, deren Zubereitung nebst Rezepten, und die verschiedenen Applikationsmethoden. Im speciellen Theil sind die in der Thierheilkunde gebräuchlichen Medikamente der Pharm. Germ. ed. alt. sowie viele nicht officinelle Mittel in alphabetischer Ordnung aufgezählt und gleichzeitig kurz die Darstellung und die Dosirung angegeben. Als Anhang sind noch Anweisungen für das Selbstdispensiren gegeben. Frick.

Die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen. Rathgeber für Fleischbeschauer in populärer Darstellung. Mit 21 Abbildungen auf 6 lithographischen Tafeln. Von Dr. C. Roller, Kgl. Kreiswundarzt in Trier. II. verm. u. verb. Aufl. Trier St. Stephanns 1886.

Das Büchlein bespricht in klarer, leicht fasslicher Darstellung die Lebensgeschichte der Trichinen und Finnen, das Mikroskop, dessen Reinigung, Aufstellung und Gebrauch, sowie auch die Anfertigung der Präparate. Die am häufigsten vorkommenden Verunreinigungen der letzteren, welche zu Täuschungen führen können, sind fast vollständig aufgeführt. Den letzten Theil des Textes bilden das Circular der Ministerien des Innern und der Landwirthschaft, Anordnungen für eine obligatorische Fleischbeschau betreffend, vom 4. Januar 1875 und die einschlägigen Verfügungen der Kgl. Regierung zu Trier, welche seither erlassen worden sind. Als eine sehr schätzbare Zugabe muss die reichliche Ausstattung mit einfachen, recht instructiven Abbildungen (auf 6 Tafeln) angesehen werden, welche zweifellos geeignet sind, das erstrebte Verständniss bei dem Lernenden in der förderlichsten Weise zu unterstützen. Die Brochüre ist dem Vorwort des Verf. zufolge nur für den Fleischbeschauer bestimmt und dürfte dem Zwecke, denselben mit der nöthigen Kenntniss der Parasiten (Trichine, Finne) und die Untersuchung des Fleisches auf deren Gegenwart zu versehen, in dem vom Verf. gezogenen Rahmen vollkommen entsprechen. Lüpke.

Kleinere Mittheilungen.

Leukämie bei einer Kuh. Vom Kreisthierarzt Preusse in Obornik.

Am 31. Mai d. J. untersuchte ich eine dem Schmiedemeister S. in K. gehörige Kuh, welche sich schon längere Zeit krank gezeigt haben soll. Ich fand dieselbe in ziemlich schlechtem Nährzustande, das Deckhaar glanzlos, gesträubt, die Haut straff und derb, das Benehmen apathisch. Die Augen waren in die Augenhöhlen zurückgezogen; die Fresslust sehr gering, die Hauttemperatur ziemlich gleichmässig vertheilt.

Die sichtbaren Schleimhäute bloss. In der äusseren Decke bemerkte man an verschiedenen Stellen, besonders am Kopf, mehrere frisch vernarbte Wunden, welche nach Aussage des Besitzers von durch ihn selbst geöffneten „Geschwüren“ herrühren sollten. Sämmtliche äusserlich fühlbaren Lymphdrüsen waren mehr oder weniger stark angeschwollen. Die stärkste Anschwellung bis zur Grösse einer Faust zeigten die Bugdrüsen beider Seiten, ferner waren erheblich vergrössert die hinteren Kieferdrüsen, dann die retropharyngealen Lymphdrüsen, die unteren Halsdrüsen, die Kniefaltendrüsen, die Lymphdrüsen über dem Euter. Die sonst so kleinen in den Hungergruben gelegenen Drüsen der oberen Weichengegend (Franck) waren haselnuss- bis wallnussgross. Alle diese Drüsen bildeten festweiche Knoten, die in der Subcutis leicht verschiebbar waren. Der Puls war an der Arterie maxill. ext. nur schwach zu fühlen, Pulsschläge etwa 60 in der Minute. Die Zahl der Athemzüge war nicht vermehrt, das Athmen selbst geschah frei ohne Anstrengung der respiratorischen Muskeln. Die Untersuchung der Brusteingeweide vermittelt Perkussion und Auskultation ergab ausser einem etwas stärkeren vesiculären Athemgeräusch keine Abnormitäten: Herzschlag rhythmisch und äqual. Die Pansenbewegungen waren etwas vergrössert, der Kothabsatz normal. Das Blut habe ich leider nicht untersuchen können.

Aus diesem Befund vermuthete ich, es mit einem Fall von Leukämie zu thun zu haben, ich empfahl daher dem Besitzer die Tödtung des Thieres.

Am 3. Juni wurde die Kuh geschlachtet und am Nachmittag desselben Tages hatte ich Gelegenheit das ausgeschlachtete Thier zu untersuchen. Dasselbe war stark abgemagert. Sämmtliche Lymphdrüsen waren stark angeschwollen, die ausserhalb der Körperhöhlen zwischen den Muskeln gelegenen Drüsen in rundliche oder eirunde, circumscribte Geschwülste umgewandelt, welche mit den an sie grenzenden Organen nur durch lockeres Bindegewebe ver-

bunden waren; sie liessen sich daher auch sehr leicht aus ihrer Umgebung herauschälen.

Auch alle im Innern des Körpers gelegenen Lymphdrüsen waren derartig verändert. Die mesenterialen Drüsen bildeten grosse, wurstförmige Geschwülste; die am Wanst, an der Milz und der Leber gelegenen Lymphdrüsen hatten die Grösse einer Wallnuss bis zu der eines kleinen Apfels. Am stärksten vergrössert waren die inneren und äusseren Darmbeindrüsen, einzelne Knoten erreichten hier die Grösse eines kleinen Kindskopfes. In der Brusthöhle waren es hauptsächlich die vorderen und hinteren Mittelfelldrüsen und die Bronchialdrüsen, welche sich zu faustgrossen Knoten angeschwollen zeigten und ein zusammenhängendes Conglomerat bildeten. Die Drüsen der oberen und unteren Brustwand erreichten die Grösse einer starken Haselnuss; sie waren von rundlicher Form und hatten grösstentheils die später beschriebene schwammige Beschaffenheit. Alle diese Lymphdrüsenknoten waren aussen von einer verhältnissmässig dünnen, bindegewebigen Kapsel eingeschlossen, und sie fühlten sich an, als ob sie äusserst prall mit Flüssigkeit angefüllt wären. Beim Einschneiden in die Kapsel quoll das Parenchym über die Schnittländer hervor. Das Letztere zeigte auf dem Durchschnitt eine weiche Beschaffenheit, es war sehr feucht, stark glänzend und von grauer Farbe; die Durchschnittsfläche war eine ganz gleichförmige. In einzelnen Drüsengeschwülsten war das Parenchym entweder ganz oder theilweise zu einer dicken, fast breiartigen, graugelben, eiterähnlichen Masse eingeschmolzen, welche in einem etwas festeren netzförmigen Gerüst lag. Das Ganze erhielt dadurch etwas Aehnlichkeit mit einem Schwamm. In anderen Geschwülsten wieder befanden sich kleinere und grössere rundliche Herde, die durch einen schmalen, dunkelrothen Streifen von dem übrigen Gewebe scharf abgegrenzt waren. Diese Herde waren auf dem Durchschnitt trocken, von gelber Farbe und brüchig.

In der Schleimhaut des Blind- und Grimmdarmes befanden sich sehr viele hanfkorn- bis erbsengrosse Hämorrhagien; Die Schleimhaut des Magens und Dünndarms war normal.

Die Milz war stark vergrössert, 62 Cm. lang, 17 Cm. breit und 5 Cm. dick, ihre Farbe rothbraun, die Pulpa durch die Kapsel durchscheinend. Auf dem Durchschnitt bemerkte man zahlreiche stecknadelkopf- bis hanfkorn-grosse glasige, grauweisse Knötchen, die vergrösserten Follikel. Die Pulpa war im übrigen sehr weich, beinahe schmierig und graurothbraun gefärbt.

Die Leber war ebenfalls sehr stark vergrössert, bis 12 Cm. dick; Kapsel überall glatt und durchsichtig, vom Parenchym leicht abziehbar; letzteres brüchig, von brauner Farbe. In dasselbe waren äusserst zahlreiche graue, glasige Punkte und verästelte Striche eingestreut, welche dem Durchschnitt ein fein marmorirtes Aussehen verliehen. Diese marmorirte Beschaffenheit machte sich auch schon durch die Leberkapsel hindurch bemerkbar.

Durch diese Zeichnung traten die Acini etwas deutlicher hervor, da die grauen Punkte und Striche im Verlauf des interacinösen Bindegewebes lagen. Die Acini selbst waren in der Mitte heller bis gelblich, am Rande dunkler, braun gefärbt.

Die Nieren zeigten keine pathologischen Abnormitäten. Die Nebennieren

waren in längliche, wurstförmige Geschwülste umgewandelt von der Beschaffenheit, wie sie vorhin an den Lymphdrüsen beschrieben worden ist.

An den Lungen befanden sich ebenfalls keine pathologischen Veränderungen; auch das Herz erschien gesund.

Die Herzkammern waren mit festen, derben Blutgerinnseln angefüllt, welche innen dunkelroth gefärbt und aussen mit einer dünnen hellrothen Schicht umgeben waren.

Die mikroskopische Untersuchung der oben erwähnten Geschwülste an den Lymphgefässen ergab folgenden Befund:

Aussen sind sie von einer derben bindegewebigen Hülle umschlossen, welche fest mit dem Parenchym verbunden ist. Das Letztere besteht aus einem engmaschigen reticulären Bindegewebe mit nur einzelnen wenigen fibrösen Bindegewebsbündeln. Die Maschen des Reticulums sind dicht angefüllt mit kleinen Rundzellen von der Form und Grösse der Lymphzellen. Es sind dies rundliche, zuweilen etwas polyedrische Zellen mit grossem, scharf markirtem, bläschenförmigem Kern und Kernkörperchen und einem verhältnissmässig schmalen, homogenen Protoplasmasaum. Diese Zellen lassen sich nur sehr unvollständig aus dem Reticulum auspinseln. In Zupfpräparaten bemerkt man ausser diesen Rundzellen auch einige der Stützsubstanz angehörige, spindelförmige Bindegewebszellen von gewöhnlicher Grösse. Von den Rundzellen sind eine grössere Anzahl in Verfettung begriffen. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Leber zeigen sich die kleinen, grauen Punkte und Striche, welche diesem Organ das fein marmorirte Aussehen gaben, ebenfalls aus derartigen Rundzellen zusammengesetzt. Sie bilden kleine Geschwülste, welche vollkommen das Aussehen kleiner Lymphdrüsen besitzen. Sie liegen nie innerhalb eines Acinus, sondern immer zwischen je 2 oder 3 derselben. An mit Eosin gefärbten feinen Leberschnitten treten diese Geschwülste als hellere rosaroth Stellen gegenüber dem dunkler roth gefärbten Lebergewebe hervor. Die Rundzellen hatten nur wenig von der Farbe angenommen, trotzdem die Schnitte längere Zeit in dem Farbstoff gelegen haben.

Eine mikroskopische Untersuchung des Blutes habe ich leider wiederum nicht vornehmen können, da das Thier vor meiner Ankunft geschlachtet und das Blut weggeschüttet worden war. Nach Aussage des Besitzers soll dasselbe abnorm hellroth gewesen sein. In den wenigen sehr festen und elastischen Blutgerinnseln, welche ich untersuchen konnte, habe ich einen abnorm hohen Gehalt an weissen Blutkörperchen nicht nachweisen können.

Es ist dieser Befund jedoch kein Beweis von dem Nichtvorhandensein eines solchen Gehaltes, da sich in den Blutgerinnseln die rothen und weissen Blutkörperchen in Folge ihres verschiedenen specifischen Gewichts nicht in demselben Verhältniss mischen wie in dem frischen, flüssigen Blut.

Aus diesem mikroskopischen Befund ergibt sich, dass die an den Lymphdrüsen beschriebenen Geschwülste nichts anderes als die hyperplastischen Lymphdrüsen selbst sind. Die Milz ist zwar ebenfalls stark vergrössert, aber im Verhältniss zu den Lymphdrüsen tritt ihre Vergrösserung in den Hintergrund. Ganz charakteristisch sind die Neubildungen in der Leber, welche derselben dieses

eigenthümliche Aussehen gaben. Auch diese sind nichts anderes als eine heteroplastische Bildung von Lymphdrüsengewebe an Stellen, wo sich sonst keine Lymphdrüsen befinden. Dagegen sind die Nieren, die Lungen und andere Organe, welche auch sonst häufig Sitz leukämischer Veränderungen sind, frei davon. Blutungen kommen bei der Leukämie fast regelmässig vor, und auch im vorliegenden Falle sind zahlreiche Hämorrhagien in der Darmschleimhaut angetroffen worden. Das Blut ist leider nicht genauer auf das Verhältniss der rothen zu den weissen Blutkörperchen geprüft worden, aber aus der Angabe, dass das Blut eine abnorm hellrothe Farbe gehabt hat, lässt sich wohl schliessen, dass die weissen Blutkörperchen gegenüber den rothen in verhältnissmässig grosser Anzahl vorhanden gewesen sind.

Wir haben es also hier mit einem Fall von „lymphatischer Leukämie“ zu thun. Trotzdem diese Krankheit bei unseren Hausthieren, namentlich beim Rind, nicht selten vorkommt, hielt ich es doch für angezeigt, den soeben beschriebenen Fall der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Heilung einer durchschnittenen Achillessehne. Vom Kreisthierarzt Martens in Sangerhausen.

Im April v. J. wurde mir von einem Fuhrherrn aus einem benachbarten Dorfe ein 3jähriger Hengst in Behandlung gegeben, der sich mittelst eines Pflugoisens die Kronenbeinbeuger- und die Achillessehne des rechten Hinterfusses durchschnitten hatte. Die Wunde befand sich circa 4—5 Cm. oberhalb der Fersenbeinspitze, war ca. 9 Cm. breit und klappte mehrere Cm. weit auseinander. Bei der näheren Besichtigung fand sich, dass die Achillessehne und die Sehne des Kronenbeinbeugers völlig durchschnitten waren. Die oberen Enden beider Sehnen hatten sich mehrere cm. weit zurückgezogen, sodass man die unterhalb liegenden Sehnen und das Unterschenkelbein deutlich sehen und fühlen konnte. Das Bein befand sich in völliger Beugstellung, sodass die vordere Wand des Hufes den Boden berührte.

Die Behandlung, welche ich nur versuchsweise einleitete, bestand in folgendem Verfahren. Nachdem die Wunde mit 4 proc. Carbolwasser gereinigt war, wurde dieselbe mit Tannin und Jodoform ausgefüllt und mit einer Gazebinde umwickelt. Auf die Gaze liess ich einen mit 4 proc. Carbolwasser durchtränkten Wergbausch binden und auf den ganzen Verband eine mit Eisstücken gefüllte Blase legen, welche wegen der fast wagerechten Stellung der verletzten Partie recht gut anzubringen war. Bemerken will ich noch, dass ich keine Unterstützungsgurte etc. anwendete.

Nach ca. 3 Wochen hatte sich die Wunde bis auf eine kleine Stelle geschlossen, die erst bei Anwendung von scharfen Reiz- und austrocknenden Mitteln verheilte.

Die vorhandene colossale Anschwellung ist durch Anwendung von Ung. Hyd.

bijod. rubr. allmählich zur Resorption gelangt, sodass man jetzt nur eine kleine Erhöhung von Kinderfaustgrösse wahrnimmt.

Das Pferd wurde bereits 2 Monate nach der Verletzung wieder in Arbeit genommen, ohne bedeutende Ermüdung und Lahmgehen zu zeigen.

Diese Heilung einer vollständig durchschnittenen Achillessehne steht wohl einzig da und ist um so wunderbarer, als die Behandlung von einem gewöhnlichen Fuhrmann in einem kleinen Stalle ausgeführt wurde.

Dieselbe bietet ferner ein eclatantes Beispiel dafür, dass selbst unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen seltene Kuren gelingen, und dass selbst bei als unheilbar erscheinenden Fällen der Versuch zur Wiederherstellung gemacht werden kann.

Personal-Notizen.

Ernennungen und Versetzungen.

Der Professor G. Röckl von der Thierarzneischule zu Stuttgart zum Regierungsrath und zum ordentlichen Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

Der Landesthierarzt Prof. Dr. Siedamgrotzky in Dresden zum Medicinalrath.

Der Lehrer an der Königl. Thierarzneischule zu Berlin Prof. Dr. Fröhner zum ausserordentlichen Mitgliede der technischen Deputation für das Veterinärwesen.

Der Kreisthierarzt J. Busch in Berlin zum Repetitor an der Königl. Thierarzneischule in Berlin.

Der Repetitor an der Königl. Thierarzneischule zu Berlin C. F. Lüpke zum commissarischen Departementsthierarzt für den Reg.-Bez. Trier und zum Kreisthierarzt für den Stadt- und Landkreis Trier.

Der Thierarzt A. Fittkau zu Bischofsstein zum interimistischen Kreisthierarzt des Kreises Roessel, Reg.-Bez. Königsberg, mit dem Amtswohnsitz in Bischofsburg.

Der Thierarzt A. Heinrichs zu Püttlingen zum commissarischen Kreisthierarzt des Kreises Saarbrücken, R.-B. Trier, mit dem Amtswohnsitz in Saarbrücken.

Der Kreisthierarzt C. F. A. Karschaekel zu Graudenz zum Kreisthierarzt des Kreises Tuchel, Reg.-Bez. Marienwerder.

Der Thierarzt L. A. R. Lorenz in Berlin zum interimistischen Kreis-Thierarzt des Kreises Heydekrug, Reg.-Bez. Gumbinnen, mit dem Amtswohnsitz in Heydekrug.

Der Thierarzt B. Rupprecht in Treffurt zum commissarischen Kreis-Thierarzt des Kreises Schweinitz, Reg.-Bez. Merseburg, mit dem Amtswohnsitz in Herzberg.

Der Thierarzt G. Wagner in Königshütte O. S. zum commissarischen Kreis-Thierarzt des Kreises Sensburg, R.-B. Gumbinnen, mit dem Amtswohnsitz in Sensburg.

Der Thierarzt E. Wallmann in Göttingen zum commissarischen Kreis-Thierarzt des Kreises Schleusingen, Reg.-Bez. Erfurt, mit dem Amtswohnsitz in Schleusingen.

Der Ober-Rossarzt a. D. Kirst in Tilsit zum Grenzthierarzt-Assistenten für den Kreis Tilsit.

Der Ober-Rossarzt a. D. Koch in Ragnit zum Grenzthierarzt-Assistenten für den Kreis Ragnit diesseits der Memel.

Der Grenzthierarzt-Assistent C. Wenke in Stallupönen in gleicher Stelle nach Goldap, Reg.-Bez. Gumbinnen, versetzt.

Der Kreisthierarzt Heincke zu Gardelegen hat seinen Wohnsitz nach Oebisfelde, Reg.-Bez. Magdeburg, verlegt.

Definitiv übertragen wurde die bisher commissarisch verwaltete Kreisthierarztstelle:

der Kreise	den Kreisthierärzten
Obornik	Preusse in Obornik.
Barmen (Stadt)	Grasses in Barmen.
Daun	Wulf in Gerolstein.
Saarburg	Oberlaender in Saarburg.
Waldenburg	Wittenbrink in Waldenburg.
Görlitz	Säßler in Görlitz.

Aus dem Staatsdienst sind geschieden:

Der Kreisthierarzt P. B. Piepenbrock in Emsbüren, Reg.-Bz. Osnabrück.

Ordens-Verleihungen.

Dem Kreisthierarzt P. B. Piepenbrock der Kronen-Orden 4. Klasse.

Dem Corps-Rossarzt O. Rust in Strassburg i. E. der Kronen-Orden 4. Kl.

Todesfälle.

Der Thierarzt F. A. Ch. Frede in Wanzleben, Reg.-Bez. Magdeburg.

Der Thierarzt C. L. Gollmer in Quedlinburg, Reg.-Bez. Magdeburg.

Der Kreisthierarzt F. Lausch in Tilsit.

Der Thierarzt E. Nessenius in Strassburg i. W., Reg.-Bez. Marienwerder.

Der Thierarzt C. H. Sanftleben in Ritzebüttel bei Hamburg.

Der Kreisthierarzt C. F. Schirlitz in Torgau, Reg.-Bez. Merseburg.

Der Kreisthierarzt W. J. Sturm in Hettstedt, Mansfelder Gebirgskreis, Reg.-Bez. Merseburg.

Der Thierarzt F. H. D. Trolldenier in Halberstadt, Reg.-Bz. Magdeburg.

Die Niederlassung eines Thierarztes wird gewünscht:

In Berlinchen, Kr. Soldin, von dem Magistrat daselbst.

In Bublitz, Reg.-Bez. Köslin. Der Magistrat daselbst macht darauf aufmerksam, dass die Kreisthierarzt-Stelle seit längerer Zeit unbesetzt ist, dass dem Kreisthierarzt für Beaufsichtigung der Märkte von Seiten der Stadt ein festes Gehalt gezahlt wird, und dass Stadt und Umgegend reichlich Gelegenheit zu einer umfangreichen Praxis bieten.

In Clenze, Kr. Lychow, Reg.-Bez. Lüneburg, von dem landwirthschaftlichen Lokal-Verein daselbst.

In Friesack, Kr. West-Havelland, Auskunft ertheilt der Bürgermeister Luedike daselbst.

In Mittelkirchen bei Stade, Auskunft ertheilt H. Heinrich daselbst.

In Schkeuditz bei Leipzig, Kr. Halle, Auskunft ertheilt H. Müller in Leipzig.

In Schönfliess, Kr. Königsberg N.-M., Auskunft ertheilt der Bürgermeister Melz daselbst. In Schönfliess soll eine landwirthschaftliche Schule eingerichtet werden, an welcher voraussichtlich auch ein Thierarzt Unterricht zu ertheilen hat.

Vacanzen.

(Die mit * bezeichneten Vacanzen sind seit dem Erscheinen von Bd. XII, Heft 3 u. 4 dieses Archivs hinzugetreten oder von Neuem ausgeschrieben.)

Regierungs-Bezirk	Kreisthierarztstellen des Kreises	G e h a l t.	Zuschuss aus Kreis- resp. Com- munalmitteln.
Königsberg	Heilsberg	600 Mark	300 Mark
"	Fischhausen	600 "	300 "
Berlin	IV. Kreisthierarztstelle*	1200 u. 450 M. Wohnungsgeld- Zuschuss.	— "
Frankfurt a. O.	Züllichau-Schwiebus	600 Mark	— "
"	Spremberg* 1)	600 "	— "
Köslin	Bublitz	600 "	— "
Oppeln	Grottkau	600 "	— "
Magdeburg	Halberstadt	600 "	— "
Merseburg	Torgau*	600 "	— "
Schleswig	Herzogth. Lauenburg 2)	600 "	— "
"	Oldenburg 3)	600 "	— "
Osnabrück	Lingen*	600 "	— "
"	Grafschaft Bentheim	600 "	— "
Münster	Kösfeld	600 "	— "
"	Borken*	600 "	300 "
Arnsberg	Arnsberg	600 "	600 "
"	Iserlohn	600 "	300 "
Köln	Bergheim*	600 "	500 "
Düsseldorf	Mettmann	600 "	200 "
Trier	Depart.- und Kreisthier- arztstelle für d. Stadt- und Landkreis Trier*	1500 "	322,98 "
Gumbinnen	Grenzthierarzt-Assist.- Stelle in Stallupönen*	900 "	— "

1) Mit dem Amtswohnsitz in Schwiebus.

2) " " " " Ratzeburg.

3) " " " " Neustadt in Holstein.

Als Verwalter von städtischen Schlachthäusern sollen Thierärzte angestellt werden:

In Eberswalde, Kr. Ober-Barnim, Gehalt 2400 Mark, freie Wohnung, Heizung und Beleuchtung. Nur Thierärzte, welche bereits bei Verwaltung von Schlachthäusern thätig waren, werden aufgefordert, sich beim Magistrate in Eberswalde zu melden.

In Höxter, Reg.-Bez. Minden, Gehalt 900 Mark, freie Wohnung und Heizung. Privat-Praxis gestattet.

Veränderungen im militär-rossärztlichen Personal.

Beförderungen.

Zum Corps-Rossarzt ist ernannt:

Der Ober-Rossarzt Rust vom 2. Hannov. Ul.-Rgmt. No. 14 beim General-Commando des 15. Armee-Corps.

Zu Ober-Rossärzten sind ernannt:

Die Rossärzte: Barnik vom 2. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 17 bei diesem Regiment; Höhnke vom 2. Hess. Hus.-Rgmt. No. 14 bei diesem Regiment.

Zu Rossärzten sind ernannt:

Die Unter-Rossärzte: Barnik vom 2. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 6; Borchardt vom Westfäl. Ul.-Rgmt. No. 5; Dischereit vom 1. Leib-Hus.-Rgmt. No. 1; Doenicke vom 1. Westfäl. Feld-Art.-Rgmt. No. 7; Fichtner vom 2. Schles. Drag.-Rgmt. No. 8; Fränzel vom Schles. Ul.-Rgmt. No. 2; Fuchs vom 2. Hess. Hus.-Rgmt. No. 14; Güntherberg vom 2. Garde-Drag.-Rgmt.; Handschuh vom 2. Badisch. Drag.-Rgmt. No. 21; Iwersen vom Hannov. Hus.-Rgmt. No. 15; Junk vom 1. Westfäl. Hus.-Rgmt. No. 8; Krüger vom Ostpreuss. Feld-Art.-Rgmt. No. 1; Lopitsch vom Magdeb. Drag.-Rgmt. No. 6; Piltz vom 1. Leib-Hus.-Rgmt. No. 1; Straetz vom 3. Bad. Drag.-Rgmt. No. 22 Prinz Carl; Trautwein vom Feld-Art.-Rgmt. No. 31; Volmer vom Westfäl. Kür.-Rgmt. No. 4; Wilde vom 3. Garde-Ul.-Rgmt.

Anstellungen.

Die Unter-Rossärzte: Biermann beim 1. Westfäl. Feld-Art.-Rgmt. No. 7; Schneider beim 2. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Leib-Drag.-Rgmt.) No. 24; Stramitzer beim 1. Schles. Hus.-Rgt. No. 4; Stringe beim 1. Bad. Feld-Art.-Rgmt. No. 14; Thomann beim 1. Grossherzogl. Hess. Drag.-Rgmt. (Garde-Drag.-Rgmt.) No. 23; Walther beim Feld-Art.-Rgmt. No. 15; Werbmbter beim Litthauisch. Ul.-Rgmt. No. 12; Westmattelman beim 1. Westfäl. Hus.-Rgmt. No. 8; Wigge beim 2. Westfäl. Hus.-Rgmt. No. 11; Zwerg beim Brandenburg. Hus.-Rgmt. (Zieten-Hus.) No. 3.

Die einj.-freiwill. Unter-Rossärzte: Maier beim Badisch. Train-Bat. No. 14; Klussmann beim 1. Hannov. Feld-Art.-Rgmt. No. 10; Scharsich beim 1. Brandenb. Feld-Art.-Rgmt. No. 3. (Generalfeldzeugmeister).

Der dreij.-freiw. Unter-Rossarzt Beier beim 1. Brandenb. Feld-Art.-Rgmt. No. 3. (Generalfeldzeugmeister).

Versetzungen.

Die Ober-Rossärzte: Brand vom 2. Brandenburg. Feld-Art.-Rgmt. No. 18 (Generalfeldzeugmeister) als 1. Assistent zur Militär-Lehrschmiede Berlin; Kirsten, Inspicient der Militär-Rossarztschule zum 2. Brandenburg. Feld-Art.-Rgmt. No. 18 (Generalfeldzeugmeister); Plaettner, 1. Assistent der Militär-Lehrschmiede Berlin als Inspicient zur Militär-Rossarztschule.

Die Rossärzte: Barnik vom Litthauisch. Ul.-Rgmt. No. 12 zum 2. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 17; Christiani von der Militär-Lehrschmiede in Königsberg zum Grossherzogl. Hess. Feld-Art.-Rgmt. No. 25 (Grossherzogl. Art.-Corps); Duvinage vom 1. Garde-Drag.-Rgmt. zum Litthauisch. Ul.-Rgmt. No. 12; Herbst von der Militär-Lehrschmiede in Hannover zum Hannov. Train-Bataill. No. 10; Hose vom Litthauisch. Ul.-Rgmt. No. 12 zur Militär-Lehrschmiede in Königsberg; Höhnke vom Grossherzogl. Hess. Feld-Art.-Rgmt. No. 25 (Grossherzogl. Art.-Corps) zum 2. Hess. Hus.-Rgmt. No. 14; König vom Thüring. Hus.-Rgmt. No. 12 zur Militär-Lehrschmiede in Berlin; Naumann vom Feld-Art.-Rgmt. No. 15 zum 2. Westfäl. Feld-Art.-Rgmt. No. 22; Straehler vom 1. Badisch. Feld-Art.-Rgmt. No. 14 zum 2. Hess. Hus.-Rgmt. No. 14.

Die Unter-Rossärzte: Büchner vom Garde-Kür.-Rgmt. zum Ostpreuss. Drag.-Rgmt. No. 10; Littmann vom 2. Garde-Ul.-Rgmt. zur Militär-Lehrschmiede in Hannover; Zilm vom Kür.-Rgmt. Königin (Pomm.) No. 2 zum 2. Schles. Hus.-Rgmt. No. 6.

Abgegangen.

Die Ober-Rossärzte: Buhl vom 2. Hess. Hus.-Rgmt. No. 14; Voigt vom 2. Pomm. Feld-Art.-Rgmt. No. 17.

Die Rossärzte: Arndt vom 2. Westfäl. Feld-Art.-Rgmt. No. 22; Erdtmann vom 1. Brandenburg. Feld-Art.-Reg. No. 3 (Generalfeldzeugmeister); Gressel vom Hannov. Train-Bat. No. 10; Schultze von der Militär-Lehrschmiede Berlin; Schurig vom 2. Hess. Hus.-Rgmt. No. 14.

Die charakterisirten Rossärzte; Boehnig vom 1. Hannov. Drag.-Rgmt. No. 9; Luedtke vom Ostpreuss. Drag.-Rgmt. No. 10; Sicker vom 2. Schles. Hus.-Rgmt. No. 6.

Die einj.-freiw. Unter-Rossärzte: Allemeyer vom Ostpreuss. Train-Bat. No. 1; Fredrich vom Niederschles. Train-Bat. No. 5; Heinrich vom Brandenburg. Train-Bat. No. 3.

Commandos.

Ober-Rossarzt Krüger vom Brandenburg. Kür.-Rgmt. (Kaiser Nic. I. von Russland) No. 6 vom 1. October 1886 ab auf 6 Monate als Inspicient zur Militär-Rossarztschule.

Unter-Rossarzt Hagemann vom 2. Badisch. Drag.-Rgmt. No. 21 vom 1. October 1886 ab als Assistent des Professors Dr. Zuntz an der landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin behufs Anstellung von Versuchen über den Stoffwechsel bei Pferden.

Sonstige Veränderungen.

Dem dreij.-freiw. Unter-Rossarzt Storch vom Magdeburg. Feld-Art.-Rgmt. No. 4 nach Ableistung seiner gesetzlichen Dienstpflicht vom 1. October 1886 ab die Erlaubniss zum ferneren Verbleiben im Dienst ertheilt, derselbe ist in die Categorie der Unter-Rossärzte übergeführt.

Literatur.

- Annual Report of the Agricultural Department of the Privy Council Office, for the year 1885. London 1886. Printed by Eyre and Spottiswood.
- Arnold, Dr. C., Pharmacognosie, pharmaceutisch-chemische Präparate und Receptirkunde auf Grund der Pharmacopoea germanica editio altera. Hannover 1886, Schmorl u. v. Seefeld. M. 6.
- Baranski, Prof. Dr. A., Geschichte der Thierzucht und Thiermedizin im Alterthum. Wien 1886, Braumüller. M. 5.
- Bericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen für das Jahr 1885. Herausgegeben von der Königlichen Commission für das Veterinärwesen. 30. Jahrgang. Dresden 1886, G. Schoenfeld. M. 3,50.
- Beyer, Geh.-Rath, Viehseuchen-Gesetze. Textausgabe mit Anmerkungen. 2. Aufl. Berlin 1886, P. Parey. M. 5.
- Birch-Hirschfeld, Dr. F. V., Lehrbuch der pathologischen Anatomie. I. Bd. Allgemeine pathologische Anatomie. Mit veterinär-pathologischen Beiträgen von Dr. A. John e, und einem Anhang: Die pathologisch-histologischen und bacteriologischen Untersuchungsmethoden mit einer Darstellung der wichtigsten Bacterien von Dr. K. Huber und A. Becker. III. völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig 1886, F. C. W. Vogel. M. 10.
- Bouley, Traşbot, Sanson, Nocard, Nouveau Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, Tome 13. Paris 1885.
- Brand, P., Ober-Rossarzt, Selbstunterricht in der Pferdekenntniss. 2. Aufl. Mit 52 Holzschn. im Text. Frankfurt a. O. 1885, B. Waldmann. M. 2.
- Bulletin du comité consultatif pour les affaires relatives aux épizooties en Belgique, Tome II. Bruxelles 1884/85.
- Burke, J. and R. W. Burke, Textbook of veterinary surgical pathology and practical medicine. With numerous illustrations. Vol. I. London apply to the authors.
- Charon, P. F., Étude sur le cornage chronique. Paris 1886, Asselin. Fr. 3.
- Dammann, Prof. Dr. C., Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Haus-thiere. Zweite Hälfte. Mit 20 Farbentafeln und 136 Abbildungen im Text. Berlin 1886, P. Parey. M. 11.
- Dammann, Prof. Dr. C., Jahresbericht der Kgl. Thierarzneischule zu Hannover. 18. Bericht (1885/86). Hannover 1886, Schmorl u. v. Seefeld. M. 4.
- Dejean, O., Traité théorique et pratique des actions rédhibitoires, 4. édition. Paris 1886, Asselin. Fr. 4.
- Ellenberger, Prof. Dr., und Schütz, Prof. Dr., Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedizin. 5. Jahrgang. (Jahr 1885). Berlin 1886, A. Hirschwald. M. 5,60.

- Fleming, G. A., Text-book of operative veterinary Surgery. Part. I. With numerous illustrations. London 1886, Baillière, Tindal and Co. sh. 10 $\frac{1}{2}$.
- Frank, A., Distr.-Thierarzt, Der Glan-Donnersberger Viehschlag in seiner Heimath. Kaiserslautern, 1886, E. Crusius. M. 0,50.
- Friedrich, L., Zur Aetiologie des Milzbrandes. Aus dem pathologischen Institut zu München. Inaug.-Dissert. Mit 1 Taf. Leipzig 1885.
- Göring, Ph., Landes-Thierarzt, Die Veterinär-Polizeiverwaltung nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen. München u. Leipzig 1886, G. Hirth. M. 3.
- Haase, W., Corps-Rossarzt, Zur Gesundheitspflege des Pferdes. Berlin 1886. Selbstverlag. M. 3,50.
- Hess, Prof. F., Bericht über die entschädigten Rausch- und Milzbrandfälle im Kanton Bern 1884 u. 1885. Bern 1886, Comm.-Verl. von Jest u. Reinert. M. 1,80.
- Hoffa, Dr. A., Die Natur des Milzbrandgiftes. Wiesbaden 1886, J. F. Bergmann. M. 1,60.
- Jahresbericht (zehnter) der Kgl. technischen Deputation für das Veterinärwesen über die Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in Preussen (1885/86). Berlin 1886, A. Hirschwald. M. 1,20.
- Kaufmann, M. M., Précis de therapeutique vétérinaire avec données scientifiques speciales sur les effets des alcaloïdes. Paris 1886, Asselin. Fr. 6.
- Kitt, Th., Werth und Unwerth der Schutzimpfungen gegen Thierseuchen. Mit 14 Text-Abbildungen. Berlin 1886, P. Parey. M. 6.
- Küchenmeister, Dr. F. Die Finnen des Bothrioccephalus und ihre Uebertragung auf den Menschen. Leipzig 1886, A. Abel. M. 1.
- Leisering, Prof. Dr. A. G. T., Der Fuss des Pferdes mit Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und Hufbeschlag. 6. Auflage, in ihrem zweiten. den Hufbeschlag betreffenden Theil umgearbeitet von L. Lungwitz. Mit 211 Holzschnitten. Dresden 1886, G. Schönfeld. M. 6.
- Liedmann, C., Zur Diagnose der Tuberculose des Rindes. Inaug.-Dissert. Dorpat 1885, Lackmann.
- List, A., Untersuchungen über die in und auf dem Körper des gesunden Schafes vorkommenden niederen Pilze. Inaug.-Diss. Leipzig 1885, List u. Franke. M. 6.
- Lungwitz, A., Wandtafeln zur Beurtheilung der natürlichen Pferdestellungen. Dresden 1886, G. Schönfeld. M. 30.
- Motlach, R., Geschichte und Zucht der Kladruber Race. Mit 2 heliographisch. Bildern. Wien 1886, J. Beck. M. 2,70.
- Münster, Graf zu, Anleitung zur rationellen Hauspferdezucht. Gekrönte Preisschrift. Darmstadt 1886, in Commission bei J. Waitz. M. 0,60.
- Nörner, Dr. C., Die Brandzeichen der Staats- und Hofgestüte Oesterreich-Ungarns. Leipzig 1885, H. Voigt. Kr. 60.
- Nosotti, Dr. J., Carni freschi, carni salate e in altro modo preparate e conservate e grassi animali. Con 76 figure intercalate. Milano 1886, Dumolard. Fr. 3,50.
- Peters, J., Der schwarze Staar des Pferdes. Mit 1 Tafel. Berlin 1886, A. Hirschwald. M. 2,40.
- Raillet, Prof. A., Eléments de zoologie médicale et agricole. 1 fascicule avec 586 figures dans le texte. Paris 1886, Asselin. Fr. 15.
- Roell, Hofrath Dr. M., Veterinärbericht für das Jahr 1884. Wien 1886, Hölder. M. 3,20.
- Roller, Dr. C., Die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen. Mit 21 Abbildungen auf 10 lithogr. Tafeln. 2. Auflage. Trier 1886, H. Stephanus. M. 1,20.
- Schlapp, W., Das Dispensirrecht der Thierärzte. Wiesbaden 1886, J. F. Bergmann. M. 2,70.
- Steglich, Dr. B., Schematische Darstellung des Zahnwechsels beim Pferde zur Altersbestimmung aus dem Gebiss. Leipzig 1885, A. Voigt. M. 1.
- Veterinär-Ordnung nebst Anhang. Berlin 1886, Mittler u. Sohn. M. 2.
- Vogel, Prof. Dr. E., Specielle Arzneimittellehre für Thierärzte. 3. Auflage in 8 Lfg. Stuttgart 1886, P. Neff. Lfg. 1—5. à M. 1,50.

- Vorträge für Thierärzte. Serie VIII. Heft 1—4. Leipzig 1885/86, H. Dürselen. Pro Serie (12 Hefte) M. 12.
- Wehenkel, Prof. J. M., Résumé de l'état sanitaire des animaux domestiques pendant l'année 1884. Bruxelles 1885.
- Witowsky, Dr. A., Systematische chronologische Sammlung der österreichischen Sanitätsgesetze und Verordnungen. Prag 1885, Domenicus. 10 Hefte à 90 Kr.
- Witt, N. H., Die englischen Fleischschafracen und ihre Verwendung in Deutschland. Mit 10 Holzsehn. u. 4 lithogr. Tafeln. Leipzig 1886, H. Voigt. M. 5.
- Wolff, Prof. Dr. E., Grundlage für die rationelle Fütterung des Pferdes. Berlin 1886, P. Parey. M. 5.
- Ausserdem Fortsetzungen von den in Lieferungen erscheinenden Werken: Dieckerhoff, Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, Friedberger und Fröhner, Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, Leisering, Atlas der Anatomie des Pferdes und der übrigen Hausthiere.
-

Erklärung.

Der Verein der Thierärzte im Regierungs-Bezirk Köslin und der Verein der beamteten Thierärzte des Regierungs-Bezirk Magdeburg haben beschlossen, im Archiv für wissenschaftliche und practische Thierheilkunde die nachfolgenden Erklärungen und die Namen der Gönner des thierärztlichen Standes, der thierärztlichen Vereine und der Thierärzte zu veröffentlichen, welche ihre Zustimmung zu der einen oder der anderen dieser beiden Erklärungen kundgegeben haben.

1) Angesichts der Thatsache, dass in der letzten Zeit hochachtbare und verdienstvolle Männer der Wissenschaft von einem Theile der Fachpresse in einer Weise geschmäht und angegriffen worden sind, welche stets empören muss und nur geeignet ist, den Stand in der Achtung anderer Stände herabzusetzen und die Standesinteressen zu schädigen, hat der thierärztliche Verein des Regierungs-Bezirks Köslin in der Sitzung vom 23. Mai cr. den nachstehenden Antrag seines Vorstandes einstimmig zum Beschluss erhoben:

„Der thierärztliche Verein im Regierungs-Bezirk Köslin erklärt, dass er die pietätlose und unnoble, um Wissenschaft und Stand hochverdiente Männer verunglimpfende Leistung einer gewissen Fachpresse missbilligt und verurtheilt, und er ist der zuversichtlichen Ueberzeugung, dass dies der Ausdruck der Gesinnung des Standes ist.

Die Versammlung beauftragt den Vorstand, dieses zur Kenntniss der Betheiligten zu bringen und an geeigneter Stelle zu veröffentlichen.“
Köslin, im Mai 1886.

Der Vorstand des thierärztlichen Vereins im Regierungs-Bezirk Köslin.

I. A.

C. Gips ¹⁾, Departements-Thierarzt.

¹⁾ Der Unterzeichnete kann es sich nicht versagen, den nachstehenden Brief, welcher ihm Ende Juli d. J. durch die Post übermittelt wurde, den Lesern dieser Zeitschrift zur eigenen Beurtheilung vorzulegen:

Euer Wohlgeboren!

Wir erlauben uns, Ihnen in der Anlage den Betrag von 2 Mark in Briefmarken zu überreichen, da Sie die Zeitschrift für Fleischbeschau und Fleischproduction im nächsten Quartal nicht weiter beziehen können.

Achtungsvoll

Die Expedition der Zeitschrift für Fleischbeschau u. Fleischproduction.

2) Der Verein der beamteten Thierärzte des Regierungs-Bezirks Magdeburg, welcher bei eigener Bethätigung um die Förderung der thierärztlichen Standes-Interessen auch alle von anderer Seite und namentlich in der letzten Zeit schärfer hervorgetretenen Bestrebungen um die Hebung des Standes und der Wissenschaft mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, ist zu der betrübenden Wahrnehmung gelangt, dass von einem Theile der deutschen Fachpresse die reformatorischen Kundgebungen in einer Form an die Oeffentlichkeit getragen worden sind und noch getragen werden, welche nach der Auffassung der unterzeichneten Vereins-Mitglieder die Grenzen der Sitte und des Anstandes unbedingt überschreitet.

Der Verein ist der Ueberzeugung, dass Vorschläge zur Besserung technischer Missstände nur dann nützlich und von Erfolg sein können, wenn die Kritik sich streng in den Grenzen objectiver und sachlicher Erörterung bewegt, und wenn aus derselben jeder gehässige Angriff auf Personen absolut fern bleibt. In der bezeichneten Fachpresse bewegen sich dagegen die reformatorischen Forderungen lediglich in unqualificirbaren Angriffen auf hochverdiente und hochgeachtete Fachmänner, welche öffentlich sogar der Rückhaltung verbessernder Einrichtungen aus egoistischen Motiven angeklagt werden. Ein solches Verfahren missbilligen die unterzeichneten Mitglieder des Vereins auf das Entschiedenste und erklären, dass sie mit demselben in keiner Weise harmoniren.

Das schmälliche Verhalten der gedachten Fachpresse hat bereits im Hause der Abgeordneten durch den Herrn Ressort-Minister und den Herrn Abgeordneten Dr. Virchow die gebührende Beleuchtung und Abfertigung erfahren. Dem Vernehmen nach ist ferner von anderer hoher Stelle der Entrüstung über das fortgesetzte Gebahren dieser Presse sowie darüber Ausdruck gegeben worden, dass ein Vertreter derselben aus Anerkennung seiner verwerflichen Leistungen zum Ehrenmitgliede eines thierärztlichen Vereins berufen worden sei.

Der unterzeichnete Verein bringt auf Beschluss seiner unterzeichneten Mitglieder die vorstehende Erörterung als Ausdruck seiner Auffassung hierdurch zur öffentlichen Kenntniss der Fachgenossen und fühlt sich demnach zu der Erklärung gedrungen,

dass er die Art und Weise der gedachten Fachpresse, bei den Kundgebungen ihrer reformatorischen Bestrebungen sich lediglich in persönlichen gehässigen Anfeindungen zu ergehen, durchaus missbilligt,

dass er gegen die Aeusserung dieser Presse, ihre Kundgebungen seien im Sinne der Mehrzahl der preussischen Thierärzte gehalten, bündig protestirt, und

dass er die geschmähten und Jedermann bekannten Männer als hochachtbare und hochverdienstvolle Träger der Wissenschaft und des Standes ganz besonders werthschätzt und sie vor der angethanen Verunglimpfung hierdurch ausdrücklich in Schutz nimmt.

Wernigerode, den 27. Juni 1886.

Der Verein der beamteten Thierärzte des Regierungs-Bezirks Magdeburg,

gez. Steffen, Vorsitzender.

Berndt. Eggeling. Fromme. Heincke. Immelmann. Lange.
Leistikow. Pauli. Sickert. Alb. Ziegenbein. Aug. Ziegenbein.

Die unterzeichneten Thierärzte Preussens treten den obigen Erklärungen

des Vereins etc. aus voller Ueberzeugung und im ganzen Umfange bei und bitten alle Vereine und Fachgenossen Aeusserungen in gleich gehaltenem Sinne zum öffentlichen Ausdruck und demnach zur weitesten Verbreitung bringen zu wollen.

Diesen Erklärungen sind — vielfach unter Uebersendung zustimmender Schreiben — die nachstehend genannten Gönner, thierärztlichen Vereine und Standesgenossen beigetreten:

Geheimer Medicinal-Rath Professor Dr. Virchow, Medicinal-Rath Professor Dr. Dammann, Prof. Dr. Froehner.

Der Verein Hamburg-Altonaer Thierärzte.

Der Verein Schleswig-Holsteiner Thierärzte.

Die beamteten Thierärzte: Dr. Anacker-Düsseldorf, Arndt-Bolkenhayn, Arndt-Morbach, Barth-Breslau, Bass-Steinau a. O., Bauer-Schmal-kalden, Bormann-Schwetz, Brause - Pr. Eylau, Brietzmann-Belgard, Borchardt-Schlawe, Buehrmann-Halle i. W., Cajoery-Sagan, Coester-Wiesbaden, Collmann-Hanau, Diefenbach-Dietz, Doehrmann-Goslar, Eberhardt-Fulda, Eckeberg-Schubye, Einicke-Wreschen, Enke-Halle a. S., Ernst-Hildesheim, Faller-Simmern, Flindt-Wiedenbrück, Friebel-Insterburg, Gabbey-Pless, Giese-Neu-Stettin, Grebin-Rummelsburg, Guettler-Niesky, Guettlich-Namslau, Hanzo-Zell, Haunschild-Breslau, Helbig-Grünberg, Hertel-Danzig, Heseler-Tondern, Heyne-Bromberg, Hinrichsen-Husum, Hocke-Frankenstein, Holst-Kosten, Hoppe-Stolp, Hupe-Ihrhove, Jacobsen-Itzehoe, Jaenel-Rotenburg, John-Haynau, Karschaekel-Tuchel, Kettler-Emden, Kiefer-Czarnikau, Klebba-Rastenburg, Kleinpaul-Johannisburg, Klingmüller-Strehlen, Klingner-Kempen, Klooss-Eisleben, Koecher-Langensalza, Koellisch-Hamburg, Koepke-Mühlberg a. E., Krueger-Templin, Krüger-Schievelbein, Kuehn-Zeitz, Kunert-Dramburg, Laucha-Bitterfeld, Lehmann-Nordhausen, Lehnhardt-Wiehe, Lewin-Marggrabowo, Liebener-Delitzsch, Luchhau-Goldap, Lütkemüller-Rybnik, Luepke-Trier, Mann-Landsberg, Matthias-Greifenberg, Martens-Sangerhausen, Mehrdorf-Beuthen O.-Schl., Melzbach-Wollstein, Meyer-Sulingen, Meyerheine-Anclam, Michael-Querfurt, Nagel-Himmelforten, Nitschke-Lychow, Nouvel-Marienburg, Oemler-Merseburg, Oldendorf-Elbing, Pirl-Wittenberg, Preusse-Obornik, Prümers-Koblenz, Pusch-Küstrin, Rathke-Pyritz, Reichel-Neidenburg, Dr. Richter-Königsberg i. P., Riechelmann-Harburg, Riedel-Neisse, Dr. Ringk-Kolberg, Ringk-Glogau, Rothamel-Gelnhausen, Schaefer-Meisenheim, Scharmer-Wetzlar, Schlüter-Kiel, Schmidt-Pr. Holland, Scholz-Gr. Strehlitz, Schramm-Poln. Wartenberg, Schubert-Meseritz, Schwanefeld-Kulm, Seiffert-Trebnitz, Spengler-Neurode, Stender-Herford, Strerath-Doveren, Toepper-Labes, Ulrich-Lauenburg, Vollers-Hamburg, Vollers-Altona, Voss-Aurich, Wedekind-Altona, Wellendorf-Pr. Stargard, Werner-Eydtkuhnen, Wiegel-Kreuznach, Winkler-Marienwerder, Winter-Rees, Wittenbrink-Waldenburg, Wolff-Dessau.

Die praktischen bzw. städtischen Thierärzte: Andrich-Berlin, Baechstedt-Saarbrücken, Beetz-Bütow, Bellin-Militsch, Duncker-Berlin, Franzelius-Magdeburg, Goeroldt-Hamersleben, Hahn-Köslin, Hamann-Belgard,

Hein-Berlin, Dr. Hertwig-Berlin, Jacob-Polzin, Klemm-Stralsund, Ober-Rossarzt a. D., Kohlmann-Hanau, Koehler-Rügenwalde, Kryzan-Neustadt b. P., Luchhau-Berlin, Ober-Rossarzt a. D., Mitschke-Köslin, Müller-Berlin, Niebuhr-Ahrweiler, Ober-Rossarzt a. D., Niebel-Halberstadt, von Paris-Tilsit, Potel-Berlin, Prevor-Berlin, Reissmann-Berlin, Rumbaum-Kolberg, Schrader-Bärwalde i. P., Schrader-Rohrshelm, Tieck-Bärwalde i. P., Wegener-Marienburg, Zeisler-Körlin, Ziegenbein-Oschersleben, Kreis-Thierarzt a. D.

Die Militär-Thierärzte: Dr. Born-Berlin, Dominik-Berlin, Ehlert-Stolp, Gabbey-Ohlau, Giesecke-Demmin, Goehring-Rendsburg, Gross-Posen, Guette-Magdeburg, Haase-Wolken, Hahn-Diedenhofen, Hanke-Frankfurt a. O., Hoepfner-Perleberg, Hose-Schlawe, Huch-Breslau, Kramer-Magdeburg, Naumann-Berlin, Qualitz-Salzwedel, Scharfenberg-Düsseldorf, Schmidt-Elbing, Schortmann-Erfurt, Schwarznecker-Berlin, Strauch-Merseburg, Spuhrmann-Bockenheim, Tiesler-Posen, Uhde-Guhrau, Weidefeld-Stolp, Wenzel-Kassel, Wittig-Düsseldorf, Wulff-Perleberg, Wulff-Altona, Dr. Zorn-Königsberg.

Zehnter Jahresbericht

der

Königl. technischen Deputation für das Veterinärwesen

über die

Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten in Preussen.

Berichtsjahr vom 1. April 1885 bis 31. März 1886.

Archiv für wissenschaftliche und praktische Thierheilkunde. XII. Band. Supplement.

Berlin 1886.

Verlag von August Hirschwald.

NW. Unter den Linden 68.

Nicht eingegangen sind Tabellen zur Viehseuchenstatistik bezw. Vacat-
anzeigen: für alle 4 Quartale aus dem Kreise Hoyerswerda, Reg.-Bez.
Liegnitz, für 2 Quartale aus den Kreisen Heilsberg, Reg.-Bez. Königs-
berg, Bersenbrück, Reg.-Bez. Osnabrück, Arnberg, Reg.-Bez. Arnberg,
für 1 Quartal aus den Kreisen Heiligenbeil, Reg.-Bez. Königsberg,
Goldap, Johannsburg, Reg.-Bez. Gumbinnen, Obornik, Reg.-Bez. Posen,
Bromberg, Schubin, Reg.-Bez. Bromberg, Militsch, Reg.-Bez. Breslau,
Iserlohn, Reg.-Bez. Arnberg, und Hofgeismar, Reg.-Bez. Kassel. Die
Kreisthierarztstellen waren während der betreffenden Quartale nicht
besetzt.

Die Zusammenstellung des vorliegenden Jahresberichtes schliesst
sich genau der unserer früheren Berichte an. Die Bezeichnungen
1., 2., 3., 4. Quartal beziehen sich stets auf das Berichts-
und nicht auf das Kalenderjahr.

1. Der Milzbrand.

Die Vergleichung am Fusse der Tabelle S. 2 und 3 zeigt, dass
die Zahl der verseuchten Ortschaften und Gehöfte bezw. der an Milz-
brand gefallenen Thiere etwas geringer ist, als im vorhergegangenen
Berichtsjahre; dieselbe vertheilt sich jedoch auf eine grössere An-
zahl von Kreisen. Wie in allen früheren Jahren entfallen die
bedeutendsten Verluste und die zahlreichsten Ausbrüche auf das
2. Quartal.

In den nachfolgenden Zusammenstellungen über das Auftreten
des Milzbrandes in den einzelnen Regierungsbezirken haben wir die-
jenigen Kreise, in denen während des vorigen Berichtsjahres
keine Fälle von Milzbrand bei den verschiedenen Thieren
beobachtet worden sind, mit * bezeichnet. Ganz frei von
Milzbrand blieben die Reg.-Bez. Stralsund und Aurich, ausserdem
die Stadt Berlin.

2 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal						Im zweiten Quartal						Im drit				
		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	gefallen			Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	gefallen			Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.		
					Pferde.	St. Rindvieh.	Schafe.				Schweine.	Pferde.	St. Rindvieh.				Schafe.	Schweine.
1.	Ostpreussen	8	9	9	2	9	2	—	7	7	7	—	9	4	—	3	3	3
2.	Westpreussen ...	6	7	7	—	11	—	—	5	8	11	—	14	—	—	1	1	1
3.	Brandenburg ...	7	9	9	—	11	41	—	14	26	27	4	56	6	—	5	7	9
4.	Pommern	5	7	7	—	13	—	—	6	8	9	—	10	285	3	4	6	6
5.	Posen	16	24	24	7	43	7	—	13	28	29	1	55	204	—	10	17	17
6.	Schlesien	23	43	43	2	40	3	2	24	44	48	—	63	5	2	18	31	31
7.	Sachsen	9	13	17	1	17	1	—	15	21	22	—	39	35	—	11	19	21
8.	Schlesw.-Holstein	8	16	18	—	23	—	—	9	23	23	—	30	—	—	6	12	12
9.	Hannover	9	10	10	—	13	—	13	8	8	8	—	9	—	—	5	6	6
10.	Westfalen	7	12	13	—	15	—	—	9	14	15	—	21	—	—	7	15	21
11.	Hessen-Nassau ..	5	5	5	—	6	—	—	8	13	15	—	17	—	—	4	4	4
12.	Rheinprovinz....	12	15	15	—	20	—	—	15	19	23	1	52	—	—	23	36	47
13.	Hohenzollernsche Lande	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	116	171	178	12	222	54	15	133	219	237	6	375	539	5	97	157	178
	Im Berichts- jahre 1884/85	102	177	187	11	225	169	—	119	214	242	19	414	509	4	97	157	169
	Im Berichts- jahre 1885/86 mehr	14	—	—	1	—	—	15	14	5	—	—	—	30	1	—	—	9
	weniger	—	6	9	—	3	115	—	—	—	5	13	39	—	—	—	—	—

ten Quartal				Im vierten Quartal									Im Berichtsjahre						Regierungsbezirke, in denen der Milzbrand nicht aufgetreten ist, nebst Angabe der seuchefrei gebliebenen Quartale.
gefallen				Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	gefallen			Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	gefallen						
Pferde.	St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.				Pferde.	St. Rindvieh.	Schafe.				Schweine.	Pferde.	St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.		
1	5	—	—	4	5	5	—	5	—	—	14	22	22	3	28	6	—	Danzig 3. Qu. Berlin 1.—4. Qu. Köslin 4. Qu. Stralsund 1.—4. Qu.	
—	1	—	—	4	8	8	1	10	18	—	7	21	25	1	36	18	—		
—	24	23	—	6	8	8	1	11	—	—	17	44	51	5	102	70	—		
—	10	17	—	2	2	2	—	4	—	—	7	20	22	—	37	302	3		
1	51	3	—	11	20	20	4	24	60	—	20	80	83	13	173	274	—	Hannover 1. Qu. Stade 3. Qu. Osnabrück 2. Qu. Aurich 1.—4. Qu.	
—	33	—	—	14	21	21	—	20	—	—	44	130	140	2	156	8	4		
—	29	3	—	13	19	21	1	35	1	—	21	58	76	2	120	40	—		
—	15	—	—	5	8	9	—	13	—	—	14	52	62	—	81	—	—		
—	6	—	—	9	10	11	3	15	—	2	24	33	33	3	43	—	15	Trier 1. Qu. Sigmaringen 2.—4. Q.	
—	31	—	1	6	8	8	4	8	—	—	16	43	56	4	75	—	1		
—	6	—	—	4	4	4	4	3	—	—	14	25	28	4	32	—	—		
1	57	—	—	14	20	24	1	30	—	—	35	73	106	3	159	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—		
3	268	46	1	92	133	141	19	178	79	2	234	602	705	40	1043	718	23		
9	276	157	6	102	156	161	8	212	26	2	224	631	738	47	1127	861	12		
—	—	—	—	—	—	—	11	—	53	—	10	—	—	—	—	—	11		
6	8	111	5	10	23	20	—	34	—	—	—	29	33	7	84	143	—		

Das statistische Material erwähnt, dass ein in Schön-Nuhr, Kr. Wehlau, an Milzbrand erkranktes Pferd nach 11stündlicher Krankheit genesen sei. Die 40 an Milzbrand gefallenen Pferde vertheilen sich auf die nachstehend genannten Bestände; in den mit ** bezeichneten Ausbrüchen herrschte der Milzbrand gleichzeitig unter dem Rindvieh desselben Gehöftes:

Lauf. No.	Ort.	Kreis.	Regierungsbezirk.	Zahl der im Gehöft an Milzbrand gefall. Pferde.
1.	Eichthal	Ortelsburg	Königsberg	1
2.	Brakupönen	Gumbinnen*	Gumbinnen	1
3.	Dwarischken	Pilkallen	-	1**
4.	Brczczka	Thorn	Marienwerder	1**
5.	Karolinenhof	Ost-Havelland	Potsdam	2**
6.	Kienburg	-	-	2**
7.	Stollen	West-Havelland	-	1
8.	Raszczyń	Adelnau	Posen	1
9.	Godcziszewo	Bomst	-	7
10.	Roznowo	Obornik	-	1
11.	Krzeszkowice	Schroda	-	1
12.	Popowo	Gnesen	Bromberg	3
13.	Dtsch. Rasselwitz	Neustadt	Oppeln	1
14.	Biskupice	Zabrze	-	1
15.	Parey	Jerichow II	Magdeburg	1**
16.	Arebben	Mansfeld, Gebkr.*	Merseburg	1
17.	Liebenberg	Goslar	Hildesheim	1
18.	Zeinsen	Springe	Hannover	1
19.	Scheventorf	Iburg*	Osnabrück	1**
20.	Lüdinghausen	Lüdinghausen	Münster	4
21.	Borstel	Rinteln*	Kassel	4
22.	Dudendorf	Wetzlar	Koblenz	1
23.	Brienen	Kleve*	Düsseldorf	1
24.	Delling	Wipperfürth	Köln	1**
Summa				40

Das in Eichthal gefallene Pferd gehörte einem Besitzer, in dessen Schafherde seit Anfang des Jahres 1885 vereinzelte Milzbrandfälle vorgekommen sind. In Karolinenhof ist bisher noch kein Milzbrandfall beobachtet worden, das zuerst erkrankte Pferd war in dem 4 km entfernten Kienburg gewesen, während die Seuche in dem dortigen Rindviehbestande herrschte. Unter den Viehbeständen von Godcziszewo kommen öfter Milzbrandfälle vor, „das Grundwasser steht sehr hoch, das Brunnenwasser ist sehr trübe und hat einen ekel-erregenden Geschmack“. Verfütterung von Heu einer überschwemmt

gewesenen Elbwiese soll Anlass zu dem Ausbruch in Parey gegeben haben. In Popowo ist bisher noch niemals ein Milzbrandfall beobachtet worden. Als Ursache des Ausbruches in Lüdinghausen wird angeführt: „schlecht gewonnenes Heu von einer sumpfigen Wiese und Trinkwasser, welches sehr viel organische Bestandtheile enthält“. In Brienen sind die Cadaver von früher an Milzbrand gefallenen Thieren sehr sorglos verscharrt worden. Der Departementsthierarzt bezweifelt in der General-Tabelle die Richtigkeit der Diagnose, bezüglich des Ausbruchs in Borstel. Die Diagnose wird auch dadurch nicht sichergestellt, dass ein mit dem Blute eines kranken Pferdes geimpftes Kaninchen nach 19 Stunden unter den Erscheinungen des malignen Oedems starb. In Borstel ist bisher noch nie Milzbrand beobachtet worden. Bezüglich der übrigen Milzbrandfälle bei Pferden liegen nur die nackten Zahlen vor.

Nach dem statistischen Material sind 32 an Milzbrand erkrankte Stück Rindvieh (2,98 pCt.) genesen.

Die in den einzelnen Quartalen und im ganzen Berichtsjahr an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh vertheilen sich in abgerundeten Procentsätzen, wie folgt, auf die einzelnen Provinzen:

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Im Berichts- jahre	Im Jahre 1884/85
Zahl der an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh	222	375	268	178	1043	1127
Davon in:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1. Ostpreussen	4,06	2,40	1,86	2,81	2,69	3,72
2. Westpreussen	4,95	3,76	0,37	5,62	3,45	3,10
3. Brandenburg	4,95	14,93	8,96	6,18	9,78	6,38
4. Pommern	5,86	2,64	3,73	2,25	3,55	4,44
5. Posen	19,37	14,66	19,03	13,48	16,58	15,52
6. Schlesien	18,02	16,80	12,31	11,24	14,96	21,12
7. Sachsen	7,65	10,40	10,82	19,66	11,50	17,00
8. Schleswig-Holstein . .	10,36	8,00	5,60	7,30	7,77	7,81
9. Hannover	5,86	2,40	2,24	8,42	4,12	5,67
10. Westfalen	6,76	5,60	11,56	4,50	7,19	4,61
11. Hessen-Nassau	2,70	4,54	2,24	1,68	3,07	3,63
12. Rheinprovinz	9,01	13,87	21,28	16,86	15,24	7,00
13. Hohenzollernsche Lande	0,45	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die vorstehende Vergleichung weist eine erhebliche Steigerung des Procentsatzes gegen den des vorigen Berichtsjahres in Branden-

burg, Westfalen und in der Rheinprovinz, dagegen eine bedeutende Abnahme in Schlesien und Sachsen nach. In den anderen Provinzen zeigen die Verhältnisszahlen in den beiden letzten Jahren nur geringfügige Verschiedenheiten.

1. Ostpreussen.

Die 28 an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh vertheilen sich auf die nachstehend genannten Kreise:

1. Fischhausen	in 1 Ortschaft.,	1 Geh.,	1 St. Rindv. gefallen.	R.-B. Königsberg.
2. Friedland*	- 1 -	1 -	1 -	-
3. Labiau	- 1 -	1 -	1 -	-
4. Rössel	- 2 -	2 -	2 -	-
5. Wehlau	- 3 -	3 -	3 -	-
6. Darkehmen	- 2 -	2 -	5 -	- Gumbinnen.
7. Goldap*	- 1 -	1 -	1 -	-
8. Gumbinnen*	2 -	2 -	2 -	-
9. Lyk	- 1 -	1 -	5 -	-
10. Niederung	- 1 -	1 -	1 -	-
11. Pilkallen	- 3 -	3 -	4 -	-
12. Stallupönen	- 1 -	1 -	2 -	-

Zusammen in 19 Ortschaft., 19 Geh., 28 St. Rindv. gefallen.

In Ogradken, Kr. Lyk, fielen kurz hintereinander 5, in Launingken, Kr. Darkehmen, in 2 Gehöften 2 Stück Rindvieh. Ogradken und Dwarischken, Kr. Pilkallen, werden als Milzbrandstationen bezeichnet; in dem zuletzt genannten Gute fielen ausser 2 Stück Rindvieh 1 Pferd und 2 Schafe. In 15 Gehöften beschränkte sich der Verlust auf 1 Stück Rindvieh. In Raschung, Kr. Rössel, und in Pillupönen, Kr. Stallupönen, werden sporadische Milzbrandfälle in längeren oder kürzeren Zwischenzeiten beobachtet.

2. Westpreussen.

An Milzbrand sind 36 Stück Rindvieh in den nachstehend genannten Kreisen gefallen:

1. Danzig, Landkr.	in 1 Ortschaft.,	3 Geh.,	3 St. Rindv. gef.	Reg.-Bez. Danzig.
2. Marienburg	- 3 -	4 -	6 -	-
3. Deutsch-Krone	- 2 -	2 -	3 -	- Marienwerder.
4. Rosenberg	- 3 -	3 -	5 -	-
5. Schwetz*	- 6 -	6 -	7 -	-
6. Thorn	- 3 -	3 -	9 -	-
7. Tuchel*	- 2 -	3 -	3 -	-

Zusammen in 20 Ortschaft., 24 Geh., 36 St. Rindv. gefallen.

In den bekannten Milzbrandstationen Aschenort und Brzezcka, Kr. Thorn, fielen an Milzbrand im Laufe des Berichtsjahres 4 Stück Rindvieh bezw. 1 Pferd, 2 St. Rindvieh und 8 Schafe, ausserdem fielen in 2 Gehöften je 3, in 2 Gehöften je 2, in 2 Gehöften von Schadwalde,

Kr. Marienburg, zusammen 4, in 16 Gehöften beschränkte sich der Verlust auf 1 Stück Rindvieh. In Langenau, Landkr. Danzig, und Schadwalde, Kr. Marienburg, ist der Milzbrand stationär.

3. Brandenburg.

Die 102 an Milzbrand gestorbenen Stück Rindvieh entfallen auf die Kreise:

Kreis	in 3 Ortsch.,	3 Geh.,	gefallen 4 St. Rindv.	Reg.-Bez.
1. Nieder-Barnim	- 8	- 9	- 37	Potsdam.
2. Ost-Havelland	- 3	- 3	- 5	
3. West-Havelland	- 1	- 1	- 1	
4. Jüterbog-Luckenwalde*	- 1	- 1	- 1	
5. Prenzlau	- 1	- 1	- 1	
6. Arnswalde*	- 3	- 3	- 6	Frankfurt.
7. Friedeberg	- 1	- 1	- 1	
8. Guben*	- 2	- 2	- 2	
9. Königsberg	- 4	- 4	- 4	
10. Krossen	- 1	- 1	- 1	
11. Landsberg*	- 2	- 2	- 3	
12. Luckau	- 4	- 9	- 9	
13. Soldin	- 3	- 4	- 21	
14. Ost-Sternberg*	- 1	- 1	- 1	
15. West-Sternberg*	- 2	- 2	- 2	
16. Sorau	- 1	- 1	- 4	

Zusammen in 40 Ortsch., 47 Geh., 102 St. Rindv. gefallen.

Ueber 3 Stück Rindvieh verlor je ein Gehöft in:

Kienberg,	Kreis Ost-Havelland,	22 Stück Rindvieh.
Bötzow,	-	4 - -
Cratznik,	- Arnswalde,	4 - -
Rehnitz,	- Soldin,	15 - -
Gross-Köbzig,	- Sorau,	4 - -

In Kienberg weidete das Rindvieh auf einer niedrig gelegenen Wiese, 2 Tage vor dem Ausbruch des Milzbrandes war ein Wolkenbruch ähnlicher Gewitterregen gefallen, welchem eine schwüle Hitze folgte. Das Herrschen der Seuche dauerte auch nach dem Aufstallen der Thiere fort, so lange Wiesengras gefüttert wurde und hörte erst nach dem Uebergange zu Trockenfutter auf. In demselben Bestande war der Milzbrand 1873 seucheartig aufgetreten. Unter dem Bestande in Bötzow hatte der Milzbrand auch während des vorigen Jahres erhebliche Verluste veranlasst. Der Ausbruch in Cratznik wird auf Verfütterung von Rapschalen zurückgeführt, welche durch Abgänge von milzbrandkranken Thieren verunreinigt waren. Rehnitz und Gross-Köbzig werden als bekannte Milzbrandstationen bezeichnet.

In 3 Gehöften fielen je 3, in 5 je 2, in 34 Gehöften beschränkte sich der Verlust auf je 1 Stück Rindvieh. In Birkholz, Kr. Friedeberg, Stein-

werdersruh, Kr. Soldin, und Tornow, Kr. West-Sternberg, kommen öfter sporadische Milzbrandfälle vor.

4. Pommern.

Die 37 an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh vertheilen sich auf die Kreise:

1. Greifenhagen	in 3 Ortsch.,	3 Geh.,	3 St. Rindv. gefallen.	Reg.-Bez. Stettin.
2. Pyritz	- 3 -	3 -	8 -	-
3. Randow	- 2 -	2 -	2 -	-
4. Regenwalde*	- 3 -	5 -	12 -	-
5. Belgard*	- 2 -	2 -	8 -	- Koeslin.
6. Dramburg	- 2 -	2 -	2 -	-
7. Lauenburg	- 2 -	2 -	2 -	-

Zusammen in 17 Ortsch., 19 Geh., 37 St. Rindv. gefallen.

In 3 Gehöften von Haselen, Kr. Regenwalde, fielen 9 Stück Rindvieh, 80 Schafe und 3 Schweine. Die Seuche brach nach dem Beweiden eines Kleeschlages aus, auf welchem vor mehreren Jahren einige Rindviehcadaver sehr oberflächlich vorgraben worden sind. In Zuchen, Kr. Belgard, fielen in längeren Zwischenzeiten 6, in Kloxin, Kr. Pyritz, 4, ferner in 1 Gehöft 3, in 2 Gehöften je 2, in 11 Gehöften je ein Stück Rindvieh. In Denzig, Kr. Dramburg, werden öfter sporadische Erkrankungen an Milzbrand beobachtet.

5. Posen.

An Milzbrand sind zusammen 173 Stück Rindvieh in den nachstehend genannten Kreisen gefallen:

1. Adelnau	in 1 Ortsch.,	1 Geh.,	1 St. Rindv. gef.	R.-B. Posen.
2. Birnbaum	- 1 -	1 -	2 -	-
3. Bomst	- 3 -	3 -	3 -	-
4. Buk	- 5 -	5 -	7 -	-
5. Fraustadt	- 8 -	8 -	8 -	-
6. Kosten	- 7 -	7 -	19 -	-
7. Kroeben	- 7 -	8 -	18 -	-
8. Obornik	- 6 -	6 -	8 -	-
9. Pleschen	- 4 -	4 -	4 -	-
10. Posen, Landkr.	- 1 -	1 -	8 -	-
11. Samter	- 5 -	5 -	35 -	-
12. Schroda	- 2 -	2 -	5 -	-
13. Wreschen	- 5 -	5 -	6 -	-
14. Bromberg, Landkr.	- 1 -	1 -	5 -	- Bromberg.
15. Gnesen	- 2 -	2 -	2 -	-
16. Inowraclaw	- 5 -	5 -	26 -	-
17. Kolmar	- 2 -	2 -	2 -	-
18. Schubin	- 2 -	2 -	2 -	-
19. Wirsitz	- 3 -	5 -	10 -	-
20. Wongrowiec	- 2 -	2 -	2 -	-

Zusammen in 72 Ortsch., 75 Geh., 173 St. Rindv. gef.

Ueber 3 Stück Rindvieh entfallen auf die nachstehend aufgeführten Bestände:

	Kreis	Kosten,	6 Stück Rindvieh.
Jerka,	-	-	6
Splawie,	-	-	6
Friederikenhof,	-	Kröben,	8
Trocko,	Landkr.	Posen,	8
Chlewiska,	Kreis	Samter,	30
Niesziczewo,	Landkr.	Bromberg,	5
Baszkowo,	Kreis	Inowraclaw,	5
Plawinek,	-	-	7
Sciborze,	-	-	8
Stahren,	-	Wirwitz,	6
			89

89 Stück Rindvieh.

Jerka, Splawie, Friederikenhof, Chlewiska und Sciborze werden als Milzbrandstationen bezeichnet. In Splawie sollen während der letzten 4 Jahre 60 bis 70 Stück Rindvieh an Milzbrand gefallen sein. In Niesziczewo traten die Erkrankungen nach dem Beweiden einer mit Sumpfstellen untermischten Höhenweide ein. Baszkowo und Plawinek waren bisher milzbrandfrei, die Einschleppung der Seuche ist angeblich durch Rübenschnitzel vermittelt worden. In Stahren wurden während der letzten 10 bis 12 Jahre keine Milzbrandfälle beobachtet. Ueber den Ausbruch in Trocko fehlen nähere Angaben.

In 5 Beständen fielen je 3, in 9 Beständen je 2, in 51 Beständen beschränkte sich der Verlust auf 1 Stück Rindvieh. In Urbanowo, Kr. Buk, Nieder-Heyersdorf, Gronau, Weine, Kr. Fraustadt, Slonskowo, Kr. Kroeben, Roznowo, Kr. Obornik, Leng. Kr. Pleschen, Lissewo und Lissewko, Kr. Inowraclaw, kommen häufiger sporadische Milzbrandfälle vor.

6. Schlesien.

Die 156 an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh vertheilen sich auf die nachstehend genannten Kreise:

1. Breslau, Landkr. in	10 Ortsch.,	11 Geh.,	11 St. Rindv. gef.	R. B. Breslau.
2. Brieg	- 8 -	8 -	8 -	-
3. Frankenstein	- 1 -	1 -	3 -	-
4. Glatz*	- 1 -	1 -	1 -	-
5. Guhrau	- 1 -	1 -	1 -	-
6. Militsch	- 2 -	2 -	2 -	-
7. Namslau	- 1 -	1 -	1 -	-
8. Neumarkt	- 10 -	14 -	14 -	-
9. Nimptsch	- 1 -	1 -	1 -	-
10. Ohlau	- 1 -	1 -	1 -	-
11. Schweidnitz	- 1 -	1 -	1 -	-
12. Strehlen*	- 1 -	1 -	1 -	-
13. Striegau	- 3 -	4 -	4 -	-
14. Trebnitz	- 7 -	7 -	7 -	-

Latus: in 48 Ortsch., 54 Geh., 56 St. Rindv. gefallen.

10 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

	Transport: in	48 Ortsch.,	54 Geh.,	56 St. Rindv. gef.	
15. Waldenburg	-	3	-	3	-
16. Wartenberg	-	1	-	1	-
17. Wohlau	-	2	-	2	-
18. Bolkenhayn	-	1	-	1	-
19. Freystadt	-	5	-	6	-
20. Glogau	-	5	-	5	-
21. Görlitz, Landkr.	-	1	-	1	-
22. Goldberg-Haynau	-	3	-	3	-
23. Grünberg	-	1	-	1	-
24. Jauer	-	1	-	1	-
25. Landeshut	-	2	-	2	-
26. Lauban	-	6	-	6	-
27. Liegnitz, Landkr.	-	5	-	6	-
28. Rothenburg	-	2	-	2	-
29. Sprottau	-	3	-	3	-
30. Beuthen	-	1	-	1	-
31. Falkenberg	-	1	-	1	-
32. Grottkau*	-	2	-	2	-
33. Kattowitz	-	1	-	1	-
34. Kreuzburg	-	1	-	1	-
35. Leobschütz	-	2	-	2	-
36. Lublinitz*	-	4	-	5	-
37. Neisse	-	1	-	1	-
38. Neustadt	-	3	-	3	-
39. Oppeln*	-	3	-	3	-
40. Ratibor*	-	1	-	2	-
41. Gross-Strehlitz	-	7	-	7	-
42. Tarnowitz	-	4	-	4	-
43. Zabrze	-	1	-	1	-

R.-B. Liegnitz.

Oppeln.

Zusammen in 121 Ortsch., 131 Geh., 156 St. Rindv. gefallen.

In Müchlitz, Kr. Wartenberg, fielen kurz hinter einander 6 Stück Rindvieh nach der Verfütterung von Gras, welches von einem abgelaassenen Teiche gewonnen war. Ueber einen Ausbruch in Wrzessin, Kr. Ratibor, in welchem Orte 13 Stück Rindvieh des Gutsbestandes und 1 Stück einer bäuerlichen Wirthschaft fielen, fehlen nähere Angaben.

In 2 Beständen fielen je 3, in 4 Beständen je 2, in 123 Beständen beschränkte sich der Verlust auf 1 Stück Rindvieh. Als Orte, in denen sporadische Milzbrandfälle häufig beobachtet werden, nennt das statistische Material: Riebnig, Kr. Brieg, Peiskerwitz, Maltsch, Landkr. Breslau, Camöse, Ganserau, Kr. Neumarkt, Poppelwitz, Kr. Nimptsch, Reichwalde, Kr. Reichenbach, Bösau, Droscheyda, Purschkau, Kr. Freystadt, Gross-Leschwitz, Lesswitz, Ober-Heydau, Landkr. Liegnitz, Deutsch-Rasselwitz, Kr. Neustadt, Kunary, Koswolagora, Kr. Tarnowitz, Ruda, Kr. Zabrze. Eine erhebliche Anzahl dieser Milzbrandstationen liegt im Uberschwemmungsgebiet der Oder.

7. Sachsen.

Die 120 in der Tabelle S. 2 und 3 aufgeführten Stück Rindvieh sind in den nachstehend genannten Kreisen gefallen:

1. Aschersleben	in 3 Ortsch.,	3 Geh.,	4 St. Rindv. gef.	R.-B. Magdeburg.
2. Jerichow II	- 3 -	4 -	5 -	-
3. Oschersleben	- 3 -	6 -	22 -	-
4. Stendal	- 1 -	1 -	1 -	-
5. Wanzleben	- 2 -	6 -	14 -	-
6. Bitterfeld	- 2 -	2 -	2 -	- Merseburg.
7. Delitzsch	- 6 -	7 -	9 -	-
8. Eckardtsberga	- 1 -	1 -	1 -	-
9. Liebenwerda	- 3 -	3 -	6 -	-
10. Mansfeld, Gebkr*	- 1 -	1 -	1 -	-
11. - Seekr.	- 2 -	2 -	4 -	-
12. Merseburg	- 1 -	1 -	1 -	-
13. Querfurt*	- 2 -	3 -	3 -	-
14. Saalkreis	- 1 -	1 -	1 -	-
15. Sangerhausen*	- 3 -	3 -	9 -	-
16. Schweinitz	- 5 -	6 -	11 -	-
17. Torgau	- 4 -	4 -	5 -	-
18. Wittenberg	- 2 -	2 -	2 -	-
19. Langensalza	- 10 -	17 -	17 -	- Erfurt.
20. Mühlhausen*	- 1 -	1 -	1 -	-
21. Weissensee*	- 1 -	1 -	1 -	-

Zusammen in 57 Ortsch., 75 Geh., 120 St. Rindv. gef.

Ueber 3 Stück Rindvieh fielen in:

2 Geh., Eilenstedt,	Kreis Oschersleben,	17 Stück Rindvieh.
1 - Neubau-Ampfurt,†	- Wanzleben,	7 -
1 - Rithnordhausen,	- Sangerhausen,	6 -
1 - Packisch,	- Liebenwerda,	4 -
1 - Zwiesigko,	- Schweinitz,	5 -
		<u>39 Stück Rindvieh.</u>

Als Ursache des Ausbruchs in Eilenstedt wird Verfütterung von befallenem Stroh bezeichnet. Die Erkrankungen in Neubau-Ampfurt traten ein, als die Thiere aus einem durch Regengüsse gefüllten Graben getränkt wurden. Die Fälle in Rithnordhausen werden auf Rübenschnitzel zurückgeführt, dieselben waren einer Grube entnommen, welche in der Nähe einer Verscharrungsstelle für Milzbrandcadaver lag. Packisch ist eine bekannte Milzbrandstation; über den Ausbruch in Zwiesigko fehlen nähere Angaben.

In 2 Gehöften fielen je 3, in 7 Gehöften je 2, in 61 Gehöften beschränkte sich der Verlust auf 1 Stück Rindvieh. Als Milzbrandstationen werden ferner genannt: Hadmersleben, Kr. Wanzleben, Trebnitz, Kr. Merseburg, Brücken, Kelbra, Kr. Sangerhausen.

8. Schleswig-Holstein.

Die 81 in der Tabelle S. 2 und 3 verzeichneten Milzbrandfälle wurden beobachtet in den Kreisen:

1. Apenrade*	in	2	Ortsch.,	2	Geh.,	4	Stück	Rindvieh	gefallen.
2. Eiderstedt*	-	1	-	1	-	1	-	-	-
3. Hadersleben	-	14	-	16	-	17	-	-	-
4. Husum	-	3	-	5	-	7	-	-	-
5. Norderdithmarschen	-	2	-	2	-	2	-	-	-
6. Pinneberg	-	1	-	2	-	2	-	-	-
7. Rendsburg	-	1	-	1	-	1	-	-	-
8. Schleswig*	-	1	-	1	-	1	-	-	-
9. Segeberg*	-	2	-	2	-	4	-	-	-
10. Sonderburg*	-	1	-	1	-	1	-	-	-
11. Steinburg	-	2	-	2	-	4	-	-	-
12. Stormarn	-	1	-	1	-	2	-	-	-
13. Süderdithmarschen	-	10	-	13	-	14	-	-	-
14. Tondern	-	11	-	13	-	21	-	-	-
<hr/>									
Zusammen in 52 Ortsch., 62 Geh., 81 Stück Rindvieh gefallen.									

In Dingstedt, Kr. Tondern, fielen 4 Stück Rindvieh eines Besitzers an Rauschbrand, Ausbrüche des letzteren sind seit 25 Jahren in dem Orte nicht beobachtet worden. Der Verlust betrug im Uebrigen in 5 Gehöften je 3, in 6 Gehöften je 2, in 50 Gehöften je 1 Stück Rindvieh.

Sämmtliche Fälle in den Kreisen Apenrade, Hadersleben, Husum, Steinburg, Süderdithmarschen und Tondern betrafen Erkrankungen an Rauschbrand (s. S. 16).

9. Hannover.

An Milzbrand sind gefallen 43 Stück Rindvieh, nämlich:

1. Hoya*	in	1	Ortsch.,	1	Geh.,	1	St. Rindv. gef.	R.-B. Hannover.
2. Neustadt*	-	3	-	3	-	3	-	-
3. Springe*	-	1	-	1	-	1	-	-
4. Syke*	-	1	-	1	-	2	-	-
5. Goslar*	-	3	-	3	-	3	-	- Hildesheim.
6. Münden*	-	1	-	1	-	1	-	-
7. Northeim*	-	1	-	1	-	2	-	-
8. Peine*	-	2	-	2	-	2	-	-
9. Fallingb. bostel*	-	1	-	1	-	3	-	- Lüneburg.
10. Gifhorn	-	1	-	1	-	3	-	-
11. Harburg	-	1	-	1	-	1	-	-
12. Lüneburg	-	1	-	1	-	1	-	-
13. Bremervörde*	-	1	-	1	-	1	-	- Stade.
14. Geestemünde*	-	2	-	2	-	5	-	-
15. Osterholz*	-	1	-	1	-	1	-	-
16. Otterndorf	-	1	-	1	-	1	-	-
17. Stade-Geest*	-	2	-	2	-	2	-	-
18. Verden	-	1	-	1	-	1	-	-

Latus: in 25 Ortsch., 25 Geh., 34 St. Rindv. gef.

Transport: in 25 Ortschaft., 25 Geh., 34 St. Rindv. gef.							
19. Bentheim*	- 1	-	1	-	1	-	R.-B. Osnabrück.
20. Bersenbrück	- 1	-	1	-	2	-	
21. Iburg*	- 1	-	1	-	1	-	
22. Lingen	- 1	-	1	-	2	-	
23. Melle*	- 1	-	1	-	1	-	
24. Wittlage*	- 1	-	1	-	2	-	

Zusammen in 31 Ortschaft., 31 Geh., 43 St. Rindv. gef.

In Meierhof, Kr. Fallingb. fielen gleichzeitig 3 Stück Rindvieh und 13 Schweine, in 2 anderen Gehöften je 3, in 6 Gehöften je 2, in 22 Gehöften je 1 Stück Rindvieh. In Wilhelmsburg, Kr. Harburg, Hollensteda, Kr. Bersenbrück und Quendorf, Kr. Lingen, kommen sporadische Milzbranderkrankungen öfter vor.

10. Westfalen.

Die 75 an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh vertheilen sich auf die Kreise:

Die 75 an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh vertheilen sich auf die Kreise:							
1. Ahaus	in 2	Ortschaft.,	2	Geh.,	2	St. Rindv. gef.	R.-B. Münster.
2. Steinfurt*	- 1	-	1	-	1	-	
3. Tecklenburg	- 1	-	1	-	2	-	
4. Warendorf	- 3	-	3	-	3	-	
5. Bielefeld*	- 2	-	2	-	2	-	- Minden.
6. Höxter*	- 2	-	2	-	2	-	
7. Wiedenbrück	- 5	-	6	-	10	-	
8. Altena	- 2	-	2	-	7	-	- Arnberg.
9. Gelsenkirchen*	- 1	-	1	-	2	-	
10. Hamm*	- 1	-	1	-	1	-	
11. Hattingen*	- 2	-	3	-	8	-	
12. Iserlohn*	- 1	-	1	-	1	-	
13. Olpe	- 2	-	6	-	9	-	
14. Siegen	- 10	-	14	-	15	-	
15. Witgenstein	- 7	-	10	-	10	-	

Zusammen in 42 Ortschaft., 55 Geh., 75 St. Rindv. gef.

In Hüttebruch, Kr. Altena, fielen kurz hintereinander 5, in 4 Gehöften von Drolshagen, Kr. Olpe, 6 Stück Rindvieh, die Ursachen werden nicht erwähnt. In Durchholz, Kr. Hattingen, verloren 2 Bestände zusammen 6 Stück Rindvieh. Dep.-Th.-Arzt Woestendieck erwähnt, dass er während seiner 38jährigen Praxis keinen Fall von Milzbrand in diesem Orte beobachtet habe.

In einem Gehöfte fielen 3, in 8 Gehöften je 2, in 39 Gehöften beschränkte sich der Verlust auf je ein Stück Rindvieh. In Epe, Kr. Ahaus, kommen sporadische Milzbrandfälle öfter vor. In Spexardt, Kr. Wiedenbrück, Hilgenbach, Rudersdorf, Zepperfeld, Kr. Siegen, wurden Milzbranderkrankungen in den verschiedenen Quartalen des Berichtsjahres beobachtet.

14 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

11. Hessen-Nassau.

Die 32 an Milzbrand gefallenen Stück Rindvieh vertheilen sich auf die Kreise:

	in	1 Ortsch.,	1 Geh.,	1 St. Rindv.	Reg.-Bez. Kassel.
1. Fulda				gefallen	
2. Gelnhausen	-	2	-	2	-
3. Hanau	-	4	-	4	-
4. Hersfeld*	-	1	-	1	-
5. Kassel, Landkr.	-	1	-	1	-
6. Schlüchtern*	-	1	-	1	-
7. Witzenhausen	-	1	-	1	-
8. Dillkreis	-	4	-	4	-
9. Ober-Taunus*	-	3	-	3	-
10. Unter-Taunus*	-	2	-	2	-
11. Ober-Westerwald*	-	2	-	2	-
12. Unter-Westerwald	-	1	-	1	-
13. Wiesbaden, Landkr.	-	1	-	1	-

Zusammen in 24 Ortsch., 27 Geh., 32 St. Rindv. gefallen.

In einem Gehöft fielen 3, in 3 Gehöften je 2, in 23 Gehöften beschränkte sich der Verlust auf 1 Stück Rindvieh.

12. Rheinprovinz.

An Milzbrand sind gefallen 159 Stück Rindvieh, nämlich:

	in	1 Ortsch.,	1 Geh.,	1 St. Rindv. gef.	R.-B. Koblenz.
1. Altenkirchen*					
2. Koblenz*	-	1	-	1	-
3. Mayen	-	1	-	1	-
4. Neuwied*	-	1	-	1	-
5. Wetzlar	-	5	-	5	-
6. Düsseldorf, Ldkr.*	-	2	-	2	-
7. Duisburg*	-	1	-	1	-
8. Essen, Landkr.*	-	2	-	2	-
9. Geldern	-	4	-	4	-
10. Gladbach*	-	1	-	1	-
11. Grevenbroich*	-	1	-	1	-
12. Kempen	-	3	-	3	-
13. Kleve*	-	2	-	2	-
14. Mörs*	-	1	-	1	-
15. Mülheim*	-	1	-	1	-
16. Neuss	-	2	-	2	-
17. Euskirchen	-	8	-	8	-
18. Köln, Landkr.*	-	2	-	2	-
19. Mülheim	-	2	-	2	-
20. Rheinbach	-	2	-	2	-
21. Wipperfürth	-	2	-	2	-
22. Bernkastel	-	1	-	1	-
23. Bitburg	-	1	-	1	-
24. Ottweiler	-	1	-	1	-
25. Prüm*	-	1	-	1	-
26. Saarbrücken	-	1	-	1	-
27. Saarburg*	-	2	-	2	-
28. Saarlouis	-	2	-	2	-

Latus: in 54 Ortsch., 75 Geh., 119 St. Rindv. gefallen.

Transport: in 54 Ortschaft., 75 Geh., 119 St. Rindv. gef.

29. Aachen, Landkr.*	- 1 -	1 -	1 -	-	-	Rg.-Bz. Aachen.
30. Düren	- 3 -	3 -	11 -	-	-	
31. Erkelenz	- 1 -	1 -	1 -	-	-	
32. Eupen	- 6 -	18 -	19 -	-	-	
33. Heinsberg*	- 1 -	1 -	1 -	-	-	
34. Malmedy	- 3 -	3 -	4 -	-	-	
35. Montjoie*	- 2 -	2 -	3 -	-	-	

Zusammen in 71 Ortschaft., 104 Geh., 159 St. Rindv. gefallen.

Ueber 3 Stück Rindvieh fielen in den nachstehend genannten

Beständen:

2 Geh.,	Ramrath,	Kreis Grevenbroich,	7 Stück Rindvieh.
1 -	Benrath Hüls,	- Kempen,	4 - -
1 -	Asperden,	- Kleve,	4 - -
1 -	Büderich,	- Moers,	15 - -
1 -	Dahl,	- Wipperfurth,	4 - -
1 -	Delling,	-	6 - -
1 -	Kettenheim,	Landkr. Aachen,	5 - -
1 -	Embken,	Kreis Düren,	4 - -

49 Stück Rindvieh.

In Ramrath befanden sich die Gruben für die Presslinge auf einem alten Verscharrungsplatz für Thiercadaver, auch der Ausbruch in Asperden wird auf die sorglose Verscharrung von an Milzbrand gefallenen Thieren zurückgeführt. In Büderich fielen 15 Stück an Rauschbrand. In Dahl und Delling trat die Krankheit unter den Erscheinungen einer septischen Gebärmutterentzündung auf. Bezüglich der übrigen Ausbrüche fehlen nähere Angaben.

In 2 Gehöften fielen je 3, in 13 Gehöften je 2, in 82 Gehöften beschränkte sich der Verlust auf ein Stück Rindvieh. In 8 Gehöften von Asslar, Kr. Wetzlar, fielen während des Berichtsjahres 8 Stück Rindvieh, in den Ställen ist das Pflaster durchweg sehr schlecht und der Jaucheabfluss ungenügend, die Krankheit tritt häufig mit starkem Emphysem verbunden auf. In Bellerndorf, Kr. Wetzlar, Wachten-donk, Sevelen, Kr. Geldern, Lüttenglan, Kr. Neuss, Erp, Pringsheim, Kr. Euskirchen, Walpertshofen, Kr. Saarbrücken, Eupen, Lontzen, Kr. Eupen, werden öfters Milzbranderkrankungen beobachtet.

Die einzige Milzbranderkrankung in den Hohenzollernschen Landen entfällt auf den Ober-Amtsbezirk Gammertingen.

Die Berichte zur Viehseuchen-Statistik enthalten im Allgemeinen nur selten Bemerkungen über die ursächlichen Verhältnisse welche zu sporadischen Milzbrandfällen Anlass gegeben haben, und diese Mittheilungen wiederholen meistens nur diejenigen Behauptungen, welche in unseren früheren Berichten bereits mehrfach

vorgetragen wurden. Vielfach wird mitgetheilt, dass sporadische Fälle von Milzbrand in den betreffenden Orten häufiger vorkommen, oder dass als Ursache die oberflächliche Verscharrung von Milzbrandcadavern anzusehen sein dürfte. Anderseitig betonen die Berichterstätter ebenfalls recht häufig, dass der Milzbrand in dem betreffenden Ort noch niemals oder wenigstens seit einer langen Reihe von Jahren nicht beobachtet worden ist, bezw. dass die früher zahlreichen Milzbrand-erkrankungen in neuerer Zeit sehr viel seltener geworden seien, seitdem man mit grösserer Sorgfalt auf die unschädliche Beseitigung der Cadaver Rücksicht nimmt.

Nach den Berichten sind besonders zahlreiche Milzbrandfälle in dem Ueberschwemmungsgebiet der Oder, Brahe, Unstrut, Elbe, Weser, Aller und Ruhr beobachtet worden.

Im Uebrigen werden als Ursachen vielfach angeführt: moorige oder als Torfstich benutzte, oder Bruchweiden, auf sumpfigem Boden gewachsenes oder von humusreichem, stark gedüngtem Boden gewonnenes oder in Fäulniss übergegangenes Futter, Gras von mit Jauche überschwemmten Wiesen, Verfütterung von verschimmeltem oder sonst verdorbenem Heu oder Haferstroh, bezw. von verfaulten, erfrorenen oder stark mit Erde verunreinigten Rüben, ferner stark an der Trockenfäule leidende Kartoffeln, schlechtes an organischen Bestandtheilen reiches Trinkwasser, veränderter Abfluss der Jauche aus den Ställen u. s. w. Der Milzbrand soll besonders häufig in Ortschaften mit schwerem, nicht drainirtem Boden auftreten, auf welchem das Wasser lange Zeit in Pfützen stehen bleibt. In mehreren Fällen wird der Ausbruch auf Infection durch die Häute von Milzbrandcadavern oder durch Gerbereiabfälle, auf die Nachbarschaft von Abdeckereien oder auf die Verfütterung von Weizenspreu zurückgeführt, welche über verseuchten Schafställen gelagert hatte.

Die Circular-Verfügung Seiner Excellenz des Herrn Ministers vom 6. September 1885 hat zur Folge gehabt, dass die Fälle von Rauschbrand schärfer als bisher von den Milzbranderkrankungen getrennt, und dass die Landestheile besser bekannt geworden sind, in denen Ausbrüche des Rauschbrandes beobachtet werden. Nach dem statistischen Material entfallen die zahlreichsten Ausbrüche von Rauschbrand auf die Provinz Schleswig-Holstein, namentlich auf die folgenden Kreise derselben: Apenrade, Hadersleben, Husum, Steinburg, Norder- und Süderdithmarschen, Tondern. Die zahlreichsten Erkrankungen wurden an bestimmten Orten, in denen die Seuche stationär ist und

namentlich während des Weideganges beobachtet. Ausserdem ist der Rauschbrand noch festgestellt worden in den nachstehend genannten Orten:

		bei	2	Stück	Rindvieh,
Brandeck,	Kr. Tüchel,	-	1	-	-
Dzielna,	- Lublinitz,	-	1	-	-
Bindfelde,	- Stendal,	-	1	-	-
Ammeloe,	- Ahaus,	-	1	-	-
Eichholtz,	- Hörter,	-	1	-	-
Reelsen,	-	-	1	-	-
Oberschild,	Dillkreis,	-	2	-	-
Langenaubach,	-	-	1	-	-
Fronhausen,	-	-	1	-	-
Donsbach,	-	-	1	-	-
Stierstedt,	Ober-Taunuskreis,	-	1	-	-
Pottun,	Ober-Westerwaldkr.,	-	1	-	-
Asslar,	Kr. Wetzlar,	-	1	-	-
Büderich,	- Mörs,	-	15	-	-
Schwierzheim,	- Prüm,	-	1	-	-
Eupen,	- Eupen,	-	1	-	-
Kettenis,	-	-	1	-	-
Lontzen,	-	-	1	-	-
Merols,	-	-	1	-	-
Mützenich,	- Malmedy,	-	1	-	-
<hr/>					
Zusammen 36 Stück Rindvieh.					

Abgesehen von Büderich, Kr. Mörs, und von einigen Beständen in der Provinz Schleswig-Holstein, welche 3 bzw. 4 Stück Rindvieh verloren, blieben die Rauschbrandausbrüche auf 1 oder 2 Stück der Bestände beschränkt. In Stierstedt, Asslar und Lontzen wurden gleichzeitig Ausbrüche des Rauschbrandes und des Milzbrandes beobachtet.

Die Tabellen der Reg.-Bez. Gumbinnen, Potsdam, Posen, Liegnitz, sowie der Kreise Marienburg, Reg.-Bez. Danzig, Göttingen, Münden, Duderstadt, Osterode, Reg.-Bez. Hildesheim, Euskirchen, Reg.-Bez. Köln, enthalten die Mittheilung, dass der Rauschbrand eine in den genannten Landestheilen unbekannte Krankheit sei. Dagegen wird aus dem Kreise Beckum, Reg.-Bez. Münster, berichtet, dass Fälle von Rauschbrand, namentlich im Spätsommer und Herbst, öfter vorkommen, jedoch selten zur Kenntniss der Behörden gelangen.

Im Kreise Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel, wurde die „neue Wild- oder Rinderseuche“ und zwar die exanthematische Form derselben bei 11 Stück Rindvieh, welche 7 Beständen angehörten, beobachtet.

Die 718 an Milzbrand gefallenen Schafe vertheilen sich auf die nachstehend genannten Ortschaften; mit Ausnahme von Haselen war in jeder derselben ein Bestand verseucht. In den mit ** bezeichneten Ortschaften herrschte der Milzbrand gleichzeitig oder doch im Laufe des Berichtsjahres auch unter dem Rindvieh:

Lauf. No.	O r t.	K r e i s.	Regierungs- bezirk.	Zahl der im Gehöft an Milzbrand gefallenen Schafe.
1.	Dwarischken**	Pilkallen	Gumbinnen	2
2.	Schwiggupönen	Stallupönen	-	4
3.	Gross-Seelau	Danzig, Landkr.	Danzig	10
4.	Brszeszka**	Thorn	Mariewerder	8
5.	Demerten	Ost-Priegnitz	Potsdam	16
6.	Zachow	Königsberg	Frankfurt	6
7.	Rehnitz**	Soldin	-	23
8.	Tornow A	West-Sternberg	-	25
9.	Sallentin	Pyritz	Stettin	200
10.	Haselen** (3 Geh.)	Regenwalde	-	80
11.	Labes**	-	-	5
12.	Hoffelde	-	-	10
13.	Eichforst	Dramburg	Köslin	7
14.	Pawlowitz	Fraustadt	Posen	150
15.	Bodzewo**	Kröben	-	5
16.	Friederikenhof**	-	-	23
17.	Krzekatowice	-	-	53
18.	Neuhof	-	-	6
19.	Sendzin**	Samter	-	7
20.	Plawinek**	Inowraclaw	Bromberg	11
21.	Lissewko**	-	-	5
22.	Stahren**	Wirszitz	-	14
23.	Hartmannsdorf	Freystadt	Liegnitz	3
24.	Ober-Reichenbach	-	-	3
25.	Zabnik	Neustadt	Oppeln	2
26.	Borschütz**	Liebenwerda	Merseburg	1
27.	Packisch**	-	-	4
28.	Rithnordhausen**	Sangerhausen	-	35
			Summa	718

In Sallentin trat die Seuche bei Benutzung eines bestimmten Weideplans und nach einiger Zeit von Neuem auf, als die Schafe wieder auf dieselbe Weide gebracht wurden. In Pawlowitz erfolgte der Ausbruch nach dem Beweiden eines Ackerstücks, auf welchem früher Milzbrandcadaver vergraben worden waren. In Ober-Reichenbach sollen 2 an Milzbrand erkrankte Schafe genesen sein. In Hoffelde zeigten die erkrankten Schafe die Erscheinungen des Rauschbrandes — „starke, beim Ueberstreichen knisternde Schwellung an den Hinterschenkeln und an der Brust; bei der Section an denselben Stellen blutige Infiltrationen und Gasansammlungen. In dem Blute fanden sich zahlreiche bewegliche Bacterien.“

Die Berichte erwähnen, dass in Hähnichen, Kr. Löwenberg, eine Ziege an Milzbrand gefallen sei.

Die 23 tödtlich gewordenen Milzbranderkrankungen bei Schweinen wurden beobachtet in:

Haselen**,	Kr. Regenwalde,	Reg.-Bez. Stettin,	3 Schweine gefallen.
Conradswalde,	- Schweidnitz,	Breslau,	1 - -
Koschentin,	- Lublinitz,	- Oppeln,	2 - -
Friedrichsgrube,	- Tarnowitz,	- -	1 - -
Meierhof**,	- Fallingbostal,	- Lüneburg,	13 - -
Scheventorf**,	- Iburg,	- Osnabrück,	2 - -
Drolshagen**,	- Olpe,	- Arnsberg,	1 - -
<hr/>			
Zusammen 23 Schweine..			

In den mit ** bezeichneten Ausbrüchen herrschte der Milzbrand gleichzeitig unter dem Rindvieh und ist die Infection jedenfalls dadurch erfolgt, dass die Schweine Abfälle oder Fleisch der erkrankten und geschlachteten oder gefallenen Rinder verzehrt haben. In Scheventorf erkrankten auf diese Weise 5 Schweine, von denen 3 genesen sind. Bezüglich der Ausbrüche in Conradswalde und Friedrichsgrube wird erwähnt, dass in dem Blute der betreffenden Schweine zahlreiche Milzbrandbacillen gefunden wurden. Die nicht selten in den Tabellen angeführten Fälle von „Milzbrandbräune“ sind wohl auf eine irrtümliche Diagnose zurückzuführen und demgemäss in unserem Berichte nicht weiter berücksichtigt worden.

Das Material erwähnt öfter, dass Hunde, welche Blut oder Fleisch von Milzbrandcadavern verzehrt hatten, schwer erkrankt und in den meisten Fällen gestorben sind.

Ueber das Vorkommen von Milzbrand unter dem Roth- und Schwarzwild wird nicht berichtet.

Weitere Milzbrandbezirke, in denen nach § 11 des Reichsgesetzes vom 23. Juli 1880 die Pflicht zur Anzeige von sporadischen Milzbrandfällen aufgehoben ist, wurden während des Berichtsjahres nicht gebildet. Die Anzeigepflicht ruht demgemäss nach wie vor in den beiden Mansfelder Kreisen und im Kreise Sangerhausen des Reg.-Bez. Merseburg.

Von den nach Pasteur's Verfahren geimpften Thieren fielen in Packisch, Kr. Liebenwerda, 4 Stück Rindvieh und 4 Schafe, in Melanienhof (Vorwerk von Dlonie), Kr. Kröben, 3 Stück Rindvieh. Von diesen Thieren waren 3 Stück Rindvieh dreimal in den 3, 2 Schafe zweimal in den 2 vorhergegangenen Jahren geimpft worden, 1 Stück Rindvieh fiel zwischen der Impfung mit dem stärker und dem weniger abgeschwächten Impfstoff. Die übrigen Thiere waren einmal mit beiden Impfstoffen geimpft worden.

Die Berichte wiederholen vielfach, dass zahlreiche Fälle von

Milzbrand nicht zur Kenntniss der Behörden gelangen, und dass an vielen Orten nicht die nöthige Aufmerksamkeit auf die unschädliche Beseitigung der Cadaver verwendet wird. Aus der Provinz Sachsen wird berichtet, dass die Cadaver der an Milzbrand gefallenen Thiere der Regel nach von den Abdeckern abgeholt und gewerbsmässig ausgenutzt werden. In der Provinz Posen, einige Male auch in der Provinz Pommern, ist es vorgekommen, dass das Fleisch von an Milzbrand gefallenen Thieren entwendet und verzehrt wurde, in einem Falle sogar, trotzdem das Fleisch reichlich mit Petroleum begossen worden war.

In Folge von Milzbrandinfection sind nach den Mittheilungen der Berichte 53 Menschen schwer erkrankt und von denselben 10 gestorben. In Jerka, Kr. Kosten, erkrankten 6 Menschen nach dem Genusse von Fleisch einer nothgeschlachteten milzbrandkranken Kuh; in allen übrigen Fällen erfolgten die Infectionen bei dem Schlachten oder Zerlegen von milzbrandkranken Stücken Rindvieh.

2. Die Tollwuth.

Ausser den in der Tabelle S. 22 und 23 aufgeführten Thieren wurde die Tollwuth bei einer Katze und bei einer Ziege constatirt. Diejenigen wuthverdächtigen herrenlosen Hunde, bei denen die Krankheit nicht constatirt wurde, bzw. die Diagnose zweifelhaft blieb, sind in die Tabelle S. 22 und 23 nicht aufgenommen worden. Die Zahl der nach § 19 der Instruction vom 24. Februar 1881 getödteten Hunde, welche mit tollwuthkranken oder wuthverdächtigen in Berührung gekommen waren, ist jedenfalls sehr viel grösser gewesen, als die Angaben der Tabelle nachweisen. Denn vielfach führt das Berichtsmaterial ohne bestimmte Zahlen zu nennen an, dass „sämmliche mit den tollwuthkranken in Berührung gekommene Hunde“, mitunter, dass „sämmliche Hunde einer Ortschaft“ getödtet worden sind. Ausserdem ist die Tödtung von 20 Katzen angeordnet worden, welche von tollwuthkranken Hunden gebissen worden waren.

Die Vergleichung am Fuss der Tabelle S. 22 und 23 zeigt, dass die Zahl der Kreise und Ortschaften, in denen Fälle von Tollwuth beobachtet worden sind, in den beiden letzten Jahren nahezu dieselbe geblieben ist, und dass die Zahl der ortsangehörigen tollwuthkranken Hunde im Berichtsjahre nur wenig,

dagegen die Zahl der Tollwuthkrankungen beim Rindvieh erheblich abgenommen hat. Ausserdem macht sich eine nicht unbeträchtliche Zunahme der herrenlos umherschweifenden tollwuthkranken Hunde bemerklich.

Frei von der Tollwuth blieben die Stadt Berlin und die Reg.-Bez. Stralsund, Erfurt, Schleswig, Aurich, Wiesbaden, Koblenz, Trier und Sigmaringen. In der Provinz Sachsen und im Reg.-Bez. Kassel sind nur ganz vereinzelt Tollwuthkrankungen beobachtet worden. Das Verhältniss der Tollwuthfälle bei Hunden in den einzelnen Provinzen während der beiden letzten Jahre ergibt sich aus der nachstehenden Berechnung:

	Ortsangehörige tollwuthkranke Hunde.		Herrenlose tollwuthkranke Hunde.	
	1884/85	1885/86	1884/85	1885/86
	352	326	302	381
Davon in	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1. Ostpreussen	19,03	19,43	24,17	20,48
2. Westpreussen	5,70	3,27	6,62	6,31
3. Brandenburg	4,26	2,15	2,65	1,84
4. Pommern	7,95	6,44	8,61	5,26
5. Posen	27,56	27,91	27,48	27,56
6. Schlesien	9,34	19,33	12,91	20,95
7. Sachsen	0,57	0,92	0,33	0,79
8. Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Hannover	11,67	11,04	7,95	11,29
10. Westfalen	10,22	4,30	6,95	3,15
11. Hessen-Nassau	0,00	0,61	0,00	0,27
12. Rheinprovinz	3,70	4,60	2,33	2,10
13. Hohenzollernsche Lande	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Aus dieser Vergleichung geht hervor, dass die Zahl der Tollwuthkrankungen in Ostpreussen und Hannover in beiden Jahren eine bedeutende, jedoch fast gleiche gewesen ist, dagegen während des letzten Jahres in Schlesien auffällig zugenommen und sich in Westfalen erheblich vermindert hat.

Aus dem im Allgemeinen sehr dürftigen Berichtsmaterial lässt sich erkennen, dass die bei Weitem meisten Ausbrüche der Tollwuth bei ortsangehörigen Hunden auf den Biss herrenlos umherschweifender Hunde und auf die Sorglosigkeit der Besitzer zurückgeführt werden muss, welche von solchen Vorfällen nicht nur keine Anzeige erstatten,

Milzbrand nicht zur Kenntniss der Behörden gelangen, und dass an vielen Orten nicht die nöthige Aufmerksamkeit auf die unschädliche Beseitigung der Cadaver verwendet wird. Aus der Provinz Sachsen wird berichtet, dass die Cadaver der an Milzbrand gefallenen Thiere der Regel nach von den Abdeckern abgeholt und gewerbsmässig ausgenutzt werden. In der Provinz Posen, einige Male auch in der Provinz Pommern, ist es vorgekommen, dass das Fleisch von an Milzbrand gefallenen Thieren entwendet und verzehrt wurde, in einem Falle sogar, trotzdem das Fleisch reichlich mit Petroleum begossen worden war.

In Folge von Milzbrandinfection sind nach den Mittheilungen der Berichte 53 Menschen schwer erkrankt und von denselben 10 gestorben. In Jerka, Kr. Kosten, erkrankten 6 Menschen nach dem Genusse von Fleisch einer nothgeschlachteten milzbrandkranken Kuh; in allen übrigen Fällen erfolgten die Infectionen bei dem Schlachten oder Zerlegen von milzbrandkranken Stücken Rindvieh.

2. Die Tollwuth.

Ausser den in der Tabelle S. 22 und 23 aufgeführten Thieren wurde die Tollwuth bei einer Katze und bei einer Ziege constatirt. Diejenigen wuthverdächtigen herrenlosen Hunde, bei denen die Krankheit nicht constatirt wurde, bzw. die Diagnose zweifelhaft blieb, sind in die Tabelle S. 22 und 23 nicht aufgenommen worden. Die Zahl der nach § 19 der Instruction vom 24. Februar 1881 getödteten Hunde, welche mit tollwuthkranken oder wuthverdächtigen in Berührung gekommen waren, ist jedenfalls sehr viel grösser gewesen, als die Angaben der Tabelle nachweisen. Denn vielfach führt das Berichtsmaterial ohne bestimmte Zahlen zu nennen an, dass „sämmliche mit den tollwuthkranken in Berührung gekommene Hunde“, mitunter, dass „sämmliche Hunde einer Ortschaft“ getödtet worden sind. Ausserdem ist die Tödtung von 20 Katzen angeordnet worden, welche von tollwuthkranken Hunden gebissen worden waren.

Die Vergleichung am Fuss der Tabelle S. 22 und 23 zeigt, dass die Zahl der Kreise und Ortschaften, in denen Fälle von Tollwuth beobachtet worden sind, in den beiden letzten Jahren nahezu dieselbe geblieben ist, und dass die Zahl der ortsangehörigen tollwuthkranken Hunde im Berichtsjahre nur wenig,

dagegen die Zahl der Tollwutherkrankungen beim Rindvieh erheblich abgenommen hat. Ausserdem macht sich eine nicht unbeträchtliche Zunahme der herrenlos umherschweifenden tollwuthkranken Hunde bemerklich.

Frei von der Tollwuth blieben die Stadt Berlin und die Reg.-Bez. Stralsund, Erfurt, Schleswig, Aurich, Wiesbaden, Koblenz, Trier und Sigmaringen. In der Provinz Sachsen und im Reg.-Bez. Kassel sind nur ganz vereinzelt Tollwutherkrankungen beobachtet worden. Das Verhältniss der Tollwuthfälle bei Hunden in den einzelnen Provinzen während der beiden letzten Jahre ergibt sich aus der nachstehenden Berechnung:

	Ortsangehörige tollwuthkranke Hunde.		Herrenlose tollwuthkranke Hunde.	
	1884/85	1885/86	1884/85	1885/86
	352	326	302	381
Davon in	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1. Ostpreussen	19,03	19,43	24,17	20,43
2. Westpreussen	5,70	3,27	6,62	6,31
3. Brandenburg	4,26	2,15	2,65	1,84
4. Pommern	7,95	6,44	8,61	5,26
5. Posen	27,56	27,91	27,48	27,56
6. Schlesien	9,34	19,33	12,91	20,95
7. Sachsen	0,57	0,92	0,33	0,79
8. Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Hannover	11,67	11,04	7,95	11,29
10. Westfalen	10,22	4,30	6,95	3,15
11. Hessen-Nassau	0,00	0,61	0,00	0,27
12. Rheinprovinz	3,70	4,60	2,33	2,10
13. Hohenzollernsche Lande	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Aus dieser Vergleichung geht hervor, dass die Zahl der Tollwutherkrankungen in Ostpreussen und Hannover in beiden Jahren eine bedeutende, jedoch fast gleiche gewesen ist, dagegen während des letzten Jahres in Schlesien auffällig zugenommen und sich in Westfalen erheblich vermindert hat.

Aus dem im Allgemeinen sehr dürftigen Berichtsmaterial lässt sich erkennen, dass die bei Weitem meisten Ausbrüche der Tollwuth bei ortsangehörigen Hunden auf den Biss herrenlos umherschweifender Hunde und auf die Sorglosigkeit der Besitzer zurückgeführt werden muss, welche von solchen Vorfällen nicht nur keine Anzeige erstatten,

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal										Im zweiten Quartal										Im							
		Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.		erkrankt und gefallen bezw. getödtet.					ge-tödtet			Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.		erkrankt und gefallen bezw. getödtet.					ge-tödtet			Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.	
						Hunde.	Pferde.	St. Rindvieh.	Schaf.	Schweine.	herrenlose wuthver-dächtige Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.					herrenlose wuthver-dächtige Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.									
		Hunde.	Pferde.	St. Rindvieh.	Schaf.									Schweine.	herrenlose wuthver-dächtige Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.				Hunde.	Pferde.	St. Rindvieh.	Schaf.	Schweine.	herrenlose wuthver-dächtige Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.	mit tollkrank in Be-rührgewes. Hunde.	
1.	Ostpreussen ..	20	60	22	—	9	—	1	36	61	16	39	10	—	11	—	1	25	35	9	23								
2.	Westpreussen .	5	5	1	—	1	—	—	3	—	7	12	1	—	1	—	—	10	30	3	4								
3.	Brandenburg .	4	6	2	—	1	—	—	3	1	4	9	4	—	1	—	—	4	24	1	1								
4.	Pommern	8	24	12	—	1	8	13	6	3	7	21	4	2	8	1	2	12	50	1	1								
5.	Posen	23	72	34	2	2	—	—	35	51	19	47	15	1	15	—	—	21	13	14	27								
6.	Schlesien.....	26	41	24	—	—	—	—	20	53	22	30	8	—	—	—	—	23	45	18	29								
7.	Sachsen.....	1	2	1	—	—	—	—	1	2	2	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—								
8.	Schleswig-Holstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
9.	Hannover	16	39	9	—	2	3	2	31	4	8	20	10	1	5	27	—	5	10	9	13								
10.	Westfalen	11	15	5	—	—	—	3	7	3	3	3	2	—	—	—	—	1	6	7	8								
11.	Hessen-Nassau	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1								
12.	Rheinprovinz .	6	7	4	—	—	—	—	3	—	6	6	3	—	—	—	—	3	1	6	8								
13.	Hohenzollernsche Lande.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Summa		121	273	115	2	16	11	19	146	178	94	190	58	4	41	28	3	106	214	69	115								
Im Berichtsjahre 1884/85		108	204	115	2	44	7	4	86	203	72	140	55	1	86	—	—	55	100	80	149								
Im Berichtsjahre 1885/86:																													
mehr		13	69	—	—	—	4	15	60	—	22	50	3	3	—	28	3	51	114	—	—								
weniger		—	—	2	—	28	—	—	—	25	—	—	—	—	45	—	—	—	—	11	34								

Regierungsbezirke, in denen Fälle von Tollwuth nicht vorge-

Danzig 1. Qu. Potsdam 2.—4. Qu. Frankfurt 4. Qu. Berlin 1.—4. Qu. Stettin 3. 4. Qu. Erfurt 1.—4. Qu. Schleswig 1.—4. Qu. Hannover 4. Qu. Hildesheim Wiesbaden 1.—4. Qu. Koblenz 1.—4. Qu. Düsseldorf 4. Qu.

dritten Quartal						Im vierten Quartal						Im Berichtsjahre												
erkrankt und gefallen bezw. getödtet.					ge- tödtet	Zahl der Kreise.	erkrankt und gefallen bezw. getödtet.					ge- tödtet	Zahl der Kreise.	erkrankt und gefallen bezw. getödtet.										
Hunde.	Pferde.	St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.			Hunde.	Pferde.	St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.			Hunde.	Pferde.	St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.						
herrenlose wuthver- dächtige Hunde, mit tollkrank in Be- rührg. gewes. Hunde.					Zahl der Ortschaften.	herrenlose wuthver- dächtige Hunde, mit tollkrank in Be- rührg. gewes. Hunde.					Zahl der Ortschaften.	herrenlose wuthver- dächtige Hunde, mit tollkrank in Be- rührg. gewes. Hunde.												
15	2	2	—	—	9	22	11	24	16	—	1	—	—	8	35	26	135	63	2	23	—	2	78	153
2	—	—	—	—	2	17	9	16	7	—	—	—	—	9	14	12	35	11	—	2	—	—	24	61
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	16	7	—	2	—	—	7	25
2	—	1	—	—	—	—	2	7	3	—	—	3	—	2	36	7	50	21	2	10	12	15	20	89
14	—	15	—	1	8	32	17	33	28	—	8	—	—	41	99	25	175	91	3	40	—	1	105	195
14	1	1	1	1	16	39	19	35	17	—	1	—	—	21	74	42	130	63	1	2	1	1	80	211
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	6	3	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	1	—	—	4	—	7	10	9	—	1	—	—	3	19	22	81	36	1	9	30	2	43	33
5	—	—	—	—	3	26	3	3	2	—	1	—	—	1	6	14	25	14	—	1	—	3	12	41
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	1	—
7	—	—	—	—	2	6	1	1	1	—	—	—	—	—	5	14	21	15	—	—	—	—	8	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	3	20	1	2	44	142	70	130	84	—	12	3	—	85	288	174	676	326	9	89	43	24	381	822
82	1	36	—	4	55	176	95	200	98	3	12	1	8	106	280	179	667	352	7	178	8	16	302	759
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	8	—	9	—	2	—	35	8	79	63
13	—	16	—	2	11	34	15	70	14	3	—	—	8	21	—	5	—	26	—	89	—	—	—	—

kommen sind, nebst Angabe der seuchefrei gebliebenen Quartale.

4. Qu. Köslin 3. Qu. Stralsund 1.—4. Qu. Magdeburg 1.—3. Qu. Merseburg
2. Qu. Lüneburg 1.—3. Qu. Aurich 1.—4. Qu. Minden 2. Qu. Kassel 2.—4. Qu.
Trier 1.—4. Qu. Aachen 3. 4. Qu. Sigmaringen 1.—4. Qu.

sondern sich in jeder Weise bemühen, die Berührung ihrer Hunde mit tollwuthverdächtigen zu verheimlichen, und ihre Hunde der vorgeschriebenen Tödtung zu entziehen. In diesem Widerstreben des Publicums gegen den § 19 der Instruction vom 24. Februar 1881 und in der grossen Zahl der gehaltenen nutzlosen Hunde liegen die Ursachen, dass die Tilgung der Tollwuth auf so grosse Schwierigkeiten stösst und bisher noch so unbedeutende Fortschritte gemacht hat.

Durch die vom Bundesrath vorgeschriebenen Tabellenformulare, welche bereits für das vierte Quartal benutzt wurden, ist eine genauere Feststellung der Fälle ermöglicht worden, in denen Hunde, welche mit tollkranken in Berührung gewesen waren, nicht getödtet, sondern nach § 19 der Instruction unter Observation gestellt wurden. Im Quartal Januar - März 1886 ist diese Observation bei 11 Hunden gestattet worden und bei 2 dieser Hunde brach die Tollwuth während der Observationszeit aus. Die Gründe, welche Anlass gaben, bei diesen 11 Hunden von der Tödtung Abstand zu nehmen, werden in keinem Falle erwähnt.

Ausserdem wird vielfach berichtet, dass die Ortspolizeibehörden der Tilgung der Tollwuth häufig eine geringere Aufmerksamkeit zuwenden, als den übrigen ansteckenden Thierkrankheiten, dass in vielen Fällen eine thierärztliche Constatirung der Krankheit unterblieben ist, und dass zahlreiche Ausbrüche den Berichterstattern nur durch die Veröffentlichungen der Kreisblätter bekannt werden.

Eine erfolgreiche Tilgung der Tollwuth kann nur erwartet werden, wenn auf strengere Beachtung der Anzeigepflicht von Seiten der Hundebesitzer gesehen und namentlich den noch vielfach vorkommenden Verheimlichungen von Ausbrüchen entgegen gewirkt wird. Der bedeutendste Erfolg würde jedoch durch Tödtung aller mit tollwuthkranken in Berührung gekommenen Hunde und durch Massregeln erzielt werden, welche geeignet sind, die Zahl der nutzlosen Hunde zu beschränken.

Die bei Weitem meisten herrenlos umherschweifenden tollwuthkranken Hunde entfallen auf die östlichen Grenzprovinzen — Ostpreussen, Westpreussen, Posen und Schlesien — nämlich 287 (75,33 pCt.). Vielfach ist behauptet worden, dass ein grosser Theil dieser herrenlosen Hunde aus Russland, Polen bzw. Oesterreich übergelaufen sei und dadurch Anlass zu stets erneuter Einschleppung der Tollwuth gegeben habe. Die

nachstehende Vergleichung zeigt, dass diese Annahme wenigstens für die Reg.-Bez. Königsberg, Gumbinnen, Bromberg und Oppeln eine gewisse Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen kann; denn von den herrenlos umherlaufenden tollwuthkranken Hunden entfallen auf den:

Reg.-Bez.	herrenlose Hunde:			Hunde			Hunde.
	in	3	Grenzkreisen	13,	in	6	Binnenkr.
Königsberg	25	-	-	13,	6	-	12
Gumbinnen	53	-	-	28,	-	6	25
Marienwerder	19	-	-	4,	-	7	15
Posen	64	-	-	11,	-	12	53
Bromberg	41	-	-	32,	-	4	9
Breslau	30	-	-	2,	-	13	28
Liegnitz	17	-	-	4,	-	6	13
Oppeln	33	-	-	26,	-	2	7

Ebenso wird behauptet, dass die verhältnissmässig zahlreichen herrenlosen tollwuthkranken Hunde im Reg.-Bez. Stade zum grössten Theil aus dem Gebiete der freien Stadt Bremen übergelaufen seien.

Die Ausbrüche der Tollwuth bei Wiederkäuern und Schweinen sind fast durchweg durch den Biss tollwuthkranker Hirtenhunde, nur ausnahmsweise durch den Biss herrenlos umherschweifender Hunde veranlasst worden. In den meisten Fällen blieben die Erkrankungen auf 1 bis 2 Stück Rindvieh beschränkt, grössere Verluste wurden beobachtet unter je einem Bestande in:

Keykuth,	Kr. Ortelsburg,	Reg.-Bez. Königsberg,	5 St. Rindv.
Kallinowen,	- Lyck,	- Gumbinnen,	4 -
Zorndorf,	- Königsberg,	- Frankfurt,	5 -
Klein-Schönfeld,	- Greifenhagen,	- Stettin,	6 -
Biersglynek,	- Wreschen,	- Posen,	4 -
Grochowiska,	- Mogilno,	- Bromberg,	7 -

In Klütz, Kr. Greifenhagen, Reg.-Bez. Stettin, fielen an Tollwuth 13 Schweine im Werthe von 1600 Mark.

Von sicher beobachteten Incubationszeiten erwähnt das statistische Material:

- bei Hunden viermal 14, je zweimal 15, 21, je einmal 4, 7, 16, 24, 25, 28, 35, 37, 41, 50, 86 Tage;
- bei Pferden je einmal 21, 23, 32, 71 Tage;
- beim Rindvieh je zweimal 32, 43, je einmal 16, 17, 22, 25, 28, 36, 40, 49, 53, 56, 67, 126, 206 Tage;
- bei Schafen je zweimal 15, 23, je einmal 18, 49 Tage;
- bei einer Ziege 21 Tage;
- bei Schweinen je einmal 13, 14, 36, 51, 72, 75, 87, 96, 105, 128, 160, 179 Tage.

In einem Rindviehbestande des Dorfes Kelpin, Kr. Tuchel, Reg.-Bez. Marienwerder, waren bereits im vorigen Jahre mehrere Stück Rindvieh an Tollwuth gefallen, im 1. Quartal erkrankte eine Kuh, bei welcher die Incubation über 10 Monate gedauert haben muss.

Ueber Erkrankungen von Menschen an der Wasserscheu enthält das statistische Material folgende Mittheilungen:

Im 1. Quartal starb in Komorowo, Kr. Schildberg, Reg.-Bez. Posen, ein im Februar 1885 von einem tollwuthkranken Hunde gebissener Mensch.

In Costau, Kr. Kreuzberg, Reg.-Bez. Oppeln, erkrankte am 9. August 1885 ein Knecht, derselbe war am 4. Mai 1885 von einem wuthkranken Hunde gebissen worden.

3. Die Rotz-Wurmkrankheit.

Die Zahl der verseuchten Bestände, sowie die der getödteten bzw. gefallenen rotz-wurmkranken Pferde hat in den drei letzten Jahren fortdauernd abgenommen, wie die nachstehende Vergleichung zeigt:

	verseuchte Bestände	getödtete bzw. gefallene Pferde
1883/84:	664	1879
1884/85:	574	1525
1885/86:	444	1176

In dem Berichtsjahre macht sich diese Abnahme namentlich auch in den Provinzen Westpreussen, Posen und Schlesien bemerklich, in denen die Rotz-Wurmkrankheit die grösste Verbreitung erlangt hatte; am Schlusse des Berichtsjahres dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Pferden in 117 Beständen fort.

Die 1176 getödteten bzw. gefallenen Pferde stellen einen Verlust von durchschnittlich 28,31 pCt. des Gesamtbestandes aller im Berichtsjahre verseuchten Bestände dar. Dieselbe Verhältnisszahl betrug 1883/84 34,30 und 1884/85 29,53 pCt., hat mithin in den letzten 3 Jahren ebenfalls abgenommen. Das Verhältniss der Verluste an getödteten bzw. gefallenen Pferden berechnet sich in den einzelnen Provinzen während den beiden letzten Berichtsjahre, wie folgt:

	1884/85	1885/86
Ostpreussen	37,29 pCt.	41,22 pCt.
Westpreussen	22,15 -	29,20 -
Brandenburg.....	46,00 -	15,77 -
Pommern.....	34,23 -	45,53 -
Posen.....	23,73 -	21,84 -
Schlesien	35,42 -	39,81 -
Sachsen	43,47 -	46,00 -
Schleswig-Holstein	29,03 -	16,66 -
Hannover	47,76 -	46,03 -
Westfalen	19,51 -	37,31 -
Hessen-Nassau	46,15 -	53,33 -

	1884/85	1885/86
Rheinprovinz	24,62 pCt.	21,00 pCt.
Hohenzollernsche Lande	0,00 -	0,00 -

Die 1176 getödteten bezw. gefallenen rotz - wurmkranken Pferde vertheilen sich in den einzelnen Quartalen und im ganzen Berichtsjahre wie folgt auf die einzelnen Provinzen:

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Im Berichtsjahre	Im Jahre 1884/85
Getödtete bezw. gefallene rotz-wurmkranke Pferde	274	313	323	266	1176	1525
Davon in:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1. Ostpreussen	14,25	14,70	15,79	12,41	14,37	9,31
2. Westpreussen	11,69	11,82	15,17	17,67	14,03	12,72
3. Brandenburg	2,92	9,27	3,42	23,68	9,44	8,33
4. Pomern	4,39	7,35	4,64	2,27	4,76	7,48
5. Posen	33,22	24,28	22,29	14,62	23,64	29,31
6. Schlesien	16,07	20,77	20,74	13,17	17,94	14,95
7. Sachsen	8,04	1,60	4,02	6,00	4,76	7,87
8. Schleswig-Holstein ..	1,09	0,32	0,00	0,38	0,43	1,18
9. Hannover	1,46	0,63	4,02	3,77	2,46	2,10
10. Westfalen	0,86	3,51	3,72	0,88	2,13	0,52
11. Hessen-Nassau	3,60	0,96	0,62	0,38	1,36	1,97
12. Rheinprovinz	2,91	4,79	5,57	5,27	4,68	4,26
13. Hohenzollernsche Lande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Von den östlichen Provinzen macht sich in Ostpreussen, Westpreussen, Brandenburg und Schlesien eine Steigerung der Verhältnisszahlen gegen das vorige Berichtsjahr bemerklich, welche im Wesentlichen auf den Umstand zurückzuführen sein dürfte, dass die Rotz-Wurmkrankheit vielfach in Beständen grösserer Güter auftrat und in diesen durch Tödtung einer grösseren Anzahl von Pferden getilgt werden musste.

Wir stellen nunmehr, wie Seite 28—54 unseres IX. Jahresberichtes, die Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in den einzelnen Regierungsbezirken zusammen und führen ausserden genauer diejenigen Seuchenausbrüche an, in denen eine grössere Anzahl von Pferden desselben Bestandes getödtet wurde bezw. gefallen ist, oder das Herrschen der Seuche durch mehrere Quartale fort dauerte. Der Kürze wegen wollen wir diese Seuchefälle, wie in früheren Berichten, als „grössere Rotz-ausbrüche“ bezeichnen.

28 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal							Im zweiten Quartal							Im dritten			
		Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.		Pferde			Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.		Pferde			Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.	Zahl der Geböfte.
		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Geböfte.	erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche Anordnung getödet.	auf Veranlassung der Besitzer getödet.	Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Geböfte.	erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche Anordnung getödet.	auf Veranlassung der Besitzer getödet.	Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Geböfte.	
1.	Ostpreussen	7	11	11	31	1	38	—	11	17	21	44	3	40	3	9	10	10	
2.	Westpreussen . . .	11	13	14	33	3	29	—	10	16	16	37	1	34	2	11	23	20	
3.	Brandenburg . . .	6	6	6	8	—	7	1	14	15	17	26	5	21	3	4	4	5	
4.	Pommern	7	10	10	12	1	11	—	9	12	14	23	2	20	1	7	12	13	
5.	Posen	17	31	32	76	—	91	—	17	35	35	73	5	69	2	16	28	30	
6.	Schlesien	21	26	30	44	3	38	3	27	40	42	67	5	55	5	16	21	22	
7.	Sachsen	8	9	9	21	—	21	1	4	4	4	5	—	5	—	8	8	8	
8.	Schlesw.-Holstein	2	2	2	3	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	
9.	Hannover	4	4	4	4	1	3	—	2	2	2	2	—	2	—	5	5	5	
10.	Westfalen	1	1	1	1	—	1	—	6	6	6	11	2	8	1	4	5	5	
11.	Hessen-Nassau . .	5	5	5	9	—	9	1	2	2	2	1	—	3	—	2	2	2	
12.	Rheinprovinz . . .	5	6	7	8	—	8	—	8	9	10	14	3	9	3	7	8	8	
13.	Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summa	94	124	131	250	9	258	7	111	159	170	304	26	267	20	89	126	138	
	Im Berichtsjahre 1884/85	115	204	215	474	25	475	9	117	189	201	439	19	422	28	92	128	140	
	Im Berichtsjahre 1885/86 mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	
	weniger	21	80	84	224	16	217	2	6	30	31	135	—	155	8	3	2	2	

ten Quartal				Im vierten Quartal						Im Berichtsjahre						Regierungs- bezirke, in denen die Rotz- Wurmkrankheit nicht beobachtet wurde, nebst An- gabe der seuche- frei gebliebenen Quartale.			
Pferde				Pferde						Pferde									
erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche An- ordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.	Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche An- ordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.	Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	Gesamtbestand der verseucht. Gehöfte.	erkrankt.		gefallen.	auf polizeiliche An- ordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.
48	3	48	—	5	5	5	22	—	30	3	20	34	38	386	145	7	156	6	Stralsund 1.—4. Q.
49	2	42	5	9	17	21	46	1	44	2	17	51	64	565	165	7	149	9	
10	—	10	1	8	11	15	56	—	62	1	18	33	40	704	100	5	100	6	
12	1	13	1	5	6	6	4	—	4	2	16	37	41	123	51	4	48	4	
70	—	69	3	11	17	17	26	1	36	2	24	71	74	1272	245	6	265	7	
64	4	48	15	10	14	14	32	2	33	—	39	78	93	530	207	14	174	23	
13	1	9	3	8	9	10	14	—	15	1	18	24	27	122	53	1	50	5	
—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	4	4	4	30	5	—	4	1	
12	—	11	2	5	6	6	9	—	9	1	12	16	16	63	27	1	25	3	
12	2	9	1	1	1	1	1	1	—	—	11	12	13	67	25	5	18	2	
2	—	2	—	1	1	1	—	—	1	—	9	9	9	30	12	—	15	1	
15	1	17	—	5	5	5	11	1	12	1	14	22	24	262	48	5	46	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
307	14	278	31	69	93	102	222	6	247	13	202	391	443	4154	1083	55	1050	71	Sigmaringen 1. bis 4. Qu.
281	14	292	15	83	108	114	204	5	218	3	208	505	574	5164	1398	63	1407	55	
26	—	—	16	—	—	—	18	1	29	10	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	14	—	14	15	12	—	—	—	—	6	114	131	1010	315	8	357	—	

1. Ostpreussen.

Die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten bezw. gefallenen Pferde beträgt 14 bezw. 27 mehr als im vorhergehenden Berichtsjahr; 1884/85 blieben 20, 1885/86 16 Kreise der Provinz frei von der Rotz - Wurmkrankheit. Am Schlusse des Berichtsjahres dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Pferden in 7 Beständen fort.

Von den 169 getödteten bezw. gefallenen Pferden gehören 130

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	
1.	Fischhausen	—	—	2	2	—	—	—	—	2	27	2	1	2	2	Königsberg
2.	Friedland	—	—	1	1	—	—	—	—	1	8	1	1	40	3	
3.	Gerdauen	—	—	—	—	1	3	—	—	1	23	3	—	—	—	
4.	Heiligenbeil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	10	
5.	Königsberg, Stdt.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	—	—	—	
6.	- Ldkr.	—	—	—	—	—	—	1	3	1	11	3	2	23	5	
7.	Labiau	—	—	3	8	—	—	—	—	3	8	8	3	9	9	
8.	Mohrungen	1	5	—	—	1	13	1	2	1	30	20	2	50	16	
9.	Neidenburg	2	2	—	—	—	—	—	—	2	9	2	5	10	6	
10.	Ortelsburg	—	—	1	1	1	3	—	—	2	4	4	—	—	—	
11.	Osterode	1	2	1	1	1	1	—	—	1	32	4	1	1	1	
12.	Rastenburg	1	3	—	—	—	—	—	—	1	4	3	1	11	2	
13.	Wehlau	—	—	1	1	2	3	1	3	2	16	7	—	—	—	
	Summa	5	12	9	14	7	24	3	8	18	175	58	17	179	54	
1.	Angerburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	80	43	Gumbinnen
2.	Goldap	—	—	1	5	1	19	—	—	1	27	24	—	—	—	
3.	Insterburg	2	2	7	16	—	—	—	—	9	39	18	1	8	1	
4.	Johannisburg	1	8	2	3	—	—	—	—	3	11	11	—	—	—	
5.	Lyck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	4	
6.	Niederung	—	—	—	—	1	2	1	23	2	31	25	1	2	2	
7.	Oletzko	—	—	1	2	—	—	—	—	1	6	2	—	—	—	
8.	Pilkallen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
9.	Sensburg	—	—	1	6	1	6	—	—	1	17	12	—	—	—	
10.	Stallupönen	2	17	—	—	—	—	—	—	2	78	17	1	16	1	
11.	Tilsit	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	1	83	35	
	Summa	5	27	12	32	3	27	2	25	20	211	111	8	202	88	

den nachstehend genannten 14 Beständen an, welche zusammen 84 pCt. verloren.

	Kr. Labiau,	4 Pferde,	4 Pferde,	— Pferde.
Popelken,	- Mohrungen,	33 -	20 -	— -
Auer,	- Sensburg,	29 -	4 -	— -
Raaschken,	- Wehlau,	14 -	4 -	1 -
Zoppen,	- Goldap,	24 -	23 -	1 -
Wissupönen,	- Insterburg,	13 -	5 -	2 -
Jänischken (4 Geh.),	- -	7 -	6 -	1 -
Gillischken,	- Johannisburg,	8 -	8 -	— -
Kruppa Mühle,	- Niederung,	23 -	23 -	— -
Gross-Skirbst,	- Sensburg,	17 -	9 -	3 -
Bienken,	- Stallupönen,	16 -	15 -	1 -
Enzuhnen,				

Zusammen in 14 Geh. 188 Pferde, 121 Pferde, 9 Pferde.

Die Pferde in Popelken sind angeblich unterwegs oder in Gastställen inficirt worden. In Auer soll die Krankheit unter den Pferden, von denen im Jahre 1884/85 11 getödtet und 6 gefallen sind, seit 1879 geherrscht haben. Ein in dem zuletzt genannten Jahre zugezogener Schäfer hat bekundet, dass er seit jener Zeit „wohl über 60 theils getödtete, theils gefallene Pferde abgezogen habe.“ Am 10. September wurde die Rotz-Wurmkrankheit constatirt und schliesslich im 3. Quartal der Rest des Bestandes beseitigt. Im 4. Quartal erkrankten 2 neu angeschaffte Pferde, welche sich wahrscheinlich durch Berührung mit Pferden des getödteten Restbestandes inficirt hatten; es ist die Tödtung aller Arbeitspferde, welche mit dem getödteten Restbestande Berührung gehabt hatten, in Aussicht genommen, um diesen alten und lange Zeit verheimlichten Seucheherd zu tilgen. Zu dem Ausbruche in Zoppen soll Berührung mit den im Kreise Labiau an Rotz erkrankten Pferden Anlass geboten haben. In Wissupönen wurde die Rotz-Wurmkrankheit gelegentlich bei der Section eines an Kolik gefallenen Pferdes festgestellt. Dieselbe hatte früher bereits zweimal in demselben Bestande geherrscht und war zuletzt 1 $\frac{3}{4}$ Jahre vorher für erloschen erklärt worden. Nachdem noch weitere 4 Pferde getödtet und bei der Section rotzkrank befunden worden waren, ordnete der Regierungs-Präsident die Tödtung des Restbestandes an; hierbei erwiesen sich von 19 Pferden nur 2 rotzfrei. In Jänischken wurde die Krankheit zuerst bei dem einzigen Pferde des Bäckers Pluskat constatirt, dasselbe war vielfach mit den Pferden des Besitzers Walther, welcher viel mit Pferden handelt, in Berührung gekommen. Sämmtliche 3 Pferde des Walthers erwiesen sich rotzkrank, dieselben waren durch Pferde des Eigenthümers Supplie angesteckt. Letzterer liess, als er von den Constatirungen der Krank-

heit bei den Pferden des Pluskat und Walther hörte, eiligst zwei seiner rotzkranken Pferde durch den Abdecker beseitigen. Die Rotz-ausbrüche in einem vierten Bestande zu Jänischken, in Gillischken, sowie in anderen Orten des Kreises Insterburg werden auf Infectionen durch die Pferde des Walther zurückgeführt. In Kruppa-Mühle ist die Rotz-Wurmkrankheit erst nach langem Zögern und nach vielfach wiederholten Untersuchungen festgestellt worden. Die Einschleppung der Rotz-Wurmkrankheit in den Bestand zu Gross-Skirbst erfolgte wahrscheinlich durch ein im September 1885 aus dem Kreise Labiau gekauftes Fohlen, dasselbe erkrankte im November 1885 an Erscheinungen, welche für die der Druse gehalten wurden. Der Besitzer beachtete diese Erkrankungen nicht, er zog einen Thierarzt erst zu Rathe, als im Januar 1886 eine grössere Anzahl von Pferden unter denselben Erscheinungen erkrankte. Unmittelbar darauf wurde die Rotz-Wurmkrankheit bei einem aus Gross-Skirbst nach Tilsit verkauften Pferde constatirt. Auf Anordnung des Regierungs-Präsidenten wurde der ganze Bestand getödtet, 10 Pferde erwiesen sich bei der Section frei von Rotz. Der Besitzer führt zu seiner Entschuldigung an, dass ihm bis dahin von der Rotz-Wurmkrankheit nicht das Mindeste bekannt gewesen sei. In dem Pferdebestande zu Bienken soll die Rotz-Wurmkrankheit in früheren Jahren wiederholt geherrscht haben. Die Einschleppung nach Enzuhnen erfolgte durch zwei in Russland angekaufte Pferde; dieselben wurden vor Constatirung der Rotzkrankheit heimlich beseitigt. Ueber den Ausbruch in Rauschken fehlen alle Angaben.

Die übrigen 39 rotz-wurmkranken Pferde vertheilen sich auf 24 Bestände mit zusammen 156 Pferden; unter denselben befinden sich 3 in Rastenburg getödtete Pferde eines umherziehenden Caroussel-Besitzers. In Annuschowken, Kr. Jahannisburg, wurden rotzkranken Pferde erst nach Monate langer Observation getödtet. Fünf rotz-wurmkranken Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Seuche angekauft, ein rotzkrankes Pferd wurde auf dem Markt in Willenberg ermittelt, drei Ausbrüche der Rotz-Wurmkrankheit werden auf Infection unterweges oder in Gastställen zurückgeführt.

2. Westpreussen.

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass die Zahl der verseuchten Bestände in beiden Regierungsbezirken der Provinz erheblich abgenommen hat; die der getödteten bzw. gefallenen Pferde beträgt im

Reg.-Bez. Danzig 21 mehr, im Reg.-Bez. Marienwerder dagegen 50 weniger als im vorigen Berichtsjahr. Namentlich hat sich die Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in den bisher stark verseuchten Kreisen Pr.-Stargard, Strassburg und Thorn vermindert. Im Jahre 1884/85 blieb nur der Kreis Elbing frei von der Rotz-Wurmkrankheit, dagegen wurden keine Ausbrüche derselben während des Berichtsjahres in den Kreisen Neustadt, Flatow, Dt.-Krone, Schlochau und Schwetz beobachtet. Die Observation von der Ansteckung verdächtigen Pferden dauerte am 1. April 1886 noch in 12 Gehöften des Reg.-Bez. Danzig und in 19 Gehöften des Reg.-Bez. Marienwerder fort.

Von den 165 getödteten bezw. gestorbenen Pferden entfallen 96 (58,80 pCt.) auf die nachstehend genannten 20 Gehöfte:

		Stadt Danzig,	8 Pferde Bestand,	5 Pferde getödtet.
Danzig,	Stadt	Danzig,	8 Pferde Bestand,	5 Pferde getödtet.
Güttland,	Landkr.	-	42 - -	14 - -
Klossow,	Kreis	Karthaus,	18 - -	5 - -
Alt-Münsterberg,	-	Marienburg,	21 - -	20 - -
Biesterfelde,	-	-	13 - -	6 - -
Neukirch,	-	-	49 - -	11 - -
Plutowo,	-	Kulm,	41 - -	6 - -
Mareese,	-	Marienwerder,	13 - -	4 - -
Klein Falkenau,	-	-	11 - -	6 - -
Cielenta,	-	Strassburg,	4 - -	4 - -
Gross-Schliowitz,	-	Tuchel,	13 - -	9 - -

In 16 Geh. 233 Pferde Bestand, 90 Pferde getödtet.

Hierzu kommen noch folgende Bestände, in denen die Rotz-Wurmkrankheit aus dem vorigen Jahre fortherrschte und im Laufe des Berichtsjahres getilgt wurde (s. IX. Jahresbericht, S. 32):

Mühlbanz,	Ldkr. Danzig,	15 Pf. Best.,	1 Pf. im Berichtsj.,	4 Pf. 1884/85 get.
Rommen,	Kr. Löbau,	16 - -	2 - -	3 - -
Riesenkirch,	- Rosenberg,	7 - -	1 - -	4 - -
Hofleben,	- Thorn,	33 - -	2 - -	9 - -

In 4 Geh. 71 Pf. Best., 6 Pf. im Berichtsj., 20 Pf. 1884/85 get.

Der Gesamtverlust in diesen 20 Gehöften betrug 38,16 pCt. des ursprünglich vorhandenen Bestandes.

In dem Bestande der Stadt Danzig wurde das Herrschen der Rotz-Wurmkrankheit im Beginn des Berichtsjahres durch Tödtten des Restbestandes getilgt. Im vorigen Jahre waren bereits 3 Pferde dieses Gehöftes getödtet worden. Der Ausbruch in Klossau wird auf Infection in Gastställen zurückgeführt. In Alt-Münsterberg brach die Rotz-Wurmkrankheit nach 5 Jahren von Neuem in einem Bestande aus, in welchem damals 36 Pferde getödtet und 13 Pferde übrig geblieben waren. Die wegen der localen und wirthschaftlichen Verhältnisse schwer durchführbare Observation ist erst nach 2 Jahren und 3 Monaten aufgehoben worden. Von den während des ersten Aus-

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.				
1.	Berent	2	2	1	1	—	—	—	—	3	4	3	5	6	5	Danzig
2.	Danzig, Stadt	1	5	1	2	3	3	—	—	4	20	10	2	9	4	
3.	Danzig, Landkr.	1	1	1	10	5	10	2	3	8	129	24	7	85	16	
4.	Elbing	—	—	—	—	2	2	—	—	2	3	2	—	—	—	
5.	Karthaus	1	1	—	—	2	6	1	1	3	23	8	4	6	5	
6.	Marienburg	1	11	—	—	1	7	2	19	3	83	37	3	12	6	
7.	Neustadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	51	16	
8.	Preuss.-Stargard	2	3	1	1	3	3	—	—	6	22	7	11	79	18	
	Summa	8	23	4	14	16	31	5	23	29	284	91	38	248	70	
1.	Flatow	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30	7	Marienwerder
2.	Graudenz	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	1	1	5	5	
3.	Konitz	1	1	—	—	2	2	2	2	4	15	5	2	3	2	
4.	Deutsch-Krone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	
5.	Kulm	—	—	2	4	2	2	3	6	4	94	12	2	49	9	
6.	Löbau	1	3	1	2	—	—	—	—	1	20	5	4	36	9	
7.	Marienwerder	—	—	4	10	3	4	3	6	6	51	20	1	2	1	
8.	Rosenberg	1	1	—	—	2	5	1	2	4	19	8	2	9	6	
9.	Schlochau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4	
10.	Schwet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	
11.	Strassburg	—	—	3	4	—	—	3	4	5	28	8	17	256	25	
12.	Stuhm	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	13	5	
13.	Thorn	1	1	1	2	—	—	—	—	2	34	3	13	213	45	
14.	Tuchel	—	—	—	—	5	5	4	4	6	13	9	1	1	1	
	Summa	6	9	12	23	14	18	16	24	35	281	74	54	628	124	

bruches vorhanden gewesenenen Pferden befanden sich auf dem Gehöft im 3. Quartal des Berichtsjahres noch 3, ausserdem 1 Pferd, welches unmittelbar nach Aufhebung der Sperre angekauft worden war und 5 Fohlen, welche von einem während des ersten Rotzausbruches vorhandenen Hengste stammten. Im 3. Quartal wurden 7, im 4. 13 Pferde getödtet, unter diesen litt eines an Lungen- und Knochenrotz, 10 an Lungenrotz. Die Diagnose „Lungenrotz“ wurde jedoch bei Untersuchung der dem pathologischen Institut der Berliner Thierarzneischule übersandten Cadavertheile nicht bestätigt. In Biesterfelde waren bei der ersten Untersuchung bereits 4 Pferde in hohem Grade rotzkrank, eines dieser Pferde soll nur Rotzknoten in den

Lungen und Vernarbungen am Gaumensegel gezeigt haben; die Einschleppung wurde nicht ermittelt. In Neukirch muss die Rotz-Wurmkrankheit schon lange vor Constatirung derselben in dem Bestande geherrscht haben, bei der ersten Untersuchung waren 11 Pferde mit der Krankheit behaftet. Die starke Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in Gross-Schliowitz soll dadurch veranlasst sein, dass der Amtsvorsteher der von den Besitzern geleisteten Anzeige längere Zeit keine Beachtung geschenkt hatte. Das statistische Material enthält bezüglich der Ausbrüche in Gütlland, Plutowo, Mareese, Kl. - Falkenau und Cielenta nur die nackten Zahlen.

Abgesehen von den Seite 33 aufgeführten grösseren Rotzherden sind 69 rotz-wurmkrankte Pferde gefallen bzw. getödtet worden; dieselben vertheilen sich auf 44 Bestände mit zusammen 261 Pferden, der Verlust in diesen Beständen, von denen zusammen 3 sich im Besitze von Handwerkern in den kleinen Städten bzw. von umherziehenden Hausirern befanden, beträgt im Durchschnitt 26,44 pCt.

Vier rotz-wurmkrankte Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Seuche angekauft, unter diesen 1 in Polen; je 1 rotzkrankes Pferd wurde auf den Märkten in Schönburg, Pr.-Stargard, Neuteich, Deutsch-Eylau bzw. bei Beaufsichtigung der Rossschlächtereien in Elbing ermittelt, und ein Ausbruch wird auf Infection unterwegs oder in Gastställen zurückgeführt. In Pillitz, Kr. Strassburg, waren Rotzkrankungen auch schon früher unter Pferden desselben Bestandes beobachtet worden. Je ein in Cielenta, Kr. Strassburg, und in Schliowitz, Kr. Tuchel, getödtetes Pferd war in der Form des Lungenrotzes erkrankt, und auch über ein in Neuendorf, Kr. Elbing, rotzkrank befundenes Pferd wird berichtet: „Der Rotz hatte seinen Sitz in dem gesammten Lymphgefässsystem, namentlich in den Mesenterialdrüsen, demnächst in beiden Lungenflügeln, in der Leber und in der Milz.“

Die Zahl der verseucht gewesenen Bestände grösserer Güter hat sich von 20 im Jahre 1884/85 auf 12 im Berichtsjahre vermindert, und unter den letzteren befinden sich 3, in denen das Herrschen der Krankheit aus dem vorigen Jahre fort dauerte.

Mehrfach wurden in den Fällen, in welchen die Constatirung der Krankheit bei gekauften Pferden bzw. auf Märkten oder in Rossschlächtereien erfolgte, bei den Untersuchungen der betreffenden Bestände eine grössere Anzahl von rotzkranken Pferden ermittelt. Die Anzeigepflicht ist noch vielfach vernachlässigt worden.

3. Brandenburg.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene Pferde.	
1.	Angermünde	—	—	1	3	—	—	1	2	2	35	5	—	—	—	Potsdam
2.	Brandenburg, St.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	
3.	Nieder-Barnim	1	3	—	—	—	—	—	—	1	28	3	4	34	10	
4.	Beeskow-Storkow	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	4	
5.	Ost-Havelland	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	
6.	West-Havelland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	7	
7.	Jüterbog- Luckenwalde	—	—	2	4	—	—	—	—	2	4	4	2	17	4	
8.	Prenzlau	—	—	—	—	—	—	3	36	3	45	36	—	—	—	
9.	Ost-Priegnitz	—	—	2	2	—	—	1	1	3	79	3	3	5	3	
10.	Ruppin	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	1	5	14	7	
11.	Teltow	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	12	6	
12.	Templin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	
Summa		2	4	6	10	1	1	5	39	14	197	54	22	124	44	
1.	Arnsvalde	—	—	1	1	—	—	—	—	1	7	1	—	—	—	Frankfurt
2.	Frankfurt, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	
3.	Friedeberg	1	1	1	1	1	1	4	4	46	7	1	25	1	2	
4.	Guben	—	—	1	1	—	—	1	1	2	2	7	9	9	9	
5.	Königsberg	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	2	6	2	
6.	Krossen	1	1	1	1	—	—	1	1	2	4	3	11	36	27	
7.	Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	
8.	Lebus	—	—	1	5	—	—	—	—	1	5	5	5	16	13	
9.	Luckau	—	—	1	1	1	2	—	—	2	8	3	3	9	5	
10.	Soldin	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	
11.	Spremberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	
12.	Sorau	1	1	1	1	—	—	1	3	3	21	5	1	2	1	
Summa		3	3	9	13	2	3	4	9	17	97	28	34	111	63	
Berlin		1	1	2	6	2	7	6	15	9	410	29	12	41	20	

Die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten bzw. ge-
fallenen Pferde beträgt 28 bzw. 16 weniger als im vorhergegangenen
Berichtsjahre; 1884/85 blieben 13, 1885/86 15 Kreise der Provinz
frei von der Rotz - Wurmkrankheit. Am 1. April 1886 standen 10
Bestände als der Ansteckung verdächtig noch unter Observation.

Grössere Rotzausbrüche wurden beobachtet in:

		Bestand	getödtet	gefallen
		28 Pferde,	3 Pferde,	— Pferde.
Höhnow,	Kr. Nieder-Barnim,	28	17	—
Köhnhof,	- Prenzlau,	25	16	—
Louisfelde,	- -	17	4	—
Zeitlow,	- Friedeberg,	35	4	—
Hohenwalde,	- Lebus,	5	4	1
Berlin (Riedel),	- Berlin,	36	12	1
- (Rohnke),	- -	9	9	—
Zusammen in 7 Geh.		155 Pferde,	65 Pferde,	2 Pferde.

In Höhnow waren bereits während des vorigen Berichtsjahres 6 Pferde getödtet worden. Ueber die Ausbrüche in Köhnhof und Louisfelde fehlen nähere Angaben, das statistische Material enthält nur die nackten Zahlen. In Zeitlow hatte die Rotz-Wurmkrankheit im Jahre 1883/84 geherrscht, es waren damals 9 Pferde getödtet und von diesen 8 rotzkrank befunden worden. Die Observation hatte bis zum 1. Juli 1884 gedauert. Von den 4 im letzten Quartal des Berichtsjahres getödteten Pferden waren 2 schon 1883 in dem Gehöft vorhanden gewesen, ein Pferd ist unmittelbar nach Aufhebung der Sperre angekauft worden. Der Ursprung der Krankheit in Hohenwalde ist nicht ermittelt worden. Die Seuche erlangte unter den Pferden des Fuhrherrn Riedel in Berlin eine so bedeutende Verbreitung, weil der Besitzer im Vertrauen auf den behandelnden Thierarzt, welcher die Krankheit als ungefährlich bezeichnete, die Anzeige längere Zeit unterliess und weil der Stall für den Bestand nicht ausreichte. Ein Theil der Pferde hatte Tages-, ein anderer Nachtdienst, die von der Arbeit heimkehrenden Pferde wurden stets in die freigewordenen Stände eingestellt. Die Einschleppung vermittelte ein krankes in Mecklenburg angekauftes Pferd. Bezüglich des Ausbruches unter den Pferden des Fuhrherrn Rohnke erwähnen die Berichte nur, dass gleich bei der ersten Untersuchung 5 Pferde rotzkrank befunden wurden.

Die 67 getödteten bzw. gefallenen Pferde der oben aufgeführten 7 Rotzherde bilden 60,36 pCt. des in der Provinz vorgekommenen Verlustes und zusammen mit den 6 in Höhnow während des vorigen Jahres getödteten Pferden 47,10 pCt. der ursprünglich vorhandenen Bestände.

Die übrigen 44 getödteten rotz-wurmkranken Pferde vertheilen sich auf 33 Bestände mit 549 Pferden; 9 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft worden, unter diesen je 1 in Russland, Mecklenburg und Braunschweig. Ein angekauftes Pferd wurde in dem mit 400 Pferden besetzten Depot No. 13 der Pferde-

bahn-Gesellschaft zu Charlottenburg rotzkrank befunden; weitere Erkrankungen sind in dem Bestande bis zum Schlusse des Berichtsjahres nicht vorgekommen. Auf dem Markte in Königs-Wusterhausen wurde die Rotz-Wurmkrankheit bei einem Pferde, in der Berliner Rossschlächtereien bei zwei Pferden ermittelt. Infectionen unterwegs oder in Rossschlächtereien sollen Anlass zu fünf Ausbrüchen der Rotz-Wurmkrankheit gegeben haben. In Neu-Hassendorf trat die Krankheit nach 3 Jahren von Neuem unter den Pferden eines früher verseucht gewesenen Bestandes auf. In Berlin wurde die Rotz-Wurmkrankheit zufällig bei der Section eines gefallenen Pferdes constatirt, welches während des Lebens keine verdächtigen Erscheinungen gezeigt hatte.

4. Pommern.

Im Reg.-Bez. Stralsund wurden keine Fälle von Rotz-Wurmkrankheiten beobachtet.

In den Reg.-Bez. Stettin und Köslin blieben 9 Kreise seuchefrei und sind 55 Pferde weniger getödtet worden bzw. gefallen als im vorigen Berichtsjahr, die rotzkranken Pferde vertheilen sich jedoch auf eine erheblich grössere Anzahl von Beständen. Am 1. April 1886 war das Herrschen der Seuche in fünf Gehöften noch nicht für erloschen erklärt worden.

Ein grösserer Rotzausbruch wurde nur in Klockenberg, Kr. Ueckermünde, beobachtet, wo in einem Bestande von 17 Pferden 7 getödtet werden mussten. Die Einschleppung erfolgte durch Ankauf eines Pony; derselbe stammte aus einem Bestande, in welchem später das Herrschen der Rotz-Wurmkrankheit constatirt wurde und ist bald darauf nach Warzin verkauft worden, wo er nach wenigen Wochen unter den Erscheinungen einer Lungenentzündung erkrankte und crepirte. Bei der Section dieses Pony inficirte sich der Kreisthierarzt Huth in Pasewalk, welcher an der Infectionskrankheit gestorben ist.

Die Rotzkrankungen entfallen mit wenigen Ausnahmen auf kleine Bestände; 17 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, ein rotzkrankes Pferd wurde auf dem Markte in Regenwalde ermittelt; zu 9 Ausbrüchen soll Infection unterwegs oder in Gastställen Anlass gegeben haben. In Müllershöhe, Kr. Randow, und in Zetzin, Kr. Dramburg, trat die Rotz-Wurmkrankheit nach 10 Monaten bzw. nach 5 Jahren von Neuem in früher verseucht gewesenen Beständen auf. Bei einem Pferde machten sich die ersten Krankheitserscheinungen 1½ Jahr nach der Infection bemerk-

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	
1.	Anklam	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	8	Stettin	
2.	Greifenhagen	3	4	1	1	—	—	—	—	4	6	5	3	4		3
3.	Kammin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	54	4		
4.	Naugard	1	1	—	—	1	1	—	—	2	2	2	—	—		
5.	Pyritz	—	—	1	1	—	—	1	1	2	7	2	2	30		30
6.	Randow	1	2	1	2	1	1	2	2	5	15	7	4	37		9
7.	Regenwalde	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—		
8.	Saatzig	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1		1
9.	Ueckermünde	—	—	2	8	—	—	—	—	2	18	8	—	—		—
10.	Usedom-Wollin	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	2	1	2		2
	Summa	6	8	7	14	3	3	3	3	19	52	28	13	136	57	
1.	Belgard	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	2	—	—	—	Köslin
2.	Bütow	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	
3.	Dramburg	—	—	—	—	—	—	1	1	1	21	1	1	12	1	
4.	Köslin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	
5.	Kolberg-Körlin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
6.	Lauenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
7.	Neu-Stettin	2	2	1	1	4	4	—	—	7	25	7	9	13	9	
8.	Rummelsburg	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
9.	Schievelbein	1	1	—	—	3	5	—	—	3	6	6	1	10	1	
10.	Schlawe	—	—	2	2	2	2	1	1	4	7	5	—	—	—	
11.	Stolp	—	—	3	4	—	—	—	—	3	7	4	2	55	40	
	Summa	4	4	7	9	10	12	3	3	22	71	28	16	96	54	
1.	Franzburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	2	Stralsund
2.	Grimmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51	1	
	Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	101	3	

lich. Oefters wurden der Seuche verdächtige Pferde trotz auffälliger Krankheitserscheinungen, und obgleich bereits andere Pferde des Bestandes sich rotzkrank erwiesen hatten, erst nach einer mehrere Wochen oder Monate hindurch fortgesetzten Observation getödtet.

5. Posen.

Die nachstehende Tabelle weist eine erhebliche Abnahme der Rotz-Wurmkrankheit in der Provinz Posen nach. Die Zahl

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre			Im Jahre 1884/85		
		verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. P.f.i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. P.f.i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene Pferde.
1.	Adelnau	—	—	1	1	1	1	—	—	2	36	2	3	51	7
2.	Birnbaum	—	—	—	—	3	7	2	2	4	92	9	1	5	1
3.	Bomst	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
4.	Buk	4	7	4	5	1	1	1	1	5	129	14	3	67	10
5.	Fraustadt	2	2	2	3	1	1	1	1	6	17	7	4	47	5
6.	Kosten	—	—	1	1	1	4	—	—	2	38	5	5	53	8
7.	Kroeben	1	1	3	7	1	2	—	—	4	10	10	9	55	14
8.	Krotoschin	1	10	2	3	1	1	—	—	3	119	14	3	91	22
9.	Obornik	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	74	12
10.	Pleschen	3	9	—	—	1	1	1	1	4	39	11	6	153	33
11.	Posen, Stadt	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	2	1	12	3
12.	Posen, Landkr.	1	1	1	10	—	—	—	—	2	74	11	1	71	4
13.	Samter	3	7	2	6	4	9	—	—	5	124	22	3	18	3
14.	Schildberg	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	8	113	18
15.	Schrimm	—	—	1	8	1	9	1	1	3	20	18	7	125	58
16.	Schroda	1	2	3	3	2	2	—	—	5	41	7	2	105	17
17.	Wreschen	4	20	3	6	—	—	—	—	5	63	26	4	34	12
	Summa	21	60	24	55	18	39	6	6	53	806	160	64	1075	228
1.	Bromberg, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2
2.	Bromberg, Ldkr.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	5	4
3.	Czarnikau	1	1	1	1	—	—	—	—	2	61	2	7	79	12
4.	Gnesen	4	12	2	6	7	23	8	21	8	149	62	6	58	20
5.	Inowraclaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	171	50
6.	Kolmar	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	3	47	4
7.	Mogilno	1	4	3	6	3	5	1	3	3	77	18	3	84	31
8.	Schubin	1	8	1	1	1	2	1	6	2	92	17	11	174	66
9.	Wirsitz	2	3	2	3	1	3	1	3	3	31	12	4	35	6
10.	Wongrowiec	1	2	1	3	—	—	—	—	1	53	5	6	149	24
	Summa	11	31	11	21	12	33	11	33	21	466	118	50	804	219

der verseuchten Bestände und der getödteten oder gefallenen Pferde hat sich um 40 bzw. 169 vermindert, 1884/85 waren nur der Kreis Meseritz, 1885/86 ausserdem noch die Kreise Bomst, Bromberg (Stadt) und Inowraclaw seuchefrei, und in den Kreisen Obornik, Schildberg, Bromberg (Landkreis) und Kolmar wurde die Krankheit nur bei je einem Pferde constatirt. Am 1. April 1886 dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Pferden in 33 Beständen fort, wobei in Betracht zu ziehen ist, dass die Observationszeit in der Provinz

Posen bei Ausbrüchen der Rotz-Wurmkrankheit unter den Beständen grösserer Güter fast der Regel nach über die durchschnittliche Zeit von 6 Monaten verlängert wird.

Von grösseren Rotzherden sind zunächst folgende zu erwähnen, in denen das Herrschen der Krankheit aus dem vorigen Jahre fort-dauerte und die Seuche im Laufe des Berichtsjahres getilgt wurde (s. IX. Jahresbericht, S. 38):

		Bestand	1884/85	im Berichtsjahre		
		45 Pf.	6 Pf. getödt.	5 Pf. getödt.	— Pf. gef.	— Pf. gef.
Posadowo,	Kr. Buk,	45	9	10	—	—
Gorecki,	- Krotoschin,	41	9	10	—	—
Klein-Ciesle,	- Wreschen,	25	7	14	—	—
Dobieszewo,	- Schubin,	48	21	8	—	—
Dziewierszno.	- Wongrowiec,	53	3	4	—	1

Zusammen in 5 Geh. 212 Pf., 46 Pf. getödt.; 41 Pf. getödt., 1 Pf. gef.

In Kl.-Ciesle, Dobieszewo und Dziewierszno dauerte das Herrschen der Rotz-Wurmkrankheit aus dem Jahre 1883/84 fort; sie ist in den beiden erstgenannten Orten durch Tödtung des ganzen Pferdebestandes getilgt worden.

Im Berichtsjahre selbst wurden grössere Rotzausbrüche in den nachstehend genannten Orten constatirt:

		Bestand	getödtot	gefallen
		83 Pferde,	5 Pferde,	— Pferde.
Lubosz,	Kr. Birnbaum,	83	5	—
Michoczewo,	- Buk,	17	4	—
Zadory,	- Kosten,	36	4	—
Neu-Sielec,	- Kröben,	4	4	—
Gross-Zalesie,	- Krotoschin,	34	3	—
Smeja Mühle,	- Pleschen,	5	5	—
Trzuskatowo,	- Posen,	40	10	—
Kaiserhof,	- Samter,	44	6	—
Konsinowo,	- -	38	6	1
Sarbia,	- -	28	11	—
Zbrudszewo,	- Schrimm,	10	8	—
Poremba,	- -	9	9	—
Skompe,	- Wreschen,	30	6	—
Gross-Gutowy,	- -	18	3	—
Charlottenhof,	- Gnesen,	14	4	—
Piekary,	- -	35	16	—
Sulin,	- -	17	12	—
Imiolki,	- -	14	3	—
Strychowo,	- -	31	12	—
Szczytnik,	- -	4	4	—
Polskawies,	- -	25	9	—
Kompiel,	- -	5	5	—
Czewujewo,	- Mogilno,	42	8	1
Dobieszewioki,	- -	29	7	—
Herzberg,	- Schubin,	42	9	—
Stahren,	- Wirsitz,	26	7	—
Wissek,	- -	4	4	—

Zusammen in 27 Geh. 684 Pferde, 185 Pferde, 2 Pferde.

Die 229 in den oben genannten 32 Gehöften getödteten bezw.

gefallenen Pferde bilden 82,37 pCt. des gesammten auf die Provinz entfallenden Verlustes und 25,56 pCt. des in den betreffenden Gehöften ursprünglich vorhandenen Bestandes.

In Zadory hatte die Rotz-Wurmkrankheit vor mehreren Jahren unter den Pferden desselben Bestandes geherrscht. Die Rotz-Wurmkrankheit in Neu-Sielec kam dadurch zur amtlichen Kenntniss, dass ein diesem Bestande angehöriges Pferd rotzkrank auf dem Markte in Kobylin angetroffen wurde; die Infection soll unterwegs oder in Gaststätten erfolgt sein. In Gross-Zalesie trat die Seuche nach längerer Pause von Neuem in demselben Bestande auf. Der Ausbruch in Smeja-Mühle wurde durch Ankauf eines rotzkranken Pferdes auf dem Markte in Rawicz vermittelt, und auch in den Bestand des Gutes Trzuskatowo ist die Seuche durch ein gekauftes Pferd eingeschleppt worden. In Poremba wurden 9 Fohlen getödtet, welche auf dem im vorigen Jahre stark verseuchten Hauptgut Lowencice gestanden hatten. Zu dem Ausbruche in Skompe soll Infection unterwegs Anlass gegeben haben. In Imiolki und Wissek brach die Seuche nach 15 Monaten von Neuem in früher verseucht gewesenen Beständen aus; dieselbe ist von Sulin aus auf den Bestand in Strychowo verschleppt worden. Der Ausbruch in Czewujewo wird auf Einschleppung aus Polen zurückgeführt. Bezüglich der übrigen in der Tabelle S. 41 aufgeführten Rotzherde fehlen nähere Angaben vollständig, oder es wird nur erwähnt, dass die Einschleppung nicht ermittelt werden konnte. Die zum Theil sehr bedeutende Verbreitung in den betreffenden Beständen scheint hauptsächlich durch Verzögerung der Anzeige bedingt worden zu sein, in vielen Fällen wurde eine grössere Anzahl von Rotzkrankungen gleich bei der ersten Untersuchung der Bestände ermittelt.

Die übrigen 49 in der Provinz getödteten bzw. gefallenrn rotzwurmkranken Pferde vertheilen sich auf 42 Bestände mit zusammen 376 Pferden; 27 rotzkranken Pferde gehörten Handwerkern oder Handelsleuten in den kleinen Städten, welche ihr Gewerbe im Umherziehen betreiben, 11 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, unter diesen 2 in Polen, 1 rotzkrankes Pferd wurde auf dem Markt in Kobylin angetroffen, fünf Ausbrüche werden auf Infection unterwegs oder in Gaststätten zurückgeführt, in einem Falle wurde die Infection durch Benutzung des Geschirres von einem anderen rotzkranken Pferde vermittelt. In Niepruszewo, Kr. Buk, trat die Krankheit nach längerer Zeit in einem früher verseuchten Bestande

von Neuem auf. In Gross-Zalesie, Kr. Krotoschin, wurde Lungenrotz bei einem alten Pferde constatirt, welches schon seit längerer Zeit zu dem Bestande des Gutes gehörte. Ein unter verdächtigen Erscheinungen erkranktes Pferd ist erst nach 5 Monate langer Observation getödtet worden.

6. Schlesien.

Die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten oder gefallenen Pferde beträgt 19 bzw. 17 weniger als im vorigen Berichtsjahre, 1884/85 blieben 20, 1885/86 25 Kreise der Provinz frei von der Rotz-Wurmkrankheit, am 1. April 1886 dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Pferden in 14 Gehöften fort.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre		Im Jahre 1884/85		Regierungs-Bezirk.		
		verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. in d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. in d. verseucht. Bestdn.		getödtete und gefallene Pferde.	
1.	Breslau, Stadt	3	3	3	4	2	2	—	—	8	15	9	8	72	11	Breslau
2.	- Landkr.	1	1	1	1	—	—	3	3	4	5	5	1	8	1	
3.	Frankenstein	2	6	—	—	—	—	—	—	2	6	6	2	2	2	
4.	Glatz	—	—	—	—	—	—	1	2	1	8	2	1	3	3	
5.	Guhrau	1	1	1	1	1	1	—	—	3	19	3	3	3	3	
6.	Militsch	—	—	—	—	2	4	—	—	2	11	4	1	6	1	
7.	Münsterberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	
8.	Namslau	1	1	1	2	1	12	2	14	2	60	29	2	48	8	
9.	Neumarkt	—	—	1	2	1	16	—	—	1	55	18	3	28	9	
10.	Neurode	—	—	1	1	—	—	—	—	1	25	1	—	—	—	
11.	Nimptsch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	7	
12.	Oels	5	7	7	11	3	3	2	4	14	68	25	2	6	2	
13.	Ohlau	1	1	—	—	1	1	—	—	2	6	2	1	2	2	
14.	Reichenbach	1	1	2	2	—	—	—	—	2	7	3	6	28	8	
15.	Schweidnitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
16.	Steinau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	3	
17.	Striegau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
18.	Trebnitz	1	1	1	5	—	—	—	—	2	37	6	4	32	8	
19.	Waldenburg	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
20.	Wartenberg	1	1	1	11	2	17	—	—	3	33	29	1	2	1	
21.	Wohlau	1	5	—	—	—	—	—	—	1	8	5	2	12	5	
	Summa	18	28	20	41	13	56	8	23	49	364	148	45	305	77	

44 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	
1.	Bunzlau	—	—	5	6	2	3	—	—	6	28	9	7	30	10	Liegnitz
2.	Freystadt	—	—	—	—	—	—	1	2	1	9	2	1	2	1	
3.	Glogau	1	2	1	1	—	—	1	1	2	40	4	3	21	5	
4.	Görlitz, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
5.	- Landkr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	
6.	Goldberg-Haynau	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
7.	Grünberg	—	—	1	1	1	1	—	—	2	9	2	—	—	—	
8.	Lauban	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	1	1	
9.	Liegnitz, Landkr	—	—	—	—	1	2	—	—	1	6	2	2	5	2	
10.	Löwenberg	2	2	1	2	1	1	—	—	4	10	5	—	—	—	
11.	Lüben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	
12.	Rothenburg	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	4	—	—	—	
13.	Sagan	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	
Summa		5	7	9	11	5	7	3	7	20	113	32	21	70	27	
1.	Beuthen	1	2	—	—	1	1	—	—	2	3	3	2	3	2	Oppeln
2.	Grottkau	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	1	3	10	6	
3.	Kattowitz	—	—	1	1	1	1	1	1	2	3	3	—	—	—	
4.	Kosel	2	3	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	7	7	
5.	Kreuzburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	6	
6.	Leobschütz	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	3	8	4	
7.	Lublinitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	
8.	Neisse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	
9.	Neustadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	55	15	
10.	Oppeln	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	8	19	12	
11.	Pless	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	2	3	3	3	
12.	Ratibor	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	4	14	8	
13.	Rosenberg	1	1	2	2	—	—	—	—	3	3	3	3	60	14	
14.	Rybnik	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	2	2	44	12	
15.	Gross-Strehlitz	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	2	1	1	1	
16.	Tarnowitz	1	1	1	2	1	1	2	3	4	24	7	1	2	1	
17.	Tost-Gleiwitz	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	2	6	33	31	
Summa		7	9	12	13	4	4	4	5	24	53	31	46	275	124	

Am erfolgreichsten hat sich die Tilgung der Rotz-Wurmheit in dem früher stark verseuchten Reg.-Bez. Oppeln gezeigt, wie die nachstehende Vergleichung nachweist:

	verseuchte Bestände	getödtete und gefallene Pferde
1880/81:	—	583
1881/82:	—	147
1882/83:	65	133

	verseuchte Bestände	getödtete und gefallene Pferde
1883/84:	58	126
1884/85:	46	124
1885/86:	24	31

Grössere Rotzausbrüche wurden in den nachstehend genannten Orten beobachtet:

		Bestand	getödtet	gefallen
		5 Pferde,	5 Pferde,	— Pferde.
Schönwalde,	Kr. Frankenstein,			
Belmsdorf,	- Namslau,	34 -	34 -	— -
Gohlau,	- Neumarkt,	55 -	17 -	1 -
Oels,	- Oels,	5 -	4 -	— -
Miskau,	- -	6 -	3 -	1 -
Sunsdorf,	- Trebnitz,	36 -	5 -	— -
Orsen,	- Wartenberg,	24 -	20 -	1 -
Münchwitz,	- -	8 -	7 -	1 -
Losswitz,	- Wohlau,	8 -	5 -	— -
Neuhammer,	- Bunzlau,	7 -	3 -	1 -
Muskau,	- Rothenburg,	6 -	3 -	1 -
Georgenburg,	- Tarnowitz,	14 -	3 -	— -

Zusammen in 12 Geh. 208 Pferde, 109 Pferde, 6 Pferde.

Die in den zwölf Seucheherden getödteten bzw. gefallenen 115 Pferde bilden 50,44 pCt. des ganzen auf die Provinz entfallenden Verlustes und 55,30 pCt. des in den betreffenden Gehöften ursprünglich vorhandenen Bestandes.

In Belmsdorf hatte die Rotz - Wurmkrankheit unter demselben Bestande im vorigen Jahre geherrscht (s. IX. Jahresbericht, S. 42), sie trat nach längerer Pause von Neuem auf und wurde durch Tödtung des ganzen Bestandes getilgt; 6 Pferde waren ausschliesslich mit Lungenrotz behaftet und 11 Pferde sollen „grösstentheils in Form des Lungenrotzes“ erkrankt gewesen sein. Die Einschleppung in den Bestand zu Gohlau wurde durch ein aus Russland angekauftes Pferd bewirkt, dessen Krankheit längere Zeit nicht richtig beurtheilt worden ist und dadurch Anlass zu der starken Verbreitung der Seuche in dem betreffenden Bestande gab. Die Ausbrüche in Oels und Mirkau werden auf Infectionen in den Ställen der Wiesner'schen Brauerei in Breslau zurückgeführt, dieselbe Ursache soll auch noch zahlreiche Ausbrüche in anderen Beständen des Breslauer Landkreises und des Kreises Oels bedingt haben. In Losswitz und Neuhammer wurde die bereits im vorigen Berichtsjahre constatirte Rotz-Wurmkrankheit getilgt. Die Infection der Pferde in Muskau scheint durch Berührung mit kranken Pferden auf dem dortigen Bahnhof vermittelt zu sein. In dem Bestande zu Georgenburg trat die Seuche nach 1½ Jahren von Neuem auf. Bezüglich der übrigen grösseren Rotzausbrüche fehlen nähere

Angaben, oder es wird nur erwähnt, dass die Einschleppung nicht ermittelt wurde.

Abgesehen von den zwölf in der Tabelle genannten Seucheherden sind 96 Pferde getödtet worden bezw. gefallen, dieselben vertheilen sich auf 81 Bestände mit zusammen 222 Pferden. 16 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, unter diesen 5 in Polen, zusammen 3 rotz-wurmkrankte Pferde wurden auf den Märkten in Königshütte, Proskau und Sohrau, ebensoviele auf der Rossschlächtereie in Breslau ermittelt, sechzehn Ausbrüche der Seuche werden auf Infectionen unterwegs oder in Gastställen, unter diesen sieben auf Infectionen in den Ställen der Wiesner'schen Brauerei zu Breslau zurückgeführt. In Eckersdorf, Kr. Bunzlau, brach die Krankheit nach 2 Jahren, in Wiesau, Kr. Bunzlau, und Biegnitz, Kr. Glogau, nach 1 Jahr in früher verseuchten Beständen von Neuem aus. In Weigelsdorf, Kr. Oels, kam die zweite Erkrankung über 4 Monate nach der ersten vor. In den Kreisen Kattowitz und Ratibor wurde je ein der Seuche verdächtiges Pferd erst nach einer 5 bezw. 11 Monate lang fortgesetzten Observation getödtet.

In Cissowa, Kr. Kosel, war im Juni 1884 ein rotzkrankes Pferd getödtet, das zweite Pferd des Bestandes nach 6 Monaten aus der Observation entlassen worden. Im April 1885 kaufte der Besitzer ein zweites Pferd, welches bald darauf unter verdächtigen Erscheinungen erkrankte. Beide Pferde wurden getödtet, bei dem neu angekauften fanden sich nur frische Veränderungen, bei dem früher in Observation befindlich gewesenem dagegen die Erscheinungen des veralteten Lungenrotzes. Auch ein in Kattowitz getödtetes Pferd war ausschliesslich mit Lungenrotz behaftet.

7. Sachsen.

Die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten oder gefallenen rotz-wurmkrankten Pferde beträgt 33 bezw. 64 weniger als im vorigen Berichtsjahre, 24 Kreise der Provinz blieben frei von der Seuche; am 1. April 1886 dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Pferden in sieben Gehöften fort. In Eimersleben, Kr. Neuhaldensleben, wurde die bereits im vorigen Berichtsjahre bei 2 Pferden constatirte Rotz-Wurmkrankheit durch Tödtung des Restbestandes von 4 Pferden getilgt. Die durch Ankauf eines

kranken Pferdes in einen Bestand von 17 Pferden zu Dammendorf, Saalkreis, eingeschleppte Seuche machte die Tödtung von 4 Pferden

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre			Im Jahre 1884/85			
		verseuchte Bestände, getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und gefallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	Regierungs-Bezirk.		
1.	Aschersleben	—	—	—	—	—	—	1	2	1	25	2	5	26	8	Magdeburg
2.	Gardelegen	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4	10	7	
3.	Halberstadt	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	6	20	17	
4.	Jerichow I	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	2	—	—	—	
5.	Jerichow II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	5	
6.	Kalbe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	
7.	Magdeburg, Stdt.	1	2	1	1	—	—	1	2	3	7	5	1	34	5	
8.	Neuhaldensleben	2	7	—	—	—	—	—	—	2	9	7	9	26	15	
9.	Oschersleben	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	
10.	Osterburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	
11.	Salzwedel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	
12.	Stendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	
13.	Wanzleben	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3	3	1	2	2	
14.	Wernigerode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	4	
15.	Wolmirstedt	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	5	4	
	Summa	6	15	2	2	1	2	4	7	13	53	26	36	177	74	
1.	Halle, Stadt	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	2	7	3	Merseburg
2.	Mansfeld, Gebkr.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	2	1	
3.	Seokr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	8	
4.	Merseburg	—	—	1	2	1	2	1	1	3	5	5	7	16	11	
5.	Naumburg	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	—	—	—	
6.	Querfurt	—	—	—	—	1	2	—	—	1	3	2	2	11	11	
7.	Saalkreis	1	4	—	—	—	—	—	—	1	17	4	—	—	—	
8.	Sangerhausen	1	2	1	1	1	1	2	3	3	15	7	4	30	4	
9.	Torgau	—	—	—	—	1	1	1	3	2	8	4	1	1	1	
10.	Weissenfels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
11.	Wittenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	
12.	Zeitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
	Summa	3	7	2	3	6	8	5	8	13	57	26	23	97	44	
1.	Mühlhausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	Erfurt
2.	Nordhausen	—	—	—	—	1	3	1	1	1	12	4	—	—	—	
	Summa	—	—	—	—	1	3	1	1	1	12	4	1	2	2	

erforderlich. Unter einem Bestande von 10 Pferden in Tilleda, Kr. Sangerhausen, kamen in längeren Zwischenzeiten während des Berichtsjahres 4 Rotzkrankungen vor. Die Einschleppung wurde durch Ankauf eines belgischen Pferdes vermittelt. Von 12 Pferden eines Bestandes in Nordhausen wurden 4 rotzkrank befunden, die Infection soll in Gastställen erfolgt sein.

Die 40 ausserdem in der Provinz getödteten oder gefallenen Pferde vertheilen sich auf 23 Bestände mit zusammen 77 Pferden, 9 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, unter diesen eines in Belgien, je ein rotz-wurmkrankes Pferd wurde in den Rossschlächtereien zu Merseburg und Artern ermittelt. Ein Ausbruch der Seuche wird auf Infection unterwegs zurückgeführt.

Von 2 in Grabow, Kr. Jerichow I. getödteten Pferden war eines jedenfalls seit längerer Zeit latent lungenrotzig, auch bei 2 in Magdeburg getödteten Pferden traten die Erscheinungen besonders in den Lungen hervor. Einem Besitzer in Reckwitz, Kr. Torgau, waren während der letzten 5 Jahre 3 Pferde als rotzkrank getödtet worden, ein Pferd, welches sich schon über 10 Jahre in dem Gehöft befand, erwies sich, als es im vierten Quartal auf Veranlassung des Besitzers getödtet wurde, in hohem Grade mit Lungenrotz behaftet. Die beiden letzten Pferde wurden nun ebenfalls getödtet, bei der Section stellte sich heraus, dass eines mit Lungen- das andere mit Lungen- und Nasenrotz behaftet war. Auch bezüglich eines in Corbetha, Kr. Merseburg, getödteten Pferdes wird berichtet, dass dasselbe an frischem Lungenrotz gelitten hat.

8. Schleswig-Holstein.

Von den 5 rotz-wurmkrank befundenen Pferden wurde eines auf dem Markt in Wandsbeck und ein aus Hamburg stammendes auf der Rossschlächtereie in Altona ermittelt, ein drittes im Kreise Flensburg gehörte einem grösseren zum Zwecke des Verkaufes eingeführten Pferdetransport an. Die Ursachen des Ausbruches in einem Bestande des Kreises Pinneberg werden nicht erwähnt. Am Schlusse des Berichtsjahres stand kein Bestand unter Observation.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre		Im Jahre 1884/85			
		verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.		
1.	Altona, Stadt	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	4
2.	Eckernförde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
3.	Flensburg	—	—	—	—	—	—	1	1	1	25	1	1	4	1
4.	Pinneberg	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	72	10
5.	Schleswig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2
6.	Stormarn	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—
	Summa	1	3	1	1	—	—	1	1	4	30	5	7	90	18

9. Hannover.

Der Reg.-Bez. Aurich und 51 Kreise in den übrigen fünf Regierungsbezirken blieben frei von der Rotz-Wurmkrankheit, die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten bzw. gefallenen Pferde beträgt 2 bzw. 3 weniger als im vorigen Berichtsjahre. Am 31. März 1886 standen noch vier Bestände als der Ansteckung verdächtig unter Observation.

In Harnbarnsum wurde die bereits im vorigen Jahre constatirte Rotz-Wurmkrankheit (s. IX. Jahresbericht, S. 48), nachdem noch ein Pferd getödtet war, getilgt. In Moritzberg, Kr. Marienburg, wurde der ganze Bestand von 10 Pferden getödtet. Bei einem Pferde fanden sich sehr alte Veränderungen in den Lungen, es kann angenommen werden, dass dieses Pferd die übrigen inficirt hat. Dasselbe war aus dem Kreise Hameln angekauft und soll auch bei dem früheren Besitzer längere Zeit als der Seuche verdächtig unter Observation gestanden haben. Ein Pferd war kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit in Belgien angekauft worden, je ein rotz-wurmkrankes Pferd wurde auf dem Markte in Gifhorn bzw. auf der Rossschlächtere in Vienenburg ermittelt. Ein Ausbruch der Seuche wird auf Infection unterwegs zurückgeführt.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene Pferde.	
1.	Hameln	—	—	—	—	1	1	1	2	2	5	3	—	—	—	Hannover
2.	Hannover, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1		
3.	- Landkr.	—	—	—	—	—	—	2	2	2	8	2	2	5		
4.	Hoya	1	1	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—		
5.	Wennigsen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1		
	Summa	1	1	—	—	1	1	3	4	5	18	6	4	12	7	
1.	Alfeld	1	1	—	—	—	—	—	—	1	17	1	—	—	Hildesheim	
2.	Goslar	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—		
3.	Hildesheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	5		
4.	Ilfeld	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	2	—	—		
5.	Liebenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	12		
6.	Marienburg	—	—	—	—	1	6	1	4	1	11	10	1	19		4
	Summa	1	1	—	—	2	8	2	5	4	33	14	7	49	21	
1.	Celle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	Lüneburg	
2.	Dannenberg	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—		
3.	Gifhorn	—	—	1	1	1	3	—	—	2	4	4	1	1		
4.	Uelzen	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—		
	Summa	1	1	1	1	1	3	1	1	4	8	6	3	6	4	
	Osterholz	1	1	—	—	1	1	—	—	2	3	2	—	—	—	Stade
	Lingen	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—	Quadrak

10. Westfalen.

Die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten oder gefallenen rotz-wurmkranken Pferde beträgt 8 bzw. 17 mehr als im vorigen Berichtsjahre; 1884/85 blieben 31, 1885/86 25 Kreise der Provinz frei von der Seuche, am 31. März standen noch drei Bestände als der Ansteckung verdächtig unter Observation.

In Ostwennemaar, Kr. Hamm, erkrankten sämtliche 4 Pferde eines Bestandes, ein Pferd ist gefallen, 3 sind getödtet worden. Die Pferde waren kurz vorher im Kreise Soest angekauft; 7 rotz-wurm-

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	
1.	Münster	—	—	1	2	—	—	—	—	1	8	2	—	—	—	Münster
2.	Tecklenburg	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	1	—	—	—	
	Summa	—	—	1	2	1	1	—	—	2	13	3	—	—	—	
1.	Bielefeld	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	Minden
2.	Herford	—	—	1	1	1	2	—	—	2	3	3	—	—	—	
3.	Minden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	
4.	Warburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	
5.	Wiedenbrück	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	1	—	—	—	
	Summa	—	—	2	2	1	2	1	1	4	8	5	3	23	4	
1.	Altena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	Arnsberg
2.	Arnsberg	1	1	—	—	—	—	—	—	1	6	1	—	—	—	
3.	Bochum	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	2	1	16	2	
4.	Hagen	—	—	—	—	2	6	—	—	2	27	6	—	—	—	
5.	Hamm	—	—	1	4	—	—	—	—	1	4	4	—	—	—	
6.	Meschede	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	3	—	—	—	
7.	Soest	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	
	Summa	1	1	3	7	3	9	—	—	7	46	17	2	18	4	

krankte Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, eines wurde auf der Rossschlächtere in Unna ermittelt. Drei in Hagen getödtete rotz-wurmkrankte Pferde gehörten einem Circusbesitzer und stammten aus Polen. Auf der Abdeckerei in Schildische, Kr. Bielefeld, wurde ein aus dem Kreise Wiedenbrück stammendes Pferd secirt und mit Lungenrotz behaftet gefunden. Der Departementsthierarzt bezweifelt die Richtigkeit der Diagnose.

11. Hessen-Nassau.

Im Berichtsjahre verseuchten sieben Bestände und sind 15 Pferde weniger getödtet worden bzw. gefallen als im Jahre 1884/85, frei von der Rotz-Wurmkrankheit blieben 26 Kreise der Provinz, einer mehr als im vorigen Berichtsjahre. Kein Pferdebestand befand sich am Schlusse des Berichtsjahres unter Observation. In Niederswehren,

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. in d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. in d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.	Gesamtzahl d. Pf. in d. verseucht. Bestdn. getödtete und ge- fallene Pferde.	verseuchte Bestände, getödtete und ge- fallene Pferde.			
1.	Gersfeld	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	1	2	12	5	Kassel
2.	Hanau	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	6	3	
3.	Hofgeismar	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	
4.	Hünfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
5.	Kassel, Landkr.	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	4	—	—	—	
6.	Marburg	1	1	1	2	—	—	—	—	1	3	3	—	—	—	
	Summa	3	7	2	3	—	—	1	1	5	14	11	5	23	13	
1.	Biedenkopf	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	2	Wiesbaden
2.	Frankfurt	—	—	—	—	1	1	—	—	1	12	1	1	23	2	
3.	Rheingau	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	
4.	Unter-Taunusk.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	
5.	Ober-Wester- waldkreis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
6.	Unter-Wester- waldkreis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	
7.	Wiesbaden, Stdt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	
8.	Landkr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	5	
	Summa	2	3	—	—	2	2	—	—	4	16	5	11	42	17	

Landkreis Kassel, mussten sämmtliche 4 Pferde eines Bestandes getödtet worden. Dieselben wurden zur Abfuhr von Kehricht in Kassel benutzt. Eines dieser Pferde wurde auf der Rossschlächtereierotzkrank befunden und in Folge dessen die Tödtung der übrigen 3 Pferde angeordnet. Dieselben erwiesen sich bei der Section mit Rotz behaftet, obgleich sie während des Lebens keine Krankheitserscheinungen gezeigt hatten. Ein rotz-wurmkrankes Pferd war kurz vor Constatirung der Krankheit in Bayern angekauft worden. In Frankfurt a. M. wurde unter einem Bestande von 12 Pferden eines nach 1³/₄ Jahre fortgesetzter Observation getödtet.

12. Rheinprovinz.

Die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten bzw. gefallenen rotz-wurmkranken Pferde beträgt 4 bzw. 10 weniger als im vorigen Jahr, 1884/85 blieben 57, 1885/86 55 Kreise der Provinz

seuchefrei. Am 31. März 1886 dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Pferden in drei Gehöften fort.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre			Im Jahre 1884/85			Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Pf. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und gefallene Pferde.	
1.	Koblenz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	11	Koblenz	
2.	Kreuznach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	5		
3.	Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1		
4.	Simmern	1	1	2	2	—	—	—	—	3	5	3	—	—		
	Summa	1	1	2	2	—	—	—	—	3	5	3	6	31	17	
1.	Barmen, Stadt	—	—	1	1	—	—	1	6	1	8	7	—	—	Düsseldorf	
2.	Düsseldorf, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	9		
3.	Elberfeld, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4		
4.	Kempen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5		
5.	Mülheim	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	3	—	—		
6.	Solingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2		
	Summa	—	—	1	1	—	—	2	9	2	11	10	8	22	20	
1.	Gummersbach	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	Köln	
2.	Köln, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2		
3.	- Landkr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	4		
	Summa	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	4	15	6	
1.	Bitburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	Trier	
2.	Daun	2	3	—	—	1	3	—	—	2	6	6	—	—		
3.	Prüm	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5	5	—	—		
4.	Saarbrücken	1	1	2	4	2	6	1	1	4	209	12	6	153		
5.	Trier, Landkr.	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	2	—	—		
6.	St.-Wendel	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—		
	Summa	4	5	3	6	4	14	1	1	9	224	26	7	158	18	
1.	Aachen, Stadt	2	2	1	2	1	1	—	—	2	9	5	—	—	Aachen	
2.	- Landkr.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	3	38		
3.	Eupen	—	—	1	2	—	—	1	1	2	3	3	—	—		
4.	Heinsberg	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—		
5.	Malmedy	—	—	1	1	1	1	3	3	7	7	5	—	—		
	Summa	2	2	3	5	4	4	2	4	9	21	15	3	38	4	

Die Rotz-Wurmkrankheit unter den Grubenpferden der Grube Dudweiler, Kr. Saarbrücken, ist noch nicht getilgt (s. IX. Jahresber., S. 52). Seit dem Wiederauftreten der Seuche im Januar 1884 sind im Ganzen 20 Pferde getödtet worden, unter diesen 3 während des Berichtsjahres. Ausserdem wird über die nachstehend genannten grösseren Rotzausbrüche berichtet:

		Bestand	getödtet
Barmen,	Kr. Barmen,	8 Pferde,	7 Pferde.
Dockweiler,	- Daun,	5 -	5 -
Niederpriesen	- Prüm,	19 -	5 -
Grube Victoria	- Saarbrücken,	23 -	4 -
Aachen	- Aachen,	8 -	4 -
		<hr/>	
		Zusammen in 5 Gehöften 63 Pferde, 25 Pferde.	

Die Einschleppung in den Bestand zu Barmen erfolgte durch ein in Belgien angekauftes Pferd, 3 Pferde waren ausschliesslich mit Lungenrotz behaftet. Auch die Ausbrüche in der Grube Victoria und in Aachen sind durch ein in Lothringen bezw. in Belgien angekauftes Pferd vermittelt worden. Ueber die Einschleppung nach Dockweiler und Niederpriesen wird nicht berichtet; 5 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, unter diesen 2 in Belgien und 1 in Lothringen. In Malmedy erkrankten von 5 Pferden eines Bestandes 3 vorherrschend an Lungenrotz, die Infection ist wahrscheinlich durch Berührung mit kranken Frachtfuhrpferden in Belgien veranlasst worden. Ausserdem wird noch ein Ausbruch der Rotz-Wurmkrankheit auf Infection unterwegs zurückgeführt. Der Fall bei dem einzigen Pferde eines Besitzers in Manderscheid, Kr. Malmedy, wird als Lungenrotz bezeichnet.

In den Hohenzollernsche Landen ist während des Berichtsjahres keine Erkrankung an Rotz beobachtet worden.

In der Tabelle S. 55 stellen wir, wie S. 55 unseres IX. Jahresberichtes, die verseuchten Bestände und die auf polizeiliche Anordnung getödteten Pferde nach dem Verhältniss zusammen, in welchem sich dieselben auf grössere Güter, kleinere Landwirthschaften oder solche Besitzer vertheilen, deren Pferde in erster Linie zum Transport von Menschen oder Gütern verwendet werden. Diejenigen Bestände und Pferde, deren Benutzung aus dem statistischen Material nicht ersichtlich ist, haben wir in den Spalten mit der Ueberschrift „Unbestimmt“ besonders aufgeführt.

Laufende Nummer.	Regierungs- bezirk.	Verseuchte Bestände.					Auf polizeiliche Anordnung getödtete Pferde.				
		Grössere Güter.	Kleinere Landwirtschaften. Pferde zu Reisen und Fuhr- werk benutzt.	Unbestimmt.	Zusammen.	Grössere Güter.	Kleinere Landwirtschaften. Pferde zu Reisen und Fuhr- werk benutzt.	Unbestimmt.	Zusammen.		
1.	Königsberg	5	6	5	2	18	28	12	11	2	53
2.	Gumbinnen	6	14	1	—	21	71	30	2	—	103
3.	Danzig	5	11	6	3	25	48	20	10	3	81
4.	Marienwerder	7	19	4	3	33	28	32	5	3	68
5.	Potsdam	6	2	4	—	12	40	2	10	—	52
6.	Frankfurt	2	8	2	2	14	7	13	2	2	24
7.	Berlin	—	—	5	—	5	—	—	24	—	24
8.	Stettin	1	3	10	1	15	7	5	11	1	24
9.	Köslin	1	11	5	1	18	1	16	6	1	24
10.	Stralsund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	Posen	22	14	14	—	50	108	25	18	—	151
12.	Bromberg	14	4	1	1	20	100	8	4	2	114
13.	Breslau	7	26	11	3	47	64	34	19	3	120
14.	Liegnitz	3	10	—	4	17	5	17	—	4	26
15.	Oppeln	1	10	5	5	21	3	13	7	5	28
16.	Magdeburg	1	3	9	—	13	2	8	15	—	25
17.	Merseburg	2	5	3	—	10	8	8	5	—	21
18.	Erfurt	—	—	1	—	1	—	—	4	—	4
19.	Schleswig	—	1	1	1	3	—	2	1	1	4
20.	Hannover	—	4	1	—	5	—	5	1	—	6
21.	Hildesheim	1	1	1	—	3	1	8	2	—	11
22.	Lüneburg	—	1	2	—	3	—	1	4	—	5
23.	Stade	—	1	1	—	2	—	1	1	—	2
24.	Osnabrück	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
25.	Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	Münster	—	1	1	—	2	—	1	2	—	3
27.	Minden	—	—	2	—	2	—	—	2	—	2
28.	Arnsberg	—	2	4	—	6	—	4	9	—	13
29.	Kassel	—	3	1	1	5	—	4	5	1	10
30.	Wiesbaden	—	2	—	2	4	—	3	—	2	5
31.	Koblenz	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
32.	Düsseldorf	—	1	1	—	2	—	2	7	—	9
33.	Köln	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1
34.	Trier	—	3	5	—	8	—	10	13	—	23
35.	Aachen	—	2	3	2	7	—	2	8	2	12
36.	Sigmaringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	84	168	111	32	395	521	286	210	33	1050

Nach dieser Tabelle entfallen von den verseuchten Beständen:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	19,66 pCt.	21,27 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften .	41,21	42,53 -
auf Fuhrwerksbetrieb	32,70 -	28,10 -
unbestimmt	6,43 -	8,10 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

und von den auf polizeiliche Anordnung getödteten Pferden:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	46,27 pCt.	49,62 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften .	27,01 -	27,24 -
auf Fuhrwerksbetrieb	24,24 -	20,00 -
unbestimmt	2,48 -	3,14 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

Berechnet man dieselben Verhältnisszahlen für die Provinzen Ostpreussen, Westpreussen, Brandenburg (excl. Berlin), Pommern, Posen und Schlesien, so stellen sich dieselben wie folgt. Es entfallen von den verseuchten Beständen:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	25,13 pCt	25,72 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften .	39,41 -	44,37 -
auf Fuhrwerksbetrieb	28,57 -	21,87 -
unbestimmt	6,89 -	8,04 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

von den auf polizeiliche Anordnung getödteten Pferden:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	55,44 pCt.	58,75 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften .	22,97 -	26,15 -
auf Fuhrwerksbetrieb	19,11 -	12,10 -
unbestimmt	2,48 -	3,00 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

Nach der vorstehenden Vergleichung sind die Verhältnisszahlen, welche auf die grösseren Güter entfallen, etwas höher als im vorigen Jahre.

Die Tilgung der Rotz-Wurmkrankheit hat während des Berichtsjahres grössere Fortschritte gemacht, als in dem vorhergegangenen Jahre. Namentlich hat die Zahl der alten Rotzstationen erheblich abgenommen, und ist die Zahl der „grösseren Rotzausbrüche“ bedeutend geringer geworden. Von 1176 getödteten bezw. gefallenem rotz-wurmkranken Pferden entfallen 129 (10,98 pCt.) — 1884/85 308 (20,33 pCt.) — auf solche Bestände, in denen das Herrschen der Seuche aus dem vorhergehenden Berichtsjahre fort-dauerte. Es sind jedoch in den östlichen Provinzen auch während des Berichtsjahres nicht selten nach längerer oder kürzerer Frist wiederholte Ausbrüche der Rotz-Wurmkrankheit in früher ver-

seucht gewesenen Beständen beobachtet worden. Namentlich erwähnt das statistische Material derartige erneute Ausbrüche:

Ostpreussen	in	2	Beständen.
Westpreussen	-	2	-
Brandenburg	-	2	-
Pommern	-	2	-
Posen	-	5	-
Schlesien	-	6	-

zusammen in 19 Beständen,

3 weniger als im Jahre 1884/85. — Bezüglich der einzelnen Ausbrüche verweisen wir auf unsere Bemerkungen über das Auftreten der Seuche in den einzelnen Provinzen.

Im Allgemeinen hat sich häufiger und in grösserem Umfange als früher das Bestreben geltend gemacht, solche alte Rotzstationen durch Tödtung des Restbestandes — ohne Rücksicht auf die Zahl der Pferde — zu beseitigen. Dieses Verfahren ist namentlich im Reg.-Bez. Gumbinnen fast bei allen Ausbrüchen der Rotz-Wurmkrankheit in grösseren Beständen zur Ausführung gelangt, und dürfte gerade in diesem Landestheil mit Rücksicht auf die blühende Pferdezucht desselben ganz besonders gerechtfertigt erscheinen.

Die Anzeige von Ausbrüchen der Rotz-Wurmkrankheit ist auch während des Berichtsjahres vielfach sehr verspätet geleistet oder ganz unterlassen worden. Das statistische Material führt fast bei der Mehrzahl der grösseren Rotzausbrüche an, dass eine verhältnissmässig bedeutende Zahl Pferde gleich bei der ersten Untersuchung rotzkrank befunden wurde. Ebenso sind diejenigen Fälle nicht selten gewesen, in denen das Herrschen der Rotz-Wurmkrankheit durch das Erkranken von aus verseuchten Beständen verkauften oder zufällig bei Sectionen von an anderen Krankheiten gefallenen Pferden ermittelt wurde. An dem Unterlassen der Anzeige sind häufig die Thierärzte Schuld gewesen, welche unter verdächtigen Erscheinungen erkrankte Pferde behandelten und den Zustand der letzteren unrichtig beurtheilten, mitunter sogar die Besitzer abhielten die Anzeige von den Erkrankungen den Behörden zu erstatten. Die Verzögerung oder Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige giebt jedenfalls die wesentlichste Ursache ab, dass die Rotz-Wurmkrankheit in einzelnen Beständen so bedeutende Verluste veranlasst hat, und dass Verschleppungen der Seuche auf andere Bestände so häufig beobachtet wurden. Andererseits ist es in vielen Fällen gelungen, die Rotz-Wurmkrankheit bei rechtzeitiger Anzeige selbst in sehr grossen Beständen mit geringen Verlusten zu tilgen.

Nach dieser Tabelle entfallen von den verseuchten Beständen:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	19,66 pCt.	21,27 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften	41,21	42,58 -
auf Fuhrwerksbetrieb	32,70 -	28,10 -
unbestimmt	6,43 -	8,10 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

und von den auf polizeiliche Anordnung getödteten Pferden:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	46,27 pCt.	49,62 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften	27,01 -	27,24 -
auf Fuhrwerksbetrieb	24,24 -	20,00 -
unbestimmt	2,48 -	3,14 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

Berechnet man dieselben Verhältnisszahlen für die Provinzen Ostpreussen, Westpreussen, Brandenburg (excl. Berlin), Pommern, Posen und Schlesien, so stellen sich dieselben wie folgt. Es entfallen von den verseuchten Beständen:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	25,13 pCt.	25,72 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften	39,41 -	44,37 -
auf Fuhrwerksbetrieb	28,57 -	21,87 -
unbestimmt	6,89 -	8,04 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

von den auf polizeiliche Anordnung getödteten Pferden:

	1884/85:	im Berichtsjahr:
auf grössere Güter	55,44 pCt.	58,75 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften	22,97 -	26,15 -
auf Fuhrwerksbetrieb	19,11 -	12,10 -
unbestimmt	2,48 -	3,00 -
	<u>100,00 pCt.</u>	<u>100,00 pCt.</u>

Nach der vorstehenden Vergleichung sind die Verhältnisszahlen, welche auf die grösseren Güter entfallen, etwas höher als im vorigen Jahre.

Die Tilgung der Rotz-Wurmkrankheit hat während des Berichtsjahres grössere Fortschritte gemacht, als in dem vorhergegangenen Jahre. Namentlich hat die Zahl der alten Rotzstationen erheblich abgenommen, und ist die Zahl der „grösseren Rotzausbrüche“ bedeutend geringer geworden. Von 1176 getödteten bzw. gefallenen rotz-wurmkranken Pferden entfallen 129 (10,98 pCt.) — 1884/85 308 (20,33 pCt.) — auf solche Bestände, in denen das Herrschen der Seuche aus dem vorhergehenden Berichtsjahre fort-dauerte. Es sind jedoch in den östlichen Provinzen auch während des Berichtsjahres nicht selten nach längerer oder kürzerer Frist wiederholte Ausbrüche der Rotz-Wurmkrankheit in früher ver-

seucht gewesenen Beständen beobachtet worden. Namentlich erwähnt das statistische Material derartige erneute Ausbrüche:

Ostpreussen	in	2	Beständen.
Westpreussen	-	2	-
Brandenburg	-	2	-
Pommern	-	2	-
Posen	-	5	-
Schlesien	-	6	-

zusammen in 19 Beständen,

3 weniger als im Jahre 1884/85. — Bezüglich der einzelnen Ausbrüche verweisen wir auf unsere Bemerkungen über das Auftreten der Seuche in den einzelnen Provinzen.

Im Allgemeinen hat sich häufiger und in grösserem Umfange als früher das Bestreben geltend gemacht, solche alte Rotzstationen durch Tödtung des Restbestandes — ohne Rücksicht auf die Zahl der Pferde — zu beseitigen. Dieses Verfahren ist namentlich im Reg.-Bez. Gumbinnen fast bei allen Ausbrüchen der Rotz-Wurmkrankheit in grösseren Beständen zur Ausführung gelangt, und dürfte gerade in diesem Landestheil mit Rücksicht auf die blühende Pferdezucht desselben ganz besonders gerechtfertigt erscheinen.

Die Anzeige von Ausbrüchen der Rotz-Wurmkrankheit ist auch während des Berichtsjahres vielfach sehr verspätet geleistet oder ganz unterlassen worden. Das statistische Material führt fast bei der Mehrzahl der grösseren Rotzausbrüche an, dass eine verhältnissmässig bedeutende Zahl Pferde gleich bei der ersten Untersuchung rotzkrank befunden wurde. Ebenso sind diejenigen Fälle nicht selten gewesen, in denen das Herrschen der Rotz-Wurmkrankheit durch das Erkranken von aus verseuchten Beständen verkauften oder zufällig bei Sectionen von an anderen Krankheiten gefallenen Pferden ermittelt wurde. An dem Unterlassen der Anzeige sind häufig die Thierärzte Schuld gewesen, welche unter verdächtigen Erscheinungen erkrankte Pferde behandelten und den Zustand der letzteren unrichtig beurtheilten, mitunter sogar die Besitzer abhielten die Anzeige von den Erkrankungen den Behörden zu erstatten. Die Verzögerung oder Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige giebt jedenfalls die wesentlichste Ursache ab, dass die Rotz-Wurmkrankheit in einzelnen Beständen so bedeutende Verluste veranlasst hat, und dass Verschleppungen der Seuche auf andere Bestände so häufig beobachtet wurden. Andererseits ist es in vielen Fällen gelungen, die Rotz-Wurmkrankheit bei rechtzeitiger Anzeige selbst in sehr grossen Beständen mit geringen Verlusten zu tilgen.

Aber auch diese einer Tilgung der Seuche so ungünstigen Verhältnisse haben sich während des Berichtsjahres wesentlich gebessert, wie die nachstehende Vergleichung zeigt:

Einige Wochen oder Monate vor Constatirung der Rotz-Wurmkrankheit waren angekauft:

1884/85: 153, 1885/86: 87 Pferde.

Bei Beaufsichtigung der Pferdemarkte wurden rotzkrank befunden in den beiden letzten Berichtsjahren je 13 Pferde; bei Beaufsichtigung der Rossschlächtereien:

1884/85: 23, 1885/86: 12 Pferde.

Von den oben genannten 112 Pferden waren 19 aus dem Auslande eingeführt, nämlich:

10 aus Russland oder Polen,
4 aus Belgien,
1 aus Bayern,
1 aus Braunschweig,
1 aus Hamburg,
1 aus Lothringen,
1 aus Mecklenburg.

Das statistische Material enthält keine Mittheilungen, welche geeignet wären die Ansicht zu unterstützen, nach welcher die starke Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in den Provinzen Westpreussen, Posen und Schlesien zum grossen Theil auf stets erneute Einschleppung der Seuche aus Polen zurückzuführen sein dürfte.

Nach den Angaben der Berichte sollen 43 Ausbrüche der Rotz-Wurmkrankheit durch Infection von Pferden unterwegs oder in Gaststätten veranlasst und die Ansteckung mehrfach auf Reisen in Polen bzw. in Belgien erfolgt sein. Anderseitig zeigt die Vergleichung S. 56, dass die Zahl der zum Transport von Menschen oder Gütern verwendeten Pferdebestände und die Zahl der zu solchen gehörenden rotz-wurmkranken Pferde gegen das vorhergehende Jahr abgenommen hat. Ebenso ist die Zahl der rotz-wurmkranken Pferde geringer geworden, welche von hausirenden Handelsleuten oder Handwerkern in den kleinen Städten der östlichen Provinzen zu ihrem Gewerbebetriebe benutzt werden. Die Berichte erwähnen keinen Fall, in welchem die in Schlesien angeordnete periodische Untersuchung der Hausirerpferde zur Ermittlung eines rotz-wurmkranken Pferdes geführt hat. Dagegen sind Ausbrüche der Rotz-Wurmkrankheit mehrfach bei Pferden von Pferdehändlern und von reisenden Künstlergesellschaften beobachtet worden.

Aus dem Berichtsmaterial ergibt sich ferner, dass die Erkran-

kungen einzelner Pferde in den verseuchten Beständen auch während des letzten Jahres nicht selten in längeren Zwischenzeiten auf einander folgten bzw. dass der Ansteckung verdächtige Pferde erst im 5. oder 6. Monate der über dieselben verhängten Observation die ersten Erscheinungen der Erkrankung zeigten. Diese Beobachtungen liefern den Beweis, dass die Anordnung, nach welcher in den östlichen Provinzen die Observation bei grösseren Pferdebeständen über die Minimalzeit von 6 Monaten verlängert werden soll, eine durchaus zweckentsprechende ist und vielfach zur Verhinderung einer Seucheverschleppung beigetragen hat. Anderseitig ist zu bedauern, dass der Seuche verdächtige Pferde nicht selten Monate lang unter Stallsperrung gehalten worden sind, bevor die Tödtung derselben angeordnet wurde. Derartige Verzögerungen der nothwendigsten und wichtigsten Tilgungsmassregel sind öfter auch in Beständen vorgekommen, welche bereits Verluste durch die Rotz-Wurmkrankheit erlitten hatten, und in denen die betreffenden Pferde demnach gleichzeitig der Seuche und der Ansteckung verdächtig waren.

Nach Angabe der Berichterstatter waren im Ganzen 35 Pferde — fast genau 3,00 pCt. der getödteten und gefallenen — lediglich mit Lungenrotz ohne gleichzeitig vorhandene krankhafte Veränderungen in den Nasenhöhlen oder in der Haut behaftet. Im vorigen Jahre war der Lungenrotz in der eben genannten Bedeutung des Wortes bei 61 Pferden (4,33 pCt. der auf polizeiliche Anordnung getödteten) beobachtet worden.

Die angeblich mit Lungenrotz behafteten Pferde stellen wir S. 60 tabellarisch zusammen, wir haben die Seucheorte mit * bezeichnet, welche in den Bemerkungen über die Verbreitung der Krankheit in den einzelnen Provinzen als „grössere Rotzausbrüche“ angeführt wurden.

Die Tabelle zeigt, dass die meisten Erkrankungen an Lungenrotz auf grössere oder auf alte Rotzherde entfallen. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen über die Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in den einzelnen Provinzen und erwähnen, dass vielfach die erheblichsten Bedenken gegen die Richtigkeit der Diagnose des Lungenrotzes geltend zu machen sind.

Bei 103 auf polizeiliche Anordnung getödteten Pferden (9,81 pCt.) wurde das Vorhandensein der Rotz-Wurmkrankheit durch die Section nicht bestätigt. Dasselbe war 1884/85

Laufende Nummer.	Ort.	Kreis.	Regierungs- bezirk.	Zahl der Pferde in den verseucht. Beständen.	Zahl der getödteten u. gefallenen Pferde.	Zahl der lediglich mit Lungenrotz behaftet. Pferde.
1.	Neuendorf	Elbing	Danzig	2	1	1
2.	Alt-Münsterberg*	Marienburg	-	21	20	11
3.	Biesterfelde*	-	-	13	6	1
4.	Cielenta*	Strassburg	Marienwerder	4	4	1
5.	Gross-Schliewitz*	Tuchel	-	13	9	1
6.	Clausdorf	Soldin	Frankfurt	2	1	1
7.	Gross-Zalesie*	Krotoschin	Posen	34	3	1
8.	Belmsdorf*	Namslau	Breslau	34	34	6
9.	Cissowa	Kosel	Oppeln	2	1	1
10.	Kattowitz	Kattowitz	-	1	1	1
11.	Grabow	Jerichow I	Magdeburg	2	2	1
12.	Corbetha	Merseburg	Merseburg	2	2	1
13.	Lauchstedt	-	-	2	2	1
14.	Reckwitz	Torgau	-	3	3	2
15.	Schildische	Bielefeld	Minden	1	1	1
16.	Barmen*	Barmen	Düsseldorf	8	7	3
17.	Manderscheid	Malmedy	Aachen	1	1	1
Summa				145	98	35

bei 148 Pferden (10,52 pCt.) der Fall. Die im Berichtsjahr bei der Section nicht rotz-wurmkrank befundenen Pferde haben wir in der Tabelle S. 61 zusammengestellt, in derselben sind die in den Bemerkungen über die Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in den einzelnen Provinzen als „grössere Rotzausbrüche“ bezeichneten Fälle mit * bezeichnet.

Das beigelegte Zeichen * weist nach, dass die meisten getödteten und bei der Section nicht rotzkrank befundenen Pferde auf die grösseren Rotzherde entfallen, in denen zum Zwecke einer Tilgung der Seuche ein bedeutender Theil des Bestandes getödtet werden musste.

Der Kreisthierarzt Huth in Pasewalk inficirte sich bei der Section eines rotzkranken Pferdes und ist nach kurzer Krankheit gestorben (s. S. 38). Weitere Fälle einer Erkrankung von Menschen in Folge von Rotzinfektion werden in dem Berichtsmaterial nicht erwähnt.

Die von den Provinzial- bzw. Communalverbänden für auf polizeiliche Anordnung getödtete oder vor bereits an-

Laufende Nummer.	Ort.	Kreis.	Regierungs- bezirk.	Zahl der Pferde in den versucht. Beständen.	Zahl der auf polizeil. Anordnung getödteten Pferde.	Zahl der bei der Section nicht rotz-wurmkrank befundenen Pferde.
1.	Auer*	Mohrungen	Königsberg	33	20	2
2.	Friedrichshof	Ortelsburg	-	3	3	1
3.	Tapiau	Wehlau	-	2	1	1
4.	Wissupönen*	Goldap	Gumbinnen	24	23	2
5.	Gillischken*	Insterburg	-	7	6	5
6.	Didlaken	-	-	2	2	1
7.	Kruppa Mühle*	Johannisburg	-	8	8	3
8.	Gross-Skirbst*	Niederung	-	23	23	10
9.	Bienken*	Sensburg	-	17	9	1
10.	Enzuhnen*	Stallupönen	-	16	15	3
11.	Tilsit	Tilsit	-	2	2	1
12.	Czersk	Konitz	Marienwerder	2	1	1
13.	Plutowo	Kulm	-	41	2	1
14.	Lissewo	-	-	2	2	1
15.	Siedletz	Marienwerder	-	2	2	1
16.	Christburg	Stuhm	-	2	2	1
17.	Schwedt	Angermünde	Potsdam	3	2	1
18.	Köhnshof*	Prenzlau	-	25	17	2
19.	Louisfelde*	-	-	17	16	5
20.	Braunsfelde	Friedeberg	Frankfurt	5	1	1
21.	Hohenwalde*	Lebus	-	5	4	1
22.	Schönwalde	Luckau	-	4	1	1
23.	Schievelbein	Schievelbein	Köslin	1	1	1
24.	-	-	-	2	1	1
25.	-	-	-	3	3	1
26.	Rawitsch	Kröben	Posen	2	1	1
27.	Gorecki*	Krotoschin	-	41	10	1
28.	Klein-Ciesle*	Wreschen	-	25	14	7
29.	Hammer	Czarnikau	Bromberg	2	1	1
30.	Charlottenhof*	Gnesen	-	14	3	1
31.	Piekary*	-	-	35	16	3
32.	Polskawies*	-	-	25	9	1
33.	Sulin*	-	-	17	12	4
34.	Szczytnik*	-	-	4	4	2
35.	Odrowacz	-	-	2	1	1
36.	Kompiel*	-	-	5	5	3
37.	Herzberg*	Schubin	-	42	9	3
38.	Dobieszewo*	-	-	48	8	5
39.	Drzewierszno*	Wongrowiec	-	53	4	1
40.	Belmsdorf*	Namslau	Breslau	34	34	1
41.	Noldau	-	-	26	2	1
42.	Gersdorf	Bunzlau	Liegnitz	2	1	1
43.	Neubausen	-	-	7	2	2
Summa				635	303	88

Laufende Nummer.	Ort.	Kreis.	Regierungs- bezirk.	Zahl der Pferde in den verseucht. Beständen.	Zahl der auf polizeil. Anordnung getödteten Pferde.	Zahl der bei der Section nicht rotz-wurmkrank befundenen Pferde.
44	Eimersleben*	Neuhaldensleben	Transport	635	303	88
45	Neuhaldensleben	-	Magdeburg	6	4	2
46	Altenweddingen	Wanzleben	-	3	3	1
47	Ober-Röblingen	Sangerhausen	-	1	1	1
48	Fechenheim	Hanau	Merseburg	2	1	1
49	Grebenstein	Hofgeismar	Kassel	3	2	1
50	Schönstedt	Marburg	-	1	1	1
51	Barmen*	Barmen	-	3	2	2
52	Niederpriesen*	Prüm	Düsseldorf	8	7	2
53	Malstedt	Saarbrücken	Trier	5	5	3
			-	3	3	1
Summa				670	332	103

geordneter Tödtung gefallene rotz-wurmkrankte Pferde gezahlten Geldbeträge haben wir in der folgenden Tabelle zusammengestellt und zur Vergleichung die entsprechenden Geldbeträge des Jahres 1884/85 wiederholt.

	Berichtsjahr 1884/85.		Berichtsjahr 1885/86.	
	Mark.	Pf.	Mark.	Pf.
1. Provinz Ostpreussen	18968	25	22214	46
2. - Westpreussen	39488	50	25244	50
3. - Brandenburg (ausschliesslich Berlin)	23039	25	17890	25
4. Berlin	1797	50	5862	50
5. Provinz Pommern	28660	—	8993	98
6. - Posen	100242	21	60247	61
7. - Schlesien	44354	—	44302	09
8. - Sachsen	41284	50	23575	25
9. - Schleswig-Holstein (ausschl. Kr. Lauenburg)	2776	—	1282	50
10. Kreis Herzogthum Lauenburg	—	—	—	—
11. Provinz Hannover	15205	—	7161	25
12. - Westfalen	3643	75	4989	25
13. Reg.-Bez. Kassel	2712	50	4018	75
14. - Wiesbaden (ausschliesslich Frankfurt a. M.)	4822	50	1162	50
15. Frankfurt a. M.	937	50	120	—
16. Rheinprovinz	22861	50	16844	50
17. Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—
Summa	350792	96	243912	39

Mithin beträgt die Gesamtsumme der Entschädigungen für auf polizeiliche Anordnung behufs Tilgung der Rotz-Wurmkrankheit getödtete Pferde

106880 Mark 57 Pfennige

weniger als im Berichtsjahre 1884/85. Nur in den Provinzen Ostpreussen, Westfalen, in Berlin und im Reg.-Bez. Kassel übersteigen die gezahlten Entschädigungssummen die entsprechenden des vorhergegangenen Jahres, in allen übrigen Landestheilen macht sich eine Verminderung der betreffenden Summen bemerklich. Im Durchschnitt betrug die für ein auf polizeiliche Anordnung getödtetes Pferd gezahlte Entschädigung

232 Mark 29 Pfennige oder 16 Mark 95 Pfennige weniger als im Jahre 1884/85.

Zur Bestreitung der Entschädigungskosten sind in den beiden letzten Jahren von den Pferdebesitzern an Beiträgen erhoben worden:

	Berichtsjahr 1884/85.			Berichtsjahr 1885/86.		
	Beitrag für jedes Pferd. Pfennige	Mark	Pf.	Beitrag für jedes Pferd. Pfennige	Mark	Pf.
1. Provinz Ostpreussen . . .	20	73575	80	20	74372	20
2. - Westpreussen . . .	20	39809	60	20	40153	50
3. - Brandenburg(ausschliessl. Berlin) .	12	28050 ¹⁾	—	5	11864 ⁴⁾	80
4. Berlin	20	5543 ¹⁾	—	15	4392 ⁴⁾	60
5. Provinz Pommern	30	54381	—	30	54723	—
6. - Posen	40, 60 ²⁾	111594	20	40, 60 ²⁾	113999	20
7. - Schlesien	bezw. 80 17,0639 ⁴⁾	46243 ¹⁾	12	bezw. 80 16,5502 ²⁾	45087 ⁴⁾	73
8. - Sachsen	10	17525 ⁴⁾	20	25	44540 ²⁾	25
9. - Schlesw.-Holstein (ausschliessl. Kr. Lauenburg) . . .	—	—	—	—	—	—
10. Kreis Herzogth. Lauenburg	10	748	12	—	—	—
11. Provinz Hannover	8	15367 ²⁾	68	8	15701 ²⁾	36
12. - Westfalen	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Diese Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1884.

²⁾ 40, 60 bezw. 80 Pfg. sind Einheitssätze bei Beständen von 1—10, 11—20, bezw. 21 und mehr Pferden.

³⁾ Die Beiträge sind zur Deckung der im Kalenderjahr 1883 bezw. 1884 gezahlten Entschädigungen erhoben worden.

⁴⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1885.

	Berichtsjahr 1884/85.			Berichtsjahr 1885/86.		
	Beitrag für jedes Pferd. Pfennige	Mark	Pf.	Beitrag für jedes Pferd. Pfennige	Mark	Pf.
13. Reg.-Bez. Kassel	20	9232	80	20	9282	60
14. - Wiesbaden)ausschl. Frankfurt a. M.)	30	4839	90	30	4815	30
15. Frankfurt a. M.	30	1083	90	—	—	—
16. Rheinprovinz	30	41999	10	30	42159	60
17. Hohenzollernsche Lande	50	2770 ¹⁾	—	50	2750 ²⁾	—

Aus der Staatskasse wurden an Entschädigungen für auf polizeiliche Anordnung behufs Tilgung der Rotz-Wurmkrankheit getödtete Pferde

26387 Mark 89 Pfennige

weniger gezahlt als im Jahre 1884/85, wie die nachstehende Vergleichung zeigt:

P r o v i n z .	Berichtsjahr 1884/85.		Berichtsjahr 1885/86.	
	Mark	Pf.	Mark	Pf.
1. Ostpreussen	24508	98	16390	12
2. Westpreussen	5524	83	2890	67
3. Brandenburg	4717	87	2649	82
4. Pommern	8543	83	534	67
5. Posen	17389	83	12820	67
6. Schlesien	11495	63	5756	49
7. Sachsen	5088	67	245	—
8. Schleswig-Holstein	676	—	—	—
9. Hannover	—	—	4001	—
10. Westfalen	51	—	135	—
11. Hessen-Nassau	722	—	3968	66
12. Rheinprovinz	1356	67	4320	32
13. Hohenzollernsche Lande	25	—	—	—
Summa	80100	31	53712	42

Auf die drei am stärksten verseuchten Provinzen Ostpreussen, Posen und Schlesien entfallen in den drei letzten Jahren in abgerundeten Procentsätzen von den aus der Staatskasse gezahlten Entschädigungen:

¹⁾ Diese Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1884.

²⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1885.

	1883/84:	1884/85:	1885/86:
Ostpreussen . . .	27,04 pCt.	30,60 pCt.	30,51 pCt.
Posen	25,40 -	21,71 -	22,00 -
Schlesien	7,05 -	14,35 -	10,71 -
zusammen	59,49 pCt.	66,66 pCt.	63,22 pCt.

Unverhältnissmässig hoch erscheint der auf Ostpreussen entfallende Betrag.

4. Die Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist nur in ganz vereinzelten Ausbrüchen aufgetreten und blieb bei denselben fast durchweg auf 1 bis 3 Bestände der verseuchten Ortschaften beschränkt. Von den letzteren entfallen 69 (52,27 pCt.) auf die Provinz Schlesien. Die zahlreichsten Ausbrüche wurden im dritten Quartal beobachtet.

Die in den nachstehenden Bemerkungen nicht erwähnten Regierungsbezirke blieben frei von der Maul- und Klauenseuche.

1. Reg.-Bez. Königsberg. Es verseuchten zwei Ortschaften des Kreises Neidenburg, in einer ist die Krankheit angeblich aus einem unmittelbar jenseits der Grenze gelegenen polnischen Dorfe eingeschleppt worden.

2. Reg.-Bez. Marienwerder. Die Ursachen des Ausbruches unter einem Bestande des Kreises Rosenberg sind nicht aufgeklärt worden. Die Seuche wurde in Westpreussen ferner bei aus Russland eingeführten Schweinen in Danzig, Thorn, Podgorze und auf dem Bahnhof Otloczyn festgestellt.

3. Reg.-Bez. Potsdam. Ausbrüche der Seuche wurden beobachtet in zusammen 13 Ortschaften der Kreise Angermünde, Nieder-Barnim, Ober-Barnim, Ost-Havelland, Jüterbog-Luckenwalde, Ost-Priegnitz und Templin. In vier Ortschaften beschränkte sich das Auftreten der Krankheit auf Schweine, in Rummelsberg wurde die Seuche bei je zwei aus Russland bzw. Ostpreussen eingeführten Schweinetransporten constatirt; in den anderen 3 Ortschaften ist die Einschleppung durch den Ankauf von Handelsschweinen vermittelt worden. In den übrigen 9 Orten erkrankten theils Rindviehstücke allein oder ausserdem noch Schafe und Schweine. Die Einschleppung erfolgte in 6 Orten durch Ankauf von Schweinen, in 2 Orten durch

66 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal						Im zweiten Quartal						Im drit					
		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Zahl der Gehöfte.	er-krankt		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Zahl der Gehöfte.	er-krankt		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Zahl der Gehöfte.		
			St. Rindvieh.	Schafe.		Schweine.	St. Rindvieh.		Schafe.	Schweine.		St. Rindvieh.	Schafe.		Schweine.				
1.	Ostpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
2.	Westpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
3.	Brandenburg	—	—	—	—	—	4	4	4	79	—	260	5	9	11	—	—	—	
4.	Pommern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	
5.	Posen	1	1	1	12	—	3	3	3	20	—	—	2	2	2	—	—	—	
6.	Schlesien	13	26	33	476	—	4	5	5	72	—	2	16	23	25	—	—	—	
7.	Sachsen	4	5	5	190	—	1	1	1	20	—	—	4	4	5	—	—	—	
8.	Schleswig-Holstein ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.	Hannover	2	2	2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.	Westfalen	2	2	3	6	—	1	1	1	—	20	—	1	1	1	—	—	—	
11.	Hessen-Nassau	2	2	2	4	—	3	3	52	218	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.	Rheinprovinz	1	1	1	3	—	5	7	20	165	—	32	—	—	—	—	—	—	
13.	Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summa	25	39	47	717	—	16	21	24	86	574	20	294	31	43	54	—	—	
	Im Berichtsjahre 1884/85	18	20	23	633	30	—	18	19	29	67	198	2	55	108	129	—	—	
	Im Berichtsjahre 1885/86:																		
	mehr	7	19	24	84	—	16	3	5	57	507	—	292	—	—	—	—	—	
	weniger	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	178	—	24	65	75	—	—	

ten Quartal			Im vierten Quartal						Im Berichtsjahre						Regierungsbezirke, in denen die Maul- und Klauenseuche nicht aufgetreten ist, nebst Angabe der seuchefrei geblieben- en Quartale.
er-krankt			erkrankt			erkrankt			erkrankt						
St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.	Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.	Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	St. Rindvieh.	Schafe.	Schweine.		
6	—	—	1	1	3	34	—	—	1	2	40	—	—	Königsberg 1. 2. Qu. Gumbinnen 1.—4.Qu. Danzig 1.—4. Qu. Marienwerder 1.2.4.Q. Potsdam 1. Qu. Frankfurt 1. 3. Qu. Berlin 1.—4. Qu. Stettin 1. 2. 4. Qu. Köslin 1.—4. Qu. Stralsund 1.—4. Qu. Posen 3. Qu. Bromberg 1. 4. Qu. Liegnitz 4. Qu. Magdeburg 3. Qu. Merseburg 2. Qu. Erfurt 2.—4. Qu. Schleswig 1.—4. Qu. Hannover 2.—4. Qu. Hildesheim 2.—4. Qu. Lüneburg 1.—4. Qu. Stade 1.—4. Qu. Osnabrück 1.—4. Qu. Aurich 1.—4. Qu. Münster 1.—4. Qu. Minden 4. Qu. Arnsberg 2.—4. Qu. Kassel 3. 4. Qu. Wiesbaden 1. 3.4. Qu. Koblenz 1. 3. Qu. Düsseldorf 3. 4. Qu. Köln 1.—4. Qu. Trier 1.—4. Qu. Aachen 1. 3. 4. Qu. Sigmaringen 1.—4. Q.	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	—		
30	—	40	3	6	7	97	815	47	10	17	206	815	347		
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	9	—	—		
13	—	2	1	1	1	19	—	—	7	7	64	—	2		
233	—	22	12	21	25	681	14	22 ¹⁾	30	69	1462	14	62		
145	—	—	3	4	4	221	—	8	8	14	576	—	8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	26	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	22	—	—	—	—	—	—	4	4	6	20	22		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	222	—	—		
—	—	—	1	1	1	6	—	—	7	9	174	—	32		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
441	—	86	21	34	41	1058	829	77	76	132	2790	849	473		
3079	346	49	98	216	285	6797	668	199	149	360	10576	1242	250		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2638	346	37	77	182	244	5739	161	—	73	228	7786	393	—		

¹⁾ und 1 Ziege.

Ankauf von Rindvieh, in 1 Orte dadurch, dass eine Kuh auf einen Markt gebracht und von diesem in den Stall zurückgenommen wurde.

4. Reg.-Bez. Frankfurt. In Kottbus ist angeblich ein einzelnes Schwein erkrankt, die Richtigkeit der Diagnose wird bezweifelt. Die Ausbrüche bei Rindvieh in 2 Ortschaften des Kreises Guben und in 1 Ortschaft des Kreises Lebus wurden veranlasst durch Ankauf von klauenseuchekranken Schweinen bezw. durch Infection während des Eisenbahntransportes.

5. Berlin. Fälle von Aphthenseuche sind bei dem in Berlin einheimischen Vieh nicht constatirt worden; dagegen herrschte die Krankheit unter 4 Rindvieh- und unter 27 Schweinetransporten auf dem Schlachtviehmarkt. Von den Schweinetransporten stammten 5 aus Galizien, je 3 aus Polen, Pommern und Mecklenburg, 2 aus der Provinz Brandenburg und 1 aus Ostpreussen. Die anderen Schweine- und Rindviehtransporte sind wahrscheinlich auf dem Markte selbst inficirt worden, die Thiere erkrankten, nachdem sie vom vorhergehenden Markte in den Ställen des Viehhofes zurückgeblieben waren.

6. Reg.-Bez. Stettin. In einen Ort des Kreises Regenwalde wurde die Seuche durch Schweine einer Treibherde eingeschleppt und verbreitete sich von dort aus auf einen benachbarten Ort.

7. Reg.-Bez. Posen. Ausbrüche der Krankheit wurden beobachtet in je einem Orte der Kreise Buk (nähere Angaben fehlen), Kröben (Infection auf Märkten), Schrimm (bei einem kurz vorher aus Bayern eingeführten Transport) und Wreschen (Einschleppung nicht erwähnt).

8. Reg.-Bez. Bromberg. Es verseuchten 3 Bestände, je einer im Landkreise Bromberg (Einschleppung durch Treibschweine), Gnesen (ohne nähere Angaben) und Wirsitz (Infection auf einem Viehmarkt).

9. Reg.-Bez. Breslau. Ein Auftreten der Seuche wurde in zusammen 31 Ortschaften der Kreise Breslau (Landkreis), Frankenstein, Glatz, Guhrau, Münsterberg, Neumarkt, Neurode, Nimptsch, Reichenbach, Schweidnitz, Steinau und Trebnitz beobachtet. Die Einschleppung erfolgte in 4 Ortschaften durch Ankauf von Rindvieh, in 10 Ortschaften durch Ankauf von Schweinen, in 1 Orte durch Zwischenträger aus einem benachbarten Dorf, in 1 Orte durch Verfütterung von Gras, welches vom Bahndamm in der Nähe der für Schweine bestimmten Ausladestellen gewonnen war, über die Ausbrüche in 15 Ortschaften fehlen nähere Angaben. In 3 grösseren Gütern blieb die

Seuche auf den Bestand eines Stalles beschränkt und verbreitete sich nicht auf die übrigen Thiere desselben Gehöftes.

10. Reg.-Bez. Liegnitz. Das Material berichtet über Ausbrüche in zusammen 12 Ortschaften der Kreise Bunzlau, Görlitz (Landkreis), Goldberg-Haynau, Grünberg, Jauer, Liegnitz (Landkreis), Rothenburg und erwähnt, dass die Einschleppung in 7 Ortschaften durch Ankauf oder durch Berührung mit Schweinen, welche Treibherden angehörten, vermittelt worden sei. In Ober-Bielau, Kr. Goldberg-Haynau, blieb die Seuche auf den Ochsenstall beschränkt, die in den übrigen Ställen des Gehöftes befindlichen Thiere erkrankten nicht.

11. Reg.-Bez. Oppeln. Die 26 verseuchten Ortschaften vertheilen sich auf die Kreise Beuthen, Kattowitz, Kreuzburg, Lublinitz, Neisse, Neustadt, Oppeln, Pless, Gross-Strehlitz, Tarnowitz und Zabrze. Die Ausbrüche in zusammen 5 Ortschaften der Kreise Beuthen und Kattowitz betrafen Rindvieh und aus Polen eingeführte Schweine, welche Schlächtern gehörten und zum Schlachten bestimmt waren, von diesen Seuchegehöftes wurde die Krankheit in 2 Ortschaften der Kreise Oppeln und Tarnowitz verschleppt, zehn Ausbrüche werden auf den Ankauf von Schweinen zurückgeführt, von denen 5 durch in Polen bzw. Oesterreich gekaufte Schweine bedingt wurden, zu je einem Ausbruche gaben Ankauf von Rindvieh bzw. Zwischenträger Anlass. Ueber die Ursachen der Ausbrüche in 5 Ortschaften wird nicht berichtet.

12. Reg.-Bez. Magdeburg. Die Maul- und Klauenseuche wurde beobachtet in zusammen 5 Ortschaften der Kreise Magdeburg, Neuhaldensleben, Oschersleben, in je einem Orte erkrankten aus Holstein bezogene Kälber bzw. aus Bayern, aus Ostpreussen oder von Händlern angekaufte Ochsen. Der Ausbruch in Magdeburg wurde gelegentlich bei Revision von den dortigen Viehhändlern gehörenden Beständen ermittelt.

13. Reg.-Bez. Merseburg. Die 8 verseuchten Ortschaften vertheilen sich auf die Kreise Delitsch, Mansfeld, Gebirgs- und Seekreis, und Merseburg. In 4 Ortschaften erfolgte die Einschleppung durch von Händlern angekaufte Ochsen, in je einer Ortschaft durch Berührung mit Treibschweinen bzw. durch Fleischer, welche in dem betreffenden Stalle verkehrt hatten.

14. Reg.-Bez. Erfurt. Der einzige im Kreise Nordhausen beobachtete Ausbruch soll dadurch veranlasst worden sein, dass sich die betreffenden Ochsen unterwegs inficirt hatten.

15. Reg.-Bez. Hannover. Ueber die Ursachen des Auftretens der Seuche in einem Orte des Kreises Syke wird nicht berichtet.

16. Reg.-Bez. Hildesheim. Anlass zu dem Ausbruch in der Stadt Hildesheim gaben aus dem Reg.-Bez. Magdeburg bezogene Ochsen.

17. Reg.-Bez. Minden. In Bielefeld blieb die Seuche auf vom Berliner Schlachtviehmarkt eingeführte Kühe beschränkt. Bezüglich eines Ausbruches im Kreise Höxter ist es zweifelhaft, ob die betreffenden Schafe an der Aphthen- oder an der bösartigen Klauenseuche litten. Auf dem Markte in Rheda, Kr. Wiedenbrück, wurde die Seuche bei 22 Schweinen constatirt.

18. Reg.-Bez. Arnberg. Ohne weitere Angaben erwähnen die Tabellen den Ausbruch der Seuche in einem Rindviehbestande des Kreises Hamm.

19. Reg.-Bez. Kassel. In Philippsthal, Kr. Hersfeld, erlangte die Seuche eine bedeutende Verbreitung; dieselbe soll aus benachbarten, angeblich stark verseuchten Ortschaften des Grossherzogthums Sachsen-Weimar eingeschleppt worden sein. Nähere Mittheilungen über die Ausbrüche in je einem Bestande der Kreise Gelnhausen und Hanau fehlen.

20. Reg.-Bez. Wiesbaden. Die Ausbrüche in je einem Viehbestande des Unter-Taunuskreises und des Landkreises Wiesbaden sind durch eingeführtes Handelsvieh bzw. durch Infection auf dem Schlachtviehmarkt in Frankfurt a. M. veranlasst worden.

21. Reg.-Bez. Koblenz. Ein Bestand im Kreise Kreuznach soll durch Berührung mit kranken Thieren in benachbarten Ortschaften der bayerischen Pfalz inficirt worden sein. Ueber die Ursachen eines Ausbruches im Kreise Meisenheim wird nicht berichtet.

22. Reg.-Bez. Düsseldorf. In Essen erwiesen sich 31 aus Russland eingeführte Schweine mit der Maul- und Klauenseuche behaftet. Bezüglich eines Ausbruches im Kreise Lennep wird erwähnt, dass auch nicht der geringste Anhalt für die Annahme einer Einschleppung vorlag.

23. Reg.-Bez. Aachen. Die Krankheit trat in je zwei Ortschaften des Landkreises Aachen und des Kreises Eupen, ausserdem in einem Orte des Kreises Geilenkirchen auf. Die Tabellen enthalten in keinem Falle Angaben über die Einschleppung.

Die Bemerkungen, welche bezüglich der Ausbrüche in den einzelnen Regierungsbezirken vorgetragen sind, zeigen, dass die bei

Weitem meisten Seuchefälle durch die Verhältnisse des Viehhandels veranlasst wurden, besonders häufig verursachten die auf dem Wege des Hausirhandels durch das Land getriebenen Schweineherden Infectionen von ortsangehörigen Wiederkäuern und Schweinen. Ausserdem haben zahlreiche Infectionen auf den Schlachtviehmärkten der grossen Städte oder auf den gewöhnlichen Viehmärkten bezw. während des Eisenbahntransportes stattgefunden. In verhältnissmässig vielen Fällen muss die Einschleppung auf Schweine zurückgeführt werden, welche in Polen oder Oesterreich angekauft waren. Ausserdem ist die Maul- und Klauenseuche jedoch nicht selten in Ortschaften beobachtet worden, in denen die Möglichkeit einer Einschleppung fast ausgeschlossen erscheint, und die Krankheit auf meilenweiter Entfernung seit langer Zeit nicht beobachtet worden war.

Das statistische Material erwähnt keinen Fall, in welchem ein Thier an der Maul- und Klauenseuche gefallen ist, ebensowenig eine Erkrankung von Menschen in Folge des Genusses der nicht aufgekochten Milch von aphthenkranken Kühen.

5. Die Lungenseuche.

Die Vergleichung am Fuss der Tabelle S. 72 u. 73 zeigt, dass die Zahl der verseuchten Kreise, Ortschaften und Gehöfte, ebenso auch die Zahl der erkrankten und getödteten bezw. gefallenen Stück Rindvieh erheblich geringer gewesen ist als im Jahre 1884/85. Jedoch haben sich die Verluste, welche auf die am stärksten verseuchte Provinz Sachsen entfallen, nur unerheblich vermindert. Lässt man Sachsen ausser Anschlag, so stellen sich Verbreitung der Seuche und Verlust an getödteten bezw. gefallenen Thieren in den beiden letzten Jahren wie folgt:

	1884/85:	1885/86:
Zahl der verseuchten Kreise . . .	51	32
- - - Ortschaften	91	44
- - - Gehöfte . . .	170	63
Verlust an getödteten bezw. gefallenen Stück Rindvieh . . .	1855	557

Die während der einzelnen Quartale und im ganzen Berichtsjahr beobachteten Erkrankungen an Lungenseuche vertheilen sich in abgerundeten Procentsätzen, wie die nachstehende Berechnung zeigt, auf die einzelnen Provinzen. Zur Vergleichung sind die für das Jahr 1884/85 berechneten Verhältnisszahlen wiederholt worden:

72 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal						Im zweiten Quartal						Im dritten			
		Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.		Zahl der Gehöfte.		St. Rindv.		Zahl der Kreise.		Zahl der Ortschaften.		Zahl der Gehöfte.		St.	
		erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche Anordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.	erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche Anordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.	erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche Anordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.	erkrankt.	gefallen.	St.	
																erkrankt.	gefallen.
1.	Ostpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Westpreussen . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	12	1	23	1	—	—	—
3.	Brandenburg . . .	1	3	3	8	—	10	5	2	2	3	7	—	1	8	1	1
4.	Pommern	1	1	1	41	—	54	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
5.	Posen	1	1	1	1	—	1	—	2	2	2	18	—	17	2	3	3
6.	Schlesien	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	28	—	28	1	1	2
7.	Sachsen	15	33	51	242	7	238	5	14	32	46	288	6	281	5	12	37
8.	Schlesw.-Holstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Hannover	6	8	14	56	1	55	10	4	5	6	44	—	42	5	5	8
10.	Westfalen	2	2	2	11	—	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	Hessen-Nassau ..	1	1	1	2	2	—	—	1	2	2	4	—	4	—	1	1
12.	Rheinprovinz . . .	1	1	1	5	1	8	—	1	1	1	7	1	6	—	1	2
13.	Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	28	50	74	366	11	378	29	26	46	63	408	8	402	22	26	56
	Im Berichtsjahre 1884/85	40	72	111	676	12	812	23	36	61	84	551	10	602	50	36	71
	Im Berichtsjahre 1885/86 mehr	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	weniger	12	22	37	310	1	434	—	10	15	21	143	2	200	28	10	15

Quartal		Im vierten Quartal						Im Berichtsjahre								
Rindv.		Zahl der Ortschaften.			St. Rindv.			Zahl der Ortschaften.			Stück Rindvieh					
auf polizeiliche Anordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.	Zahl der Kreise.	Zahl der Gebötte.	erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche Anordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.	Zahl der Kreise.	Zahl der Gebötte.	Gesamtzahl d. Thiere in d. verseuchten Geh.	erkrankt.	gefallen.	auf polizeiliche Anordnung getödtet.	auf Veranlassung der Besitzer getödtet.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	25	12	1	23	1	
1	—	—	—	—	—	—	—	4	6	7	160	16	—	12	13	
6	—	1	1	1	2	—	2	4	4	4	193	49	—	62	—	
24	—	2	2	2	18	1	17	5	6	7	251	62	2	59	2	
47	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	76	57	—	75	1	
400	5	12	47	100	358	10	319	25	20	73	187	7497	1289	29	1238	40
36	5	5	8	12	74	3	70	3	10	16	32	610	210	5	230	23
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	21	11	—	12	9	
9	1	—	—	—	—	—	—	2	3	3	33	16	2	13	1	
9	1	1	1	1	10	—	12	3	4	4	39	32	2	35	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
532	12	21	59	116	462	14	420	28	52	117	250	8905	1754	41	1732	91
812	38	36	78	115	803	6	858	22	72	183	340	9191	2834	35	3084	133
—	—	—	—	1	—	8	—	6	—	—	—	—	—	6	—	—
280	26	15	19	—	341	—	438	—	20	66	90	286	1080	—	1352	42

Regierungsbezirke, in denen Fälle von Lungenseuche nicht vorgekommen sind, nebst Angabe der suchefrei gebliebenen Quartale.

- Königsberg 1.—4. Qu.
- Gumbinnen 1.—4. Qu.
- Danzig 1.—4. Qu.
- Marienwerder 1. 3. 4. Q.
- Potsdam 3. 4. Qu.
- Frankfurt 1. 2. 4. Qu.
- Berlin 1.—4. Qu.
- Stettin 1.—4. Qu.
- Köslin 2.—4. Qu.
- Stralsund 1. 2. Qu.
- Bromberg 1.—3. Qu.
- Breslau 1.—4. Qu.
- Liegnitz 1.—4. Qu.
- Oppeln 1. 4. Qu.
- Schleswig 1.—4. Qu.
- Lüneburg 1. Qu.
- Stade 1.—4. Qu.
- Osnabrück 1.—3. Qu.
- Aurich 1.—4. Qu.
- Münster 1.—4. Qu.
- Minden 2.—4. Qu.
- Arnsberg 2.—4. Qu.
- Kassel 4. Qu.
- Wiesbaden 1.—4. Qu.
- Köblenz 1.—4. Qu.
- Düsseldorf 2.—4. Qu.
- Köln 1.—4. Qu.
- Aachen 1. 3. 4. Qu.
- Trier 1. 2. Qu.
- Sigmaringen 1.—4. Q.

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Im Berichts- jahre	Im Jahre 1884/85
An Lungenseuche erkrankte Stück Rindvieh	366	408	532	462	1754	2834
Davon in:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1. Ostpreussen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Westpreussen	0,00	2,94	0,00	0,00	0,67	2,27
3. Brandenburg	2,19	1,72	0,20	0,00	0,91	7,78
4. Pommern	11,20	0,00	1,16	0,44	2,85	9,65
5. Posen	0,27	4,41	4,82	3,68	3,53	4,78
6. Schlesien	0,00	6,86	5,60	0,00	3,24	0,52
7. Sachsen	66,12	70,59	77,41	77,60	73,49	45,52
8. Schleswig-Holstein ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
9. Hannover	15,30	10,78	6,95	16,10	11,96	19,14
10. Westfalen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,62	2,63
11. Hessen-Nassau	0,55	0,98	1,93	0,90	0,91	6,14
12. Rheinprovinz	1,37	1,72	1,93	2,18	1,82	1,54
13. Hohenzollernsche Lande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Demnach ist der Procentsatz gegen das vorhergehende Jahr in Sachsen sehr erheblich und ausserdem etwas in Schlesien gestiegen, dagegen macht sich in allen übrigen Provinzen eine zum Theil sehr erhebliche Abnahme der durch die Lungenseuche verursachten Verluste bemerklich.

Die nachstehende Berechnung zeigt ferner, dass die Zahl der in den letzten 5 Jahren verseuchten Bestände, welche auf die Provinz Sachsen entfallen, nicht nur keine Verminderung erlitten hat, sondern sogar gestiegen ist, dass dagegen in den übrigen Provinzen die Zahl der Lungenseucheausbrüche erheblich abgenommen, und dass die Tilgung der Krankheit deutliche Fortschritte gemacht hat, welche namentlich in der Provinz Hessen-Nassau besonders auffällig sind.

	1881/82	1882/83	1883/84	1884/85	1885/86
Zahl der Bestände, in denen die Lungenseuche ausgebrochen war:	216	214	281	340	250
Davon in	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1. Ostpreussen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Westpreussen	0,93	0,00	1,42	4,12	0,40
3. Brandenburg	4,65	1,40	4,98	4,42	2,80
Latus	5,58	1,40	6,40	8,54	3,20

	1881/82	1882/83	1883/84	1884/85	1885/86
Transport	pCt 5,58	pCt. 1,40	pCt. 6,40	pCt. 8,54	pCt. 3,20
4. Pommern	0,93	2,80	1,42	2,65	1,60
5. Posen	4,65	8,88	2,85	2,36	2,80
6. Schlesien	3,26	1,87	0,72	0,81	1,20
7. Sachsen	64,18	70,10	59,09	50,00	74,80
8. Schleswig-Holstein	0,00	0,00	1,42	0,30	0,00
9. Hannover	2,79	5,14	6,40	17,95	12,80
10. Westfalen	0,00	0,00	2,85	6,77	0,80
11. Hessen-Nassau	17,68	8,88	13,52	6,77	1,20
12. Rheinprovinz	0,93	0,93	5,33	3,85	1,60
13. Hohenzollernsche Lande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Der Verlust an getödteten bzw. gefallenem Stück Rindvieh hat sich ebenfalls erheblich verringert; derselbe betrug:

1882/83	23,42 pCt.
1883/84	27,48 -
1884/85	35,40 -
1885/86	20,93 -

der gesammten in den Gehöften vorhandenen Bestände.

Frei von der Lungenseuche blieben die Provinzen Ostpreussen, Schleswig-Holstein, die Hohenzollernschen Lande, die Reg.-Bez. Danzig, Stettin, Breslau, Liegnitz, Stade, Aurich, Münster, Wiesbaden, Koblenz, Köln und die Stadt Berlin.

Wir stellen nunmehr, wie Seite 77—92 unseres IX. Jahresberichtes, zunächst die Ausbrüche in der Provinz Sachsen und sodann die Ausbrüche in den übrigen Regierungsbezirken zusammen, in denen die Seuche während des Berichtsjahres aufgetreten ist.

1. Provinz Sachsen.

In dem Reg.-Bez. Magdeburg sind es, mit Ausnahme von Jerichow II, wieder dieselben Kreise, welche, wie in den vorhergegangenen Jahren, stark verseucht waren. Die Zahl der verseuchten Orte hat etwas abgenommen, dagegen ist die Zahl der verseuchten Bestände ebenso wie die der getödteten bzw. gefallenem Thiere gestiegen.

In 16 Ortschaften dauerte das Herrschen der Lungenseuche aus dem vorigem Berichtsjahre in denselben Beständen fort oder verbreitete sich die Krankheit auf andere Bestände desselben Ortes — nämlich in Schneidlingen, Königsau, Kr. Aschersleben, Nordgermers-

leben, Emden, Altenhausen, Eimersleben, Ostingersleben, Bornstedt, Kr. Neuwaldensleben, Etgersleben, Gross-Ottersleben, Hadmersleben, Egeln, Kr. Wanzleben, Meitzendorf, Niederdodeleben, Drakenstedt, Dreileben, Kr. Wolmirstedt.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre				Im Jahre 1884/85					
		verseuchte Bestände.		verseuchte Bestände.		verseuchte Bestände.		verseuchte Bestände.		verseucht.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Rv. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.		verseucht.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Rv. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	
		verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.				verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.				verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.
1.	Aschersleben	3	12	6	25	—	—	6	11	4	7	554	48	5	7	248	16		
2.	Halberstadt	—	—	1	10	1	32	1	3	1	1	73	45	5	18	329	120		
3.	Jerichow I	2	30	2	24	2	34	1	2	2	2	219	90	3	3	243	23		
4.	Jerichow II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	103	43		
5.	Kalbe	1	1	1	1	2	4	1	3	4	4	155	9	6	7	571	25		
6.	Magdeburg, Stdt.	1	1	1	2	—	—	—	1	1	28	—	3	—	—	—	—		
7.	Neuhaldensleben	7	37	9	46	17	86	33	95	14	41	929	264	13	22	599	304		
8.	Oschersleben	—	—	2	22	3	5	2	2	3	4	632	29	4	14	573	61		
9.	Wanzleben	7	24	2	13	7	13	5	70	14	19	1818	120	15	27	943	147		
10.	Wolmirstedt	17	45	13	42	39	165	40	95	12	78	1593	347	12	33	847	185		
	Summa	38	150	37	185	71	339	89	281	55	157	6001	955	65	131	4456	924		
1.	Delitsch	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	52	1	2	2	65	21		
2.	Eckartsberga	—	—	2	28	2	4	—	—	2	3	223	32	4	5	58	57		
3.	Halle, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	1		
4.	Mansfeld, Gebkr.	1	42	—	—	—	—	—	—	1	1	58	42	1	1	58	16		
5.	- Seekr.	—	—	—	—	—	—	1	29	1	1	118	29	3	3	78	35		
6.	Merseburg	1	2	1	5	—	—	7	37	3	8	309	44	5	7	399	78		
7.	Querfurt	3	30	3	24	3	54	1	1	2	5	206	109	3	12	278	194		
8.	Saalkreis	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	68	2	2	2	146	33		
9.	Sangerhausen	—	—	1	34	1	1	—	—	1	1	150	35	—	—	—	—		
10.	Weissenfels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	60	4		
11.	Zeitz	2	10	—	—	—	—	—	—	2	2	107	10	—	—	—	—		
	Summa	9	86	7	91	7	60	9	67	14	23	1291	304	22	34	1149	439		
1.	Erfurt, Landkr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	9	2		
2.	Nordhausen	3	13	2	16	3	12	2	6	3	6	192	47	2	2	169	31		
3.	Weissensee	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	1		
4.	Ziegenrück	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	13	1	—	—	—	—		
	Summa	4	14	2	16	3	12	2	6	4	7	205	48	5	5	188	34		

Regierungs-Bezirk.

Magdeburg

Merseburg

Erfurt

Unter den 39 Ortschaften. in denen Ausbrüche der Lungenseuche während des Berichtsjahres constatirt wurden, befindet sich eine

grössere Anzahl von solchen, welche in den vorhergegangenen Jahren — zum Theil mehrfach — verseucht gewesen waren.

In Knoblauchshof, Kr. Jerichow I, brach die Krankheit von Neuem in einem früher verseucht gewesenen Bestande aus; anscheinend vollkommen gesunde, jedoch noch infectionsfähige Stücke haben die Seuche jedenfalls auf die neuangekauften Thiere übertragen. Durch Benutzung des Bullen wurde die Seuche auf einen Bestand des benachbarten Ortes Britzke verschleppt.

In Derenburg, Kr. Halberstadt, Förderstedt, Rothenförde, Kr. Kalbe, in Magdeburg, in Uhrleben, Kr. Neuwaldenleben, Heynburg, Kr. Oschersleben, Mammendorf, Gross-Rodenleben, Hakeborn, Wanzleben, Walmerleben, Bahrendorf, Bleckendorf, Kr. Wanzleben, — mithin in 13 Ortschaften gab Ankauf von kranken oder inficirten Thieren die Ursache zum Ausbruch der Lungenseuche ab. Die Thiere, welche die Einschleppung vermittelten, waren in Heynburg und Hakeborn aus Bayern, in Magdeburg aus Sachsen eingeführt und für den Bestand in Bahrendorf auf Märkten des Fürstenthum Reuss angekauft.

In Gröningen, Kr. Oschersleben, Tundersleben, Kr. Neuwaldenleben, Ampfurt, Kr. Wanzleben, und Gross-Schnarsleben, Kr. Wolmirstedt, erfolgte die Infection durch Berührung mit kranken Thieren benachbarter Ortschaften.

Der Ausbruch in Gross-Santersleben ist dadurch veranlasst worden, dass der Besitzer, welcher als Schiedsmann bei der Tilgung der Lungenseuche in einem anderen Orte thätig gewesen war, die Einschleppung durch das an seinen Kleidern haftende Contagium vermittelte.

Ueber die Einschleppung der Seuche in 19 Ortschaften wird nicht berichtet.

Das Bestreben, die Seuche durch Abschachten der ganzen verseuchten Bestände zu tilgen, ist in immer steigender Zunahme begriffen. Vielfach wurde von Seiten des Regierungspräsidenten zu diesem Zwecke die Tödtung selbst verhältnissmässig grosser Viehbestände angeordnet, und hierbei sind auch 18 Stück Rindvieh getödtet, welche sich bei der Section nicht lungenseuchekrank erwiesen. Ebenso haben die Besitzer grösserer Viehbestände recht häufig sämmtliche der Ansteckung verdächtige Thiere zur Abschachtung nach den grossen Städten ausgeführt. Hierbei stellte sich nicht selten heraus, dass zahlreiche anscheinend noch vollkommen gesunde Stücke bereits mit der Lungenseuche behaftet waren. Durch die krankhaften Verän-

derungen, welche sich in den Lungen von Mastthieren beim Abschachten derselben im Schlachthause zu Köln vorfanden, wurde das Herrschen der Lungenseuche in Irxleben, Kr. Wolmirstedt, ermittelt.

Ueber Impfungen bezw. deren Resultate enthält das statistische Material folgende Bemerkungen:

Kr. Jerichow I: In Knoblauchshof erkrankten 2 im Jahre 1883 mit vollem Erfolge geimpfte Kühe.

Kr. Neuhaldensleben: In Tundersleben kam unter 142 gleich nach der ersten Erkrankung geimpften Thieren ein weiterer Fall von Lungenseuche nicht vor; es trat zum Theil sehr heftige Reaction an der Impfstelle ein.

Kr. Oschersleben: Heynburg, die Thiere des Bestandes waren theils vor längerer, theils vor kürzerer Zeit geimpft. Ueber die Resultate der nach dem Ausbruch der Seuche wiederholten Impfung wird nicht berichtet. In Gröningen waren alle Thiere, mit Ausnahme der Jahrgänge 1884 und 1885, geimpft, das Material enthält keine Mittheilungen über den Erfolg der nach Ausbruch der Seuche wiederholten Impfung. Auch die Thiere in Edelhof-Gröningen waren bereits vor Ausbruch der Seuche geimpft.

Kr. Wanzleben: Klein-Ottersleben, die Erkrankungen traten 17 Tage nach der Impfung ein, 2 Bestände, welche mit dem verseuchten Berührung gehabt hatten, wurden geimpft; ein Fall von Lungenseuche kam in diesen Beständen nicht vor. Gross-Ottersleben, von 23 im Seuchestall geimpften Thieren erkrankten keines, von 26 ungeimpft gebliebenen dagegen 7. Das Herrschen der Lungenseuche in einem zweiten Bestände wurde durch die Zerlegung eines Ochsen auf dem Schlachtviehmarkt in Köln ermittelt; die Impfung des schon früher geimpft gewesenen Bestandes ist wiederholt, eine weitere Erkrankung nicht beobachtet worden; in Hakeborn sind unter 143 Stück des Bestandes 4 in früheren Jahren mit Erfolg geimpfte Thiere wegen schwerer Erkrankung auf polizeiliche Anordnung getödtet worden; der Ausbruch in Sohlen betraf einen Bestand in welchem während des vorigen Sommers die Schutzimpfung ausgeführt worden war; Bahrendorf, von den 386 beim Ausbruch der Seuche vorhandenen Thieren wurden 276 geimpft, von denselben erkrankten 1, von den ungeimpft gebliebenen dagegen 44 Stück; Tarthun, Impfung 6 Tage nach Constatirung der Krankheit, es erkrankten von 24 geimpften Thieren 1, ausserdem jedoch 3 ungeimpft gebliebene Kühe; Gross-Germersleben, 118 Stück wurden 3 Tage nach Constatirung der Seuche geimpft, von denselben erkrankten noch 15; Blekendorf, sofortige Impfung von 85 Stück, nur eines derselben erkrankte.

Kr. Wolmirstedt: Irxleben, der Bestand war 4 Wochen vor Ausfuhr eines Ochsen geimpft worden, welcher sich im Schlachthause zu Köln mit der Lungenseuche behaftet erwies, weitere Erkrankungen kamen nicht vor. Ueber die Impfungen in Schneidlingen, Kr. Aschersleben, Bisdorf, Thale, Kr. Kalbe, Langenweddingen, Wolmersleben fehlen nähere Angaben.

Am Schlusse des Berichtsjahres dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Thieren noch in 93 Beständen fort. Der Verlust an getödteten und gefallen Thieren betrug 15,90 pCt. des ursprünglich vorhandenen Bestandes.

Im Reg.-Bez. Merseburg hat die Tilgung der Lungenseuche nicht unerhebliche Fortschritte gemacht, die Zahl der verseuchten Bestände und der getödteten bezw. gefallen Thieren ist erheblich geringer als im Jahre 1884/85.

In 5 Ortschaften — Gollma, Kr. Delitsch, Leimbach, Mansfelder

Gebirgskreis, Körbisdorf, Kr. Merseburg, Schönwerda, Kr. Querfurt, Domnitz, Saalkreis, dauerte das Herrschen der Lungenseuche aus dem vorigen Berichtsjahr fort. Ueber die Einschleppung in die während des Berichtsjahres verseuchten Ortschaften enthält das statistische Material folgende Angaben:

Die Ausbrüche in Zeitz, Kr. Zeitz, und Wessmar, Kr. Merseburg, werden auf Ankauf von kranken oder inficirten Thieren, von denen die in Zeitz erkrankten aus Thüringen oder Süddeutschland bezogen waren, der Ausbruch in Zöbiger, Kr. Querfurt, auf Berührung mit kranken Thieren benachbarter Ortschaften zurückgeführt. Baltzenhöhe, Mansfelder Seekreis, gehört einem Eigenthümer, welcher noch andere, zum Theil verseuchte Güter besitzt. Das Herrschen der Lungenseuche in Etzleben, Kr. Eckartsberga und in Schkauditz, Kr. Zeitz, wurde dadurch bekannt, dass je ein diesen Beständen angehöriger in Leipzig bezw. Gera geschlachteter Mastochse sich lungenseuchekrank erwies. In Betreff der Ausbrüche in Cannawurf, Kr. Eckartsberga, Niederwünsch, Kr. Merseburg, und Kelbra, Kr. Sangerhausen, fehlen nähere Angaben über die Verhältnisse der Einschleppung.

Die bedeutende Verbreitung der Seuche in Schönwerda und Niederwünsch wurde durch die Erkrankung des Bullen bedingt, welcher die Seuche auf die von ihm gedeckten Kühe übertrug, bei drei der letzteren dauerte die Incubation 3, 4 bezw. 5 Monate.

In Gollma, Kr. Delitsch, erkrankte nach einer Zwischenzeit von 4 Monaten wieder ein Stück. In Zöbiger, Kr. Querfurt, wurde der ganze Bestand von 82 Stück abgeschlachtet, nur 1 Stück war frei von Lungenseuche. In Schönwerda, Kr. Querfurt, wurde an Stelle des abgeschlachteten ein neuer Bestand angeschafft, unter welchem bald die Lungenseuche ausbrach, es wird vermuthet, dass die Infection von anderen Beständen des verseuchten Ortes ausgegangen ist.

Ueber Impfungen und deren Resultate theilt das statistische Material folgende Bemerkungen mit:

Cannawurf, Kr. Eckartsberga: sofort nach Constatirung der Seuche wurden 211 Stück geimpft, von diesen sind 22 auf polizeiliche Anordnung, 2 wegen zu bedeutender Impfgeschwulst getödtet und 94 behufs Abschachtung nach Leipzig ausgeführt worden. Ein Stück starb in Folge der Impfrkrankheit.

In Körbisdorf, Kr. Merseburg, erkrankten heftig 3 im Jahre vorher mit vollem Erfolge geimpfte Ochsen, bei 2 derselben fanden sich neben frischen Veränderungen alte Sequester in den Lungen.

In Baltzenhöhe, Mansfelder Seekreis, erkrankten von 95 acht Tage nach Constatirung der Seuche geimpften Thieren 19, und ein Stück musste wegen allzu bedeutender Impfgeschwulst geschlachtet werden.

In Kelbra, Kr. Sangerhausen, war bei sämmtlichen Ochsen, mit Ausnahme

der im Jahre 1882 angeschafften, die Schutzimpfung ausgeführt worden. Von 29 geimpften erkrankten heftig 9 an der Lungenseuche.

Ueber die Resultate der Impfung in Domnitz, Saalkreis, und in Zeitz, Kr. Zeitz, liegen keine näheren Angaben vor.

Am Schlusse des Berichtsjahres dauerte die Observation von der Ansteckung verdächtigen Thieren in 12 Gehöften fort. Der Verlust an getödteten bezw. gefallenem Stück Rindvieh betrug 23,55 pCt. der ursprünglich vorhandenen Bestände.

Im Reg.-Bez. Erfurt wurden Ausbrüche der Lungenseuche in 4 Ortschaften beobachtet. In Fronderode und Hesserode, Kr. Nordhausen, dauerte das Herrschen der Seuche aus dem vorigen Berichtsjahre fort; der Bestand in Fronderode war sofort nach Constatirung der Krankheit geimpft worden. Nach Klein-Wechsungen, Kr. Nordhausen, soll die Krankheit durch Zwischenträger aus dem benachbarten Orte Hesserode eingeschleppt worden sein. In Blankenberge, Kr. Ziegenrück, ist die Seuche angeblich aus einem benachbarten Seucheorte des Fürstenthums Reuss eingeschleppt worden, dieselbe blieb auf ein Thier beschränkt, die übrigen 12 Stück des Bestandes erkrankten nicht.

2. Verbreitung der Lungenseuche in den Provinzen Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Hannover, Westfalen, Hessen-Nassau und in der Rheinprovinz.

Wir stellen nunmehr die Ausbrüche der Lungenseuche in den oben genannten Provinzen zusammen:

1. Reg.-Bez. Marienwerder. Der Ausbruch der Lungenseuche in Kaldas, Kr. Kulm, wurde durch Ankauf von bayerischen Zugochsen vermittelt und durch Abschachten des gesammten Bestandes getilgt, von 23 auf polizeiliche Anordnung getödteten Thieren waren nur 10 mit Lungenseuche behaftet, unter diesen hatten 7 alte Sequester, 3 frische Veränderungen in den Lungen.

2. Reg.-Bez. Potsdam. Kr. Nieder-Barnim. In Börnicke wurde die im vorigen Berichtsjahre constatirte Lungenseuche durch Abschachten des Restbestandes von 8 Stück getilgt, 5 Stück zeigten sich mit Lungenseuche behaftet. Die Einschleppung nach Falkenberg und dem dazu gehörenden Vorwerk Birknersfelde erfolgte durch aus Bayern bezogene Zugochsen. In beiden Orten wurden zusammen 81 Stück geimpft, von denselben erkrankten in den nächsten 2 Monaten noch 2 an Lungenseuche, und 4 mussten wegen zu starker

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre				Im Jahre 1884/85				Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.		verseuchte Bestände.		verseuchte Bestände.		verseuchte Bestände.		verseucht. Ortschftn.		Gesamtzahl d. Rv. i. d. verseucht. Bestdn.		verseucht Ortschftn.		Gesamtzahl d. Rv. i. d. verseucht. Bestdn.		
		getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.	getödtete und gefallene St. Rindv.		
1.	Kulm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	102	72	Marienwerfer
2.	Konitz	—	—	1	25	—	—	—	—	1	1	25	25	—	—	—	—	
3.	Schlochau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	12	
4.	Schwet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	70	70	
	Summa	—	—	1	25	—	—	—	—	1	1	25	25	3	14	184	154	
1.	Angermünde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	161	127	Potsdam
2.	Nieder-Barnim	3	15	—	—	—	—	—	—	3	3	90	15	3	6	83	74	
3.	Ober-Barnim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	38	20	
4.	West-Havelland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	173	24	
5.	Potsdam, Stadt	—	—	2	8	—	—	—	—	1	2	8	8	—	—	—	—	
6.	Teltow	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	60	1	—	—	—	—	
	Summa	3	15	3	9	—	—	—	—	5	6	158	24	8	12	455	245	
1.	Königsberg	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	2	2	6	6	Frankfurt
2.	Lebus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	99	31	
	Summa	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	3	3	105	37	
	Schievelbein	1	54	—	—	—	—	—	—	1	1	83	54	1	1	106	29	Köslin
1.	Franzburg	—	—	—	—	1	4	—	—	1	1	7	4	—	—	—	—	Stralsund
2.	Greifswald	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	2	2	3	4	165	81	
3.	Grimmen	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	101	2	—	—	—	—	
	Summa	—	—	—	—	2	6	1	2	3	3	110	8	3	4	165	81	
1.	Adelnau	—	—	1	5	2	2	—	—	2	3	12	7	—	—	—	—	Posen
2.	Fraustadt	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	22	1	1	2	4	2	
3.	Krotoschin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	21	1	
4.	Posen, Landkr.	—	—	1	14	1	22	1	2	1	1	101	38	1	4	284	115	
5.	Schildberg	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	
6.	Wreschen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	38	20	
	Summa	1	1	2	19	4	25	1	2	5	6	136	47	4	8	347	138	
	Schubin	—	—	—	—	—	—	1	16	1	1	115	16	—	—	—	—	Bromberg

82 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichts- jahre		Im Jahre 1884/85		Regierungs-Bezirk.				
		verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.	verseucht. Ortschftn.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Rv. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.		verseucht. Ortschftn.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl d. Rv. i. d. verseucht. Bestdn.	getödtete und ge- fallene St. Rindv.
	Beuthen	—	—	2	29	2	47	—	—	2	3	76	76	—	—	—	—	Oppeln
1.	Hannover, Stadt	3	5	—	—	—	—	—	—	1	3	8	5	1	12	82	58	Hannover
2.	- Landkr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	33	21	
3.	Neustadt	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	47	1	—	—	—	—	
4.	Springe	1	13	1	23	2	21	2	29	2	6	111	86	4	7	283	187	
5.	Stolzenau	3	4	—	—	—	—	—	—	1	3	16	4	1	1	60	4	
	Summa	7	22	1	23	3	22	2	29	5	13	182	96	11	27	458	270	
1.	Alfeld	1	2	2	4	2	9	1	1	1	5	33	16	2	11	227	113	Hildesheim
2.	Einbeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	56	11	
3.	Gronau	1	26	—	—	—	—	—	—	1	1	150	26	—	—	—	—	
4.	Hildesheim, Ldk.	4	16	2	13	3	7	4	30	5	9	195	66	9	15	186	162	
5.	Liebenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	104	2	
	Summa	6	44	4	17	5	16	5	31	7	15	378	108	15	30	573	288	
1.	Burgdorf	—	—	1	7	1	4	—	—	1	1	14	11	—	—	—	—	Lüneburg
2.	Celle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	17	17	
3.	Gifhorn	—	—	—	—	—	—	2	12	1	2	18	12	1	1	60	17	
	Summa	—	—	1	7	1	4	2	12	2	3	32	23	4	4	77	34	
	Bersenbrück	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	18	4	—	—	—	—	Minden Osnabrück
	Wiedenbrück	1	20	—	—	—	—	—	—	1	1	20	20	—	—	—	—	
1.	Altena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	16	5	Arnsberg
2.	Dortmund, Land- kreis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	31	4	
3.	Hagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	3	
4.	Hamm	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	13	12	
5.	Iserlohn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	70	49	
6.	Soest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	59	14	
	Summa	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	14	23	198	87	

Laufende Nummer.	Kreis.	1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		Im Berichtsjahre				Im Jahre 1884/85				Regierungs-Bezirk.
		verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene St. Rindv.	verseuchte Bestände.	getödtete und gefallene St. Rindv.	verseucht. Ortschaften.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl. Rv. i. d. verseucht. Bestän.	getödtete und gefallene St. Rindv.	verseucht. Ortschaften.	verseuchte Bestände.	Gesamtzahl. Rv. i. d. verseucht. Bestän.	getödtete und gefallene St. Rindv.	
1.	Fulda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	2	Kassel
2.	Gelnhausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	3	
3.	Hofgeismar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	62	62		
4.	Rinteln	—	—	2	4	1	10	—	—	2	2	17	14	—	—	—	—	
5.	Schlüchtern	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	16	2	1	2	26	14	
6.	Schmalkalden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3	
	Summa	1	2	2	4	1	10	—	—	3	3	33	16	5	6	108	84	
1.	Geldern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	15	15	Düsseldorf
2.	Lennep	1	9	—	—	—	—	—	—	1	1	10	9	3	6	39	22	
	Summa	1	9	—	—	—	—	—	—	1	1	10	9	4	9	54	37	
	St.-Wendel	—	—	—	—	2	10	1	12	2	2	22	22	—	—	—	—	Aachen
1.	Düren	—	—	1	7	—	—	—	—	1	1	7	7	—	—	—	—	
2.	Heinsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	19	14	
	Summa	—	—	1	7	—	—	—	—	1	1	7	7	1	3	19	14	

Impfgeschwulst getödtet werden. Die 8 in Potsdam nach dem Schlachten lungenseuchekrank befundenen Stück waren zum Zwecke der Abschachtung aus Kaldas, Kr. Kulm, eingeführt worden. In Heinersdorf, Kr. Teltow, erkrankte ein aus Bayern eingeführter Zugochse, unter den übrigen 60 Stück des Bestandes kam ein weiterer Fall nicht vor.

3. Reg.-Bez. Frankfurt. Nach den Bemerkungen des Departementsthierarzt dürfte der ganz vereinzelt gebliebene Fall in Neu-Rüdnitz, Kr. Königsberg, nicht eine Lungenseucheerkrankung gewesen, sondern als ein Irrthum in der Diagnose zu bezeichnen sein.

4. Reg.-Bez. Köslin. Die während des vorigen Berichtsjahres in Klemzow, Kr. Schivelbein, constatirte Lungenseuche wurde durch Tödtung des Restbestandes getilgt. Von 54 Stück Rindvieh erwiesen sich 13 nicht mit Lungenseuche behaftet. Die 23 Kühe, welche den Tagelöhnern des Gutes gehörten, erkrankten nicht.

5. Reg.-Bez. Stralsund. Die Erkrankungen in Platenberg, Kr. Franzburg, Neuenkirchen, Kr. Greifswald, Gross-Miltzow, Kr. Grimmen, betrafen Jungviehstücke, welche der Pommersche Viehzuchtverein in Ostfriesland angekauft hatte. Es wird behauptet, dass diese Thiere, welche in den Ställen der Käufer isolirt aufgestellt blieben, vor der Uebergabe an den Verein inficirt gewesen sein müssen.

6. Reg.-Bez. Posen. Die Einschleppung in einen kleinen Bestand des Dorfes Gross-Topolla, Kr. Adelnau, erfolgte durch Ankauf einer Kuh, in deren Lunge sich bei der Section ein alter Sequester vorfand. Von Gross-Topolla wurde die Seuche nach dem benachbarten Orte Jankow-przygodzki verschleppt. Ueber die Einschleppung in je einen Bestand zu Gross-Kreutsch, Kr. Fraustadt, und Mixstedt, Kr. Schildberg, wird nicht berichtet. In Lussowki, Landkr. Posen, brach die Krankheit von Neuem unter dem nach Erlöschen des vorhergegangenen Seuchenausbruches aus der Danziger Niederung angekauften Rindviehbestände aus. Die Infection ist wahrscheinlich von scheinbar vollständig durchgesehenen Thieren des alten Bestandes, in welchem die Krankheit geherrscht hatte, ausgegangen.

7. Reg.-Bez. Bromberg. Die Einschleppung der Seuche in den Viehbestand von Zurawia, Kr. Schubin, hat nicht aufgeklärt werden können; Vieh ist nicht angekauft worden, und der Regierungsbezirk seit Jahren vollständig seuchefrei. Nachdem im Ganzen 15 Stück Rindvieh erkrankt waren, wurde 12 Tage nach Constatirung der Krankheit das Gutsvieh (91 Stück) geimpft. Die 24 Kühe der Dienstleute blieben ungeimpft, bisher sind weitere Erkrankungen weder unter den geimpften, noch unter den ungeimpften Thieren vorgekommen.

8. Reg.-Bez. Oppeln. Die Einschleppung der Lungenseuche in die Bestände des Gutes und einer bäuerlichen Wirthschaft von Mittel-Lagiewnik, Kr. Beuthen, ist nicht ermittelt worden, dieselbe kann auf den Ankauf einer Oldenburger Kuh oder auf Berührung mit Vieh vom Breslauer Schlachtviehmarkt zurückgeführt werden. Von Mittel-Lagiewnik wurde die Seuche auf einen Bestand in dem benachbarten Orte Ober-Lagiewnik übertragen, das zweite dem zuletzt genannten Besitzer gehörende Thier wurde abgeschlachtet, erwies sich bei der Section jedoch frei von Lungenseuche.

9. Reg.-Bez. Hannover. In Wiedensahl, Kr. Stolzenau, und in der Stadt Hannover dauerte das Herrschen der Lungenseuche aus dem vorigen Berichtsjahre fort. In Gross-Müntzel, Kr. Neustadt, erkrankte ein kurze Zeit vorher aus Bayern eingeführter Ochse. Der Ausbruch

in Wülfigen, Kr. Springe, wurde durch einen Bullen aus dem während des vorigen Jahres stark verseuchten Orte Gleidingen, Kr. Hildesheim, vermittelt. Ueber die Ursachen des Ausbruchs in Rössing, Kr. Springe, fehlen nähere Angaben.

10. Reg.-Bez. Hildesheim. In Lammspringe, Kr. Alfeld, Mahlerten, Landkr. Hildesheim, Kr. Gronau, Adlum, Giften, Gross-Algermissen dauerte das Herrschen der Lungenseuche aus dem vorigen Berichtsjahre fort. Der Ausbruch in Oesselde, Landkr. Hildesheim, wird noch auf die starke Verseuchung des Petersen'schen Bestandes in Gleidingen zurückgeführt (s. IX. Jahresbericht, S. 88). Die Ursachen des Ausbruches in Ruthe, Landkr. Hildesheim, werden nicht erwähnt. Nachdem 6 Stück des Bestandes erkrankt waren, wurden am 8. Februar 1886 82 Stück geimpft, von denen keines bis zum Schlusse des Berichtsjahres erkrankt ist.

11. Reg.-Bez. Lüneburg. Bezüglich des Auftretens der Lungenseuche in Harber, Kr. Burgdorf, wird die Vermuthung ausgesprochen, dass die Einschleppung aus benachbarten Seucheorten des Reg.-Bez. Hildesheim erfolgt ist. Berührungen mit kranken Thieren in benachbarten braunschweigischen Orten soll Anlass zu den Ausbrüchen in Bechtsbüttel und Albesbüttel, Kr. Gifhorn, gegeben haben.

12. Reg.-Bez. Osnabrück. Der Departementsthierarzt bezweifelt die Richtigkeit der Diagnose des Lungenseucheausbruches in Nortrupp, Kr. Bersenbrück. Der in Ostfriesland angekaufte Stier, welcher angeblich die Einschleppung vermittelt hat, ist überhaupt nicht erkrankt.

13. Reg.-Bez. Minden. Ueber den Ausbruch in Mohler, Kr. Wiedenbrück, fehlen nähere Angaben.

14. Reg.-Bez. Arnsberg. In Unna, Kr. Hamm, erkrankte die einzige Kuh eines Besitzers; dieselbe gehörte zu den während des vorigen Berichtsjahres auf den Ruhrweiden inficirten Thieren (s. IX. Jahresbericht, S. 90).

15. Reg.-Bez. Kassel. In einem Bestande von 16 Stück zu Salmünster, Kr. Schlüchtern, fielen in einem Zwischenraum von 2 Wochen ein 14 Tage und ein $\frac{3}{4}$ Jahr altes Kalb. Weitere Erkrankungen traten nicht ein. Der Departementsthierarzt bezweifelt die Richtigkeit der Diagnose. In Sielhof, Kr. Rinteln, trat die Lungenseuche in einem Bestande auf, welcher für die Zwecke der Mastung auf Märkten der Provinz bezw. im Braunschweig'schen zusammen gekauft war. Die Krankheit wurde von Sielhof auf einen Bestand des benachbarten Ortes Rolfhagen übertragen.

16. Reg.-Bez. Düsseldorf. Die in Oberherde, Kr. Lennep, während des vorigen Berichtsjahres constatirte Lungenseuche wurde durch Töden des ganzen Bestandes getilgt.

17. Reg.-Bez. Trier. Die Einschleppung der Lungenseuche in einen Bestand zu Ober-Linxweiler, Kr. St. Wendel, ist nicht ermittelt worden. Der zweite Ausbruch in demselben Kreise betraf eine Mastungswirtschaft mit häufigem Viehwechsel in Fohren-Linden.

18. Reg.-Bez. Aachen. Der Ausbruch in einem Bestande zu Merzenich, Kr. Düren, wird auf die Einstellung einer aus der Gegend von Dortmund stammenden Kuh in den betreffenden Stall zurückgeführt.

Von den 117 Ortschaften, in denen Fälle von Lungenseuche beobachtet wurden, sind 36 (30,77 pCt.) solche, in denen das Herrschen der Lungenseuche in denselben Beständen fort-dauerte, oder die Krankheit auf andere Bestände des bereits im vorigen Jahr verseuchten Ortes übertragen wurde.

Die oben vorgetragenen Bemerkungen weisen wiederum nach, dass die Verhältnisse des Viehhandels am häufigsten zur Verschleppung der Lungenseuche beitragen. Unter den 81 Ortschaften, in denen die Lungenseuche während des Berichtsjahres constatirt wurde, befinden sich 20, in denen Ankauf von kranken oder inficirten Thieren die Einschleppung vermittelt hat. Von den angekauften Thieren gaben folgende aus dem Auslande eingeführte Anlass zu Ausbrüchen der Lungenseuche;

aus Bayern	zu 7 Ausbrüchen.
- Sachsen	- 1 -
- Fürstenth. Reuss	- 2 -
- Thüringen oder Süddeutschland	- 1 -

Mehrfach brach die Lungenseuche in früher verseucht gewesenen Beständen dadurch aus, dass scheinbar vollkommen gesunde oder vollständig durchgeseuchte Thiere des alten Bestandes sich noch fähig zeigten, andere Rindviehstücke zu inficiren.

In 11 Ortschaften erfolgte die Einschleppung durch Berührung mit kranken Thieren benachbarter Orte, besonders häufig durch Bullen, denen Kühe zur Begattung zugeführt wurden. Dagegen ist eine Verschleppung der Krankheit durch Zwischenträger nur sehr selten beobachtet worden.

Bei 49 auf polizeiliche Anordnung getödteten Stück

Rindvieh (2,81 pCt.) wurde das Vorhandensein der Lungenseuche durch die Section nicht bestätigt.

Die wenigen Bemerkungen des statistischen Materials über die Impfung gestatten keine begründete Folgerungen über die Wirksamkeit dieses Verfahrens. Einerseits kam es häufiger vor, dass nach der Impfung nur noch sehr wenige Stücke erkrankten, und andererseits waren die Verluste auch nach sehr frühzeitiger Impfung mitunter nicht wesentlich von denen verschieden, welche in nicht geimpften Beständen die durchschnittliche Regel bilden. Wir glauben jedoch auf die verhältnissmässig zahlreichen Fälle hinweisen zu müssen, in denen vor 1 oder 2 Jahren mit vollem Erfolge geimpfte Stück Rindvieh in der heftigsten Weise an Lungenseuche erkrankten. Nach diesen Beobachtungen liegt die Folgerung nahe, dass die Schutzkraft der Impfung, selbst wenn man dieselbe anerkennt, nicht auf mehrere Jahre erhalten bleibt.

In der folgenden Tabelle haben wir zu berechnen versucht, in welchem Verhältniss sich die auf polizeiliche Anordnung behufs Tilgung der Lungenseuche getödteten Stück Rindvieh auf Bestände grösserer Güter und kleinerer Landwirthschaften vertheilen (s. IX. Jahresbericht, S. 94). Die gefallenen und die auf Veranlassung der Besitzer getödteten Thiere sind bei dieser Berechnung ausser Anschlag gelassen.

Laufende Nummer.	Regierungsbezirk.	Grössere Güter			Kleinere Landwirthschaften		
		Zahl der verseuchten Bestände.	Zahl des Rindviehs in den verseuchten Beständen.	Zahl der auf polizeil. Anordnung getödteten Stück Rindvieh.	Zahl der verseuchten Bestände.	Zahl des Rindviehs in den verseuchten Beständen.	Zahl der auf polizeil. Anordnung getödteten Stück Rindvieh.
1.	Marienwerder	1	25	23	—	—	—
2.	Potsdam	3	143	3	1	9	3
3.	Frankfurt	—	—	—	1	2	1
4.	Köslin	1	83	54	—	—	—
5.	Stralsund	3	110	8	—	—	—
6.	Posen	2	123	38	3	12	6
7.	Bromberg	1	115	15	—	—	—
8.	Oppeln	2	74	73	1	2	2
	Latus	13	673	214	6	25	17

Laufende Nummer.	Regierungsbezirk.	Grössere Güter			Kleinere Landwirthschaften		
		Zahl der verseuchten Bestände.	Zahl des Rindviehs in den verseuchten Beständen.	Zahl der auf polizeil. Anordnungen getödteten Stück Rindvieh.	Zahl der verseuchten Bestände.	Zahl des Rindviehs in den verseuchten Beständen.	Zahl der auf polizeil. Anordnungen getödteten Stück Rindvieh.
	Transport	13	673	214	6	25	17
9.	Magdeburg	31	4027	445	117	1774	455
	Davon in den Kreisen:						
	Aschersleben	3	489	25	4	65	18
	Halberstadt	1	73	45	—	—	—
	Jerichow I	2	219	87	—	—	—
	Kalbe	2	137	3	2	18	5
	Magdeburg	—	—	—	1	28	2
	Neuhaldensleben	3	239	60	37	548	196
	Oschersleben	3	617	24	1	15	1
	Wanzleben	11	1676	85	7	131	17
	Wolmirstedt	6	577	116	65	969	216
10.	Merseburg	10	1108	216	13	181	76
	Davon in den Kreisen:						
	Delitzsch	1	52	1	—	—	—
	Eckhartsberga	1	221	22	2	12	9
	Mansfeld, Gebirgskr.	1	58	42	—	—	—
	Mansfeld, Seekr.	1	118	29	—	—	—
	Merseburg	1	182	7	7	127	31
	Querfurt	2	164	70	4	42	36
	Saalkreis	1	68	1	—	—	—
	Sangerhausen	1	150	35	—	—	—
	Zeitz	1	95	9	—	—	—
11.	Erfurt	1	83	8	5	90	38
12.	Hannover	—	—	—	12	135	78
13.	Hildesheim	2	238	31	13	140	72
14.	Lüneburg	—	—	—	5	50	20
15.	Osnabrück	—	—	—	1	18	2
16.	Minden	—	—	—	1	20	11
17.	Arnsberg	—	—	—	1	1	1
18.	Kassel	—	—	—	2	17	13
19.	Düsseldorf	—	—	—	1	10	8
20.	Trier	—	—	—	2	22	21
21.	Aachen	—	—	—	1	7	6
	Summa	57	6129	914	180	2490	818

Nach dieser Berechnung entfallen während der beiden letzten Jahre:

	von den verseuchten Beständen.		von den auf polizeiliche Anordnung getödteten Thieren	
	1884/85	1885/86	1884/85	1885/86
auf grössere Güter	23,52 pCt.	24,05 pCt.	56,87 pCt.	52,77 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften .	76,48 -	75,95 -	43,13 -	47,23 -

und wenn man dieselben Verhältnisszahlen für die Provinzen Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen berechnet:

	von den verseuchten Beständen		von den auf polizeiliche Anordnung getödteten Thieren	
	1884/85	1885/86	1884/85	1885/86
auf grössere Güter	33,18 pCt.	26,83 pCt.	62,9 pCt.	57,67 pCt.
auf kleinere Landwirthschaften .	66,82 -	73,17 -	37,09 -	42,33 -

Hiernach hat die Verseuchung von Beständen grösserer Güter während des letzten Jahres etwas abgenommen.

Der Verlust an auf polizeiliche Anordnung getödteten Stück Rindvieh im Verhältniss zum Gesamtbestande der verseuchten Gehöfte betrug im Durchschnitt:

	1884/85	1885/86
in den grösseren Gütern	28,07 pCt.	14,91 pCt.
in den kleineren Landwirthschaften	50,94 -	32,85 -

Von den Provinzial- bzw. Communalverbänden sind für solche Stück Rindvieh, welche auf polizeiliche Anordnung behufs Tilgung der Lungenseuche getödtet wurden oder vor der bereits angeordneten Tödtung gefallen waren, die in nachstehender Tabelle genannten Entschädigungssummen gezahlt worden. Die entsprechenden Beträge des Jahres 1884/85 haben wir zur Vergleichung gegenübergestellt:

	Berichtsjahr 1884/85.		Berichtsjahr 1885/86.	
	Mark.	Pf.	Mark.	Pf.
1. Provinz Ostpreussen	—	—	—	—
2. - Westpreussen	24836	01	1484	32
3. - Brandenburg (ausschliesslich Berlin)	69669	34	5688	50
4. Berlin	—	—	—	—
5. Provinz Pommern	83637	97	9393	33
6. - Posen	31967	—	9120	44
7. - Schlesien	2734	33	119	—
8. - Sachsen	336384	24	227699	09
9. - Schleswig-Holstein (ausschl. Kr. Lauenburg)	—	—	—	—
10. Kreis Herzogthum Lauenburg	—	—	—	—
11. Provinz Hannover	65857	55	95402	20
12. - Westfalen	12626	99	3162	67
Latus	627713	43	352069	55

	Berichtsjahr 1884/85.		Berichtsjahr 1885/86.	
	Mark	Pf.	Mark	Pf.
Transport	627713	43	352069	55
13. Reg.-Bez. Kassel	16381	60	1443	67
14. - Wiesbaden (ausschliesslich Frankfurt a. M.)	17206	10	—	—
15. Frankfurt a. M.	2254	—	—	—
16. Rheinprovinz	7548	95	5659	—
17. Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—
Summa	671104	08	359172	22

Mithin beträgt die Gesamtsumme der Entschädigungen für auf polizeiliche Anordnung getödtete Stück Rindvieh

311931 Mark 86 Pfennige

weniger als im vorhergegangenen Berichtsjahr. Nur in der Provinz Hannover übersteigt die betreffende Summe die des Jahres 1884/85. Im Durchschnitt wurde für ein auf polizeiliche Anordnung getödtetes Stück Rindvieh

207 Mark 38 Pfennige

oder 10 Mark 23 Pfennige weniger als im vorigen Jahre gezahlt.

Zur Bestreitung der Entschädigungen für auf polizeiliche Anordnung getödtete Stück Rindvieh sind während der beiden letzten Jahre von den Rindviehbesitzern an Beiträgen erhoben worden:

	Berichtsjahr 1884/85.			Berichtsjahr 1885/86.		
	Beitrag für jedes St. Rindv. Pfennige	Mark	Pf.	Beitrag für jedes St. Rindv. Pfennige	Mark	Pf.
1. Provinz Ostpreussen . . .	—	—	—	—	—	—
2. - Westpreussen . . .	5	22909	20	5	23395	36
3. - Brandenburg(aus- schliessl. Berlin) . . .	13	90530 ¹⁾	57	2, 4, 6 bezw. 8 ²⁾	24482 ³⁾	02
4. Berlin	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1884.

²⁾ Einheitssätze bei Beständen von 1—10, 11—20, 21—50, bezw. über 100 Stück Rindvieh.

³⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1885.

	Berichtsjahr 1884/85.			Berichtsjahr 1885/86.		
	Beitrag für jedes St. Rindv. Pfennige	Mark	Pf.	Beitrag für jedes St. Rindv. Pfennige	Mark	Pf.
5. Provinz Pommern	20	100020	20	10, 20, 30, 40 ⁵⁾	88966	30
6. - Posen	5, 10 bezw. 20 ²⁾	55914	05	5, 10, 20 ²⁾	60046	40
7. - Schlesien	0,207463	2889 ¹⁾	26	0,013316	191 ⁴⁾	47
8. - Sachsen	3, 4, 6 bezw. 8	278821 ²⁾	94	4, 6, 8, 12 bezw. 16	393160 ⁶⁾	50
9. - Schlesw.-Holstein (ausschliessl. Kr. Lauenburg)	—	—	—	—	—	—
10. Kreis Herzogth. Lauenburg	10	2541	14	—	—	—
11. Provinz Hannover	4	33638 ²⁾	64	8	69514 ⁶⁾	—
12. - Westfalen	—	—	—	—	—	—
13. Reg.-Bez. Kassel	5	13713	10	5	14201	70
14. - Wiesbaden/ausschl. Frankfurt a. M.)	5	10308	90	10	22135 ⁷⁾	90
15. Frankfurt a. M.	150	2395	50	—	—	—
16. Rheinprovinz	5	46694	40	5	48110	55
17. Hohenzollernsche Lande .	—	—	—	—	—	—

Aus der Staatskasse sind für auf polizeiliche Anordnung behufs Tilgung der Lungenseuche getödtete Stück Rindvieh

27562 Mark 7 Pfennige

weniger an Entschädigungen gezahlt worden als im Jahre 1884/85, wie die nachstehende Vergleichung zeigt:

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1884.

²⁾ 5, 10, bezw. 20 Pfennige sind Einheitssätze für Bestände von 1—20, 21 bis 40, bezw. 41 und mehr Stück Rindvieh.

³⁾ Die Beiträge sind zur Deckung der im Kalenderjahr 1883 gezahlten Entschädigungen erhoben worden.

⁴⁾ Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr 1885.

⁵⁾ Einheitssätze bei Beständen von 1—10, 11—20, 21—50 bezw. über 100 Stück Rindvieh.

⁶⁾ Die Beiträge sind zur Deckung der im Kalenderjahr 1884 gezahlten Entschädigungen erhoben worden.

⁷⁾ Ausserdem sind nachträglich für das Rechnungsjahr 1884/85 noch von 213 Stück Rindvieh (à 5 Pf.) 10,65 Mark zur Erhebung gelangt.

P r o v i n z.	Berichtsjahr 1884/85.		Berichtsjahr 1885/86.	
	Mark	Pf.	Mark	Pf.
1. Ostpreussen	—	—	270	—
2. Westpreussen	13538	23	2935	—
3. Brandenburg	6634	65	1511	67
4. Pommern	4234	33	1885	—
5. Posen	100	—	201	—
6. Schlesien	310	—	305	—
7. Sachsen	2707	32	9626	66
8. Schleswig-Holstein	—	—	—	—
9. Hannover	8152	—	1879	—
10. Westfalen	6197	25	537	12
11. Hessen-Nassau	3632	49	310	—
12. Rheinprovinz	2895	25	1379	—
13. Hohenzollernsche Lande.....	—	—	—	—
Summa	48401	52	20839	45

6. Die Schafpocken.

Ausbrüche der Schafpocken sind nur in Ostpreussen und zwar in denjenigen Kreisen beobachtet worden, in denen die Seuche auch im vorigen Berichtsjahre eine mehr oder minder bedeutende Verbreitung erlangt hatte (s. IX. Jahresbericht, S. 98 u. 99).

1. Reg.-Bez. Königsberg. Im ersten Quartal verseuchte je eine Herde in Wangotten, Kr. Rastenburg, — Einschleppung nicht ermittelt — und in Josephshof, Kr. Rössel, — die Einschleppung erfolgte wahrscheinlich von dem Hauptgute Raschung, dessen Schafbestand wegen Ausbruchs der Pocken vom vierten Quartal des vorigen Jahres bis zum 9. Juni 1885 unter Observation gestanden hatte. Ausserdem wurden die Schafpocken in den Kreisen Rastenburg und Rössel während des zweiten und dritten Quartals noch constatirt: in Freudenberg — Ursachen werden nicht erwähnt, Schönbruch — das Gut grenzt an den verseuchten Ort Raschung — und Rothfliess — der Besitzer hatte Schafe aus dem früher stark verseuchten Kreis Sensburg gekauft.

Im zweiten Quartal kamen Ausbrüche der Pocken ausserdem unter 10 Schafherden in 7 Ortschaften des Kreises Allenstein und unter 6 Schafherden in eben so vielen Ortschaften des Kreises Ortelsburg

vor. Die verseuchten Ortschaften des Kreises Allenstein liegen so nahe benachbart, dass die Krankheit sich leicht von einem Orte nach dem anderen verbreitet haben kann, in den zuerst verseuchten Ort soll dieselbe aus dem Kreise Rössel eingeschleppt worden sein. Die Einschleppung in den Kreis Ortelsburg ist angeblich durch Fleischer vermittelt worden, an deren Kleidern Contagium haftete. Die Fleischer hatten in den Ställen, in denen die Seuche bald darauf ausbrach, Schafo behufs Ankauf untersucht. Im dritten Quartal brach die Seuche noch in einer Ortschaft des Kreises Ortelsburg unter Schafen aus, welche mit einer im Quartal vorher erkrankten Herde in Berührung gekommen waren, ferner in Münsterberg, Kr. Heilsberg — Einschleppung nicht erwähnt — und in 3 Ortschaften des Kreises Wehlau, nämlich in Gross-Neumühl, wohin sie durch Hausirer eingeschleppt sein soll, und in Kleinmühl bezw. Elisenthal, wohin sie aus dem zuerst genannten benachbarten Seucheorte verschleppt worden ist

Im vierten Quartal sind Ausbrüche der Schafpocken im Reg.-Bez. Königsberg nicht beobachtet worden.

2. Reg.-Bez. Gumbinnen. Im ersten Quartal wurden Schafpocken nur in je einer Herde zu Klein-Jauer, Kr. Lötzen, — unter einem Bestande von 5 Schafen — und in Alt-Jucha, Kr. Lyck, — unter einem Bestande von 13 Schafen — beobachtet, die Präcautionsimpfung wurde bei 38 Schafen, welche 26 Besitzern gehörten, ausgeführt, nur 5 Schafe sind gefallen. Die Seuche gewann in den Kreisen Lötzen und Lyck während des zweiten und dritten Quartals eine bedeutende Verbreitung und ergriff auch noch im vierten Quartal die Schafe je einer Ortschaft. Im Ganzen waren während des Berichtsjahres 13 Ortschaften des Kreises Lötzen und 40 Ortschaften des Kreises Lyck durch die Schafpocken verseucht. Das statistische Material enthält keine Mittheilungen über die Ursachen der starken Verbreitung im Kreise Lötzen, in welchem die Seuche ununterbrochen seit dem Jahre 1880 herrscht und wiederholt unter Schafen derselben Ortschaft aufgetreten ist. Der Kreis Lötzen kann als der Centralherd der Pockenseuche in den masurischen Kreisen Ostpreussens angesehen werden. Der Kreisthierarzt des Kreises Lyck äussert sich ebenfalls nicht über die Ursachen der zahlreichen Pockenausbrüche. Dagegen theilt der Departementsthierarzt aus den ihm zugänglichen Acten Folgendes mit:

„Der Kreis Lyck war 1883 pockenfrei, im August 1884 brach die Seuche in Gross- und Klein-Mrossen, sowie in Kallenzin aus, über

die Einschleppung hat nichts ermittelt werden können. Von Mrossen aus verbreiteten sich die Pocken im Herbst 1884 auf die Schafe in Sordachen, Kosziken und Alt-Jucha. Von dem zuletzt genannten Orte hat sich die Seuche im Jahre 1885 mittelbar oder unmittelbar auf die oben erwähnten 40 Ortschaften verbreitet.“

Ausserdem wurden Pockenausbrüche beobachtet: in 6 Ortschaften des Kreises Angerburg, in 6 Ortschaften des Kreises Johannisburg und in 15 Ortschaften des Kreises Oletzko. Die verseuchten Ortschaften des Kreises Angerburg liegen an der Grenze des Kreises Lötzen, aus welchem die Seuche angeblich eingeschleppt worden ist. Ueber die Ausbrüche im Kreise Johannisburg fehlen nähere Angaben, in den Kreis Oletzko soll die Seuche aus dem Kreise Lyck eingeschleppt worden sein. Der früher stark verseuchte Kreis Sensburg ist während des Berichtsjahres frei von den Pocken geblieben.

Vielfach wird aus den genannten Kreisen des Reg.-Bez. Gumbinnen berichtet, dass die Anzeige von Ausbrüchen der Schafpocken sehr verspätet geleistet worden ist, dass zur Zeit der Constatirung die Pocken theils schon abgeheilt waren, theils bereits eine grössere Anzahl von Herden in der betreffenden Ortschaft ergriffen hatten. Im Kreise Lyck wurde meist sofort die Präcautionsimpfung aller Herden in den verseuchten Ortschaften angeordnet, während derartige Impfungen im Kreise Oletzko so gut wie gar nicht und Nothimpfungen nur dann ausgeführt wurden, wenn die Pocken nach dem Befunde erst kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit zum Ausbruch gekommen waren. Dem entsprechend erstreckte sich in einzelnen grösseren Dörfern des Kreises Oletzko die Dauer der Seuche auf mehrere Monate. In Schwentainen z. B. verseuchten je ein Gehöft am 7., 18., 23. September und 18. October, in Krzywen je ein Gehöft am 20., 23., 30. September und 23. December.

Das statistische Material liefert auch im Berichtsjahre keine nähere Aufklärung über die Ursachen der zahlreichen Pockenausbrüche in Ostpreussen und der zum Theil weiten Verbreitung, welche die Seuche in einzelnen Kreisen erlangte. Nur in ganz vereinzelt Fällen wird erwähnt, dass das Umsichgreifen der Krankheit durch Weidenschaft bzw. durch die Schafe der Dienstleute vermittelt wurde. Im Uebrigen bleiben die Verhältnisse im Dunkeln, welche Anlass gaben, dass die Pocken in jedem Jahre zahlreiche Herden in bestimmten ostpreussischen Kreisen ergreifen, während der ganze übrige Staat dauernd pockenfrei bleibt.

Im Allgemeinen muss jedoch anerkannt werden, dass die Zahl der Pockenausbrüche gegen die vorhergehenden Jahre auch in Ostpreussen abgenommen, und dass die Tilgung der Seuche namentlich im Reg.-Bez. Königsberg Fortschritte gemacht hat. Wie in allen früheren Jahren entfallen die zahlreichsten Pockenausbrüche in Ostpreussen auf das zweite und dritte Quartal.

Ausserdem enthalten die Berichte noch folgende Angaben über das Auftreten der Schafpocken:

In Buchhof, Kr. Dramburg, Reg.-Bez. Köslin, starb am 20. Juni 1885 ein Lamm angeblich an den Pocken. Weitere Erkrankungen sind in der aus 287 Schafen bestehenden Herde nicht vorgekommen. In Kerketief, Kr. Emden, Reg.-Bez. Aurich, starb im ersten Quartal ein Schaf an den Pocken, die übrigen auf demselben Gehöft befindlichen 8 Lämmer und 1 Schaf erkrankten nicht. Da in beiden Fällen sicherlich eine unrichtige Beurtheilung der Krankheit vorliegt, sind die genannten Ausbrüche nicht in die Generaltabellen aufgenommen worden.

7. Die Beschälseuche und der Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehs

Ueber einen Fall von Beschälseuche wird aus dem Kreise Recklinghausen, Reg.-Bez. Münster, Folgendes berichtet:

„Drei Stuten erkrankten etwa 14 Tage nach dem Decken unter folgenden Erscheinungen: häufiges Drängen auf die Geschlechtsorgane, mehr oder weniger heftiger Scheidencatarrh, Ausfliessen einer ziemlich klaren, gelbröthlichen Flüssigkeit aus der Scheide, Schwellung um After und Scham, dagegen keine Bläschen an den Geschlechtsorganen, Fresslust vermindert. Später entstanden neben After und Scham bezw. am Euter Abscesse, aus denen sich tiefe, fistulöse Geschwüre bildeten, letztere entleerten gelblichen, dünnflüssigen Eiter. Dabei war starke Abmagerung, gesträubtes Haar, starkes Aufziehen der Flanken zu beobachten. Zwei Stuten schienen nach 10 wöchentlicher Behandlung genesen zu sein, die dritte zeigte am Schlusse des Berichtsjahres noch eine starke Anschwellung des Euters und befand sich noch in Behandlung. Der Hengst, welcher die Stuten gedeckt hatte, soll von dem Kreisthierarzte eines benachbarten Kreises untersucht und gesund befunden sein“.

Nach diesen Angaben liegt jedenfalls ein Irrthum in der Diagnose vor. Wir haben in der Zusammenstellung S. 96 u. 97 demgemäss den betreffenden Fall von Beschälseuche nicht weiter berücksichtigt und dürfte hier hervorgehoben werden, dass Fälle von Beschälkrankheit während des Berichtsjahres nicht beobachtet worden sind.

Der Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehs ist fast in derselben Verbreitung wie im vorigen Jahr beobachtet

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal					Im zweiten Quartal					Im drit	
		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	erkrankt		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	erkrankt		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.
					Pferde.	St. Rindvieh.				Pferde.	St. Rindvieh.		
1.	Ostpreussen	2	4	4	2	63	1	1	1	—	1	—	—
2.	Westpreussen	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3.	Brandenburg	7	17	44	4	66	4	5	11	—	12	2	2
4.	Pommern	2	9	13	9	6	1	1	1	—	1	1	2
5.	Posen	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1
6.	Schlesien	8	12	20	—	25	4	13	30	—	34	1	1
7.	Sachsen	10	17	53	11	47	4	7	45	—	101	3	4
8.	Schleswig-Holstein . .	7	35	66	13	90	1	1	1	—	1	—	—
9.	Hannover	4	6	47	—	58	2	9	71	—	91	3	3
10.	Westfalen	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
11.	Hessen-Nassau	7	17	131	—	164	6	6	22	—	24	2	2
12.	Rheinprovinz	3	6	7	2	16	2	2	2	—	7	2	2
13.	Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	54	128	390	43	538	25	45	184	—	272	15	17
	Im Berichts- jahre 1884/85	53	101	315	47	394	26	41	117	19	117	14	20
	Im Berichts- jahre 1885/86 mehr	1	27	75	—	144	—	4	67	—	55	1	—
	weniger	—	—	—	4	—	1	—	—	19	—	—	3

ten Quartal			Im vierten Quartal						Im Berichtsjahre				Regierungsbezirke, in denen der Bläschenaus- schlag der Pferde und des Rindviehs nicht beobachtet worden ist, nebst Angabe der seuchefrei gebliebenen Quartale.
Zahl der Gehöfte.	er- krankt		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.			er- krankt	Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		er- krankt		
	Pferde.	St. Rindvieh.		Zahl der Gehöfte.	Pferde.	St. Rindvieh.			Pferde.	St. Rindvieh.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	2	64	Königsberg 3. 4. Qu. Gumbinnen 1.—4. Qu. Danzig 2.—4. Qu. Marienwerder 1.—4. Q.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	Frankfurt 3. Qu. Berlin 1.—4. Qu.
5	—	7	5	7	16	—	18	11	31	4	103	Stettin 2. 4. Qu. Köslin 1. 3 4. Qu.	
5	—	6	—	—	—	—	—	3	12	9	13	Stralsund 2.—4. Qu. Posen 1. 2. 4. Qu.	
1	—	5	1	3	3	12	—	4	6	14	5	Bromberg 2. 3. Qu. Breslau 3. 4. Qu.	
2	—	2	2	10	13	9	4	13	36	9	65	Liegnitz 3. Qu. Erfurt 1.—3. Qu.	
15	1	19	8	10	42	—	53	15	38	12	220	Schleswig 3. Qu. Hannover 1.—3. Qu.	
—	—	—	4	5	11	—	13	8	41	13	104	Hildesheim 2.—4. Qu. Lüneburg 1. Qu.	
7	—	10	4	4	14	—	17	10	22	—	176	Stade 3. 4. Qu. Osnabrück 2. 4. Qu.	
—	—	—	1	2	5	5	—	2	4	5	2	Aurich 1. 2. 4. Qu. Münster 1.—3. Qu.	
7	—	8	5	9	28	—	30	10	34	—	226	Minden 2.—4. Qu. Arnsberg 1.—4. Qu.	
23	—	24	3	4	6	1	7	6	14	3	54	Düsseldorf 2.—4. Qu. Köln 1. 2. Qu.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Trier 1.—4. Qu. Aachen 2.—4. Qu. Sigmaringen 1.—4. Q.	
65	1	81	33	54	138	27	142	86	244	71	1033		
80	1	132	27	41	106	8	141	85	198	75	784		
—	—	—	6	13	32	19	1	1	46	—	249		
15	—	51	—	—	—	—	—	—	—	4	—		

worden, die Zahl der verseuchten Kreise ist fast dieselbe, und es sind nahezu die gleichen Kreise, in denen die Krankheit während beider Jahre unter dem Rindvieh beobachtet worden ist. Wie in den vorhergegangenen Berichtsjahren entfallen die meisten Erkrankungen auf das erste und vierte Quartal.

Unter den erkrankten Pferden befinden sich 7 Landgestüts-hengste, welche eine grössere Anzahl von Stuten inficirten. Jedoch erkrankten in den meisten Fällen nicht alle von den kranken Hengsten gedeckte Stuten, im Kreise Memel z. B. nur eine von 38 Stuten, welche der Landgestüts-hengst Seidenspitz gedeckt hatte. Die ersten Krankheitserscheinungen machten sich meistens 2, 4 mitunter erst 6 Tage nach dem Begattungsact bemerklich.

Die zahlreichsten Erkrankungen bei dem Rindvieh wurden in den nachstehend genannten Kreisen beobachtet:

Reg.-Bez.	Königsberg,	Kr. Labiau	in 2	Geböften	63	St. Rindvieh
-	Potsdam	- Ost-Priegnitz	- 31	-	51	-
-	Frankfurt,	- Krossen	- 6	-	11	-
-	Breslau,	- Militsch	- 17	-	20	-
-	Liegnitz,	- Grünberg	- 22	-	24	-
-	Magdeburg,	- Gardelegen	- 21	-	62	-
		- Kalbe	- 9	-	10	-
-	Merseburg,	- Bitterfeld	- 12	-	13	-
		- Torgau	- 36	-	58	-
		- Sangerhausen	- 12	-	14	-
-	Schleswig,	- Husum	- 10	-	12	-
		- Norderdithmarschen	- 8	-	11	-
		- Ploen	- 4	-	20	-
		- Sonderburg	- 18	-	28	-
		- Tondern	- 10	-	18	-
-	Stade,	- Kehdingen	- 70	-	90	-
		- Stade-Marsch	- 36	-	42	-
-	Kassel,	- Hanau	- 29	-	29	-
		- Schlüchtern	- 9	-	10	-
-	Wiesbaden,	- Oberlahnkr.	- 33	-	35	-
		- Oberwesterwaldkr.	- 76	-	108	-
-	Koblenz,	- Zell	- 25	-	43	-
Zusammen			in 496 Geböften		772 St. Rindvieh.	

Auf die genannten 22 Kreise entfallen mithin 74,73 pCt. aller Erkrankungen an Bläschenausschlag bei dem Rindvieh.

Im Uebrigen enthält das statistische Material keine Bemerkungen von veterinär-polizeilichem Interesse über diese Krankheit, welcher von den Besitzern im Allgemeinen nur eine geringe Aufmerksamkeit zugewendet wird.

8. Die Räude der Pferde und der Schafe.

a) Räude der Pferde.

Die Vergleichung am Fusse der Tabelle S. 100 u. 101 zeigt, dass die Zahl der Räudeausbrüche und der räudekranken Pferde gegen das vorige Jahr sehr bedeutend abgenommen hat. Auch im Berichtsjahre hat sich die Thatsache auffallend bemerklich gemacht, dass die Zahl der Räudeausbrüche und der erkrankten Pferde im ersten und vierten Quartal die entsprechenden Zahlen des zweiten und dritten Quartals erheblich übersteigt.

Von den 559 räudekranken Pferden entfallen 77 (13,77 pCt.) — im vorigen Berichtsjahre 32,84 pCt. — auf Ostpreussen und unter denselben 36 auf den Reg.-Bez. Königsberg, 41 auf den Reg.-Bez. Gumbinnen. Die Räudeerkrankungen vertheilen sich:

1884/85	auf 25 Kreise	und 157 Bestände.
1885/86	- 17 - -	34 -

Die Tilgung der Räude hat mithin in dieser bisher am stärksten verseuchten Provinz sehr erhebliche Fortschritte gemacht. Nur in wenigen Beständen wurden mehr als 3 Pferde desselben Bestandes räudekrank befunden, nämlich in je einem Bestande der Ortschaften:

Gottker,	Kr. Allenstein,	5 Pferde.
Landsberg,	- Pr. Eylau,	4 -
Ebersbach,	- Pr. Holland,	5 -
Althof Insterburg,	- Insterburg,	12 -
Rzurren,	- Johannsburg,	4 -
Masuhren,	- Oletzko,	5 -
Ungenannte Ortschaften,	- Ragnit,	6 -

In allen übrigen Ausbrüchen blieben die Erkrankungen vereinzelt; 8 räudekranke Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, unter diesen 2 in Russland, je 1 räudekrankes Pferd wurde auf den Märkten in Ortelsburg und Kaukehmen ermittelt, drei Ausbrüche führen die Berichte auf Infection unterwegs bezw. in Gaststätten zurück, zwei Ausbrüche in einer Ortschaft des Kreises Mohrungen sind durch Benutzung des Sattels von einem räudekranken Pferde veranlasst worden; 2 räudekranke Pferde gehörten umherziehenden Handelsleuten, 1 räudekrankes Pferd war einem Abdecker zum Tödten übergeben, von diesem jedoch verkauft worden. Die

100 Jahresbericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten.

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal					Im zweiten Quartal					Im dritten		
		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Pferde		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Pferde		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	
			Zahl der Gehöfte.	erkrankt.	gefallen bezw. getödtet.	Zahl der Gehöfte.		erkrankt.	gefallen bezw. getödtet.	Zahl der Gehöfte.	erkrankt.		gefallen bezw. getödtet.	
1.	Ostpreussen	6	7	7	22	1	7	7	8	13	3	2	3	3
2.	Westpreussen	14	32	38	50	4	5	11	12	15	3	2	2	3
3.	Brandenburg	4	5	9	22	3	2	4	4	8	—	4	4	4
4.	Pommern	7	15	19	34	5	5	10	10	27	2	4	7	7
5.	Posen	13	23	24	46	4	5	6	6	10	6	4	7	7
6.	Schlesien	13	17	18	23	6	10	13	14	17	—	6	6	6
7.	Sachsen	3	3	3	12	1	—	—	—	—	—	1	1	1
8.	Schleswig-Holstein . .	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
9.	Hannover	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
10.	Westfalen	2	6	6	4	—	1	1	1	1	—	1	1	1
11.	Hessen-Nassau	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
12.	Rheinprovinz	2	3	3	3	1	1	4	5	6	—	—	—	—
13.	Hohenzollernsche Lande	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	66	113	129	218	25	37	57	61	99	14	26	33	34
	Im Berichtsjahre 1884/85	92	177	215	459	54	61	116	139	295	34	45	55	60
	Im Berichtsjahre 1885/86: mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	weniger	26	64	86	241	29	24	59	78	196	20	19	22	26

Quartal		Im vierten Quartal						Im Berichtsjahre						Regierungsbezirke, in denen die Räude der Pferde nicht beobachtet wurde, nebst Angabe der seuchefrei gebliebenen Quartale.
Pferde		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Pferde		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Pferde				
erkrankt.	gefallen bezw. getötet.		Zahl der Gehöfte.	erkrankt.	gefallen bezw. getötet.	Zahl der Gehöfte.		erkrankt.	gefallen bezw. getötet.					
		erkrankt.					gefallen bezw. getötet.							
6	—	9	15	16	34	5	17	29	34	77	9	Danzig 3. Qu. Frankfurt 2. Qu. Berlin 2.—4. Qu. Stettin 2. Qu. Stralsund 1.—4. Qu.		
9	3	7	16	16	31	3	17	58	69	105	13			
5	—	3	4	4	13	4	11	17	21	48	7			
7	2	7	9	13	23	5	14	39	49	91	14			
18	1	11	19	21	38	5	20	51	58	112	16			
8	—	12	22	22	25	7	27	55	60	73	13			
1	—	2	2	3	5	1	5	7	7	18	2			
1	1	1	1	1	1	—	3	3	3	3	1			
2	—	1	1	1	3	—	2	2	2	5	—			
1	—	3	3	4	6	—	6	9	12	12	—			
—	—	1	1	1	1	—	2	2	2	3	—			
—	—	1	1	1	2	—	2	8	9	11	1			
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—			
60	7	58	94	103	182	30	127	281	327	559	76	Magdeburg 2. Qu. Merseburg 2. 3. Qu. Erfurt 1.—4. Qu. Schleswig 2. Qu. Hannover 1.—4. Qu. Hildesheim 1.—4. Qu. Lüneburg 1.—3. Qu. Stade 1.—4. Qu. Osnabrück 1.—4. Qu. Aurich 1. 2. 4. Qu. Münster 1. 2. 4. Qu. Minden 3. Qu. Arnsberg 2. 3. Qu. Kassel 1. 3. Qu. Wiesbaden 1.—4. Qu. Koblenz 3. Qu. Düsseldorf 1.—4. Qu. Köln 1.—4. Qu. Trier 1.—4. Qu. Aachen 2.—4. Qu. Sigmaringen 2.—4. Qu.		
112	25	83	165	193	434	50	155	475	607	1300	163			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
52	18	25	71	90	252	20	28	194	280	741	87			

Berichte erwähnen, dass die zum Theil sehr lässig durchgeführte Behandlung und dass die mangelhafte Desinfection ein verhältnissmässig lange Zeit fortdauerndes Herrschen der Räude in einzelnen Beständen zur Folge gehabt und nicht selten Anlass zu einer weiteren Verbreitung der Krankheit gegeben haben.

Von den 105 in Westpreussen räudekrank befundenen Pferden (18,78 pCt.) — im vorigen Berichtsjahr 23,47 pCt. — entfallen 35 auf den Reg.-Bez. Danzig und 70 auf den Reg.-Bez. Marienwerder; die Räudeerkrankungen vertheilen sich:

1884/85	auf 21 Kreise	und 127 Bestände.
1885/86	- 17 - -	19 -

In Wollenthal, Kr. Pr.-Stargard, waren 12 und in zwei Gehöften von Riesenburg, Kr. Rosenberg, 8 Pferde desselben Bestandes räudekrank. Die meisten Fälle blieben ganz vereinzelt. Während des ersten Quartals wurden in 7 Ortschaften des Kreises Flatow zusammen 15 Pferde räudekrank befunden; dieselben gehörten 9 kleinen Beständen, welche zu Holzfahren benutzt wurden, einem Müller und einem Hausirer. 6 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, je 1 räudekrankes Pferd wurde auf den Märkten in Adlich-Briesen, Christburg und Neuteich, 2 solche Pferde bei Revision der Hausirerpferde ermittelt. Vier Ausbrüche der Räude sollen durch Infection unterwegs oder in Gastställen veranlasst worden sein.

Die 48 räudekranken Pferde in der Provinz Brandenburg, (8,58 pCt.) — im vorigen Jahre 4,46 pCt. —, von denen 20 auf den Reg.-Bez. Potsdam, 19 auf den Reg.-Bez. Frankfurt und 9 auf die Stadt Berlin entfallen, vertheilen sich auf 21 Bestände in 11 Kreisen. Im vorigen Jahr waren 58 Pferde räudekrank, welche 41 Beständen in 14 Kreisen angehörten. Ueber 3 Pferde waren räudekrank in folgenden 4 Beständen:

1 Bestand	in Schönfeld, Kr. Teltow,	4 Pferde.
1 -	- Schöneich, - Sorau,	8 -
2 Bestände	- Kremmen, - Ost Havelland,	8 -

Drei Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, unter diesen 1 in Galizien, je 2 räudekranken Pferde wurden auf den Märkten in Mittenwalde und Priebus, je 1 auf dem Markte in Beeskow und auf der Berliner Rossschlächtereie ermittelt. Zu zwei Ausbrüchen soll Infection unterwegs oder in Gastställen Veranlassung gegeben haben.

Von den 91 in P o m m e r n räudekrank befundenen Pferden

(16,28 pCt.) — im vorigen Jahre 9,08 pCt. —, entfallen 20 auf den Reg.-Bez. Stettin und 71 auf den Reg.-Bez. Köslin. Der Reg.-Bez. Stralsund blieb wie im vorigen Jahre frei von der Pferderäude. Die Räudeerkrankungen vertheilen sich:

1884/85 auf 12 Kreise und 52 Bestände.
1885/86 - 14 - - 49 -

Ueber 3 Pferde wurden räudekrank befunden in den nachstehend genannten Beständen:

Polzin,	Kr. Belgard,	4 Pferde.
Neu-Barzin,	- Köslin,	4 -
Sohrenbohm,	- -	5 -
Poppow,	- Lauenburg,	6 -
Heinrichsbrunn,	- Rummelsburg,	6 -

Während des vierten Quartals erwiesen sich 14 Pferde, welche fünf Fuhrleuten im Kreise Greifenhagen gehörten, mit der Räude behaftet, die Infection hatte durchweg unterwegs stattgefunden; 11 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, je 3 räudekranke Pferde wurden auf den Märkten in Bütow und Tempelburg, 2 auf dem Markte in Kolberg, 1 auf dem Markte in Rummelsburg ermittelt; zu 10 Ausbrüchen soll Infection unterwegs oder in Gaststätten Anlass gegeben haben. Im Reg.-Bez. Köslin verbreitete sich die Krankheit nicht selten auf die Pferde nachbarlicher Besitzer.

Von den 112 räudekranken Pferden in der Provinz Posen, (20,03 pCt.) — im vorigen Berichtsjahre 7,38 pCt. — entfallen 54 auf den Reg.-Bez. Posen und 58 auf den Reg.-Bez. Bromberg. Die Räudeerkrankungen vertheilen sich:

1884/85 auf 17 Kreise und 62 Bestände.
1885/86 - 20 - - 58 -

In Tesin, Kr. Schrimm, und in Radlin, Kr. Wreschen, erwiesen sich je 6 Pferde desselben Bestandes räudekrank; 7 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, 1 räudekrankes Pferd wurde auf dem Markte in Gnesen ermittelt. In Ziegelscheune, Kr. Meseritz, gelangte das Herrschen der Krankheit nach halbjähriger Verheimlichung zur Kenntniss der Behörden; in Behle, Kr. Czarnikau, brach die Räude nach halbjähriger Pause von Neuem aus. Ein Ausbruch soll durch die Benutzung einer gefundenen Pferddecke veranlasst worden sein. In Adelnau wurden 4 räudekranke, in Polen zum Droschkenfuhrwerk benutzte Pferde eines Besitzers getödtet.

Von den 73 räudekranken Pferden in Schlesien, (13,06 pCt.) — im vorigen Jahre 13,77 pCt. — entfallen 34 auf den Reg.-Bez.

Breslau, 20 auf den Reg.-Bez. Liegnitz und 19 auf den Reg.-Bez. Oppeln. Die Räudeerkrankungen vertheilen sich:

1884/85	auf	41	Kreise	und	117	Bestände.
1885/86	-	27	-	-	60	-

Dieselben haben im Berichtsjahre demgemäss erheblich abgenommen und wurden fast durchweg in kleinen Beständen beobachtet. 5 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, 2 räudekranke Pferde wurden auf dem Markt in Pless, je 1 auf den Märkten in Sohrau und Schweidnitz und 4 auf der Rossschlächterei in Breslau ermittelt. Zu vier Ausbrüchen der Räude soll Infection in Polen bezw. Galizien Anlass gegeben haben. Die Revision der Hausirerpferde führte zur Ermittelung eines räudekranken Pferdes.

In Eilsleben, Kr. Neuhaldensleben, erwiesen sich alle 4 Pferde des Bestandes, in Elsterberg, Kr. Torgau, 7 Pferde desselben Besitzers mit der Räude behaftet. Die Einschleppung war in dem zuletzt genannten Falle durch ein Pferd vermittelt, welches der Besitzer auf einer Auction in Berlin gekauft hatte.

Die übrigen 7 in der Provinz Sachsen räudekrank befundenen Pferde vertheilen sich auf zusammen 5 Bestände in den Kreisen Kalbe, Wanzleben, Reg.-Bez. Magdeburg, und Wittenberg, Reg.-Bez. Merseburg. Der Reg.-Bez. Erfurt blieb wie im vorigen Jahre frei von der Pferderäude. 4 Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, zu zwei Ausbrüchen hat Infection unterweges — unter diesen einmal in Anhalt — Anlass gegeben.

Im Reg.-Bez. Schleswig wurde die Räude bei je 1 Pferde in den Kreisen Altona — die Infection war in Hamburg erfolgt — Kiel — auf der Rossschlächterei ermittelt — und Apenrade — bei dem aus Russland angekauften Pferde eines Gensdarmen — festgestellt.

In der Provinz Hannover beschränkte sich das Auftreten der Räude auf 2 kurz vorher im Grossherzogthum Oldenburg angekaufte Pferde eines Besitzers im Kreise Leer, Reg.-Bez. Aurich, und auf sämtliche 3 Pferde eines Bestandes im Kreise Harburg, Reg.-Bez. Lüneburg. Die Reg.-Bez. Hannover, Hildesheim, Stade und Osna-brück blieben frei von der Pferderäude.

Die 12 räudekranken Pferde in der Provinz Westfalen vertheilen sich auf die Kreise Kösfeld (1), Reg.-Bez. Münster, Bielefeld (2), Herford (3), Höxter (1), Reg.-Bez. Minden, Brilon (4) und Iserlohn, (1), Reg. Bez. Arnsberg.

In Hessen-Nassau wurde die Räude bei 2 Pferden eines Be-

sitzers im Kreise Frankenberg und bei 1 Pferde im Kreise Gerfeld, Reg.-Bez. Kassel, constatirt. Der Reg.-Bez. Wiesbaden blieb wie im vorigen Jahre frei von der Pferderäude.

Unter den Pferden eines Fuhrunternehmers im Kreise Koblenz brach während des ersten Quartals die Räude aus, welche sich von diesem Bestande aus auf die Pferde von sieben anderen Besitzern verbreitete. Ausserdem wurde die Räude bei einem kurz vorher aus Holland angekauften Pferde in der Stadt Aachen beobachtet. Die Reg.-Bez. Düsseldorf, Köln und Trier blieben frei von der Pferderäude.

Die einzige in den Hohenzollernschen Landen constatirte Räudeerkrankung entfällt auf den Oberamtsbezirk Gammertingen.

Im Allgemeinen wurde die Pferderäude bei zweckentsprechender Behandlung meistens in kurzer Zeit geheilt. Gefallen bezw. getödtet sind im Ganzen 76 räudekranke Pferde (13,60 pCt.). Die entsprechende Verhältnisszahl betrug im vorigen Jahre 12,54 pCt.

Zusammen 48 räudekranke Pferde waren kurze Zeit vor Constatirung der Krankheit angekauft, unter diesen 3 in Polen, 2 in Oldenburg, je 1 in Holland und Galizien, 24 bezw. 6 räudekranke Pferde wurden bei Beaufsichtigung der Perdemärkte und Rossschlächtereien ermittelt, zu 26 Ausbrüchen der Räude soll Infection unterwegs oder in Gastställen Anlass gegeben haben, die Infection erfolgte je zweimal in Polen bezw. in Galizien, je einmal in Anhalt bezw. Hamburg.

Uebertragungen der Pferderäude auf Menschen wurden beobachtet: in Bahrow, Kr. Guben, die ganze Familie des Besitzers erkrankte, Greifenhagen, Kr. Greifenhagen, — 2 Menschen —, Sohrenbohm, Kr. Köslin, — 1 Mensch.

b) Räude der Schafe.

Die Angaben des statistischen Materials über die Verbreitung der Schafräude sind fast durchweg so dürftig und so wenig zuverlässig, dass die Tabelle S. 106 u. 107, in welche nur die während des Berichtsjahres constatirten Ausbrüche aufgenommen wurden, weder eine genaue Kenntniss von dem Stande der Schafräude noch einen Massstab liefern kann, nach welchem zu beurtheilen ist: welche Fortschritte die Til-

Laufende Nummer.	Provinz.	Im ersten Quartal					Im zweiten Quartal					Im dritten			
		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Schafe			Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Schafe			Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.	Zahl der Gehöfte.	
				erkrankt.	gefallen bezw. getödtet.				erkrankt.	gefallen bezw. getödtet.					
1.	Ostpreussen.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5
2.	Westpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Brandenburg.....	1	3	3	150	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Pommern.....	1	1	1	22	—	—	—	—	—	—	—	1	3	10
5.	Posen.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Schlesien.....	1	1	1	80	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4
7.	Sachsen.....	9	18	63	1666	119	5	9	9	470	—	—	8	8	42
8.	Schleswig-Holstein ..	1	3	20	683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Hannover.....	11	32	155	2102	—	3	3	3	96	—	—	10	14	40
10.	Westfalen.....	5	15	31	795	9	2	2	2	75	—	—	7	20	66
11.	Hessen-Nassau	9	38	233	360	—	6	14	34	?	—	—	15	41	128
12.	Rheinprovinz.....	1	8	9	93	—	1	1	42	310	4	—	2	5	207
13.	Hohenzollernsche Lande.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	39	119	516	5951	133	17	29	90	951	4	—	45	97	502
	Im Berichtsjahre 1884/85	55	179	657	8297	64	32	106	209	4486	18	—	35	87	624
	Im Berichtsjahre 1885/86: mehr	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—	10	10	—
	weniger	16	60	141	2346	—	15	77	119	3535	14	—	—	—	122

Quartal		Im vierten Quartal					Im Berichtsjahre				Regierungsbezirke, in denen die Schafräude nicht beobachtet wurde, nebst Angabe der seuchefrei gebliebenen Quartale.	
Schafe		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Schafe		Zahl der Kreise.	Zahl der Ortschaften.		Schafe		
erkrankt.	gefallen bezw. getötet.		Zahl der Gehöfte.	erkrankt.	gefallen bezw. getötet.	erkrankt.		gefallen bezw. getötet.	erkrankt.	gefallen bezw. getötet.		
21	21	—	—	—	—	—	1	2	21	21	Königsberg 1. 2. 4. Qu. Gumbinnen 1.—4. Qu. Danzig 1.—4. Qu. Marienwerder 1.—4. Qu. Potsdam 1.—3. Qu. Frankfurt 2. 3. Qu. Berlin 1.—4. Qu. Stettin 2. Qu. Köslin 1.—3. Qu. Stralsund 1.—4. Qu. Posen 1.—4. Qu. Bromberg 1.—4. Qu. Breslau 1.—4. Qu. Liegnitz 1. 2. 4. Qu. Oppeln 2.—4. Qu.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4	4	4	2364	—	5	7	2514	5	—	
24	—	2	3	4	58	—	3	7	104	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	—	—	—	—	—	—	2	5	140	156	—	
2412	37	4	5	8	2003	—	18	40	6551	—	—	
—	—	1	1	1	59	—	2	4	742	1	Schleswig 2. 3. Qu. Hildesheim 1. Qu. Aurich 1. 2. 4. Qu.	
1180	1	11	16	29	1965	—	29	64	5343	11	—	
251	2	18	52	128	12633	—	23	70	13754	—	—	
712	—	18	32	191	6878	—	22	125	7950	14	Wiesbaden 1. 2. Qu. Koblenz 1. 2. 4. Qu. Düsseldorf 2. 3. Qu. Köln 1.—4. Qu. Trier 1. Qu. Aachen 1.—3. Qu.	
152	10	5	6	35	688	—	7	20	1243	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sigmaringen 1.—4. Qu.	
4812	71	63	119	400	26648	—	112	344	38362	208	—	
4957	29	58	167	440	5403	139	99	538	23243	250	—	
—	42	5	—	—	21245	—	13	—	15119	—	—	
145	—	—	48	40	—	139	—	194	—	42	—	

gung der Seuche in Folge der angeordneten Radikalbehandlung gemacht hat. Wir bemerken, dass die im Verhältniss zum vorigen Jahr grössere Zahl der verseuchten Kreise lediglich durch das Fehlen genauerer Angaben über die Verbreitung der Schafräude in Westfalen während des vorigen Jahres und durch die veränderte Kreiseintheilung in der Provinz Hannover veranlasst worden ist. In sehr vielen Fällen führen die Berichte die Zahl der räudekranken Schafe nicht an, so dass die betreffenden Zahlen der Tabelle nur den Werth eines Massstabes beanspruchen können, welcher die Verbreitung der Seuche in den einzelnen Provinzen zu vergleichen gestattet.

Aus der Tabelle ergibt sich zunächst, dass Westpreussen, Posen und die Hohenzollernschen Lande seuchefrei blieben, dass in den Provinzen Ostpreussen, Brandenburg, Pommern, Schleswig-Holstein und in der Rheinprovinz nur vereinzelte Ausbrüche der Schafräude beobachtet wurden, welche in den Provinzen Sachsen, Hannover, Westfalen und Hessen-Nassau nach wie vor ungemein verbreitet fortherrscht.

Bei dem geringen Werth, welchen die tabellarische Zusammenstellung beanspruchen kann, gestatten wir uns, die Aufmerksamkeit auf die folgenden dem Berichtsmaterial entnommenen Bemerkungen zu lenken. Die in denselben nicht genannten Regierungsbezirke blieben frei von der Schafräude. Stets sind nur die im Berichtsjahr constatirten Ausbrüche berücksichtigt, dagegen alle im vorigen Bericht erwähnten Ausbrüche, welche im Jahre 1885/86 fort dauerten bzw. getilgt wurden, ausser Acht gelassen wurden.

1. Reg.-Bez. Königsberg. Das Auftreten der Schafräude beschränkte sich auf zwei Ortschaften des Kreises Osterode. Ueber die Einschleppung wird nicht berichtet. Die Seuche ist durch Abschachten der betreffenden Bestände sofort getilgt worden.

2. Reg.-Bez. Potsdam. Die Räude wurde unter den Schafen eines grösseren Bestandes im Kreise Angermünde constatirt, dieselbe soll durch Treibschafe eingeschleppt worden sein.

3. Reg.-Bez. Frankfurt. Kr. Arnswalde: In Cürtow und zwei zu diesem Gute gehörenden Vorwerken brach die Räude, deren Herrschen im Februar 1885 für erloschen erklärt war, während des ersten Quartals von Neuem aus. Die kranken Schafe sind auf dem Berliner Schlachtviehmarkt abgeschlachtet worden. Kr. Lebus: Die angeblich durch Treibschafe infectirten Thiere eines Bestandes sind sofort abge-

schlachtet worden. Kr. Luckau: Die Ursachen des Ausbruches in einem Orte haben nicht ermittelt werden können. Kr. Spremberg: In einem Orte brach die Räude nach Ablauf von 2 Jahren von Neuem in einem scheinbar geheilten Bestande wieder aus; Anlass zu dem Auftreten der Krankheit in einem zweiten Orte sollen in Westfalen angekaufte Schafe gegeben haben.

4. Reg.-Bez. Stettin. Abgesehen von dem Herrschen der Räude in einem kleinen Bestande des Kreises Kammin, über welchen Ausbruch genauere Angaben fehlen, blieb die Krankheit in diesem früher stark verseuchten Regierungsbezirk auf vier Orte des Kreises Greifenberg beschränkt, dieselbe brach in zwei früher verseuchten Herden nach längerer Pause von Neuem aus. Die Tilgung würde weiter vorgeschritten sein, wenn die Räudebäder der kalten Witterung wegen nicht hätten aufgeschoben werden müssen.

5. Reg.-Bez. Köslin. Die Ausbrüche in zwei Orten des Kreises Köslin sind durch Ankauf kranker Schafe aus dem Kreise Greifenberg, Reg.-Bez. Stettin, veranlasst worden. Die betreffenden Bestände sollen abgeschlachtet werden.

6. Reg.-Bez. Liegnitz. Ueber die Einschleppung der Schafräude in einen Ort des Kreises Lüben enthält das statistische Material keine Mittheilungen. Durch Ankauf von Brakschafen aus der zuerst verseuchten Herde wurde die Krankheit auf Schafe in drei anderen Ortschaften desselben Kreises verbreitet.

7. Reg.-Bez. Oppeln. Die Räude brach in einem früher verseucht gewesenen, jedoch anscheinend geheilten Bestand des Kreises Tost-Gleiwitz von Neuem aus. Die betreffende Herde war am Schlusse des Berichtsjahres bis auf einen kleinen Rest bereits abgeschlachtet.

8. Reg.-Bez. Magdeburg. Von den 18 durch die Schafräude verseuchten Ortschaften sind 12 solche, in denen das Herrschen der Krankheit im Berichtsjahre constatirt wurde, in 6 Ortschaften waren andere Bestände im vorigen Jahr oder vor noch längerer Zeit mit der Räude behaftet gewesen. Von den 12 Ortschaften entfallen:

1	auf den Kreis	Aschersleben,
6	- - -	Gardelegen,
1	- - -	Halberstadt,
1	- die Stadt	Magdeburg,
2	- den Kreis	Oschersleben,
1	- - -	Wolmirstedt.

In je einen Ort wurde die Seuche durch kranke, aus der Gegend von Bamberg bzw. aus der Provinz Hannover angekaufte Schafe ein-

geschleppt. In Magdeburg erwiesen sich 34 Bestände räudekrank, welche im Sommer vorher auf einer gemeinschaftlichen Weide gehütet worden waren. Bezüglich der übrigen Ortschaften wird die Einschleppung nicht erwähnt. In den zahlreichen Räudestationen des Bezirks ist die Radikalbehandlung wohl überall eingeleitet worden; der Erfolg wird „als im Allgemeinen zufriedenstellend“ bezeichnet, jedoch fehlt es nicht an solchen Herden, bei denen auch nach dreimaligem Baden eine wesentliche Besserung nicht erreicht wurde.

9. Reg.-Bez. Merseburg. In 10 Orten wurden Ausbrüche der Räude während des Berichtsjahres ermittelt, nämlich:

in 1 Orte	des Kreises	Delitsch,
- 2 Orten	-	Eckartsberga,
- 1 Orte	-	Merseburg,
- 3 Orten	-	Naumburg,
- 1 Orte	-	Sangerhausen,
- 1	-	Weissenfels,
- 1	-	Zeitz.

In 2 Orten brach die Seuche nach längerer Pause von Neuem aus. in 6 Ortschaften gab Ankauf von kranken Schafen — welche je einmal aus Anhalt, Sachsen-Gotha und Schwarzburg-Sondershausen eingeführt worden waren — Anlass zur Einschleppung der Krankheit. Das Badeverfahren hatte bei seit längerer Zeit räudekranken Schafen häufig nicht den gewünschten Erfolg und soll im Sommer des nächsten Jahres nochmals wiederholt werden. Es wird die Befürchtung ausgesprochen, dass die Schafräude stets von Neuem durch Ankauf von Schafen aus den benachbarten Kleinstaaten eingeschleppt werden wird.

10. Reg.-Bez. Erfurt. Die im Allgemeinen sehr dürftigen Andeutungen des statistischen Materials erwähnen Ausbrüche der Schafräude in:

3 Ortschaften	des Kreises	Langensalza,
3	-	Mühlhausen,
1 Ortschaft	-	Nordhausen.

In einem Falle wird berichtet, dass die Einschleppung von räudekranken Schafen benachbarter Ortschaften ausgegangen ist, im Uebrigen werden nur die nackten Zahlen mitgeteilt. Nach einer Bemerkung des Departementsthierarztes herrscht die Schafräude noch in den Kreisen Mühlhausen, Worbis, wahrscheinlich auch in den Kreisen Heiligenstadt und Langensalza, während die übrigen Kreise des Bezirkes für räudefrei angesehen werden können.

11. Reg.-Bez. Schleswig. Die Berichte erwähnen — ohne irgend welche weitere Bemerkungen —, dass die Schafräude in 3 Ortschaften

des Kreises Segeberg und in 1 Ortschaft der Kreises Stormarn geherrscht hat.

12. Reg.-Bez. Hannover. Nach den Berichten ist die Räude constatirt worden:

in 3 Ortschaften des Kreises Hameln,			
- 2	-	-	Springe,
- 2	-	-	Sulingen,

Ueber die Ursachen der Ausbrüche fehlen alle Angaben. Die Krankheit herrscht jedenfalls noch stark verbreitet im ganzen Regierungsbezirk; auf dem Schlachtviehmarkt in Hannover erwiesen sich 15 Schafrtransporte mit der Räude behaftet, dieselben stammten zum Theil aus Kreisen, deren beamtete Thierärzte die Schafräude in ihren Berichten nicht erwähnen. Mehrfach äussern sich die Kreisthierärzte, dass ihnen über den Stand der Schafräude nichts bekannt geworden sei.

13. Reg.-Bez. Hildesheim. Während des Berichtsjahres wurden Ausbrüche beobachtet:

Kreis Duderstadt in 2 Ortschaften,		
- Ilfeld	- 1	-
- Northeim	- 2	-
- Peine	- 4	-

Nur bezüglich eines Ausbruches wird erwähnt, dass derselbe eine anscheinend vollkommen geheilte Gemeindeherde betraf. Im Uebrigen fehlen Bemerkungen über die ursächlichen Verhältnisse. In Goslar sind seit langer Zeit 79 Bestände räudekrank, dieselben werden im Sommer in vier Herden von zwei Schäfern geweidet, im Winter nimmt jeder Besitzer seine Schafe in das Gehöft und bemüht sich die Räude durch Schmierkuren niederzuhalten. Eine Controle der zahlreichen Bestände ist nicht durchzuführen, selbst nicht einmal der Verkauf aus den einzelnen Beständen kann verhindert werden. Das im Sommer 1885 durchgeführte Badeverfahren blieb ganz ohne Erfolg.

14. Reg.-Bez. Lüneburg. Nach den Berichten wurde die Räude constatirt:

Kreis Burgdorf in 17 Ortschaften,		
- Celle	- 5	-
- Fallingbostal	- 3	-
- Gifhorn	- 1	-

Nur bezüglich zweier Ausbrüche wird erwähnt, dass dieselben durch Ankauf von Schafen aus dem Kreise Hoya bzw. durch den Schafhandel vermittelt worden sind. Der Departementsthierarzt berichtet: die Kreise Blekede, Dannenberg, Harburg, Lüneburg, Lychen, Uelzen und Winsen können als räudefrei bezeichnet werden, dagegen sind noch mehr oder minder verseucht die Kreise Burgdorf, Celle, Fallingbostal, Gif-

horn, Isenhagen und Soltau; die zuletzt genannten vier jedenfalls sehr viel stärker, als das statistische Material anzunehmen berechtigt.

15. Reg.-Bez. Stade. Die Tabellen zur Viehseuchenstatistik erwähnen Ausbrüche der Schafräude:

in 2 Ortschaften des Kreises	Blumenthal,
- 1 Ortschaft	- - Bremervoerde,
- 6 Ortschaften	- - Geestemünde,
- 1 Ortschaft	- - Stadeln,
- 1 -	- - Kehdingen,
- 3 Ortschaften	- - Lehe,
- 1 Ortschaft	- - Osterholz,
- 1 -	- - Otterndorf,
- 1 -	- - Stade-Geest,
- 2 Ortschaften	- - Verden,
- 1 Ortschaft	- - Zeven.

In einem Orte brach die Krankheit nach längerer Pause unter anscheinend vollständig geheilten Beständen aus, in zwei Orten gab Ankauf von kranken Schafen, in einem Benutzung einer gemeinschaftlichen Weide Anlass zu Ausbrüchen der Seuche. Im Allgemeinen kann wohl behauptet werden, dass die Schafräude noch umfangreich verbreitet herrscht, dass jedoch in vielen Fällen die Zahl der verseuchten Bestände und der Grad der Erkrankung bei den einzelnen Schafen erheblich abgenommen hat.

16. Reg.-Bez. Osnabrück. Abgesehen von der Thatsache, dass die Räude in einem Orte des Kreises Lingen constatirt worden ist, beschränken sich die Berichte auf ganz allgemeine Andeutungen, wie z. B.: über den Stand der Schafräude kann nicht berichtet werden, — Revisionen der erkrankten Herden haben nicht stattgefunden —, der Erfolg des Badeverfahrens bleibt abzuwarten —, man ist wiederum mit der vorgeschriebenen Schafwäsche beschäftigt, welche bisher nichts geholfen haben soll u. s. w.

17. Reg.-Bez. Aurich. Das statistische Material erwähnt nur das Erkranken eines Schafes im Kreise Emden und enthält im Uebrigen keine Mittheilungen über die Schafräude.

18. Reg.-Bez. Münster. Während des Berichtsjahres wurden Ausbrüche der Schafräude constatirt:

in 5 Ortschaften des Kreises	Ahaus,
- 1 -	- - Beckum,
- 4 -	- - Kösfeld,
- 8 -	- - Lüdinghausen,
- 11 -	- - Landkr. Münster.

Ueber die Verhältnisse der Einschleppung fehlen alle Angaben; drei räudekranke Herden wurden auf dem Schafmarkt in Haltern ermittelt. Sämmtliche räudekranke Schafherden sind dem Badeverfahren unter-

worfen und dann als geheilt vorläufig von den bis dahin aufrecht erhaltenen Verkehrsbeschränkungen befreit worden. Die Berichterstatter erwähnen mehrfach, dass die ländliche Bevölkerung allmählich anfängt, die guten Erfolge der Radikalbehandlung anzuerkennen, und dass die Verbreitung der Räude entschieden abgenommen hat. Am stärksten verseucht sind noch immer die sogenannten Wanderherden, welche häufig ihren Standort und durch Zukauf und Verkauf ihre Kopfzahl wechseln. Ebenso kommen zahlreiche Räudeausbrüche auch in solchen Herden vor, deren Schafe aus verschiedenen Gegenden zusammengekauft waren. Im Kreise Warendorf sind so viele neue Herden angeschafft, dass die nochmalige Anfertigung von Listen erforderlich wurde.

19. Reg.-Bez. Minden. Constatirt wurde die Räude in:

2	Ortschaften des Kreises	Herford,
7	-	- Paderborn,
3	-	- Warburg.

Das Herrschen der Krankheit in einem Orte wurde auf dem Markt in Büren ermittelt. Ankauf von Schafen aus dem Reg.-Bez. Kassel gab Anlass zum Auftreten der Räude in einem Orte.

Unter den drei westfälischen Bezirken scheint die Tilgung der Schafräude im Reg.-Bez. Minden die meisten Fortschritte gemacht zu haben. Trotz des hartnäckigsten Widerstandes der ländlichen Bevölkerung ist das Baderverfahren in den meisten Ortschaften durchgeführt, jedoch wurde in einzelnen Kreisen auch die Vornahme von Schmierkuren gestattet, wenn nur wenige Procente der Herde sich räudekrank zeigten. Nach den Berichten sind durch Schmierkuren vollständig geheilt:

Kreis Bielefeld	1182	Schafe Bestand,	1182	geheilt.
- Lübbecke	131	-	-	131
- Minden	1072	-	-	783
- Wiedenbrück	6212	-	-	6009

In dem früher stark verseuchten Kreise Halle ist die Räude angeblich ganz und gar, in anderen Kreisen zum grössten Theil oder derartig getilgt, dass nur noch 1—10 pCt. der Herden merklich krank erscheinen. Dabei wird jedoch die Befürchtung ausgesprochen, dass erneute Ausbrüche durch die Wanderherden bezw. durch den Schafhandel vermittelt werden dürften, oder dass die Krankheit wieder aus dem Fürstenthum Lippe-Detmold eingeschleppt wird.

20. Reg.-Bez. Arnsberg. Die Berichterstatter entschuldigen häufig die ungemein grosse Dürftigkeit ihrer Angaben dadurch, dass

Revisionen der behandelten Herden nicht stattgefunden haben. Während des Berichtsjahres wurden Ausbrüche der Schafräude constatirt:

in 1 Ortschaft	des Kreises	Arnsberg,
- 1	-	Brilon,
- 4 Ortschaften	-	Bochum,
- 2	-	Gelsenkirchen,
- 9	-	Hattingen,
- 5	-	Lippstadt,
- 2	-	Meschede,
- 4	-	Soest.

13 räudekranke Herden wurden bei Beaufsichtigung der Schafmärkte ermittelt, mehrfach gaben angekaufte kranke Schafe Anlass zur Einschleppung, oder die Krankheit brach von Neuem in scheinbar geheilten Beständen aus. Nach den Bemerkungen herrscht die Schafräude noch viel stärker verbreitet, als das statistische Material annehmen lässt; mangelhafte Beaufsichtigung und schlechte Behandlung der Schafe von Seiten der Besitzer erschweren ungemein die Tilgung der Krankheit, welche durch den Schafhandel nach den verschiedensten Richtungen verschleppt wird.

21. Reg.-Bez. Kassel. Derselbe kann wohl als derjenige bezeichnet werden, in welchem die Schafräude zur Zeit am verbreitetsten herrscht; nur aus den Kreisen Gersfeld, Marburg, Schmalkalden und Wolfhagen wird nicht über das Auftreten der Seuche berichtet; dieselbe wurde nach dem vorliegenden Material während des Berichtsjahres constatirt:

Kreis	Eschwege	in 2 Ortschaft.,	Kreis	Hünfeld	in 27 Ortschaft.,
-	Frankenberg	- 12	-	Kirchhayn	- 1
-	Fritzlar	- 10	-	Melsungen	- 3
-	Fulda	- 4	-	Rinteln	- 1
-	Gelnhausen	- 2	-	Rotenburg	- 26
-	Hanau	- 1	-	Schlüchtern	- 2
-	Hersfeld	- 1	-	Witzenhausen	- 3
-	Hofgeismar	- 3	-	Ziegenhayn	- 20
-	Homberg	- 5	-		-

In 16 Orten brach die Krankheit nach längerer Pause in früher versucht gewesenen Beständen von Neuem aus, in 25 Orten gab Ankauf von kranken Schafen — je einmal aus Bayern und aus Lippe-Deilmold — bzw. der rege Schafhandel Anlass zu dem Auftreten der Seuche, mehrfach wurde dieselbe auf Schafe benachbarter Ortschaften übertragen.

Nach den Bemerkungen des Departementsthierarztes herrscht die Räude im Regierungsbezirk noch ebenso verbreitet wie früher, nur der Grad der Erkrankung hat abgenommen. Die Schafbesitzer wollen sich noch immer nicht dazu verstehen, der Räude eine grössere Aufmerk-

samkeit zuzuwenden; dieselben bemühen sich noch weniger eine Wiedereinschleppung der Krankheit durch sorgfältige Auswahl der angekauften Schafe zu verhüten. Gewöhnlich wird zu lange nach der Schur gewartet, ehe man das Badeverfahren widerwillig zur Ausführung bringt, vielmehr fast durchweg mit einer besonderen Vorliebe auf die Schmierkuren zurückgegriffen, welche auch bei einigen Kreis-thierärzten in jeder Beziehung Begünstigung finden. Besitzer und Schäfer versäumen in der Regel solche Schafe, bei denen sich nach dem Badeverfahren wieder Spuren des Ausschlages zeigen, von den übrigen Thieren zu trennen und einer erneuten Räudewäsche zu unterwerfen; man glaubt genug gethan zu haben, wenn man bei diesen Schafen wieder mit der Schmierkur beginnt. Auf ganz besonders grosse Schwierigkeiten stösst die Unterdrückung der Räude in den Gemeindeherden.

22. Reg.-Bez. Wiesbaden. Die Schafräude wurde constatirt in je einer Ortschaft der Kreise Biedenkopf — Wiederausbruch nach zwei Jahren —, Ober-Taunuskr. — in einer angekauften Herde —, Unter-Taunuskr. und Wiesbaden.

23. Reg.-Bez. Koblenz. Es wird nur über einen Ausbruch im Kreise Simmern berichtet, derselbe betraf auf einem Markte angekaufte Schafe.

24. Reg.-Bez. Düsseldorf. Während des ersten Quartals wurden Ausbrüche der Räude in 8 Ortschaften des Landkreises Düsseldorf constatirt. Von den betreffenden Herden waren 6 in Westfalen, je eine im Reg.-Bez. Kassel bezw. Düsseldorf angekauft. Im vierten Quartal erwiesen sich je eine Herde in den Kreisen Grevenbroich und Neuss mit der Räude behaftet. Die Einschleppung wird nicht erwähnt. Die im Kreise Grevenbroich erkrankte Herde ist nach dem Auslande verkauft worden.

Es hat den Anschein, dass die Schafräude in dem früher stark verseuchten Regierungsbezirk am Schlusse des Berichtsjahres getilgt war.

25. Reg.-Bez. Trier. Das Herrschen der Seuche in Erweiler, Kr. St. Wendel, wurde bei Gelegenheit der Marktrevisionen ermittelt. Die starke Verbreitung der Seuche im Orte und die dicken Borken auf der Haut der Schafe lassen vermuthen, dass die Räude schon lange Zeit in Erweiler geherrscht haben muss. Genaue Untersuchungen zeigten, dass zahlreiche Schafe in vier weiteren Orten desselben Kreises räudekrank waren, meistens sogenannte Lehnsschafe, d. h. solche, welche andere Besitzer in Fütterung gegeben hatten. Die Verbreitung




ist jedenfalls durch den starken Schafhandel wesentlich begünstigt worden. Unmittelbar vor Constatirung der Krankheit kauften Händler die räudekranken Schafe zum grossen Theil zusammen und trieben dieselben nach dem Grossherzogthum Luxemburg, ein anderer Theil der räudekranken Herden ist nach der bayerischen Pfalz verkauft worden. Der Bericht spricht die Vermuthung aus, dass die Einschleppung aus der Pfalz oder aus der oldenburgischen Enclave Birkenfeld erfolgt ist.

26. Reg.-Bez. Aachen. Das Auftreten der Schafräude beschränkte sich auf zwei Ortschaften des Landkreises Aachen — Einschleppung durch in Westfalen angekaufte Schafe — und auf eine aus Lothringen eingeführte Herde im Kreise Düren.


Das Berichtsmaterial, so lückenhaft dasselbe auch ist, liefert doch den Nachweis, dass die zur Tilgung der Schafräude von Sr. Excellenz dem Herrn Minister angeordneten strengeren Massregeln in den Provinzen Hannover, Westfalen und Hessen-Nassau nicht den gehofften Erfolg gehabt haben. Die Ursachen der geringen Fortschritte, welche die Tilgung der Schafräude in diesen Provinzen macht, sind wohl in erster Linie auf die längjährige weite Verbreitung der Krankheit und auf den Umstand zurückzuführen, dass die Schafbesitzer für die Unterdrückung der Räude kein Interesse haben, und sich häufig sogar einer Radikalbehandlung der Krankheit mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln widersetzen. Die zahlreichen Wiederausbrüche in scheinbar geheilten Beständen lassen vermuthen, dass die betreffenden Herden zu frühzeitig räudefrei erklärt worden sind, oder dass die Krankheit durch den als ungemein rege geschilderten Schafhandel immer von Neuem wiedereingeschleppt wird. In verhältnissmässig häufigen Fällen ist diese Einschleppung durch aus benachbarten Staaten angekaufte Schafe vermittelt worden, und vielfach wird geklagt, dass eine Unterdrückung der Räude überhaupt nicht erwartet werden kann, so lange in diesen benachbarten Ländern zur Tilgung der Räude nichts geschieht. Als weitere Schwierigkeiten sind die in den genannten Provinzen vielfach gehaltenen sogenannten Wanderherden, die aus den Schafen zahlreichen Besitzer bestehen, ferner die Gemeindeherden und die wirthschaftlichen Verhältnisse zu nennen, welche Anlass bieten, dass die Schafe anderer Besitzer in Fütterung gegeben werden. In allen soeben genannten Fällen ist eine zuverlässige Controle der einzelnen Schafbestände kaum durchführbar. Endlich wird als eine wesentliche Ursache des Misserfolges der angeordneten Radikalbehand-

lung erwähnt: dass die erforderlichen Massregeln in den einzelnen benachbarten Kreisen und kleineren Bezirken desselben Regierungsbezirks häufig sehr ungleich zur Ausführung gelangten, und die Ansicht ausgesprochen, dass eine grössere Uebereinstimmung des Verfahrens in den benachbarten Kreisen erheblich beitragen würde, die Unterdrückung der Schafräude in den stark verseuchten Provinzen zu fördern.


Ausbrüche der Rinderpest sind während des Berichtsjahres in Preussen nicht beobachtet worden.



4.




5.




4


Taf. II.



5.










Fig. 1.




Fig. 2.

